PRESENTED TO THE
Public Library of the City of Boston
SICUT PATRIBUS SIT DEUS NOBIS
BOSTONIA
CONDITA AD
1630.
QUIBUS HEGEMINE DOMATA AUDIT
By Joshua Bates, Esq.
Received 21 Feb. 1854 No.
38.19.5
V.1.
22028

Reinhardsbrunn

Gemeinnützige

Naturgeschichte

Deutschlands

nach allen drey Reichen.

Ein

Handbuch

zur deutlichern und vollständigern

Selbstbelehrung

besonders

für Forstmänner, Jugendlehrer und Oekonomen

von

J. M. Bechstein.

Erster Band

welcher die nöthigen Vorkenntnisse und die Geschichte der Säugethiere enthält.

Mit Kupfern.

Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Leipzig,

bey Siegfried Lebrecht Crusius.

1801.

Gemeinnützige

Naturgeschichte

der

Säugethiere Deutschlands

für allerley Leser

vorzüglich

für Forstmänner, Jugendlehrer und Oekonomen

von

J. M. Bechstein.

Mit Kupfern.

Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Leipzig,

bey Siegfried Lebrecht Crusius.

1801.

Dem

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn

Herrn

Ernst dem Zweyten

regierenden Herzog zu Sachsen-Gotha

und Altenburg,

meinem gnädigsten Landesvater.

Durchlauchtigster Herzog,

Gnädigster Herr!

Unter Ew. Durchlaucht landesväterlichem Schutze bearbeitete ich bisher dasjenige wissenschaftliche Feld, von welchem ich jetzt die Erstlinge einzusammeln

meln wage. Dieſe Erſtlinge Ew. Durchlaucht als ein Dankopfer zu weihen, gebeut mir nicht nur die Pflicht eines Herzens, welches das Glück zu ſchätzen weiß, unter einem ſolchen Für-

ſten

sten zu leben, sondern auch die Wissenschaft selbst, welche, wie alle Wissenschaften und Künste, Ew. Durchlaucht hohen Huld und Beförderung sich zu erfreuen hat.

Mit

Mit solchen Gesinnungen leget ehrfurchtsvoll dieses Opfer nieder

Ew. Durchlaucht

unterthänigster

Johann Matthäus Bechstein.

Vorrede zur ersten Ausgabe.

Bekanntschaft mit den Produkten unserer Erde überhaupt ist jeder Menschenklasse nützlich; ganz vorzüglich aber die Kenntniß der vaterländischen. Oft, laut und nachdrücklich sagten dieß die aufgeklärtesten Männer, und ihr Zuruf wurde auch in unsern Zeiten so allgemein anerkannt, daß man es für überflüßig halten könnte, diese Behauptung hier nochmals auseinander gesetzt zu lesen. Allein die Wichtigkeit der Sache entschuldigt, glaube ich, jede Wiederholung. Mit den Worten meines würdigen Freundes, des Herrn Professor Salzmanns, der sie schon so oft in seinen Schriften auf das einleuchtendste dargestellt und eingeschärft hat, leg ich sie daher meinen Lesern nochmals ans Herz*).

„Ein

*) Noch etwas über die Erziehung von C. G. Salzmann S. 24. Ein mehreres hierüber findet man noch in Stuvens vortrefflichen Abhandlung

„Ein Hauptmangel in unserer Erziehungskunst, dem noch abgeholfen werden muß, ist dieser, daß man die Jugend zu wenig mit der Natur bekannt macht. Ein Hauptmangel ist es. Denn die Natur ist, nach einem bekannten Gleichniß, Gottes Buch, das die Macht, Weisheit und Güte seines Verfassers erzählt. Jede natürliche Wirkung ist eine Hieroglyphe, unter der die vortrefflichsten Wahrheiten verborgen liegen, die sich vorzüglich auf den Menschen beziehen. Eine jede von ihnen, einzeln betrachtet, ist eine Redensart, die aus dem Zusammenhange herausgerissen und unverständlich ist, die aber immer deutlicher wird, je aufmerksamer ich auf den Zusammenhang bin. Eine Menge von Insekten halte ich für unnütz, sie sind mir eine unverständliche Stelle in Gottes Buche, so lange ich sie außer dem Zusammenhange betrachte. Betrachte ich sie aber im Zusammenhange mit Melonen und Gurken, sehe ich, wie sie im Staube der männlichen Blumen sich pudern, von diesen auf die weiblichen überfliegen, und sie auf diese Art befruchten, so kann ich nicht anders, als mit dankbarer Empfindung, zu dem Allweisen empor sehen, die dunkle Stelle wird mir deutlich.

Je

lung über die Nothwendigkeit Kindern frühzeitig zu anschauender und lebendiger Kenntniß zu verhelfen. Braunschweig, 1788.

Je mehr Einsichten ich daher im Zusammenhange der Dinge, die um mich sind, bekomme, desto bekannter werde ich mit dem Allvater, desto herzlicher wird meine Ehrfurcht, meine Liebe, mein Vertrauen zu ihm. Das Erforschen der Hieroglyphen Gottes, das beständige Bestreben, den Zusammenhang seiner Werke, ihre Ursachen und Absichten, zu erforschen, ist auch der sicherste Weg, den Grad von Glückseligkeit zu erlangen, dessen unsere Natur fähig ist. Auf diesem Wege entsteht das Wahrheitsgefühl, der edelste Sinn, den Gott der menschlichen Natur ertheilt hat, durch den sie hoch über die Thiere des Feldes erhoben wird. Ein jedes riecht und schmeckt, und sieht und hört, und alle empfinden, manche übertreffen uns sogar in Ansehung einiger dieser Fähigkeiten. Wo ist aber das Thier, das solche herrliche Anlagen bekommen hätte, Gefühl für Wahrheit zu erlangen, als der Mensch? Die Schwalbe hat Gefühl für den Werth des Schlammes und vieler Insekten; hat sie aber auch Gefühl für den Werth der Blumen? Nur der Mensch, den Gott nach seinem Bilde schuf, kann für alle Wahrheiten Gefühl bekommen.

Was ist, fragt man, Wahrheit? Sie ist nichts anders, als Übereinstimmung unserer Vorstellung mit den Sachen. Wenn einer die Nessel als ein höchst schädliches Unkraut betrachtet, das Gott zur Strafe der Menschen erschaffen habe, ein anderer

derer aber sie als eine höchst nützliche Pflanze ansieht, auf wessen Seite ist wohl die Wahrheit? Sinn für Wahrheit aber, oder Wahrheitsgefühl, ist nichts anders als das Vermögen, sich die Sachen so vorzustellen, wie sie sind.

Diesen edlen Sinn erlangt man, wie gesagt, am sichersten, durch Betrachtung der Natur, oder welches einerley ist, der Werke Gottes. Denn wo in der ganzen Welt ist denn ein sicherer Weg, zur richtigen Vorstellung der Sachen zu gelangen, als die Betrachtung derselben? Um es recht fühlbar zu machen, so betrachte man einen recht rohen Bauer, der für nichts, als für sein Vieh, seinen Pflug, Wagen und Acker Theilnehmung hat, und einen Mann, der es zu seinem vorzüglichsten Geschäffte macht, die Werke Gottes zu betrachten. Jener schreyt, der liebe Gott ist böse, so oft es einen Donnerschlag thut, er zweifelt an Gottes Vorsehung, wenn der Regen und Sonnenschein nicht immer so eintreffen, wie er es wünscht, er betrachtet jedes Feld als ein verfluchtes Land, das keinen Roggen und Waizen trägt, verwünscht die Mäuse als Ungeziefer, und die Quecke als Unkraut. Dieser hingegen findet allenthalben Stoff zu frommen Empfindungen, guten Entschliessungen und nützlichen Handlungen. Jeder Donnerschlag fordert ihn zur Dankbarkeit gegen den Donnerer auf; jede außerordentliche Witterung reitzt seine Wißbegierde, und nährt sie. Er besäet die Felder,

die

die unfähig sind, Roggen und Waizen zu tragen, mit Fichten, Kiefern, oder Espersette, oder bepflanzt sie mit Erlen, und freut sich gar herzlich darüber, daß der gute Gott so mancherley Erdarten zur Hervorbringung von so mancherley Gewächsen bereitet hat; die Vermehrung der Mäuse und anderes, ganz fälschlich sogenannten, Ungeziefers. (In des weisen Gottes Welt giebt es kein Ungeziefer. Behaupten, daß Gott Ungeziefer, oder schädliche und unnütze Geschöpfe gemacht habe, ist eben so viel, als versichern, daß der Verfasser des schönen Buchs der Natur sich in dieser, oder jener Stelle, geirrt habe.) reizt ihn ihre Natur zu erforschen, und auf Mittel zu denken, ihre Anzahl zu vermindern. Und die Quecke sammelt er sich ein, um daraus ein Genesungsmittel zu bereiten.

Durch diesen Wahrheitssinn empfangen wir innigere, reinere und dauerhaftere Freuden, als durch irgend einen andern. Millionen Vergnügungen, die dem lebenslang unbekannt bleiben, dem dieser Sinn mangelt, strömen uns aus allen Weltgegenden entgegen. Das Entwickeln des Schmetterlings aus seiner Raupe und Nymphe, die Frühlingsblumen und die Herbstfrüchte, alles führt Vergnügen bey sich, das der, der diesen Wahrheitssinn hat, empfindet, unterdessen, daß der andere, dem dieser Sinn mangelt, dabey steht, wie der Blinde bey einem Gemählde.

An der Natur können auch alle Kräfte, die uns Gott gab, am sichersten und nützlichsten geübt werden. Willst du dein Gesicht üben, so betrachte recht aufmerksam bald den Bau der Blume, oder eines Insekts, bald eine geräumige Landschafft! Soll dein Ohr vollkommner werden, so merke auf den Gesang der Vögel, und lerne sie an ihren Tönen von einander unterscheiden! Willst du dem Geruche mehr Vollkommenheit geben, so verschließe die Augen und versuche, ob du nicht verschiedene eingesammelte Kräuter durch den Geruch von einander unterscheiden kannst! Strebest du nach körperlicher Stärke, so bearbeite den Garten; wünschest du aber lieber geschickte Finger, so zeichne die Blumen, die in demselben wachsen! Willst du deine Einbildungskraft stärken, so fasse eine schöne Gegend in die Augen, beobachte genau die Mannichfaltigkeiten derselben, und die Ordnung, in der sie mit einander verbunden sind! Dann wende dich um, und gieb dir Mühe, dieß Bild in deiner Seele wieder darzustellen. Willst du Ordnung in deinen Gedanken lernen, so beschreibe alles, was du in einer gewissen Gegend bemerkt hast! Fühlst du Neigung zum Redner, Dichter oder Mahler, so beobachte erst, laß deine Beobachtung dich begeistern, dann stelle vor, was du beobachtet hast, und du wirst Beyfall finden! Willst du Scharfsinn lernen, so übe dich die Merkmale aufzusuchen, durch welche die Gattungen der

Din-

Dinge von einander unterschieden sind! Verlangst du Uebung in der Abstraction, so untersuche erst die Aehnlichkeit zwischen dem Roßkäfer und dem Maykäfer, dann zwischen dem Käfer und Krebse, weiter zwischen dem Insekte und dem Fische, dann zwischen dem Thiere und der Pflanze, dem Metalle u. dgl. Willst du die wahre Philosophie des Lebens erlernen, so spüre den Ursachen nach, aus welchen die Wirkungen der Natur entspringen!

Die Natur ist auch das allgemeine Behältniß von Mitteln gegen das menschliche Elend und zur Vermehrung menschlicher Glückseligkeit. Je tiefer wir in dasselbe eindringen, desto mehr muß sich die Summe der Leiden vermindern, und die Summe der Freuden vergrößern. Es ist gewiß kein Uebel denkbar, gegen welches der gute Gott nicht ein Gegenmittel in die Natur gelegt hätte, und kein Ziel kann sich ein gesunder Menschenverstand als erreichbar denken, zu dessen Erreichung nicht die Hülfsmittel in Gottes großem Magazine zu finden wären. Und der sicherste Weg, dieß alles zu finden, kann dieser wohl ein anderer seyn, als das Suchen?

Wie saumselig ist man aber zeither gewesen, die Menschen mit der Natur bekannt zu machen! Wer daran zweifelt, der stelle nur mit dem ersten, dem besten, seiner Nebenmenschen eine kleine Unterredung über die Dinge an, die zunächst um ihn sind. Er wird viele Gelehrte finden, die

den Waizen von dem Roggen nicht zu unterscheiden wissen, und die im ganzen Ernste behaupten, daß die Frösche, mit welchen, nach warmen Sommerregen oft unsere Felder bedeckt sind, mit dem Regen herabgefallen wären; Künstler und Handwerker, die Meilen weit durch die blumenreichsten Gegenden wandeln können, ohne darinne etwas merkwürdiges zu finden. Selbst der Landmann, der beständig im Schooße der Natur lebt und webt, kennt oft von den Dingen, die um ihn sind, weiter nichts, als was ihm Geld einbringt.

Beweises genug, wie mangelhaft noch unsere Schulen und Erziehungsanstalten in Ansehung dieses Punktes sind. Freylich immer eine mehr, die andere weniger mangelhaft."—

Dank sey es der Vorsehung, daß es auch in diesem Stücke schon besser geworden ist! Für alle Menschen, von den höchsten bis zu den niedrigsten Ständen, wird jetzt die Naturkenntniß fast allgemein als eine nützliche und nothwendige Kenntniß anerkannt; nur in der Auswahl und der gehörigen Scheidung findet oft noch Zwecklosigkeit und Mangelhaftigkeit statt. Doch hört man auch schon jetzt in manchen Schulen unsers Vaterlands eher vom Fuchs, als vom Parder, eher von der Gans, als vom Straus, eher von der Viper, als der Brillenschlange, eher vom Regenwurm, als der Seemaus, eher von der Tanne, als von der Ceder, eher vom Töpferthon, als von der japanischen

panischen Porcellanerde sprechen. Man findet es allgemach seltsam, seine Blicke nach den Schätzen und Schönheiten der Natur in den entferntesten Ländern hinzuwenden, und das zu übersehen, was dieselbe so nahe um uns hingelegt hat, was so nahe mit uns verbunden ist, und oft unmittelbar auf uns wirkt. So unnöthig einem deutschen Frauenzimmer zu ihrem Schmucke die Perlen zu seyn scheinen, deren Aufsuchung so vielen Menschen das Leben kostet; so überflüßig ist demselben auch dann noch ihre Naturgeschichte, wenn es noch nicht die Entstehung der Wolle, des Flachses, welche Produkte es täglich bearbeitet, näher kennen gelernt hat. So wahr und natürlich es ist, daß derjenige, der sich einer großen Menschenkenntniß rühmt, sich selbst erst genau kennen muß; eben so wahr und natürlich ist es, daß derjenige, der die Natur kennen lernen will und soll, zuerst eine genaue Kenntniß von dem haben muß, was aus dem Reiche der Natur zunächst in seine Sinne fällt.

Zu diesem Behufe habe ich es in vorliegendem Versuche gewagt, die Bewohner unsers Vaterlandes mit den Gegenständen und Schönheiten, welche die Natur in demselben verbreitet hat, näher bekannt zu machen. Plan und Zweck des Ganzen wird, deucht mir, jedem so gleich aus der Bearbeitung dieses ersten Bandes einleuchten.

Die Uebersicht der Landcharte von Deutschland, die Aufzählung aller Berge, Seen und Flüsse, der feurigen und wässerigen Lufterscheinungen, die Anzeigen und Listen von Witterungs- und Jahrszeitenbeobachtungen u. s. w. wird man also hier vergeblich suchen; statt dessen aber eine, so viel als möglich, vollständige und practische Naturgeschichte von und für Deutschland finden. Da ich meine Beobachtungen in Thüringen gesammelt habe, und die Geschichte der Natur dieses Theils von Deutschland, der durch seine abwechselnde Lage und Boden so reich an mancherley Naturalien ist, aus besonderer Neigung und Beruf schon von Jugend auf aus der Quelle selbst schöpfen konnte, so wollte ich vorhero bloß die Naturgeschichte dieser Gegend bearbeiten; entschloß mich aber der Gemeinnützigkeit halber die Bearbeitung auf ganz Deutschland auszudehnen. Daraus läßt sich die doppelte Aufzählung der Produkte Deutschlands und Thüringens erklären, woraus am Ende des Werks, nicht nur eine Fauna, Flora, und Mineralogia Germanica, sondern auch Thuringica entstehen wird.

Ich bestimme mein Werk jedem Liebhaber der Natur, vorzüglich aber dem Forstmann, Jugendlehrer und Oekonomen; denn ich glaubte, für diese drey Stände ließen sich die Materialien auf eine solche schickliche Art mit einander verbinden, daß für das

Fach

Fach eines jeden einzeln, ohne besondern Nachtheil der übrigen, hinlänglich gesorgt würde. In wie weit mir dieß gelungen oder nicht gelungen sey, davon werden mich Kenner belehren.

Der Forstmann, von dem man eigentlich von jeher mit Recht eine vorzügliche und genaue Kenntniß in dieser Wissenschaft hätte fordern sollen, wird hier die nöthige Anleitung, und zwar in seiner Sprache, in welcher er alles so gern ausgedrückt wissen will, finden, wird hier die Hauptgegenstände seines Fachs systematisch kennen lernen, und nach den detaillirten Beschreibungen in den Stand gesetzt werden, künftig seine Beobachtungen und Entdeckungen selbst zu ordnen. Möchte es doch eher dahin gekommen seyn, daß man diesen Theil der Naturwissenschaft zu einem Gegenstande seines Berufs, ohne welche er doch weder ein wahrer Jäger noch Forstmann seyn kann, gemacht hätte; wir würden dann schon längst in derselben die wichtigsten Fortschritte gemacht haben, da er, durch Zeit und Gelegenheit so sehr begünstigt, fast nur allein im Stande ist, die wichtigsten Kapitel in derselben zu vervollständigen und zu berichtigen! Zur Einsicht in den Zusammenhang aller Dinge, zur Uebersicht des Plans der Schöpfung auf unserer Erde und der Naturkette unsers Planeten ist das Kapitel Nahrung das allervorzüglichste, da sie das eigentliche Bindeglied in der ganzen Kette zu seyn scheint. Wer kann aber

wohl die hier hergehörigen Data besser und vollständiger liefern, als der Forstmann, der zu allen Zeiten, um in seiner Sprache zu reden, die Thiere sich äsen sehen, sie zu allen Jahrszeiten in diesen Geschäfften beobachten, ihre Mägen und Kröpfe untersuchen kann, der fast der beständige Zuschauer aller Vegetation u. d. g. ist?

Der Jugendlehrer wird hier ein Magazin finden, aus welchem er seinen Kindern alles das, was zunächst um sie ist, vorlegen kann, Materialien, die er nur nach Zeit und Zweck zu ordnen nöthig hat. In Absicht der Zeit können ihm die Kalender, die jeder Classe beygefügt werden sollen, die nöthige Anleitung geben. Seinen besondern Zweck aber muß er selbst zu beurtheilen im Stande seyn, so, daß er diesem gemäs nicht nur seine Schüler mit alle dem bekannt macht, was ihrer Fassungskraft, und ihrem Kindersinn nach der Verschiedenheit der Jahre am angemessensten ist, sondern auch vorzüglich auf ihre verschiedene Bestimmung Rücksicht nimmt, dem künftigen Landmann, was für ihm gehört, dem Bürger, was ihm nützen kann, und so auch dem Studirenden mehr das, was ihm am angemessensten ist, vorträgt u. s. w. Hierbey dürfen ihm die Rubriken Jagd u. d. gl., die nur eigentlich für den Forstmann zugehören scheinen, nicht überflüßig seyn, da es keinen schicklichern Ort giebt, wo diese Kenntnisse, die in wenigen Technologien vorkommen, den

Kin-

Kindern mitgetheilt werden können; besonders da ihm bald die Erfahrung sagen wird, daß diese Kenntnisse und insbesondere die Jägersprache der Aufmerksamkeit der Kinder einen vorzüglichen Reitz geben, und ihnen das Studium der Natur angenehm und interessant machen.

Meiner Einsicht nach darf sich auch die genauere Bekanntschaft mit der Naturgeschichte auf gelehrten Schulen nicht über die Gränzen der vaterländischen erstrecken; das was zur Verständlichkeit der ausländischen Produkte in der Geographie nöthig wäre, würde, wie billig, in dieser Wissenschaft beyläufig berührt, und eigentliche ausländische Naturgeschichte gehörte dann für den Liebhaber auf Universitäten, wo auch gewöhnlich Cabinette zu intuitiver Kenntniß angelegt sind, die den Schulen fast immer mangeln. Es ist eine solche Scheidung, die man, wie hier, also auch in der Mathematik noch immer vermißt, um so nothwendiger, je mannichfaltiger jetzt die Kenntnisse und Geschicklichkeiten werden, die man von einem Gelehrten verlangt. Und auch zu diesem Behufe wird man in der allgemeinen Uebersicht der Classen, Ordnungen und Gattungen für diejenigen, die dieses Buch als Handbuch in dieser Rücksicht brauchen wollen Anleitung finden.

Der Oekonome endlich wird nicht nur von dem, was ihm nützt, sondern auch von dem, was ihm schadet, und womit er diesen Schaden abwenden

kann, hinlängliche Kenntnisse erhalten; er wird von manchem Aberglauben und Vorurtheile befreyt, und durch eine allgemeinere, größere und genauere Einsicht in die Dinge, die in seinem Wirkungskreise liegen, in den Stand gesetzt werden, mit mehr Leichtigkeit, Gründlichkeit und Gewißheit die besondern Zwecke seines Berufs zu erfüllen.

Jedoch nicht bloß für die genannten drey Stände, die ich bey meiner Arbeit immer besonders im Auge hatte, sondern auch für den Kenner der Natur selbst, für den gelehrten Naturforscher, schmeichele ich mir, ohne die Bescheidenheit zu beleidigen, nicht umsonst gearbeitet zu haben. Ich gestehe es zwar gerne, daß ich die Werke eines Blumenbachs, Gatterers, Götze's, Leske's, Schrebers u. a. m. auch bey diesem ersten Theile benutzt habe, und daß in diesen Büchern, besonders in den Beschreibungen der Säugethiere des letztern, so weit sie vorgerückt sind, fast alles erschöpft ist, was zu einer vollständigen Geschichte dieser Classe gehört. Allein da ich, so viel als möglich, nichts niederschrieb, was ich nicht selbst gesehen und beobachtet hatte, so hoffe ich, daß eine solche Bestätigung jedem Naturforscher angenehm seyn werde. Sind wohl irgend einer Wissenschaft dergleichen Bestätigungen nöthiger, als der Naturgeschichte? Da ich von Jugend auf der Natur in ihren Schlupfwinkeln nachspürte,

und

und mir die dazu gehörigen Fertigkeiten und Geschicklichkeiten, z. B. die Jägerkenntnisse erwarb, so hatte ich oft Gelegenheit schon gesagte Sachen bestätigt, oder widerlegt zu finden; daher in meinem Buche mancher Zusatz, manche Erläuterung, manche Verbesserung und Berichtigung, die man nirgends antreffen wird.

Eben so habe ich auch, so viel als möglich, mich bemüht, passende Trivialnamen für die Arten zu wählen, die ich durch die ganze vaterländische Naturgeschichte fortzusetzen gedenke, wodurch man, wenn sie Beyfall und allgemeine Aufnahme finden, in den Stand gesetzt wird, sich auch in der deutschen Sprache jedem, gelehrten und ungelehrten, Naturkenner verständlich zu machen.

In den drey folgenden Bänden, welche die Geschichte der Vögel Deutschlands enthalten werden, hoffe ich, mehr Neues sagen zu können, da in diesem Theile der Naturgeschichte weniger vorgearbeitet ist, als in den übrigen. Besonders werde ich die Verwirrung und Unbestimmtheit in den Beschreibungen der Singvögel zu verbessern und zu heben mich bemühen, mit Abbildungen zu erläutern suchen, und auch manche neue Entdeckung beyfügen können.

In allen übrigen Theilen der Naturgeschichte werde ich mich auch in den Beschreibungen kürzer fassen können, wenn durch diesen ersten meine ungeübten Leser erst geübt genug sind, auch eine mehr gedrungene Sprache in dieser Wissenschaft zu fassen.

Nur von den seltensten, interessantesten und merkwürdigsten Naturalien werde ich allezeit Abbildungen liefern.

Gott gebe, daß auch diese Arbeit etwas zu seiner Verherrlichung und zur Vervollkommnung, Freude und Glückseligkeit der Menschen beytragen möge!

Schnepfenthal, im Februar. 1789.

Der Verfasser.

Vorrede zur zweyten Ausgabe.

Meine Bemühungen die Freunde und Verehrer der vaterländischen Natur auf unsern beflügelten und unbeflügelten Mitbewohner aufmerksam zu machrn, sind, wie ich aus schriftlichen und mündlichen Zeugnissen weiß, nicht vergeblich gewesen. Einen nicht geringen Beweis davon giebt auch der Vergriff der ersten Ausgabe dieser Schrift. Ich habe es daher um so mehr für meine Pflicht gehalten, derselben sowohl nach den zeitherigen Fortschritten der Wissenschaft überhaupt, als auch nach den von mir selbst gemachten neuen Beobachtungen und Erfahrungen, eine, so viel meine Kräfte vermögen, veränderte und verbesserte Gestalt zu geben. Selbst der Gebrauch, den ich und andere von derselben gemacht haben, hat Berichtigungen und Zusätze veranlaßt, wodurch, wie ich hoffe, dieses auf Gemeinnützigkeit abzweckende Werk aufs neue seiner Vollkömmenheit um einige Schritte näher gerückt ist.

Eine kleine Vergleichung dieser Ausgabe mit der vorhergehenden wird den Leser in den Stand setzen, zu urtheilen, ob ich wirklich von meinen eignen und von den fremden neuen Beobachtungen und Erfahrungen zweckmäßigen Gebrauch gemacht habe.

Daß

Daß ich die Säugethiere nicht wieder nach dem Linneischen Systeme aufgestellt habe, wird hoffentlich niemanden auffallen, da ich durch eigene Erfahrungen, die vorzüglich beym Unterrichte selbst gemacht sind, wahrgenommen habe, daß die von mir jetzt aufgestellte Methode übersichtlicher und faßlicher seyn muß als jene, und dieß ist ja bis jetzt noch der Hauptnutzen, den eine Classification leisten kann. Sollte jemand demohngeachtet die Linneische dieser vorziehen, so wird er die hier beschriebenen Säugethiere sehr leicht nach derselben ordnen können, da sie ja auch, so wie die Blumenbachische in der Einleitung angegeben ist.

Meinem Plane nach sollten bloß die seltensten und merkwürdigsten Thiere in Abbildungen beygefügt werden; da aber mehrere meiner Leser den Wunsch geäußert haben, daß ich doch wenigstens für jede Gattung eine Kupfertafel beysetzen möchte, um etwas Anschauliches zur Bestimmung derselben und ihrer Kennzeichen vor sich zu haben; so habe ich auch hierdurch die Gemeinnützigkeit dieser Schrift zu erhöhen suchen wollen. Man wird auch hierin die gewiß vortrefflichen Arbeiten des geschickten Naturforschers und Künstlers Herrn Capieux's zu Leipzig nicht verkennen.

Möchte doch diese neue Ausgabe abermals der Natur viele Freunde und Verehrer verschaffen!

Waltershausen, im Oct. 1800.

Der Verfasser.

Ver-

Verzeichniß der Kupfertafeln.

Taf. I.	Fig. 1. Das menschliche Herz. S. 121.
	— 2. Der Leipziger Maasstab oder der gewöhnliche Werkfuß. S. 285.
	— 3. Der französische Maasstab. —
Taf. II.	— 1. Deutsches Pferd. S. 226.
	— 2. Deutscher Ochs. S 309.
Taf. III.	— 1. Spanisches Schaf. S. 363.
	— 2. Gems. S. 429.
Taf. IV.	— 1. Steinbock. Nach Schreber. 400.
	— 2. Wildes Schwein. Desgl. 528.
Taf. V.	Damhirsch. S. 445.
	— 1. Männchen.
	— 2. Weibchen.

Taf.

Taf. VI. Fig. 1. Wolf. S. 608.
— 2. Rothluchs. S. 678.

Taf. VII. 1. Vielfraß. Nach Schreber. S. 718.
2. Dachs. Varietät. S. 729.

Taf. VIII. — 1. Frettchen. S. 791.
— 2. Großes Wiesel. Varietät. S. 802.

Taf. IX. — 1. Sumpfotter. Aus Pennant. S. 838.
— 2. Maulwurf. Varietät. S. 846.

Taf. X. — 1. Waſſerſpitzmaus. Nach Schreber. S. 872.
— 2. Grabende Spitzmaus. S. 879.

Taf. XI. — 1. Igel. Varietät. S. 893.
— 2. Meerſchweinchen. S. 911.

Taf. XII. — 1. Brandmaus. Varietät. S. 972.
— 2. Rüſſelmaus. Nach Schreber. S. 978.

Taf. XIII. — 1. Alpen ſ Murmelthier. Nach Schreber S. 1027.
— 2. Ohrloſes Murmelthier. Desgl. S. 1043.

Taf. XIV. — 1. Siebenſchläfer. Desgl. S. 1053.
— 2. Gartenſchläfer. Desgl. S. 1076.

Taf.

Taf. XV. Fig. 1. Haselschläfer. Desgl. S. 1069.
— 2. Eichhorn. Varietät. S. 1075.

Taf. XVI. — 1. Veränderlicher Hase. S. 1112.
— 2. Rauhflüglige Fledermaus. S. 1182

Taf. XVII. — 1. Blasse Fledermaus. Nach Schreber. S. 1170
— 2. Kleine Hufeisenflugmaus. 1194.

Taf. XVIII. — 1. Gemeiner Seehund. S. 1198.
— 2. Stumpfschnauziger Delphin. 1246

Taf. XIX. Gemeiner Narwall. Nach Schreber. 1218.

Taf. XX. — 1. Gemeiner Wallfisch. Nach Zorgdrager. S. 1225.
— 2. Kleinäugiger Kachelot. Dgl. 1240.

Taf. XXI. Fährten. 1. des Wolfs.
— 2. des Fuchses.
— 3. der wilden Katze.
— 4. des Luchses.

Taf. XXII. — 5. a. des großen Wiesels.
b. des kleinen Wiesels.

Fährten 6. des Marders.

— 7. des Iltisses.

— 8. des Flußotters.

Taf. XXIII. — 9. des Landbären.

— 10. des Dachses.

— 11. des Igels.

— 12. des Hasen.

— 13. verschiedener Mäuse.

Taf. XXIV. — 14. des Eichhorns.

— 15. des Roth- und Damm-hirsches.

— 16. des Rehes.

— 17. des Schwarzwildes.

Ein-

Einleitung.

Erster Abschnitt.

Von der Naturgeschichte überhaupt und der Eintheilung ihrer Gegenstände in die drey Naturreiche.

Das erste Kapitel.

Begriff der Naturgeschichte.

Das Wort Natur, das wir hier und in der Folge so oft brauchen, hat nicht die allgemeine Bedeutung, daß es alle erschaffene Dinge, einfache und zusammengesetzte, Elemente, Geister, Welt- und Erkörper bedeutet, sondern die eingeschränkte, in welcher es nur diejenigen Körper unsers Erdballs bezeichnet, die sich auf oder unter der Oberfläche desselben befinden.

Unter Naturalien (natürlichen Körpern) versteht man alle aus einfachen Bestandtheilen zusammengesetzte Körper unserer Erde, die durch den Kunstfleiß des Menschen noch nicht wesentlich verändert oder zu seinem ökonomischen Gebrauche in eine andere Gestalt gebracht worden sind. Sie unterscheiden sich durch diese Einschrän-

kung von den Artefacten (künstlichen Körpern), und es machen daher auch diejenigen Erdkörper, welche, ehe sie als Naturalien gehörig beobachtet oder in den Naturalienkabinetten aufbewahrt werden können, einige Bearbeitung von Menschenhänden erfordern, wie z. B. geschliffene und polirte Marmortafeln, von der rauhen und die innern Schönheiten verbergenden Cruste befreyete Muscheln und Seeschnecken, so wie diejenigen, welche der bloße Zufall formt oder verändert, wie z. B. im Kalkstein abgedruckte Muscheln, und diejenigen, welche die Kunst der Thiere zur Befriedigung eines oder des andern ihrer Bedürfnisse umbildet, z. B. ein Vogelnest, noch mit Recht Anspruch auf den Namen der Naturalien. Ausgeschlossen aber werden noch der Aether, die Luft, das Feuer und Wasser, weil diese Körper theils als einfache Bestandtheile, theils als Sammelplätze und Behälter der Naturalien angesehen werden, die man von jeher aus der Gesellschaft der Naturalien selbst ausgeschlossen hat. Zu den einfachen Bestandtheilen der natürlichen Körper oder zu den sogenannten Elementen rechnet man gewöhnlich Erde, Wasser und ein brennbares Wesen, und schließt die Luft als einen eigenen Bestandtheil um deswillen aus, weil man noch zweifelhaft ist, ob sie nicht mehr aus den feinsten in Dämpfe aufgelösten Theilen bestehe. Die verschiedene Zusammensetzung und Mischung dieser Bestandtheile erzeugen die mancherley Naturalien, und machen dieselben bald zu einem Thiere, bald zu einer Pflanze, bald zu einem Mineral, so wie zu Fleisch, Holz oder Stein, und sie werden fest genannt, wenn sie aus mehr erdigen als wässerigen Grundstoff

bestehen, und flüssig, wenn das Verhältniß umgekehrt ist.

Mit diesen natürlichen Körpern beschäfftigt sich nun die Naturgeschichte, welche nichts anders ist, als eine Wissenschaft, die uns die Natur in einer gewissen bestimmten Ordnung kennen lehrt.

Sie lehrt die natürlichen Körper kennen d. h. sie giebt uns die Kennzeichen an die Hand, wodurch sich einer von dem andern unterscheidet, bestimmt die Art und Weise, wie einer mit dem andern verbunden ist, unterrichtet uns von ihren Eigenschaften, von ihrer Entstehung, Fortdauer und Zerstöhrung, von ihrem Nutzen und Schaden u. s. w., und dieß thut sie in einer gewissen bestimmten Ordnung, weil ohne dieselbe keine Uebersicht der großen Menge dieser Dinge statt haben kann, sondern vielmehr Verwirrungen und Wiederholungen unvermeidlich werden.

Das zweyte Kapitel.

Von dem Unterschiede der organisirten und unorganisirten Körper und der hieraus sich ergebenden Absonderung der Naturalien in drey Reiche.

Beym ersten Anblick der Naturalien bemerkt man sogleich in Ansehung ihrer Entstehung, Zusammensetzung und ihres Wachsthums zwey Hauptverschiedenheiten. Einige nämlich erhalten 1) ihr Daseyn von andern Körpern, die mit ihnen von gleicher

Gestalt und Art sind; und diese Art der Entstehung bleibt und war bey ihnen immer dieselbe bis zu ihren ersten Stammeltern hinauf. Eben diese Körper nehmen 2) allerhand fremde Substanzen als Nahrungsmittel in ihrem Körper auf, eignen sie den Bestandtheilen desselben an, und befördern dadurch ihr Wachsthum von innen. Diese beyden Eigenschaften setzen 3) von selbst eine besondere Structur oder Zusammensetzung bey diesen natürlichen Körpern voraus. Sie müssen nämlich, wenn sie auf diese Art Nahrungsmittel zu sich nehmen und in der Folge ihres Gleichen erzeugen wollen, mancherley Gefäße, Adern und andere Organe in und an sich haben, die zur Aufnahme bestimmter Flüssigkeiten, zur Aneignung ihrer Nahrungsmittel, zur Erzeugung der Nachkommenschaft u. s. f. nothwendig sind; und diese mit Gleichförmigkeit und Ordnung aufgestellte Gefäße oder Organe müssen endlich mit Lebenskraft versehen seyn, wenn sie zur Vollziehung ihrer Verrichtungen geschickt seyn sollen. Diejenigen Körper, welche diese Eigenschaften besitzen, werden nun organisirte Körper genannt und machen die erste Hauptverschiedenheit aus.

Zur zweyten Hauptverschiedenheit gehören alle übrigen Naturalien, die man auch deshalb unorganisirte Körper nennt. Sowohl ihre Entstehung als ihr Wachsthum (wenn man es anders Wachsthum nennen darf) geschieht keinesweges durch Ernährung, sondern bloß durch Anhäufung und Ansatz gleichartiger Theile von außen; und sie haben daher keinen organisirten Körperbau, keine Organe, keine Lebens-

kraft

kraft nöthig. Man nennt sie daher auch todte und jene lebendige Körper.

Wie diese Hauptunterschiede, welche Organisation und Mangel derselben unter den Naturalien überhaupt hervorbringen, gleich auf den ersten Anblick bemerklich werden, so zeigt sich nun auch eben sobald unter den organisirten Körpern, selbst in Rücksicht der Art, wie sie ihre Nahrung zu sich nehmen, und in Rücksicht ihrer Bewegung eine doppelte Verschiedenheit. Die einen nähren sich bloß von sehr einfachen flüßigen Theilen und haben, um dieselbe einzusaugen, viele Werkzeuge oder Oeffnungen; die andern hingegen nähren sich neben den verschiedenen flüssigen auch noch von verschiedenen festen Theilen und nehmen diese durch eine einfache, aber im Verhältniß weit größere Oeffnung zu sich. Die Nahrungsmittel, welche jenen zukommen, scheinen innerhalb des Körpers wenig oder gar keine Veränderungen zu leiden, sondern nähren gleichsam als roher Stoff; dahingegen diejenigen, welche diese zu sich nehmen, sich noch in verschiedenen Gefäßen mancherley Veränderungen unterwerfen müssen, ehe sie die bezielte Ernährung bewirken können. Diese letztern haben außerdem auch noch die Fähigkeit der willkührlichen Bewegung ihrer Gliedmaßen durch eigene Kraft und eignen Antrieb, und zeigen dadurch, daß sie beseelt sind; dahingegen bey jenen nur eine mechanische Bewegung, d. i. durch eine fremde Kraft von außen und Bewegung der flüssigen Theile innerhalb der festen, statt findet.

Nach Angabe dieser sehr auffallenden Verschiedenheiten der Naturalien ist man denn nun schon im Stande dieselben auf eine sehr natürliche Art in die bekannten drey Reiche abzutheilen, wovon das erste die Thiere, das zweyte die Gewächse und das dritte die Mineralien in sich begreift.

I. Das Thierreich. Regnum animale.

In dasselbe gehören alle belebte und beseelte organisirte Körper, die willkührliche Bewegung besitzen und vermittelst derselben ihre Nahrung durch Eine Oeffnung, den Mund, zu sich nehmen. Man lernt dieß Reich in der Zoologie (Zoologia) kennen.

II. Das Gewächsreich. Regnum vegetabile.

Dieß enthält zwar ebenfalls organisirte Körper; sie sind aber bloß belebt, es fehlt ihnen die willkührliche Bewegung gänzlich und ihren Nahrungssaft saugen sie vermittelst unwillkührlicher Bewegung durch viele Oeffnungen, die Wurzeln, in sich. Die Botanik (Botanica) ist die Wissenschaft von der Kenntniß der Vegetabilien oder Gewächse.

III. Das Mineralreich. Regnum minerale.

Dieß umfaßt alle unbelebten und unorganisirten Körper in sich, die folglich ohne Lebenskraft, nach den phy-

physischen und chemischen Gesetzen der Anziehung, Anhäufung ꝛc. entstehen. Man lernt sie in der Mineralogie (Mineralogia) kennen *). In dieses Reich könnte man unsere Erde selbst rechnen. Sie ist die Werkstätte, in welcher sich die verschiedenen Mineralien bilden; aus ihrem Schooße entspringen die Pflanzen, und von ihren Händen empfangen die Thiere Ernährung. Allen Naturalien leiht sie eine Zeitlang Theilchen, unter mancherley Gestalten auf der Oberfläche der Erde zu wirken, fordert sie aber auch bald wieder zurück.

*) Blumenbachs Handbuch der N. G. 5te Ausgabe. Göttingen 1797. S. 1—9.

Zweyter Abschnitt.

Nähere Betrachtung der organisirten Körper überhaupt.

Das erste Kapitel.

Von den verschiedenen Veränderungen der organisirten Körper und ihren Bestimmungen im allgemeinen.

Während der Dauer eines jeden organisirten Körpers, sey sie lang oder kurz, sind zwey Hauptzeitpunkte bemerkbar: Der Anfang des Lebens, sein Entstehen und die Vollendung desselben, sein Tod. Die tausendjährige Eiche und der zweytägige Schimmel *), der Mensch, welcher hundert Jahr alt wird, und das Uferaas **), das keinen Tag überlebet, alle organisirten Körper haben diese Gränzen ihrer Wirksamkeit gemein; sie entstehen und — sterben.

Alle die regelmäßigen, periodischen sichtbaren Veränderungen, die sich mit einem jeden organisirten Körper von seinem Beginnen an bis zu dessen Aufhören durch dessen eigne Kraft zutragen, nennen wir das Leben desselben. Sie sind Ernährung, daraus folgen

*) Embolus carneus. *Halleri.*

**) Ephemera vulgata. *Lin.*

gen Erhaltung und Wachsthum und dann die Fortpflanzungsfähigkeit.

Daß alle organisirten Körper mit jedem Augenblicke beständigen Veränderungen unterworfen sind, wenn wir sie gleich nicht immer wahrnehmen, ist mehr als zu bekannt. Daß der Baum in voller Blüthe da stehet, sehen wir; allein die Millionen Veränderungen, die er, den ganzen Winter und Frühling durch, an Tausenden seiner Theilen erfahren mußte, bis er in voller Blüte da stehen konnte — diese bemerkten wir nicht.

Die nothwendigen Folgen dieser beständigen Veränderungen, welche, so wie alle, also auch die organisirten Körper erfahren, sind anfänglich Abnutzung und zuletzt Zerstörung. Diese erfolgt in der That auch bey allen organisirten Körpern.

Das zweyte Kapitel.

Von der Entstehung der organisirten Körper.

Die Entstehung neuer organisirter Körper zu erklären hat von jeher den menschlichen Geist beschäfftigt und es sind mehrere merkwürdige Versuche in dieser Hinsicht gemacht worden, dieß Geheimniß der Natur zu enthüllen.

§. 1.

Zufällige Erzeugung.

Die Alten hielten die kleinern organisirten Körper im Thierreiche, als Insecten und Würmer, und im Gewächs-

wächsreiche die Moose, Flechten und Schwämme für weniger vollkommen, als die größeren, und glaubten, daß sie ohne von ihres Gleichen erzeugt zu werden, durch eine Art von Gährung oder Fäulniß aus den aufgelösten Theilen anderer organisirter Körper entstünden, welche Entstehungsmethode sie die zufällige Erzeugung (generatio aequivoca) nannten *). Allein diese Lehre, welche sich größtentheils auf falsche Beobachtungen gründet, ist längst durch Vernunft und Erfahrung widerlegt, und es wird als ausgemacht angenommen, daß kein organisirter Körper, ohne Erzeugung seines Gleichen, die Erzeugung gehe auch auf welche Art sie nur wolle vor sich, entstehen könne.

§. 2.

Lehre der allmähligen Bildung.

Das älteste System in Rücksicht der Entstehung größerer Körper ist die Lehre der allmähligen Bildung (Theoria epigeneseos). Man nahm einen doppelten Saamen an, einen männlichen und einen weiblichen, vermittelst deren Verbindung und innigste Vermischung der neue Körper durch eine Art lebendiger Kristallisation, nach der Aehnlichkeit im Mineralreiche, gebildet würde, und zwar sollte ein männlicher entstehen, wenn die männliche Saamenfeuchtigkeit, ein weiblicher aber, wenn die weibliche entweder durch die größere Kraft

*) Nach dem Zoologen. I. S. 12 u. f. weil hier alles zweckmäßig und in bündiger Kürze zusammengeordnet ist.

Kraft und Wirksamkeit oder durch die größere Menge die Oberhand hätte.

§. 3.

Lehre der Entwickelung.

Da neuere Untersuchungen bewiesen haben, daß es keinen weiblichen Saamen gebe, so erfand man die Einschachtelungslehre oder die Lehre der Entwickelung (Theoria evolutionis), wobey man annahm, daß alle Keime der organisirten Körper im Anfange der Schöpfung geschaffen worden und die ganze Folge der Körper von ein und eben derselben Art in dem erstgeschaffenen enthalten gewesen wäre, daß sie gleichsam wie mehrere Schachteln ineinander gelegen hätten und sich nur nach und nach entwickelten. Die Vertheidiger dieser Lehre theilen sich in zwey Secten, einige suchen die Keime im männlichen Saamen, andere im weiblichen Körper.

An der Spitze jener Secte steht der holländische Naturforscher Leeuwenhoeck. Dieser untersuchte den männlichen Saamen mit dem Mikroscope und fand darin eine unglaubliche Menge sich lebhaft bewegender Theilchen, welche er Saamenthierchen nannte und worin er die Keime der jungen Körper zu finden wähnte. Bey der Begattung, sagt er, schlüpft eins oder mehrere in die Gebärmutter, frißt sich in das zu gleicher Zeit durch einen starken physischen Reiz in dieselbe eingetretene Ey ein, findet darin seine erste Nahrung und vergrößert sich dann nach und nach in der Gebärmutter. Die

andere

andere Secte sagt mit Recht, die Natur müsse in Erschaffung der Keime der organischen Körper sehr verschwenderisch gewesen seyn, wenn diese Theorie wahr seyn sollte. Diese Theilchen, welche man für Saamenthierchen ausgiebt, finden sich in jedem Tropfen der männlichen Saamenflüssigkeit in ungeheurer Menge. Wie viel Saame geht zu Grunde, ohne daß eine Erzeugung erfolgt, und wenn wirklich eine erfolgt, so ist unter so vielen Tausenden nur ein einziges, selten mehrere, so glücklich zur völligen Ausbildung zu gelangen. Die Keime liegen also im weiblichen Körper, und zwar in den mütterlichen Eyern, welche sich bey den eyerlegenden Thieren so deutlich zeigen; und auch bey den lebendiggebährenden in Form von Bläschen in den die Muttertrompeten umgebenden Eyerstöcken vorhanden und nur darin von den Eyern der eyerlegenden Thiere unterschieden sind, daß sie sich innerhalb des Körpers der Mutter entwickeln. Diese Eyerchen enthalten die schon nach allen Theilen ausgebildete Frucht, und diese wird entweder durch eine lebendigmachende Ausdünstung des männlichen Saamens oder durch eine äußerst feine aber sehr wirksame und lebenerregende Nahrung, die ihm durch denselben zugeführt wird, zum Leben erweckt und erhält die Kraft fortzuwachsen.

Allen beyden Erklärungsarten, die sich auf vorausgebildete (präformirte) Keime gründen, stellen sich unendliche Schwierigkeiten entgegen. Die außerordentliche, gar nicht denkbare Kleinheit der in so viel tausend Gliedern eingewickelten Keime — die überflüssige Erschaffung so vieler, welche gar nicht zur Vollkommenheit gelangen,

aber

aber doch darzu hätten gelangen können, wenn ihre Väter oder Mütter in eine andere Lage wären versetzt gewesen — die auffallende Aehnlichkeit, welche Kinder mit Vater oder Mutter, ja oft mit entfernten Verwandten sowohl in körperlicher Bildung, als in Neigungen und Geistesanlagen haben, forterbende Fehler, z. B. sechs Finger, welche man manchmal in einer Familie mehrere Generationen hindurch findet — alles dieß widerspricht der Lehre von den vorausgebildeten und sich nur nach und nach entwickelnden Keimen.

Die Erzeugung der Bastarde und die Reproduktionsgeschäffte werfen schon allein die ganze Evolutionstheorie über den Haufen. Wären die Keime präformirt, wie wäre es möglich, daß durch die Begattung zweyer Körper von verschiedener Art eine Mittelart entstehen könnte, welche mit beyden Eltern Aehnlichkeit hätte? Müßte man nicht, um dieses zu erklären, annehmen, daß die Bastardbegattung auf den gewissen Zeitpunkt wäre voraus bestimmt worden, und nothwendig hätte geschehen müssen, weil die Natur in die Reihenfolge der Keime einen Bastardkeim gelegt hatte, der um diese Zeit zur Entwicklung kommen sollte? Wer kann dieß glauben?

Ferner wenn alle Keime präformirt wären, wie wollte man das Reproductionsgeschäffte, daß sich bey vielen Körpern in so auffallender Stärke zeigt, vermöge dessen z. B. bey den Krebsen, bey den Polypen sich ganze abgerissene Glieder wieder ersetzen, ja letztere sogar sich durchs Zerschneiden vermehren — wie wollte man diese Erscheinung erklären? Der Schöpfer müßte alle mög-

liche

liche Verstümmelungsfälle bey einem jeden sich dereinst entwickeln sollenden Körper vorausbestimmt und auf diese Fälle Keime zum Ersatz der verstümmelten Theile in ihn gelegt haben.

§. 4.

Lehre der Verwandschaft.

Diesen Widersprüchen zu begegnen ersann der französische Naturforscher Graf von Büffon die Lehre der Verwandschaft oder Dissemination (Theoria disseminationis seu panspermiae). Er untersuchte den männlichen Saamen aufs neue und fand zwar die sich lebhaft bewegenden Theilchen, konnte sie aber nicht für Thierchen erkennen. Bey weiterer Untersuchung fand er sie auch in der Feuchtigkeit der weiblichen Eychen, in Aufgüssen von Pflanzensaamen, in Stücken Fleisch, ja sogar in der Bratenbrühe, in allen diesen Theilen in schneller und besonders in dem männlichen Saamen und in der Feuchtigkeit des Eychens zur Brunstzeit in sehr heftiger Bewegung. Sie erhielten sogar in der Hitze des siedenden Wassers ihre Beweglichkeit bey, welches dann die Meynung, daß sie Thierchen seyen, völlig wiederlegte. Er erklärte sie für die ersten Elemente oder für den Grundstoff der organisirten Körper, der Thiere und Pflanzen, welcher überall auf dem Erdboden verbreitet sey, durch die Nahrung in die organisirten Körper gebracht würde, die innere Form derselben durchdränge, dieselbe einnähme, und nicht nur die Erhaltung

und

und das Wachsthum befördern, sondern auch die Erzeugung neuer Körper bewirke. Letzteres, sagt er, geschieht auf folgende Weise: Aus dem gegenwärtigen Körper sondern sich solche wirksame Theilchen ab, werden in gemeinschaftliche Behältnisse, bey dem weiblichen Körper in die Eyerstöcke und bey dem männlichen in die Saamenbehältnisse verführt, durch die wechselseitige Vereinigung der Körper beyderley Geschlechts und durch den dadurch bewirkten sehr starken Reiz ergießen sie sich aus den Eyerstöcken und aus den Saamenbehältnissen in die Gebärmutter und verbinden sich daselbst nach den Gesetzen der Verwandschaft, welche zwischen den verschiedenen Theilen, von denen sie sich abgesondert haben, obwalten, so daß z. B. die Theilchen, welche sich am Kopfe absonderten, an dem neuen Körper wieder den Kopf bilden u. s. w. *) Bey weniger vollkommen organisirten Körpern,

*) Nicht um diese Theorie zu vertheidigen, sondern bloß die während der Schwangerschaft der Menschen und Thiere existirende Correspondenz der einzelnen Theile der Mutter mit der Frucht zu zeigen, muß ich unter hundert Fällen nur einige anführen. Ich schlachtete vor einiger Zeit eine Kuh, welche wider meinen Willen trächtig war; sie wurde mit dem Beile wider den Kopf geschlagen, und der Embrio hatte einen großen blauen Fleck oben an der Stirn, wo der Schlag hingegangen war. Vor etlichen Tagen wurde ein Stück Wildpret geschossen, dessen Embrio, ein Hirschkalb, schon ziemlich erwachsen war. (Es war den zweyten Februar). Diesem Thiere saßen die zwey Kugeln, womit es erlegt war, an der Seite des Kopfs und das Kalb hatte an der nemlichen Stelle, wie mit dem Cirkel abgemessen, zwey der Kugel große mit Blut unter-

pern, deren einzelne Theile einander ähnlich sind, z. B. bey den Polypen ist nach dieser Theorie die Abscheidung in besondere Behältnisse nicht nöthig; sondern jeder einzelne Theil ist fähig sich zu entwickeln und einen neuen Körper zu bilden, sobald er hinlängliche Nahrung erhält; folglich ist bey diesen Körpern keine Begattung nöthig, sie bedürfen keine Saamenbehältnisse, sondern jeder einzelne Theil ist Saamenbehältniß und kann den in ihm verschlossenen Theil entwickeln.

Aus dieser Theorie sucht Büffon sich die Mißgeburten, welche Theile, die andern natürlichen Körpern ähnlich sind, an sich haben, zu erklären. Die ersten Elemente, sagt er, sind nicht durch siedendes Wasser zu zerstöhren, sie können also auch die Hitze des Magens vertragen. Nun kann es vielleicht geschehen, daß organisirte Theilchen, welche in der Saamenfeuchtigkeit eines andern Thieres, aus dessen Körper sie sich abgeschieden haben, enthalten sind, in einen andern Körper kommen, und durch den Blutumlauf während des Augenblicks der Empfängniß in die Gebärmutter gebracht werden. Es können sich alsdenn diese verschiedenen Saamenfeuchtigkeiten mit einander vermischen, und den neuen Körper, welcher sich auszubilden anfängt, eine fremde Gestalt geben.

laufene blaue Flecken. Da meine Frau mit meinem Sohne guter Hoffnung war, so fiel sie einmal auf der Treppe sehr hart nieder; sie machte gleich die Bemerkung, daß es gut wäre, daß sie rücklings niedergefallen sey — und siehe da, wie der Junge zur Welt kam, so hatte er an der nemlichen Stelle, wo die Contusion war, große blaue Flecken und hat sie noch.

geben. So entstand z. B. der berühmte Hund, dessen Kopf dem Kopfe eines Truthahnes glich, wahrscheinlich dadurch, daß seine Mutter den Saamen, den ein Truthahn fallen gelassen, aufgeleckt hatte, und dieser durch den Blutumlauf zur Zeit der Empfängniß der Gebärmutter zugeführt wurde. So entstehen auch die Bastartthiere, daß sich nämlich bey der Empfängniß die Theile von zwey verschiedenen Arten mit einander vermischen. Mißgeburten, welchen Theile mangeln, entstehen dadurch, daß sich in dem väterlichen und mütterlichen Körper nicht aus allen Theilen organisirte Grundstoffe abscheiden, sondern daß diejenigen, welche den fehlenden Theil bilden sollten, bey der Zusammensetzung fehlten. Mißgeburten, welche Theile zu viel haben, entstehen, wenn sich die zu dem Theile, welcher doppelt vorhanden ist, erforderlichen Theile in doppelter Anzahl abgesondert haben.

Gegen diese Erklärungsart wendet man folgendes ein. Man fragt: Wie ists möglich, daß sich bey der Empfängniß gerade nicht mehr und nicht weniger organisirte Bestandtheilchen in die Gebärmutter ergießen sollten, als zur vollkommnen und regelmäßigen Bildung nothwendig und hinreichend sind? Müßten nicht die Mißgeburten mit fehlenden und überzähligen Theilen weit häufiger, ja die Regel und die regelmäßig gebildeten Körper die Ausnahmen seyn? Ja müßte man nicht öfters Mißgeburten sehen, welche Theile von fremden Körpern an sich hätten? denn wie viele befruchtete Eyer von Vögeln werden nicht gegessen! sollten da nicht öfters Bestandtheile von denselben durch den Blutumlauf, in dem Augenblick

genblick der Empfängniß in die Gebärmutter gebracht werden, und sich daselbst mit dem neuen Körper verbinden? Die Zwitter müßten alsdann auch weit häufiger seyn, als man sie wirklich findet; denn wie wäre es möglich, daß bey der Bildung eines Körpers des einen, z. B. des weiblichen, Geschlechts sich gerade nur die Stoffe, die sich von den weiblichen Geschlechtstheilen absondern, in die Gebärmutter begeben, und die sich von den Theilen des andern Geschlechts abscheidenden gänzlich zurückbleiben sollten?

§. 5.

Lehre der beyden Principien.

Mehrere Naturforscher haben die Theorie der beyden Principien angenommen. Sie sagen, jeder Körper besteht aus zwey Principien, aus dem Mark- (Principium medullare) und Haut-Principium (corticale), deren jenes den Grundstoff des Gehirns und dessen Fortsätze, die Nerven, dieses aber die Haut, die Muskeln und die übrigen beyden größern Theile begreift. Diese beyden Principien sind für sich träge, mit einander vereinigt können sie sich aber ins Unendliche vermehren. Alle Erzeugung ist also nichts anders, als eine durch die beyden Principien geschehene Vermehrung. Das Principium medullare kömmt von der Mutter, und das corticale vom Vater. Zum Beweise sollen dienen die Bastartthiere, welche in ihrer äußern Gestalt immer mehr Aehnlichkeit mit der Mutter als mit dem Vater zeigen. — Die Gewächse, bey welchen die männlichen

lichen Geschlechtstheile immer aus dem Holze, die weiblichen aber aus dem Marke entstehen — die Zergliederung, durch welche man finde, daß die Nerven bey dem weiblichen Körper sich ganz nackt in dem Eyerstocke endigen, da sie bey dem männlichen nur zur Aufrichtung und Anspannung der Geschlechtstheile dienen, und daß der männliche Saame aus dem Blute abgeschieden werde.

Gegen diese Hypothese wendet man aber wieder ein, daß nach derselben die neuen Körper in ihrer äußerlichen Gestalt immer Aehnlichkeit mit dem Vater, und in ihrer Denkungsart, in ihren Seelenkräften, in ihren Geisteswirkungen mit der Mutter haben müßten. Wie sehr oft aber findet man das Gegentheil! Wie oft sind Kinder in ihrer äußern Bildung der Mutter, und in der Anlage ihrer Geisteskräfte dem Vater ähnlich! Woher kömmt die Aehnlichkeit, die oft Kinder mit entfernten Verwandten, sowohl von väterlicher als mütterlicher Seite haben? und wenn das corticale lediglich vom Vater kommen soll, woher entstehen beyderley Geschlechter? Woher kommt der Stoff zu den weiblichen Geschlechtstheilen? Sodann ist es auch noch nicht ausgemacht, ob der männliche Saame einzig und allein aus dem Blute abgeschieden werde, oder ob nicht auch feinere Säfte, die sich vielleicht im Gehirne absondern, ihm durch die Nerven zugeführt werden. Die Erfahrung lehrt wenigstens, welchen Einfluß die zu starke Ausübung der Wollust auf die Seelenkräfte habe, wie sehr der Kopf dadurch geschwächt werde, und daß sie wohl öfters den völligen Verlust des Gedächtnisses nach sich gezogen habe. Die Zergliederung eines Menschen, der sich durch Selbstbefleckung zu Grunde

gerichtet, hat gezeigt, daß sein Gehirn fast ganz vertrocknet war. Sollte man daraus nicht schließen dürfen, daß durch die häufige Abtreibung des männlichen Saamens, welcher sich immer wieder neu generirt hat, dem Gehirn nach und nach seine Säfte entgangen seyen, und sich zuletzt neue nicht genug haben generiren können?

§. 6.

Lehre vom Bildungstriebe.

Die Unzulänglichkeit aller obigen Erklärungsarten von der Erzeugung haben in den neuern Zeiten die Annahme der Lehre vom Bildungstriebe (Nisus formativus), bey welcher die Lehre von der allmähligen Bildung zum Grunde liegt, verursacht. Diese Erklärungsart haben wir Hrn. Hofr. Blumenbach in Göttingen zu verdanken *). Sie gründet sich auf folgende Wahrnehmungen. In der ganzen Natur sieht man die unverkennbarsten Spuren eines allgemein verbreiteten Triebes, der Materie eine gewisse bestimmte Bildung zu geben. Schon bey den unorganisirten Körpern sieht man diesen Trieb in der auffallendsten Wirksamkeit, wie die verschiedenen Crystallisationen beweisen, und in den organisirten Reichen der Natur kann man diesen Trieb bey durchsichtigen schnell wachsenden Körpern, welche von sehr einfacher Textur sind, z. B. bey den Polypen,

*) Vergl. Blumenbach über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte. Göttingen 1791. (mit Kupf.)

Polypen, bey der Brunnen-Conferve fast mit bloßen Augen bemerken. Die niedlichen Vegetationen, die nicht eher als durch den zufälligen Stich eines Insects auswachsen, z. B. die Galläpfel an den Eichen, die Schlafäpfel an den wilden Rosen u. a. m. die Erzeugung der Bastartthiere, das Reproductionsgeschäfte, beweisen deutlich, daß nicht die Theile eines neuen Körpers in einem vorausgebildeten Keime existirten, und sich nach und nach nur entwickeln, sondern vielmehr, daß der Bildungstrieb durch zufällige Ursachen eine andere Richtung bekommen könne. Weder in dem Saamen der Pflanze, noch in dem thierischen Eye sieht man vor der Befruchtung die geringste Spur von einem Keime, selbst durch die stärksten Microscope entdeckt man keine, sondern man sieht, wie er sich erst geraume Zeit nach der Befruchtung, nach der innigsten Mischung der beyden Zeugungsstoffe zu bilden anfängt. Es ist daher weit befriedigender und allen Erscheinungen bey dem Erzeugungs- Ernährungs- und Reproductionsgeschäfte angemessener, anzunehmen, daß, nachdem die Zeugungsstoffe beyder Geschlechter sich bey der Begattung innigst gemischt haben und gleichsam zur Reife gediehen sind, ein besonderer lebenslänglich dauernder Trieb rege wird, der Materie eine bestimmte Gestalt zu geben und dadurch ein neuer Körper durch eine Art einer lebendigen Crystallisation gleichsam ausschießt, und zwar nach der Form derjenigen Körper, von denen sich die Zeugungsstoffe abgesondert haben. Der Zeugungsstoff ist bey dem männlichen Geschlechte im Thierreiche in der Saamenfeuchtigkeit, im Pflanzenreiche in dem feinen Oehle, das sich in dem sogenannten Blumenstaube findet

und beym weiblichen Geschlecht in der Feuchtigkeit des Eyes enthalten.

Die Ursache dieses Bildungstriebes läßt sich freylich eben so wenig als die der anziehenden Kraft, der Schwere und anderer noch so allgemein anerkannten Naturkräfte angeben; genug, daß es eine eigenthümliche Kraft ist, deren unläugbares Daseyn und ausgedehnte Wirksamkeit sich durch die ganze organisirte Schöpfung in der Erfahrung offenbart, und welche einen weit leichtern und hellern Aufschluß über die Zeugung und viele andere wichtige Geschäfte des körperlichen Lebens giebt, als andere zu deren Erklärung vorgeschlagene Theorien.

§. 7.

Von den Mißgeburten und Spielarten.

Dieser Bildungstrieb kann aber bey der Zeugung auf mancherley Weise von seiner bestimmten Richtung abweichen. Er kann bey Bildung der einen Art organisirter Körper die für eine ganz andere Art derselben bestimmte Richtung annehmen, wohin z. B. die angeblichen gehörnten Hasen mit vollkommen ausgebildeten kleinen Rehgeweihen u. a. dergl. sonderbare Erscheinungen zu gehören scheinen.

Oder es kann bey Ausbildung der Geschlechtsorgane, die bey einem Geschlecht mehr oder weniger von der Gestalt des andern erhalten und dadurch ein zwitterartiges Geschöpf entstehen.

Befolgt aber der Bildungstrieb nicht bloß eine solche fremdartige, sondern eine völlig widernatürliche Richtung,

Richtung, so wird der organisirte Körper zur eigentlich sogenannten Mißgeburt, worunter man eine widernatürliche, angebohrne, leicht in die Augen fallende Verunstaltung in Bildung äußerer, größerer Theile versteht. Diese Mißgestalten bestehen theils aus mehr, theils aus weniger, theils aus anders gebildeten Theilen. Man findet daher

1) Mißgeburten, welche überzählige Glieder haben. So kommen zuweilen zwey völlig mit allen Gliedmaßen versehene Menschen, die an einem Theile zusammengewachsen sind, zur Welt. Es giebt Kühe mit sechs Beinen. Man kennt Familien, wo die sechs Finger sogar erblich sind.

2) Mißgeburten, wo die einzelnen Glieder versetzt sind, oder eine widernatürliche Lage haben. Z. B. wenn die Oeffnung des Mundes da steht, wo die Ohren sind.

3) Mißgeburten, an denen einzelne Glieder widernatürlich gebildet sind. Hierher gehören übermäßig große Köpfe oder Arme; zusammengewachsene Zehen; Hunde mit einem Elephantenrüssel; Menschen mit einem Hundskopfe, mit Gänsen- oder Krötenfüßen.

4) Mißgeburten, an denen einzelne Theile mangeln. So sind Menschen gebohren worden, denen die Finger, die Hände oder die Füße fehlten.

Anders sind wiederum diejenigen Abweichungen des Bildungstriebes, wodurch die organisirten Körper in Spielarten oder Varietäten ausarten; welche Ausartung oder Degeneration nach Herrn Blumen-

bach vorzüglich aus folgenden Quellen abzuleiten ist *).

Der kürzeste Weg zur Ausartung ist die Begattung organisirter Körper verschiedener Art, wodurch Bastarte (hybridae) erzeugt werden, die keinem von beyden Eltern vollkommen gleichen, sondern vielmehr mit beyden zusammen Aehnlichkeit haben. Da aber von der besondern Bildung der organisirten Körper, besonders der Thiere, die gehörige und für den Gang der Schöpfung so äußerst wichtige Vollziehung ihrer Geschäffte abhängt, so ist es eine weise Einrichtung der Vorsicht, daß diese Bastarte mehrentheils unfruchtbar und nur sehr selten im Stande sind, ihr Geschlecht fortzupflanzen. Daher gehört es zu den seltneren Ausnahmen, wenn Maulthiere, oder Bastarte von Füchsen und Hunden, von Stieglitzen und Canarienvögeln zuweilen fruchtbar sind. Bey den Pflanzen gelingt es leichter, daß durch künstliche Befruchtung Bastartarten hervorgebracht werden können, die fruchtbaren Saamen tragen. Hingegen bedürfen die fabelhaften Sagen von den vermeinten Bastarten von Rindvieh und Pferden, von Caninchen und Hühnern, oder von Menschen und Vieh, jetzt hoffentlich gar keiner Widerlegung mehr.

Andere Ursachen der Ausartung wirken zwar langsamer, unmerklicher, aber für die Folge meist dauerhafter und fester. Dahin gehören vorzüglich Einfluß des Himmelsstriches,

*) Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, 5te Ausgabe S. 20.

melsstriches, der Nahrung und bey Menschen und Thieren auch Lebensart u. s. w. Kaltes Clima unterdrückt z. B. das Wachsthum der organisirten Körper und bringt auch weiße Farbe an ihnen hervor. Darum sind die Grönländer, Lappländer u. s. w. so wie die Thiere und Gewächse klein, untersetzt; die Nordländer von Natur von weißer Haut, so wie viele warmblütige Thiere der kälteren Gegenden anomalisch weiße Haare und Federn haben, und viele Pflanzen daselbst anomalisch weiße Blüten tragen.

Wie sehr aber verschiedene Lebensart, Cultur und Nahrungsmittel nach und nach die Bildung, Farbe und ganze Constitution der organisirten Körper umzuändern vermögen, davon sehen wir an unsern Hausthieren, an unserm Getraide, Obst, Küchen- und Blumengewächsen u. s. w., am allerauffallendsten aber bey den Verschiedenheiten im Menschengeschlechte selbst, die augenscheinlichsten Beyspiele.

Das dritte Kapitel.

Von der Ernährung, Erhaltung, dem Wachsthume und der Reproductionskraft der organisirten Körper.

Diejenige Operation, mittelst welcher die organisirten Körper den Abgang ihrer eigenen Theile durch fremde wieder ersetzen, heißt die Ernährung, ohne welche das Leben sehr bald aufhören würde. Sie geht auf verschiedene Weise vor. Den Gewächsen wird ihre einfache

Nahrung

Nahrung durch Wurzeln, die sich außerhalb ihres Stammes am Ende desselben befinden, zugeführt. Die Thiere hingegen haben gleichsam ihre Wurzeln innerhalb ihres Körpers, nämlich im Magen und Darmkanal, wo die nahrhaften Theile der Nahrungsmittel durch unzählige Gefäßchen, fast wie bey den Gewächsen durch Wurzeln eingesogen und den verschiedenen Theilen des Körpers zugeführt werden. Viele ungebohrne Thiere werden auch außerdem durch die Nabelschnur ernährt; eine Art der Ernährung, die ebenfalls viel Aehnlichkeit mit der Gewächse ihrer hat. Der brauchbarere Theil der Nahrungsmittel wird durch einen bewundernswürdigen Proceß mit dem Stoffe der organisirten Körper vereiniget; der überflüßige hingegen aufgelöst und durch die tägliche Ausdünstung vermittelst unzähliger feiner Oeffnungen, die sich auf ihrer Oberfläche befinden, fortgeführt; auch bey den Thieren, die keinen so geläuterten Nahrungssaft, wie die Pflanzen, zu sich nehmen, durch andere Wege als Unrath ausgeworfen. Da durch diese stete Bewegung der flüssigen Theile in den festen und durch das stete Reiben der Theile an einander die Körper durch das sogenannte Ausdünsten beständig einen Abgang von Theilen erleiden, so würden sie, wenn die Natur nicht stark für Ersatz sorgte, nach und nach gänzlich zerstöhrt werden; allein da durch die Ernährung sich immer neue Theile mit den vorhandenen verbinden, so geschieht dieß nicht, und dieß nennt man denn die Erhaltung.

Auf die Ernährung stützt sich auch das Wachsthum der organisirten Körper. Wenn nämlich dieselben eine größere Menge neuer Theile empfangen, als sie verlieren,

so

so werden die Fasern, das zellige Gewebe und alle Gefäße derselben nach allen Seiten immer mehr und mehr vergrößert, ihre Masse und der Umfang ihres Raums wird also vermehrt — das heißt sie wachsen.

Diese Erscheinung nimmt man bey den organisirten Körpern von dem ersten Augenblicke ihres Daseyns an wahr, und beobachtet sie bey den meisten nur bis zu einem gewissen Zeitpunkte, da sie zwar nicht gänzlich aufhört, aber doch weit weniger bemerkbar wird; alsdann ist das fernere Wachsthum bloßer Ersatz dessen, was nach und nach durch die Bewegung der festen Theile und durch den Umlauf der flüßigen von der Maschine abgenutzt wird. Einige Thiere hingegen, wie die Krocodille, und mehrere Gewächse, z. B. Eichen, Linden u. s. w. scheinen ihr ganzes Leben hindurch an Länge und Dicke zuzunehmen.

Während des Wachsens nun gehen in dem organisirten Körper mancherley Veränderungen vor, es gehen immer Theile verlohren, andere ersetzen sich in größerer Anzahl, einige verändern ihre Gestalt, andere waren vorher ganz verborgen, oder es zeigten sich nur schwache Spuren von ihnen und sie entwickeln sich nur nach und nach zur gehörigen Vollkommenheit. Diese Entwickelung nennt man die Verwandlung (metamorphosis) der organisirten Körper. Wenn der Körper vor der vollkommenen Entwickelung aller seiner Theile von der Gestalt, welche er in seinem vollkommenen Zustande zeigt, beträchtlich abweicht, so nennt man ihn in diesem Zustande der Unvollkommenheit Larve, nach der vollständigen Entwickelung aber einen vollkommenen Körper. Frösche, Wassersalamander, und die meisten

sten Insecten leiden diese Verwandlung. Manche Körper treten auch, ehe sie ganz vollkommen ausgebildet werden, aus dem Larvenstande noch in einen Zwischenzustand, in welchem sie, meist in einer von dem ersten und letzten Zustande ganz abweichenden Gestalt, zu der zu erlangenden Vollkommenheit zubereitet werden, und in diesem Zustande nennt man sie Puppe (pupa, nympha, chrysalis) z. B. bey den Käfern und Schmetterlingen.

Eine Folge der Ernährung ist auch die Reproduction, deren schon mehrmalen erwähnt worden ist. Die Reproductionskraft ist die merkwürdige Eigenschaft, daß verstümmelte oder wohl gar verlohren gegangene Theile des organisirten Körpers sich von selbst wieder ergänzen. Es ist dieß eine sehr weise Einrichtung in der Natur, welche Thiere und Pflanzen, da sie dieselbe alle nur nicht in einerley Maaß besitzen, bey tausend Gefahren, wo ihr Körper verletzt wird, sichert.

Man theilt sie in die gewöhnliche und außerordentliche ein. Jene ist an gewisse Zeit und an bestimmte Theile des Körpers gebunden. Hierher gehört das Haren der Säugethiere, das Mausern der Vögel, das Abwerfen der Geweihe, das Häuten der Schlangen und Raupen, das Schälen der Krebse, das Entblättern der Gewächse u. s. w. Diese hingegen, von welcher auch eigentlich hier die Rede ist, besteht darin, daß bey Thieren und Pflanzen zufällige Schäden und Verstümmelungen wieder heilen und sich wieder ersetzen, ja ganz verlohren gegangene Glieder wieder nachwachsen.

Diese

Diese außerordentliche Reproductionskraft findet sich zwar bey allen Körpern, aber nicht bey allen in gleicher Stärke. Bey den vollkommenen, sehr künstlich zusammengesetzten und ausgebildeten Körpern, bey denen das Lebensprincip, so zu sagen, nur in gewissen Theilen liegt, von da es auf den ganzen Körper wirkt, finden wir sie in einem geringen Grade, und meist nur auf Knochen, Knorpel, Muskeln, Nägel und dergl. eingeschränkt; bey den einfachen Thieren hingegen, deren Lebensprincip gleichsam in dem ganzen Körper vertheilt ist, und wo die abgesonderten Theile nach langer Zeit ein ihm eigenthümliches Leben äußern, z. B. bey vielen Amphibien, Insecten und Würmern, findet man sie oft in einer außerordentlichen Stärke. Den Krebsen wachsen die Scheeren wieder — den Landschnecken die Köpfe — den Wassersalamandern die Schwänze, Augen u. s. w. — einem in zwey Stücke geschnittenen Regenwurm ein zweyter Kopf oder Schwanz — bey Armpolypen wird jedes Stück zu einem neuen Thiere. Vermöge der Reproductionskraft heilt an Thieren und Gewächsen jede nicht absolut tödtliche Wunde, wenn sie gehörig behandelt wird. So wird jede verletzte Thierhaut wieder ersetzt, und die Rinde an einem Baume, wenn sie nur nicht ganz herum abgeschnitten ist *).

*) Blumenbachs Handbuch der N. G. S. 27. der Zoologe I. S. 23.

Das vierte Kapitel.

Von der Fortpflanzung der organisirten Körper.

Wenn die organisirten Körper durch die Ernährung in ihren vollkommnen Zustand getreten und so zu sagen zu ihrer vollen Reife gelangt sind, so zeigt sich dann auch das Fortpflanzungsvermögen. Diejenigen ernährenden Theile, welche nicht zur Erhaltung und Wachsthum des Körpers gehören, werden nämlich auf eine so wunderbare Weise verwandelt, daß sie dadurch die Fähigkeit erhalten, unter gewissen Umständen ein eben so ausgebildeter organisirter Körper zu werden, als der ist, von dem sie anfänglich nur einen kleinen, unansehnlichen Theil ausmachen. Die Fortpflanzung selbst geschieht aber auf gar verschiedene Weise.

1. Ohne Begattung zweyer Geschlechter durch Keime, Knospen oder Sprossen, welche ein solcher Körper hervortreibt. Hierher gehören die Arm- und Blumenpolypen, Infusionsthierchen, Conferven u. s. w. Mehrere davon, wie die Armpolypen, scheinen ganz aus solchen Keimen zusammengesetzt zu seyn, da man sie durch Theilung vermehren kann.

2. Durch Begattung zweyer Geschlechter. Diese sind

a) in einem Körper verbunden. Solche Körperarten, die männliche und weibliche Geschlechtstheile zugleich haben, heißen Zwitter. Hier können sich

α) beyde Geschlechter ohne Beytritt eines andern Körpers befruchten, wie bey den Zwitterblüten der Gewächse und wahrscheinlich auch bey einigen Conchilien;

b) bey

b) oder die Zwitter befruchten sich wechselsweise, der eine den andern, wie die Regenwürmer und einige Landschnecken.

b) Die Geschlechter sind abgesondert, und das männliche bewirkt durch einen befruchtenden Stoff die Erzeugung bey dem weiblichen. Diese Art der Fortpflanzung findet am häufigsten bey den Thieren statt, auch bey den Gewächsen mit getrennten Geschlechtern der Blüten. Hierbey finden sich noch folgende Umstände. Es wird nämlich

a) nach jedem Ausschluß der erzeugten Körper wieder eine neue Befruchtung zur fernern Fortpflanzung nöthig, wie bey den meisten Thieren und Pflanzen, oder

b) die Wirkung der Befruchtung dauert, wie bey den Blattläusen, in mehreren Generationen fort *).

Noch ist zu bemerken, daß die Fortpflanzungsfähigkeit nur unter gewissen Bedingungen statt findet. Jeder organisirte Körper muß, dessen Leben mag so kurz seyn als es will, Nahrung zu sich nehmen, welche das Wachsthum, und wenn es auch nur im geringsten Maße seyn sollte, zur Folge hat; allein nicht alle pflanzen sich in ihrer Art fort. Denn es giebt erstlich Thiere, welche sich ernähren und wachsen, aber sterben, ohne das Geschäfte der Fortpflanzung verrichtet zu haben, z. B. die

*) G. A. Suckows Anfangsgründe der theoretischen und angewandten Naturgesch. Leipzig 1797. I. S. 2. Blumenbachs Handb. der N. G. S. 29.

die ungeflügelten Ameisen und die Arbeitsbienen. Zweytens gehört bey den Thieren und Pflanzen, wie wir gesehen haben, ein gewisses Alter dazu, ehe die Fortpflanzungsfähigkeit eintritt, viele aber sterben, ehe sie diesen Zeitpunkt erreichen; andere hingegen überleben auch diese Fähigkeit und werden zuletzt zu der benannten Verrichtung untüchtig.

Das fünfte Kapitel.

Von dem Tode der organisirten Körper.

Alle organisirten Körper bestehen aus festen und flüssigen Theilen. Die einfachsten festen Theile heißen Fasern, mehrere solcher Fasern formen ein zelliges Gewebe und aus diesem entstehen und bestehen dann zusammengesetzte Fasern, Häute und Gefäße und andere wiederum aus diesen verschiedenen Theilen zusammengesetzte Theile. In diesem zelligen Gewebe und in dessen Gefäßen werden diejenigen flüssigen Theile nach gewissen von der Natur bestimmten Gesetzen so lange bewegt, bis sie die Bestimmung ihres Lebens erfüllt haben, oder bis die Lebenskraft weicht und so erfolgt der Tod. So wie nämlich bey fortdauernder Ernährung und Wachsthum die Fasern immer dichter und härter und die Zwischenräume so ausgefüllt und enge werden, daß sich keine neuen nährenden Theile dazwischen anhängen können, und also mit der Zeit der Körper zu wachsen aufhört; so werden auch nach und nach die Bereitungsgefäße selbst dicht und hart, so daß die Säfte nicht mehr gehörig ausgearbeitet werden und cirkuliren können;

nen; die Bewegung derselben wird also immer langsamer, stockt endlich gar, und hört so wie die davon abhängende Ernährung auf. Hier beschließt dann der organisirte Körper sein ihm von der Natur vorgesteckstes Lebensziel, er stirbt. Die wenigsten organisirten Körper aber erreichen dieß Ziel, sondern tausenderley Zufälle verkürzen ihnen dasselbe früh oder spät.

Nach dem Tode wird der Organismus der Thiere und Pflanzen zerstöhrt, die Theile derselben werden gewöhnlich durch die Fäulniß oder Zerlegung aufgelöst, und die wenige übrigbleibende Masse oder Asche verhält sich dann wie ein unorganisirter Körper, vereinigt sich mit der Erde, die ihnen vorher Nahrung und Aufenthalt gegeben hatte.

Dritter Abschnitt.

Nähere Betrachtung der Thiere überhaupt.

Das erste Kapitel.

Angabe der Hauptunterscheidungsmerkmale der Thiere von den Gewächsen.

Was bisher von den organisirten Körpern gesagt wurde, war den Gewächsen und Thieren gemein. Da aber die letztern viele merkwürdige Eigenheiten noch besonders haben; so verdienen sie eine eigne Betrachtung. Das Allerbewundernswürdigste ist ihre mannichfaltige Verschiedenheit, welche es auch fast unmöglich macht, etwas näheres von ihnen zu sagen, welches allen insgesammt zukäme. Doch lassen sich außer der oben schon erwähnten Ernährung noch zwey Hauptmerkmale angeben, wodurch sich alle Thiere wesentlich von den Gewächsen unterscheiden. Diese sind: willkührliche Bewegung und Empfindung.

Die Ernährung beruht vorzüglich auf den besondern Bau des Gebisses, die willkührliche Bewegung auf dem eignen Bau der Gliedmaßen, und die Empfindung auf den hierzu besonders eingerichteten Sinneswerkzeugen.

Das zweyte Kapitel.

Von der Ernährung der Thiere.

Wenn wir die Thiere überhaupt betrachten, so finden wir, daß bey der großen Verschiedenheit, welche sich in ihrem Bau und ihrer Bildung zeigt, doch dieselben darin übereinstimmen, daß sie eine einzige Oeffnung in ihrem Körper haben, durch welche sie die Nahrungsmittel zu sich nehmen. Dieß ist der Mund, und nur sehr wenige Thiere, als einige Infusionsthierchen, scheinen hierin eine Ausnahme zu machen. Nicht aber bloß diese einfache Oeffnung, sondern auch die Mannichfaltigkeit der Nahrungsmittel unterscheiden sie hinlänglich von den Gewächsen. Nach Beschaffenheit ihrer Natur scheint den Thieren kein besonderes Naturreich zu ihrer Nahrung angewiesen zu seyn, doch nähren sie sich vorzüglich aus dem Thier- und Pflanzenreiche, da hingegen die Gewächse ihren einfachen Nahrungssaft fast nur aus dem Mineralreiche zu sich nehmen. Daß nicht alle Thiere, welche einen Mund haben, auch Nahrung zu sich nehmen, wie z. B. viele Nachtfalter, ist bekannt genug, und hat seinen Grund darin, daß sie nur zur Erhaltung ihrer selbst in der letzten Epoche ihres Lebens dieselbe nicht nöthig haben; manche nehmen auch im Winter, den sie theils durchschlafen, keine Nahrung zu sich, und noch andere, wie die Puppen der Schmetterlinge, leben eine Zeitlang ohne Mund und also auch ohne alle Nahrungsmittel.

Die Gefühle des Hungers und Durstes sind die Reizungsmittel, welche die Thiere zur Aufsuchung ihrer Nahrung zwingen, wodurch ihre Erhaltung bewirkt und

ihre Bestimmung erreicht wird. Sie äußern sich aber bey den verschiedenen Thierarten auch auf eine verschiedene Weise; so daß die kaltblütigen Thiere der Regel nach länger als die warmblütigen hungern können, und daher Amphibien und Insecten eine sehr beträchtliche Zeit ohne alle Nahrung leben.

Wie schon oben (3tes Kap. S. 28) angegeben wurde, so müssen die Nahrungsmittel bey den Thieren sehr mannichfaltige Veränderungen erleiden, ehe sie zur eigentlichen Ernährung geschickt sind, oder den verschiedenen Theilen des Körpers zugeeignet werden können. Die härteren Speisen werden durch ein verschieden geformtes Gebiß zermalmt, und mit speichelartigen Säften vermischt, ehe sie zum Darmkanal gelangen. Hier werden sie noch durch mancherley auflösende Mittel in einen Brey verwandelt, aus welchem wieder der Nahrungssaft abgeschieden, und der Ueberrest als Unrath aus dem Körper geschafft wird. Dieser Nahrungssaft wird bey den gröfsern und vollkommnern Thieren mit dem Blute vermischt, durch den Kreis auf desselben vermittelst der Adern in allen Theilen des Körpers herumgeführt und von da aus erst in die übrigen Bestandtheile des Körpers abgesetzt. Außerdem werden zugleich in besonders dazu bestimmten Werkzeugen durch das Scheidungsgeschäfte mancherley besondere Säfte aus der allgemeinen Blutmasse abgeschieden. Dieses wahre Blut, welches man bey den Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen findet, hat immer eine rothe Farbe; der Saft hingegen, der bey den sogenannten weißblütigen Thieren, den Insecten und Würmern, die Stelle des Blutes vertritt, ist gewöhnlich

wöhnlich weiß, doch auch bisweilen roth, braun oder schwarz, und führt nur wegen entfernter Aehnlichkeit den Namen des Blutes. Wegen des verschiedenen Grades der Hitze des rothen Blutes werden die Thiere warm- oder kaltblütige genennt; und man nennt das Blut kalt, wenn seine Temperatur entweder der Temperatur des Elements, worin das Thier lebt, gleich, oder doch kaum merklich stärker ist; warm hingegen, wenn seine Temperatur die des Elements, in welchem es lebt, weit übertrifft. Dieß letztere zeigt im vollkommen gesunden Zustande des Thieres immer eine Wärme von ohngefähr 100 Grad Fahrenheit, etwas mehr oder weniger.

Das dritte Kapitel.

Von der willkührlichen Bewegung.

Der Gliederbau der Thiere, welcher sie zur willkührlichen Bewegung geschickt macht, unterscheidet sich auffallend vom Bau der Gewächse. Diese machen zwar keine einförmige, gleichgestaltete Masse aus, aber ihre Theile haben doch immer eine feste, zähe Verbindung und sind daher auch in Absicht ihrer Lage wenigerer Veränderungen fähig. Welche gegliederte Zusammensetzung hingegen im thierischen Körper! Die kleinen Massen, welche wir Muskeln nennen, sind in so leichter und nach so genauer Verbindung mit andern gewöhnlich festern Theilen, so fest und so künstlich an einander gekettet, daß der ganze Körper überhaupt im Zusammenhang, so wie jeder einzelne Theil für sich, auf unzählige Weise seine Lage ändern kann.

Die Grundmasse des thierischen Körpers ist der Rumpf. Er ist an sich, oder nach dem äußern Ansehen, am wenigsten viel eigener Bewegung fähig, ob gleich in ihm Wunder der Bewegung verborgen sind. Mit demselben sind die äußern Gliedmaßen und der Kopf auf eine solche Weise verbunden, daß sie mit dem Rumpfe im genauesten Zusammenhange stehen und doch viel Beweglichkeit für sich haben. Kopf und Rumpf treffen wir bey allen Thiern an; allein in Absicht der äußern Gliedmaßen zeigt sich eine große Abweichung. Einige Thiere haben bloß Arme und Beine, andere noch einen Schwanz, noch andere haben diesen allein, einige haben Flossen, wieder andere Flügel, noch andere Fühlhörner oder Fühlfaden. So verschieden alle diese Gliedmaßen sind; so kommen sie doch darin überein, daß ihnen durch die leichte Art ihrer Verbindung mit dem Rumpfe ein hoher Grad der Bewegungsfähigkeit eigen ist. Fast durchgängig sind diese äußere Gliedmaßen wieder in mehrere kleine gegliedert, welche die Menge und Leichtigkeit der Bewegungen ungemein befördern. Und eben so sind fast durchgängig diese äußern Gliedmaßen die Werkzeuge, durch welche der ganze Körper der Thiere in Bewegung gesetzt wird.

Das Merkwürdigste aber bey dieser Bewegungsfähigkeit ist die Willkühr; da die Thiere nicht durch eine fremde Kraft, wie z. B. die Gewächse durch die Gewalt des Windes bewegt werden, sondern durch ihre eigne Kraft, und aus eignem Antriebe, nach dem Entschlusse ihres Willens, sich selbst bewegen, so schreibt man ihnen mit Recht eine willkührliche Bewegung zu; denn nur über einige Muskeln, welche die innere Bewegung befördern,

z. B.

z. B. über das Herz vermag der Wille nichts, sondern diese sind unaufhörlich, lebenslang und ohne wie andere Muskeln und Gliedmaßen zu ermüden oder endlich zu schmerzen, in steter Bewegung.

Das vierte Kapitel.

Von der Empfindung der Thiere und von den Nerven.

Die Pflanzen haben keine Empfindungsfähigkeit; denn sie sind nicht vermögend sich irgend etwas vorzustellen, weder sich selbst, noch etwas außer sich; auch haben sie kein Gefühl, das sie einen Unterschied zwischen angenehmen und widrigen Eindrücken machen lehrte. In beyden besteht das Wesentliche der Empfindungsfähigkeit, welche allen Thieren verliehen worden ist. Da aber die Mannichfaltigkeit der Thiere so groß ist, so sind auch eben so große Grade in den Abstufungen dieser Empfindungsfähigkeit; doch fehlt sie keinem Thiere gänzlich. Der Wurm hat vielleicht gar keine Vorstellungen, seine Empfindungen beschränken sich also vielleicht blos auf das Gefühl einiger weniger angenehmen und unangenehmen Eindrücke; wie vielerley Vorstellungen und Empfindungen ist dagegen der Hund nicht fähig? Je mehr Empfindungswerkzeuge ein Thier hat, desto vollkommener und mannichfaltiger sind seine Empfindungen und umgekehrt. Diese Empfindungswerkzeuge sind die Nerven oder diejenigen markigen weißen Fäden, welche sich vom Gehirn und Rückenmark aus in die Werkzeuge der Empfindung und Bewegung, in die Eingeweide und

Gefäße, ja in alle Theile des Körpers verbreiten. *) Ihre Enden, besonders die der kleinsten, dringen fast überall bis auf die Oberfläche des Körpers. Es mag daher ein Körper an irgend einem Orte, wo man will, berührt werden, so trifft die Berührung ein unter der Haut liegendes Nervenende. Eine jede Berührung oder Reiz bringt den Nerven, den sie trifft, wahrscheinlich in eine gewisse Erschütterung, die durch den ganzen Nerven fortgeht und im Gehirn, dem Sammelplatz aller Nerven, aufhört, worauf das Thier sich allemal eine Vorstellung, nicht nur von dem Eindrucke selbst, sondern auch von der Art desselben, ob es z. B. ein angenehmer oder unangenehmer war, machen kann.

Nach Beschaffenheit der besondern Organe, in welchen sich die Nerven verbreiten, entstehen denn auch die besondern Empfindungen der Sinne, das Gefühl, Gesicht, Gehör, der Geruch, und Geschmack. Alle sind sie nicht immer bey allen Thieren anzutreffen, sondern bey vielen in der Anzahl und Art verschieden, so daß z. B. bey den Polypen das Gefühl die Stelle des Gesichts vertritt. Auch haben gewisse Theile der thierischen Körper die Eigenschaft, daß sie gereizt eine mehr oder weniger starke Empfindung liefern, und diese heißen empfindliche; bey andern ist der Reiz mit keiner Empfindung, aber mit einer größeren oder geringeren Zusammenziehung verbunden, und diese werden reizbare Theile genannt, wor-

zu

*) Vollständig siehe hierüber: Busch Grundriß einer zootomischen Beschreibung der landwirthschaftlichen Thiere. Heidelberg 1798. 324—338.

zu vorzüglich das Herz gehört. Die Geisteskräfte der Thiere scheinen außerdem, nach den scharfsinnigen Beobachtungen des Herrn Hofrath Sömmerings *), mit der Größe des Gehirns in Vergleichung zur Dicke, der daraus entstehenden Nerven im umgekehrten Verhältnisse zu stehen, so daß der Mensch von allen das größte Gehirn in Vergleichung seiner sehr dünnen Nerven hat, da hingegen einfältige Thiere, wie die inländischen Amphibien, dicke Nerven und ein sehr kleines Gehirn besitzen.

Es ist auch so gut als ausgemacht, daß eben diese Nerven die ersten Werkzeuge der thierischen willkührlichen Bewegung ausmachen; denn da die äußern Gliedmaßen als die zweyten Werkzeuge nicht beständig und auch nicht immer in Bewegung sind, so muß doch etwas vorhanden seyn, was erst auf dieses oder jenes Glied wirkt, damit sich dieß und kein anders, und damit es sich auch gerade jetzt und nicht früher oder später bewege; und dieß kann denn wieder nichts anders seyn als die Nerven. Da sie sich nach allen Seiten verbreiten, und der Erschütterung fähig sind, so erschüttert wohl die Thierseele die Nerven im Gehirn, und diese Erschütterung pflanzt sich bis zu dem Gliede fort, welches in Bewegung gesetzt werden soll. Einen Unterschied sieht man hier leicht ein. Bey der Empfindung wirkt nämlich ein Gegenstand von außen auf die Nerven, die sich an der Oberfläche des Körpers befinden, erschüttert diese fortlaufend bis zum Gehirn, und bringt die gehörige Vorstellung in demselben, als dem

*) S. dessen Dissertatio de basi encephali. p. 17.

dem Sitz der Seele hervor; bey der willkührlichen Bewegung aber geschieht die Berührung gleichsam im Gehirn und die Erschütterung von innen nach außen, um diese Erscheinung zu bewirken.

Das fünfte Kapitel.

Kurze Uebersicht des gesammten Thierreichs.

Die bisher angegebenen Vorzüge sind allen Thieren mehr oder weniger eigen. Da aber die Menge derselben so groß und ihr Bau so äußerst verschieden ist; so würde man nie weder das gesammte Thierreich übersehen, noch von einzelnen Thieren deutliche Begriffe bekommen können, wenn man die Thiere etwa nur so, wie sie uns in der Natur aufstoßen, betrachten, und sich nun mit dieser Erkenntniß begnügen wollte. *) Die große Menge der Thiere bringt es an sich schon mit sich, daß sich viele im Aeußern ähnlich werden, die man doch bey genauer Untersuchung ganz voneinander verschieden findet. Eben diese große Menge von Gegenständen würde

*) Hier oder noch früher entwickelt man gewöhnlich die Begriffe von der Stufenleiter in der Natur und vom natürlichen System; allein nach meinem Plan und meiner Einsicht kann dieß wichtige Kapitel nur erst am Ende der N. G. an seinem rechten Orte stehen. Die Gründe: Warum? lassen sich bey wenigem Nachdenken leicht entdecken.

Man sehe einstweilen hierüber: Blumenbachs Handbuch der N. G. S. 6. Anmerkung.

würde das Gedächtniß überladen, und beständige Verwechselungen der Begriffe verursachen, wenn uns nicht die eben so auffallende Verschiedenheit der Thiere ein gutes Hülfsmittel an die Hand gäbe, beydes so viel als möglich, zu vermeiden.

Wir sammeln daher in Gedanken alle uns bekannten Thiere, die zerstreut auf dem ganzen Erdboden leben, vor unserm Blicke, bemerken die auffallendsten Hauptverschiedenheiten, und machen nach diesen gewisse Hauptabtheilungen oder Classen. So würden wir z. B. im Augenblicke bemerken, daß sich die Vögel durch ihr Gefieder und zwey Füße sehr auffallend von allen andern Thieren unterscheiden, und aus diesen daher eine eigne Classe machen.

Alles kommt aber bey solchen Ab- oder Eintheilungen darauf an, welche Kennzeichen (Charaktere) der Aehnlichkeit und welche Kennzeichen oder Merkmale der Verschiedenheit man fest setzt. Sind diese Kennzeichen zweydeutig gewählt, so wird auch die Eintheilung mangelhaft werden.

Aristoteles *) machte, so viel wir wissen, die erste Eintheilung unter den Thieren. Er bestimmte nämlich zwey Hauptabtheilungen, unter deren erste er alle lebendiggebährende und unter deren zweyte er alle eyerlegende Thiere brachte.

Diese Eintheilung mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen war nun immer das mangelhafte Lehrgebäude

*) Ein berühmter griechischer Weltweise, der ohngefähr 400 Jahr vor Christi Geburt lebte.

bäude, an welchem die Naturforscher nur änderten und besserten, das aber demohngeachtet immer unbequem und unvollkommen blieb, weil die Kennzeichen zu unbestimmt und schwankend waren. Der große Naturforscher von Linne' *) war zuerst so glücklich, natürlichere und bestimmtere Kennzeichen zu finden, und auf diese ein ganz neues System zu bauen, welches die meisten Naturforscher wegen seiner Gründlichkeit und Vollkommenheit angenommen haben. Er behauptet mit Recht, daß diese Kennzeichen allemal so gewählt werden müßten, daß man die natürlichen Körper mit Leichtigkeit und Gewißheit voneinander unterscheiden könne. Eben um nun gewisse Kennzeichen, besonders bey einer Hauptabtheilung, bey der Classification des gesammten Thierreichs zu haben, konnte man nicht aufs Aeußerliche, nicht auf den Augenschein gehen, wo so vieles veränderlich und betrüglich ist; sondern man mußte dieselben von wesentlichen

*) Er lebte in der Mitte dieses Jahrhunderts, war Ritter des Nordsternordens, Leibarzt des Königs von Schweden, Professor der Medicin, Stifter und erster Präsident der Gesellschaft der Wissenschaften zu Stockholm. Er hat sich durch seine Bemühungen, die er auf die Naturgeschichte gewendet hat, einen unsterblichen Ruhm erworben, und seit er einen bessern und gebahntern Weg, zur Kenntniß der Geschöpfe unsers Erdballs zu gelangen, gezeigt, sind ihn viele nach ihm glücklich gegangen, und die N. G. ist nicht nur dadurch an mehrerer Vollkommenheit und Vollständigkeit gewachsen, sondern hat auch eine große Anzahl Verehrer bekommen, ist fast ein allgemein beliebtes Studium geworden. Er ist derjenige Schriftsteller in der N. G., nach dessen System man sich jedem Naturforscher verständlich machen kann.

sentlichen, von Haupteigenschaften der Thiere hernehmen, d. h. von solchen, die unzertrennlich von der Natur des Thieres, unwandelbar, unveränderlich sind, demselben unter allen Umständen zukommen, und sich hauptsächlich auf innern Bau und innere Bildung gründen.

Nachdem Linne' dieß alles erwogen, setzte er sechs Thierclassen fest, deren Eintheilungskennzeichen er aus innern Eigenschaften der Thiere, aus der Beschaffenheit des Herzens und des Blutes hernahm. Sie sind etwas näher bestimmt folgende: *)

Erste Classe. Säugethiere. Mammalia.

Sie haben ein Skelet, rothes, warmes Blut, ein Herz mit zwey Kammern und zwey Vorkammern, athmen durch Lungen, gebähren ihre Jungen lebendig, und säugen sie mit Milch eine Zeitlang an ihren Brüsten.

Zweyte Classe. Vögel. Aves.

Sie haben ein Skelet, rothes, warmes Blut, ein Herz mit zwey Kammern und zwey Vorkammern, athmen durch Lungen und legen Eyer.

Dritte Classe. Amphibien. Amphibia.

Sie haben ein Skelet, ein Herz mit einer Kammer und einer Vorkammer, rothes, kaltes Blut, athmen durch Lungen, die meisten legen Eyer, nur wenige gebäh-

*) Zoologe. Heft I. S. 41.

gebähren ihre Jungen lebendig und viele erlangen ihre Vollkommenheit erst nach verschiedenen Verwandlungen.

Vierte Classe. Fische. Pisces.

Sie haben ein Skelet, ein Herz mit Einer Kammer und Einer Vorkammer, rothes, kaltes Blut, keine Lungen, sondern athmen durch Kiemen.

Fünfte Classe. Insecten. Insecta.

Sie haben kein Skelet, ein Herz mit Einer Kammer ohne Vorkammer, einen kalten blutähnlichen Saft von mancherley Farbe, erlangen erst ihre Vollkommenheit nach verschiedenen Häutungen und zum Theil merkwürdigen Verwandelungen, athmen durch Luftlöcher, oder wie einige Wasserinsecten, durch den Hintern und haben völlig ausgebildete Sinneswerkzeuge und mehr als vier wahre, gegliederte Füße.

Sechste Classe. Würmer. Vermes.

Sie haben kein Skelet, ihr Herz, wenn es da ist, hat nur eine Kammer ohne Vorkammer, ihr blutähnlicher Saft ist kalt, sie leiden keine Verwandlung, haben keine vollkommen ausgebildete Sinneswerkzeuge, so wie keine wahren gegliederten Füße, und ein Athemholen hat man auch noch nicht bey ihnen bemerkt. *)

Der Ritter von Linne' beschreibt 6137 Arten Thiere, nämlich 230 Arten Säugethiere, 946 Arten Vö-

*) Meine N. G. Deutschl. I. S. 20.

Vögel, 292 Arten Amphibien, 404 Arten Fiſche, 3060 Arten Inſecten, und 1205 Arten Würmer; aber durch das ausgebreitete Studium der Naturgeſchichte, und die Entdeckungen, die man nach ihm gemacht hat, beläuft ſich die Anzahl der bekannten Thierarten gewiß ſchon auf 12000, und man nimmt daher ſogar nicht unwahrſcheinlich 25000 Thierarten an. Denn wie viele Gegenden der Erde ſind noch gänzlich in dieſer Abſicht ununtersucht? Wie viele Entdeckungen werden noch durch die immer mehr und mehr verbeſſerten Vergrößerungsgläſer gemacht werden? Ja wie groß müßte die Anzahl der Thiere werden, wenn wir die Tiefen des Weltmeeres durchſuchen könnten?

Vierter Abschnitt.

Von den Säugethieren *).

I. Allgemeine Beschreibung ihres äußern und innern Baues.

Das erste Kapitel.

Von den äußern Theilen.

Da sich die ganze Absonderung dieser Thierclasse von den andern auf ihren Bau gründet, so ist es jetzt Zeit diesen kennen zu lernen. Der thierische Körper besteht aus flüssigen und festen Theilen. Die festen Theile sind theils weich, theils hart. Wenn man daher weder auf die flüssigen Theile, noch auf den innern Körperbau Rücksicht nimmt, so scheint der thierische Körper, auch dieser Classe, aus zwey Hauptmassen zu bestehen: Fleisch und Knochen. Wir finden das Fleisch nie bloß, sondern allemal mit einer Haut überzogen. Diese Haut hat zu mancherley Verrichtungen und Bestimmungen verschiedene Oeffnungen von großer und kleiner Art, als den Mund, die Nasenlöcher, die Schweißlöcher ꝛc. und

*) Die Lehre von den Säugethieren heißt auch Mammalogie (Mammalogia).

und ist nach der verschiedenen Lebensart der Thiere, bald mehr oder weniger hart und dicht. Bey den meisten Säugethieren ist sie mit Haaren, bey andern mit Stacheln, bey noch andern mit Schuppen besetzt. Sie bestehet aus drey Lagen übereinander, die man wieder, als so viele besondere Häute ansehen kann. Die äußerste ist die Oberhaut, welche aus lauter kleinen, ungleichen, durchsichtigen Schuppen mit Furchen und Einschnitten, zwischen denen die Gefäße des Schweißes und der Ausdünstung liegen, zusammengesetzt zu seyn scheint. Sie hat keine Empfindung und beschützt die Wärzchen des Gefühls. Unter derselben liegt die Netzhaut, welche aus sehnigen Fasern zusammen geflochten ist, und sehr viele nervige Warzen, kleine Blutgefäße, Drüsen und Schweißlöcher enthält. Die dritte ist die Fetthaut, welche aus unzähligen Bläschen, und Zellen, die mit Fett angefüllt sind, zusammengesetzt ist.

Das Fleisch bestehet aus unzähligen Gefäßen, Fasern und Nerven. Von den Nerven ist oben schon geredet worden. Der Gefäße, als Behälter der flüssigen Theile, wird bey diesen weiter unten Erwähnung geschehen. Hier also nur von den Fleischfasern.

Wenn man den von der Haut entledigten thierischen Körper betrachtet, so sieht man, daß diese Fasern gar nicht in einer Richtung immer fortlaufen, sondern dieselbe beständig ändern; doch nicht einzeln, sondern in Vereinigung mit mehrern Fasern. Man bemerkt daher auch im Fleische Abtheilungen. Eine jede solche Abtheilung, die immer aus einem Bündel Fleischfasern besteht, heißt ein Muskel. Diese Muskeln machen unzählige, biegsame

Fasern aus, sind mit einigen Häutchen umgeben, mit Adern und Nerven durchflochten, an den Knochen, oder andern Theilen des Körpers vermittelst verschiedener Flechsen befestiget und mit einander verbunden. Man unterscheidet an ihnen den Kopf, das obere stumpfe Ende, ferner den Bauch, den dicken mittlern Theil und zuletzt den Schwanz oder die Sehne, nämlich das untere spitzige Ende, welches in einem Knochen oder andern festen Theil eingesenkt ist. Sie besitzen die besondere Eigenschaft, durch jeden fremden Reiz sich zusammenzuziehen, welches man ihre Reizbarkeit nennt, und dadurch wird die Bewegung des Körpers und jedes einzelnen Gliedes bewerkstelliget. Durch diese Einrichtung sind die Muskeln im Stande die Knochen unter einander zu verbinden und zu bewegen, welche ihnen hingegen wieder zur Stütze dienen. Der Kopf aller derjenigen, welche zur Bewegung der Knochen dienen, ist an den einen, und ihr Schwanz am andern Knochen befestigt. Kopf und Schwanz bestehen aus zähen Flechsen; der Bauch aber ist fleischig. Sobald ein Glied bewegt werden soll, schwillt der Bauch des Muskels auf; dadurch wird er kürzer und zieht die Flechse des Schwanzes sammt dem daran hängenden Knochen oder Gelenke nach demjenigen Knochen zu, der an dem Kopfe des Muskels befestigt ist. Wieder eine Anstalt, die Beweglichkeit der Gliedmaßen zu befördern, der die Pflanzen gänzlich entbehren.

Die Knochen selbst sind harte, unbiegsame, mehrentheils mit Mark erfüllte Theile, welche die weichern Theile des Körpers unterstützen, diesem seine Grundgestalt

stalt geben, und durch Gelenke zur Beförderung der Bewegung mit einander verbunden sind.

Die ganze Zusammenstellung derselben, ihre gegliederte Verbindung, ihre Bekleidung mit Fleisch, welches mit einer Haut überzogen ist; dieß alles bildet die äußere Gestalt der Thiere.

Wir bemerken an den Säugethieren Kopf, Rumpf, und Gliedmaßen.

Am Kopfe unterscheidet man die Hirnschale und das Gesicht. Die Hirnschale ist der oberste Theil des Kopfs und besteht aus denjenigen Knochen, welche die Höhle bilden, worinnen sich das Gehirn befindet. Der vordere Theil derselben heißt der Vorderkopf, der zuweilen mit hornartigen Auswüchsen, die man Hörner nennt, versehen ist, und der hintere, der vom Scheitel bis an den Nacken geht, der Hinterkopf. Im Gesichte zeigt sich zuerst oben die Stirn, unter welcher die Augen stehen. In der Mitte des Gesichts läuft die Nase hin, an deren Seiten die Backen und weiter hinten die Ohren stehen. Der Mund wird durch zwey Knochen, die man die obere und untere Kinnlade (Kiefer) oder die Kinnbackenknochen nennt, gebildet. Diese enthalten die Zähne der Thiere, und formen unten bey manchen ein merkliches, bey andern ein unmerkliches Kinn. Derjenige Theil, wodurch Kopf und Rumpf zusammenhängen, ist oft dünner, und heißt der Hals. Sein vorderer Theil wird die Kehle und sein hinterer der Nacken genannt. Der Rumpf wird in den Oberleib und in den Unterleib eingetheilt. Der Vordertheil des Oberleibes

heißt die Brust, der Hintertheil der Rücken, was zwischen beyden liegt, sind die Seiten. Am Unterleibe hingegen wird der vordere Theil der Bauch, der hintere Theil die Lenden, das Kreuz, und weiter unten das Gesäß genennt. Diese verschiedenen Theile werden vorzüglich durch die Knochen des Rückgrats, des Brustbeins und der Ribben gebildet. Das Rückgrat besteht aus einer gewissen Anzahl von Wirbeln, von denen einige den Hals, die meisten den Rücken befestigen, und oft einige außerhalb des Rumpfes noch die Grundlage des Schwanzes werden. Das Brustbein läuft von der Kehle an in der Mitte der Brust der Länge nach herab, und vereiniget vermittelst eines Knorpels den größten Theil der Ribben mit sich. Diese sind an dem Rückgrate befestiget, wölben sich nach der Brust zu, und bilden daselbst eine Höhle, in welcher verschiedene Theile der edlern Eingeweide eingeschlossen liegen. Am Hintertheile des Unterleibes liegen noch die Zeugungswerkzeuge, und an der Brust oder dem Bauch oder an beyden zugleich, die dem weiblichen Geschlechte besonders zur ersten Ernährung der Jungen so nöthigen Milchgefäße, die Brüste und Zitzen.

Die äußern Gliedmaßen, die besonders den Thieren zur Bewegung dienen, sind mehrentheils vier Füße, oder zwey Arme und zwey Beine. Die Vorderfüße sind meist durch das Schulterblatt mit dem Körper verbunden, und bestehen aus dem Hinterarm (Oberarm), der aus einem cylindrischen Knochen, dem Vorderarm, welcher aus zwey länglichen Knochen, und der Hand oder dem Fuß im engen

Verstande,

Verstande, der wieder aus mehrern Knochen und Gelenken zusammengesetzt ist. Zu den Hinterfüßen gehören an jeder Seite das Hüftbein, das aus einem einzigen Knochen, der Schenkel, welcher aus zwey langen Knochen, und der eigentliche Fuß, der aus verschiedenen Gelenken und Knochen besteht. Bey den meisten Thieren dieser Classe bemerkt man äußerlich die Fingergelenke und Knochen der Vorder- und Hinterfüße; bey andern aber sind sie mit einer Haut umzogen, die sie bald mehr bald weniger einer Fischflosse ähnlich macht.

Dieser ganze äußere Körperbau der Säugethiere erhält durch seine Symmetrie Schönheit und Anmuth für das Auge. Die Symmetrie besteht nämlich darinn, daß ein ungleiches und unähnliches Mittelding durch gleiche und ähnliche Theile eingefaßt wird. So stehen z. B. an jeder Seite der ungleichen Nase ein Auge, ein Ohr, eine Wange; und es würde häßlich aussehen, wenn an der einen Seite nur ein Auge, ein Ohr, und an der andern von beyden keins wäre. Doch ist diese symmetrische Stellung nicht bloß der Schönheit halber da, sondern hat auch, wie sich leicht einsehen läßt, ihren anderweitigen sehr großen Nutzen.

Das zweyte Kapitel.

Von den innern Theilen *).

Die Natur mußte den Thieren, die sich willkührlich bewegen konnten, eine andre Art der Ernährung anweisen, als den Pflanzen, die nur vermittelst der Wurzeln an einem gewissen Orte befestigt zu seyn brauchten, wo sie ihre Nahrung durch die Säugekraft dieser Theile zu sich nehmen, verdauen, dadurch wachsen und sich erhalten konnten. Alle drey Naturreiche wurden daher aufgeboten, den Thieren ihre Schätze zu ihrer Nahrung aufzuthun. Der Mund der meisten Säugethiere ward mit Zähnen versehen, welche die verschiedenen Nahrungsmittel so verkleinern und zubereiten sollten, daß sie, in einen Saft verwandelt, den Körper ernähren und erhalten konnten. Die Zunge, Lippen und Wangen mußten durch Hülfe einer Feuchtigkeit, welche aus verschiedenen Drüsen quillt, und die Eigenschaft einer Seife besitzt, die verschiedenen Speisen, die oft schwer zu vereinigen seyn würden, aufs beste mit einander vermischen und in einen Brey verwandeln. In diesem Zustande gleiten sie alsdann sehr gut von der Zunge hinab bis zur Oeffnung des Schlundes. Hier ereignete sich aber eine Schwierigkeit, welcher abgeholfen werden mußte. Die Thiere hatten zu ihrer Erhaltung Luft nöthig, und diese

*) Nach Unzer im Arzt, der gerade für diesen Zweck schon eine so treffliche Beschreibung geliefert hat, daß ich nichts besser zu machen wüßte.

diese sollte durch die Kanäle des Mundes und der Nase geschöpft werden. Die Luft mußte zu dieser Absicht in ein großes Eingeweide dringen, das die ganze Brust ausfüllt, und in dessen Mitte das Herz, als in einem weichen Bette schlagen konnte. Dieses Eingeweide, welches die Lunge genannt wird, ist einem großen Beutel ähnlich, an dessen obern Ende eine starke Röhre befestiget ist, durch welche die Luft in unzählige Zellen und Gänge, woraus das innere Gewebe dieses Eingeweides besteht, hineindringen kann. Der Kopf dieser Luftröhre öffnete sich oben im Halse; und nun kam es bloß darauf an, zu verhindern, daß die Speisen, welche in den Schlund gepreßt werden sollten, nicht in die Oeffnung der Luftröhre fielen. Diese mußte daher eine harte, mit knorpligen Reifen versehene Röhre seyn, damit der Aus- und Eingang der Luft immer frey bliebe. Der Schlund hingegen, durch welchen die Speisen in den Magen gepreßt werden sollten, mußte aus weichen Fleischfasern bestehen, die sich, wenn sie ein Bissen ausdehnte, wieder zusammenziehen, und ihn immer weiter hinunter treiben konnten. Solchergestalt war es nicht möglich, den Schlund unter die Luftröhre zu setzen, weil ihn diese, vermöge ihrer Härte, zusammengedrückt haben würde. Er läuft also unmittelbar hinter der Luftröhre, die den vordern Theil im Halse einnimmt, und sich bey vielen Thieren auswendig an demselben sehr deutlich fühlen läßt, herab. Er kann also die Speisen auf keine andre Weise empfangen, als daß sie über die Oeffnung der Luftröhre hinwegschlüpfen. Damit nun nichts von denselben da hineinfallen möchte, so wurde die Oeffnung der Luft-

röhre mit einem Deckel versehen, welchen die Speisen, wenn sie zum Schlunde gehen, so genau verschließen, daß nicht das geringste in die Lunge fallen kann, und welcher sogleich wieder aufspringt, und die Luftröhre öffnet, sobald der Schlund die Nahrungsmittel empfangen hat.

Der Schlund geht hinter der Lunge und Brust am Rücken hinab, durchbohrt gewissermaßen das Queer- oder Zwerchfell, eine Haut, welche die ganze Höhle des Körpers inwendig in zwey Theile theilet, darin das oberste Behältniß die Lunge mit dem Herzen, das unterste aber viele andere Eingeweide in sich faßt, und eröffnet sich endlich in dem Magen. Diese Verdauungsmaschine liegt dicht unter dem Zwerchfelle in der linken Seite des Bauches, und erstreckt sich nach der rechten Seite hin, wo sie zum Theil von der Leber bedeckt wird. In der Leber, einem sehr großen Eingeweide des Unterleibes, das mit einem sehnigen Bande an das Zwerchfell befestigt ist, wird die Galle ausgearbeitet, und durch gewisse Röhren in dem ersten Darme, der an den Magen stößt, geleitet. Sobald die Speisen in den Magen gekommen sind, werden sie mit neuen Säften, welche aus mancherley zarten Röhrchen herausdringen, vermischt und durch die stete Reibung, Zusammenziehung und Ausdehnung des Magens sowohl, als durch die Gewalt der Wärme und das Schlagen der Adern in einen Brey verwandelt, welcher der Natur des thierischen Körpers nun schon angemessener worden ist, da er sich mit verschiedenen seiner eignen Säfte vermischt hat.

An

An der andern Seite des Magens hängt eine lange Reihe wunderbar durch einander geschlungener Därme, die einen großen Theil des Unterleibes ausfüllen, und sich zuletzt in dem Hintern öffnen und endigen. Sie sind von außen und innen mit Drüschen besetzt, die einen seifenartigen Saft enthalten, der in ihnen ausfließt, alle Theile des Speisesaftes aufs genaueste mit einander vereinigt, und so vermischt, daß daraus solche Säfte entstehen können, wie sie durch unsere Adern strömen. Das sanfte Zusammenziehen der Därme treibt diesen Nahrungsbrey immer weiter fort, und er würde durch den natürlichen Weg wieder weggehen, wenn nicht neue Maschinen da wären, die ihn an einen bessern Ort leiteten.

Auf der auswendigen Fläche der Därme ist eine Haut befestiget, so wie ohngefähr die Leinewand an einem Fahnenstocke angeheftet ist. Sie heißt das Gekröse und ist voll zarter Röhrchen, die sich in der inwendigen Höhle der Därme öffnen. Diese kleinen Röhren haben die Eigenschaft, daß sie den feinsten Saft aus dem Breye der Speisen, wenn er in den Därmen vor ihnen vorbey geht, in sich saugen und weiter fortführen. Der gröbere Theil des Breyes aber bleibt in den Därmen zurück und wird immer weiter bis zu ihrer Oeffnung fortgetrieben, und als eine überflüßige Masse aus dem Körper weggeschafft.

Der Saft, den die kleinen Gefäße in der Haut des Gekröses aus den Speisen an sich gezogen haben, und der wegen seiner weißen Farbe der Milchsaft genannt wird, versammelt sich endlich beym Rücken in ein gemeinschaftliches

schaftliches Behältniß, das Milchbehältniß, in welchem sich alle die besondern kleinen Milchgefäße ergießen. Aus diesem Behältnisse steigt eine Röhre im Rücken in die Höhe, und öffnet sich auf ihrer andern Seite in eine Blutader. Der Gang, der zu diesem Behältnisse führt, ist inwendig mit verschiedenen kleinen Fallthüren versehen, welche sich zwar öffnen, wenn der Milchsaft von unten gegen sie andringt, sich aber fest verschließen, wenn er hernach wieder zurückgehen wollte. Wo sich der Milchgang in die Blutader öffnet, ist eine andere kleine Fallthür angebracht, die der ankommende Milchsaft aufstoßen, und sich Eingang verschaffen kann, die aber das Blut, wenn es vor ihr vorbeyfließt, zerdrücket, und sich also den Weg selbst verschließen muß, in den Milchgang hineinzudringen.

Jetzt ist nun der Nahrungssaft im Blute. Das Blut aber selbst hält im Körper der Säugethiere einen steten Kreislauf, der folgendermaßen seinen Anfang nimmt.

Das Herz, welches in der Lunge eingehüllt liegt, ist eine fleischige Maschine, die zwey Höhlen bildet, welche durch eine Zwischenwand von einander abgesondert werden. Es ist in einer steten Bewegung, welche in einem wechselsweisen Zusammenziehen und Ausdehnen besteht. Aus der linken Kammer des Herzens geht ein allgemeiner Stamm von einer Ader heraus, welche die große Pulsader genannt wird. Diese Ader zertheilt sich bald in viele andere, welche theils in die Höhe, theils in die Tiefe steigen, und sich mit ihren unzähligen Zweigen, die immer kleiner und enger

werden,

werden, je weiter sie sich vom Herzen entfernen, in alle Theile des Leibes verbreiten. In die Adern spritzet die linke Herzkammer das Blut durch ihren Druck mit einer solchen Gewalt, daß es bis in die zärtesten Röhrchen der letzten Nebenzweige hineindringt. Man muß sich vorstellen, daß in diesen Adern das Blut von dem weitern Ende derselben stets gegen die engern getrieben wird, welches nicht geschehen kann, ohne bey jedem Stoße des Herzens die Häute dieser Adern auseinander zu dehnen und aufzuheben. Diese Bewegung heißt der Pulsschlag, der also bloß eine Wirkung des Herzschlages ist, und geschwinder oder langsamer erfolgt, je nachdem sich das Herz geschwinder oder langsamer zusammenzieht. Man nennt deswegen alle die Adern, in welchen sich das Blut vom Herzen hinweg, das ist vom weitern Ende gegen das engere, bewegt, Pulsadern.

Diesen Weg vom Herzen bis zu den äußersten Theilen des Körpers macht das Pulsaderblut nicht umsonst. Es sind nämlich allenthalben auf diesem Wege Maschinen aufgestellt, deren jede dem Blute etwas abnimmt, um es im Körper zu gewissen Absichten auszuspenden. Einige von diesen Maschinen sind aus so kleinen Röhrchen zusammengesetzt, daß sie die gröbsten Theile des Blutes, welche eine rothe Farbe haben, nicht in sich hineinlassen, dagegen aber eine andere feinere Feuchtigkeit aus dem Blute an sich ziehen. Einige ziehen nur die wässerigen, andere nur die öhligen, und noch andere die salzigen Theile heraus, und dieß thun sie alle nur an solchen Orten, wo diese Säfte, die sie aus dem Blute ausgesogen haben, zu gewissen andern Zwecken

verbraucht

verbraucht werden können. Kömmt z. B. das Pulsaderblut in die Gegend des Mundes, wo die Speicheldrüsen liegen, so ziehen diese diejenige Materie aus demselben, die wir bey dem Menschen Speichel nennen, welche dann durch kleine Abführungsgefäße in den Mund fließt, und die Speisen verdaulich macht. Kömmt es zum Schlunde und zu den Gedärmen, so wird aus 1000 Drüschen ein schlüpfriger Saft aus demselben gezogen, um diese Gänge geschmeidig zu erhalten. Kömmt es zur Leber, so sondert diese die Galle aus dem Geblüte heraus, um sie der Gallenblase und dann den Speisen mitzutheilen.

Im Oberrücken sind wiederum ein Paar Maschinen, die Nieren, befestigt, die das Salzwasser aus dem Blute in sich ziehen, es in eine Blase leiten, und aus dieser wieder durch einen andern Weg, als eine unnütze Feuchtigkeit aus dem Körper herausschaffen. In andern Theilen, durch welche sich die Pulsadern verbreiten, wird Milch, Fett, die zur Zeugung nöthige Saamenfeuchtigkeit oder sonst eine andere Feuchtigkeit abgesondert, und dieß ist überhaupt das Geheimniß, wodurch die Natur aus unserm Blute alle die Säfte absondert, die ihr entweder zu besondern Absichten nöthig sind, oder die als unnütz aus dem Körper weggeschafft werden müssen.

Außer diesen besondern Eingeweiden und Maschinen, welche von dem Blute, das ihnen die Adern zuführen, ihren Theil nehmen, giebt es eine große Menge anderer Arten, welche durch ihre kleinen Oeffnungen den rothen Theil des Blutes nicht hindurch lassen, sondern

dern nur eine gallerige und klebrige Feuchtigkeit in sich saugen. Diese kleinen Wassergefäße führen den nahrhaftesten Theil des Blutes zu allen Enden und Punkten des Körpers hin, und lassen ihn zum Theil daselbst zurück. Hier setzt er sich an, vergrößert den Körper, dehnt ihn nach allen Seiten aus und ernährt ihn, bis durch viele neue Zusätze die Theile so stark und hart werden, daß sie nicht mehr nachgeben, da dann das Wachsthum des Körpers aufhört. Und wenn dieß endlich so weit geht, daß nach und nach die kleinsten Gefäße durch den immer zuströmenden Nahrungssaft gar erfüllt werden und verwachsen, so erfolgt der natürliche Tod der Thiere vor Alter, welchen aber sehr wenige erreichen.

Wenn das Blut endlich, nach so vielen Nachstellungen, in die äußersten Enden der Pulsadern gekommen ist, so passen auch hier noch einige kleine überall unter der Haut liegende Drüsen auf, um die allerfeinste Schärfe aus demselben in sich zu ziehen, und sie in Gestalt eines dünnen Dampfes, welcher die Ausdünstung heißt, auszuhauchen. Ist diese Ausdünstung so stark, daß sie auf der Haut in Tropfen zusammenfließt, so wird sie der Schweiß genannt.

Der übrige Theil des Bluts, der diesen Nachstellungen glücklich entgangen ist, fließt in den kleinsten Enden der Pulsadern so zart fort, daß man die rothen Blutkügelchen durch ein gutes Vergrößerungsglas ganz deutlich hintereinander durchrollen sehen kann. *) Diese kleinsten

*) Wer die Wunder des Schöpfers in der Feinheit der Adern und dem Kreislaufe des Blutes sehen will, der bringe

kleinsten Kanäle fangen aber alsdann bald an, sich wieder zu erweitern. Es werden größere Gefäße daraus, die sich in noch größere zertheilen, und worin das Blut von allen Seiten eben so wieder zum Herzen steigt, als es durch die Pulsadern davon ausgegangen war. Weil sich in diesen Adern das Blut vom engern Ende gegen das weitere bewegt, so kann der Stoß des Herzens nicht in sie wirken; daher haben sie keinen Puls, und heißen zum Unterschiede Blutadern.

Diese Blutadern führen nun das Geblüt sowohl aus den obern als untern Theilen des Körpers wieder nach dem Herzen zusammen, wo sie einen gemeinschaftlichen kurzen Kanal formiren, welcher das Blut wieder in die rechte Herzkammer ausschüttet. Aus dieser geht es nicht sogleich wieder in die linke hinüber, sondern es wird durch das Zusammenziehen des Herzens aus der rechten Kammer in eine Pulsader getrieben, welche sich in der ganzen Lunge in unendlich kleine Zweige ausbreitet, so daß daselbst alles Blut, was im ganzen Körper umgelaufen, und durch das Reiben und Erschüttern erhitzt worden ist, ehe es zu einem neuen Umlauf gelangen kann, durch die frische Luft, welche die Säugethiere in die Lunge ziehen, abgekühlet, und durch die Macht dieser Abkühlung wieder zusammengezogen wird, nachdem es sich durch die Erhitzung bey seinem Umlaufe sehr ausgedehnt hatte. Hier ist zugleich der Ort, wo der Milchsaft aus den Speisen, der sich in den Blutadern, wie oben

bringe die Schwimmhaut eines Frosches unter ein gutes Vergrößerungsglas.

oben bemerkt wurde, ergießt, wahrscheinlicherweise in rothes Blut verwandelt wird. Dieser nunmehr zu Blut gewordene Nahrungssaft strömt mit dem übrigen Blute aus der Lunge wieder zurück zum Herzen, und ergießt sich in die linke Kammer desselben, aus welcher er wieder zu allen Theilen des Körpers getrieben wird.

Hieraus sieht man, warum die Thiere täglich durch Speise und Getränke neues Blut verfertigen müssen, da jeder Umlauf, der doch geschwind vollzogen ist, das Blut so sehr abnutzt und ausmergelt, wie oben gezeigt worden ist. Man muß aber auch die erstaunliche Zertheilung der Blutgefäße bewundern, da kein Theil des thierischen Körpers, den nur eine Nadelspitze berühren kann, ohne ein Blutgefäß ist, das sich von der kleinsten Wunde ergießt.

II. Besondere Beschreibung der Körpertheile der Säugethiere, in sofern deren Vorkenntniß besonders zur Verständniß der nachherigen Beschreibungen der Thierarten hier nöthig ist.

A. Aeußerer Bau.

Das dritte Kapitel.

Von den Brüsten der Säugethiere, als dem Hauptcharakter der ganzen Classe. *)

Die erste Thierclasse unterscheidet sich dadurch von den andern hinlänglich, daß die Mütter die Jungen an den Brüsten (Euter, Gesäuge) *a*), in welchem aus dem Blute abgesonderte Milch sich befindet, eine Zeitlang ernähren und sie hat daher auch den Namen Säugethiere erhalten. Diese Brüste oder Euter sind mit Saugwarzen *b*) versehen. Es sind ihrer gewöhnlich noch einmal so viel, als die Mutter Junge zur Welt bringt. Ihre Lage ist verschieden. Sie sitzen 1) an der Brust: Bruseuter oder eigentlichen Brüste *c*), 2) am Bauche: Baucheuter *d*), oder 3) zwischen

*) S. Borkhausens zool. Terminologie. S. 66. Sulkows Anfangsgründe der Thiergeschichte I. 35.

a) Mammae.

b) Papillae.

c) Mammae pectorales.

d) — abdominales.

zwischen den Hinterfüßen: Schaameuter *e*). Sie liegen gewöhnlich frey und unbedeckt; bey einigen liegen sie aber auch in einem besondern Beutel oder Sack *f*) am Bauche, worin sich die säugenden Jungen verkriechen können, wie bey den Beutelthierarten. Wir bemerken auch meist beym männlichen Geschlechte diese Brüste, und wissen aber nicht, wozu sie eigentlich dienen, sie sind auch kleiner oder sitzen nicht an der nämlichen Stelle, wie beym Hengste, fehlen auch wohl ganz, wie beym Hamster.

Außer diesem auszeichnenden Unterscheidungsmerkmale kommen die Säugethiere auch noch darin überein, daß ihr Kopf durch einen langen oder kurzen Hals mit dem Rumpfe verbunden ist, daß sie meist vier Füße oder auch nur zwey vollkommene und selten gar keine, und eine Bedeckung von sehr verschiedener Art haben, und von getrennten Geschlechtern sind. Wenn man in der Folge eine genaue und richtige Beschreibung von den Säugethieren entwerfen will, so ist nöthig, daß man alle diese verschiedenen Theile bestimmt zu benennen weiß.

e) Mammae inguinales.

f) Folliculus abdominalis mammarum.

Das vierte Kapitel.

Von der Größe und Gestalt.

Wenn man die Größe eines Säugethiers im Ganzen oder auch seine einzelnen Theile ins Besondere angeben will, so wählt man dazu das Pariser-Maas *), bey welchem der Fuß 12 Zoll, der Zoll 12 Linien und die Linie 10 Scrupel enthält; man müßte denn durch besondere Umstände veranlaßt werden, sich des Rheinländischen, Leipziger **) oder eines andern Maafes zu bedienen, doch thut man alsdenn allezeit besser, jenes bey naturhistorischen Beschreibungen angenommene Maas beyzusetzen. Die ganze Gestalt des Körpers sucht man übrigens durch besondere Ausdrücke oder Vergleichungen anzugeben. So heißt der Körper eines Thiers sehr groß *g*), z. B. beym Elephanten, sehr klein *h*) bey der Maus; dickleibig *i*) ist es, wenn die Länge gegen die Dicke wenig beträgt, schmächtig *k*) umgekehrt; hager oder dürre *l*), wenn das Fleisch fehlt, und die Knochen vorstehen; hohlbäuchig *m*), wenn der Hinterleib sich einzieht, wie beym Windhund — schweinsartig *n*), mäuseartig *o*) u. s. w.

Das

*) Taf. I. Fig. 2.
**) Taf. I. Fig. 3.

g) Corpus maximum. *h*) minimum. *i*) quadratum. *k*) gracile. *l*) torosum. *m*) helvolum. *n*) suillum. *o*) murinum.

Das fünfte Kapitel.

Von der Bedeckung.

An der Haut der Säugethiere, die von verschiedener Dicke ist, bemerkt man 1) die Oberfläche, nach welcher sie: glatt *p*), runzlich *q*), gegittert *r*) knöpfig *s*), knotig *t*) oder schwielig *u*) ist. 2) Nach der verschiedenen Härte ist dieselbe: weich *v*), hart *w*), lederartig *x*), krustenartig *y*). 3) Nach ihrem Zusammenhange mit den innern Theilen: übergespannt und schlaff *z*). 4) Nach ihrer Bedeckung: nackend *a*), schuppig *b*), beschildet (große Schuppen) *c*), mit Ringen oder Gürteln versehen *d*), borstig (steife starre Haare) *e*), stachlig (dicker und stärker als Borsten) *f*), haarig *g*), rauch oder zottig *h*), pelzig *i*), wollig *k*), dichtbehaart und dünnbehaart *l*). Die Haare *m*), womit die meisten Säugethiere besetzt sind, scheinen gewächsartig, denn sie stecken mit ihren Zwiebelwurzeln in der Zellhaut und ziehen aus dem Fette derselben ihre Nahrung; inwendig sind sie hohl. Nach Verschiedenheit des Orts, wo sie stehen, bekommen sie auch verschiedene Namen: Haupt-

p) Cutis glabra. *q*) rugosa. *r*) cancellata. *s*) tuberculosa. *t*) nodosa. *u*) callosa *v*) mollis. *w*) dura. *x*) coriacea. *y*) crustacea. *z*) laxa. *a*) nuda. *b*) squamata. *c*) clypeata. *d*) cingulis, zonis. *e*) setosa. *f*) aculeata. *g*) pilosa. *h*) hirta. *i*) villosa. *k*) lanata. *l*) subpilosa. *m*) Pili.

haare *n*); Bart *o*) am Kinn; Mähnen *p*) am Halse u. s. w.; Bartborsten *q*) im Gesicht auf einzelnen Warzen, diese bekommen auch oft die Gestalt eines Knebelbarts *r*) um den Mund herum; Schopf *s*), langes Haarbüschel auf dem Scheitel; Nath *t*), die erhabenen Streifen von den verschiedenen Richtungen der Haare, wie bey den Hunden; Stern *u*), in einen Kreis gelegt, wie an der Stirn der Pferde; Wimpern *v*) und Augenbraunen *w*).

Nach der Farbe ist die Bedeckung, besonders in Ansehung der Haare, gleichfarbig *x*) oder ungleichfarbig *y*). Hat der Körper außer der Grundfarbe noch anders gefärbte Plätze, so ist er gefleckt *z*) und zwar getüpfelt *a*), rundgefleckt *b*), augenfleckig *c*), pfeilförmig, mondförmig, viereckig, dreyeckig, mit zusammenfließenden Flecken *d*), mit Streifen, Binden, Strichen, Linien versehen *e*); wenn die Streifen um einen walzenförmigen Theil laufen, so sind sie geringelt *f*), wie der Schwanz der Katzen.

Haare,

n) Coma. *o*) Barba. *p*) Iuba. *q*) Vibrissae. *r*) Mystaces. *s*) Crista. *t*) Sutura. *u*) Stella. *v*) Ciliae. *w*) Supercilia. *x*) Corpus unicolor. *y*) discolor. *z*) maculatum. *a*) punctatum. *b*) guttatum. *c*) ocellatum. *d*) maculis sagittatis, lunaribus, quadratis, trigonis, confluentibus. *e*) striatum, fasciatum, strigatum, liniatum. *f*) annulatum.

Haare, Wolle, Borsten und Stacheln sind auch oft einzeln verschieden gefärbt, so daß sie im Grunde, in der Mitte und an der Spitze anders sind, welches bey der Beschreibung auch angegeben werden muß. Ist endlich z. B. der Grund rothgelb und die Spitze weiß, so sagt man, die Farbe ist rothgelb mit weiß überlaufen u. s. w.

Die wilden Thiere behalten gewöhnlich die Farbe ihrer Art bey und verändern sie nach den Jahreszeiten und zwar so, daß der Haase im Sommer seinen dünnen und im Winter seinen dichtern Balg anzieht; allein bey den Hausthieren macht die Einschränkung, Nahrung ꝛc. daß in der Art selbst die Farben abändern, wie wir dieß an Hunden, Katzen und Pferden täglich sehen. Doch giebt es auch unter den wilden Thieren hierinn Ausnahmen, so daß zuweilen ganz weiße Hirsche ausfallen, welches Geschöpfe von schwächlicher Natur und schwächlichen Eltern scheinen, besonders wenn sie rothe Augen haben (Kackerlacken, Albinos); weiter giebt es auch, wiewohl selten, geschäcktes und sogenanntes Bläßwildpret, schwarze Rehe, geschäckte Eichhörner u. s. w.

An manchen Thieren haben die Haare noch die besondere Eigenschaft, z. B. an der Katze, dem Haasen, Marder, Pferde, daß sie elektrisch sind; sie geben nämlich, wenn sie stark gestrichen werden, ein Knistern und im Dunkeln Funken von sich, und richten sich, wenn man mit der Hand in einer kleinen Entfernung darüber hinfährt, nach derselben in die Höhe.

Das sechste Kapitel.

Von dem Kopfe, dessen Theilen und dem Halse.

Am Kopfe *g*) unterscheidet man den Vorderkopf *h*) oder das Gesicht, den Scheitel *i*) und Hinterkopf *k*). Zwischen Scheitel und Augen liegt die Stirn *l*). Diese ist verschieden. 1) Nach Verhältniß zum ganzen Gesicht: proportionirt (der dritte Theil des Gesichts) *m*), kurz *n*), lang oder hoch *o*). 2) Nach der Erhabenheit: flach *p*), niedergedrückt *q*), gewölbt *r*), 3) Nach der Oberfläche: glatt *s*), runzlich *t*), gefurcht *u*).

Zwischen Augen und Ohren und noch eine Strecke über denselben liegen die Schläfe *v*), die entweder nackt *w*) oder behaart *x*) sind. Die Gegend zwischen der Nase, dem Mund und den Ohren nennt man Backen *y*) und die erhabene Gegend unmittelbar unter den Augen die Wangen *z*); jene sind glatt, runzlich, gefurcht, nackt, behaart, schmal, breit, eingedrückt oder eingefallen und aufgedunsen oder aufgeblasen *a*); diese rund hervorstehend, oder beygedrückt *b*).

Die

g) Caput. *h*) Sinciput. *i*) Vertex. *k*) Occiput. *l*) Frons. *m*) F. proportionata. *n*) brevis. *o*) alta. *p*) planx. *q*) depressa. *r*) convexa. *s*) laevis. *t*) rugosa. *u*) sulcata. *v*) Tempora. *w*) T. nuda. *x*) pilosa. *y*) Buccae. *z*) Genae. *a*) B. laeves, rugosae, sulcatae, nudae, pilosae, tenues, latae, compressae, tumidae. *b*) G. gibbae, compressae

Die gläsern scheinenden Kugeln, die wir die Augen nennen, sind hervorstehend *c*), oder tiefliegend *d*), auch wohl gar unsichtbar und bedeckt *e*), und die Pupille oder die Oeffnung des farbigen Sterns ist bey den meisten Thieren krausrund *f*), bey einigen aber länglich, entweder nach der Länge (Katze) oder nach der Breite der Augen (Hirsch) *g*). Den Raubthieren, welche ihre Geschäffte meist bey der Nacht treiben, war eine längliche Oeffnung nothwendig, weil diese das Auge mehr erweitert als die runde, und dadurch mehr Lichtstrahlen im Dunkeln aufgefangen werden können. Am Tage zieht sich eine solche längliche Pupille sehr zusammen und läßt nur einen kleinen Ritzen, weil ohne dieß Vermögen des Zusammenziehens durch die häufig einbrechenden Lichtstrahlen die sehr empfindliche Nervenhaut leicht beschädigt und dadurch das Auge verdunkelt werden könnte.

In Ansehung der Größe der Augen findet sich auch eine merkliche Verschiedenheit, so wie in der Lage, nach welcher sie nahe bey einander, oder entfernt stehen, oder auch schief *h*) gegen die Nase gerichtet sind. Die Augenbraunen sind erhaben oder borstig *i*), und außer den Augenliedern haben noch einige Thiere eine

c) Oculi prominentes. *d*) profundi. *e*) tecti. *f*) Pupilla rotunda. *g*) oblonga, longitudinalis s. transversa. *h*) Oculi approximati, distantes, obliqui. *i*) Supercilia gibba, setosa.

innere Augendecke, die Nickhaut *k*), durch welche ihr Auge noch eines besondern Schutzes genießt, z. B. der Dachs; ingleichen findet man auch unter den Augen gewisse Säcke oder Beutel *l*), so wie auch Thränenhöhlen *m*) (Hirsch).

Die Nase der Säugethiere hat eine sehr verschiedene Bildung. Sie ist verschieden 1) nach ihrer Gestalt: hervorragend *n*), gerade *o*), aufwärts gebogen *p*), unterwärts gebogen *q*), platt gedrückt *r*), breit *s*), zusammengedrückt *t*), trichterförmig *u*), hufeisenförmig *uu*), gerinnelt *uuu*), erhaben gerandet *v*). 2) Nach dem Baue der Spitze: zugespitzt *w*), spitzig *x*), pfriemenförmig *y*), lanzetförmig *z*), stumpf *a*), abgeschnitten *b*), herzförmig *c*), spiesförmig *d*). Nach der Länge: kürzer *e*) als die Oberlippe, länger *f*) als die Oberlippe, in einen kurzen oder langen Rüssel verlängert *g*). Dieser ist *a*) nach seiner Gestalt und Spitze; stumpf *h*), abgeschnitten

k) Membrana nictitans. *l*) Sacculus. *m*) Sinus lacrimalis. *n*) Nasus prominens. *o*) rectus. *p*) simus. *q*) resimus. *r*) depressus. *s*) latus. *t*) compressus. *u*) infundibuliformis. *uu*) ferro equino similis. *uuu*) cananiculatus. *v*) carinatus. *w*) acuminatus. *x*) acutus. *y*) subulatus. *z*) lanceolatus. *a*) obtusus. *b*) truncatus. *c*) cordatus. *d*) hastatus. *e*) abbreviatus. *f*) elongatus. *g*) rostratus; rostrum. *h*) R. obtusum.

schnitten *i*), zugespitzt *k*), pfriemenförmig *l*) und ausgebreitet (vorne breiter als hinten) *m*). b) Nach seiner Bewegbarkeit: beweglich und unbeweglich *n*); in einen langen beweglichen Rüssel verlängert *o*). Dieser ist a) nach seiner Gestalt: röhrenförmig *p*), zugespitzt *q*). b) Nach seiner Bewegbarkeit: das Thier kann ihn verlängern und verkürzen *r*), oder wie eine Hand brauchen *s*) (Elephant). 4) Nach dem äußern Ansatze: einfach *t*), geblättert *u*), gehörnt *v*).

Die doppelten Nasenlöcher sind 1) nach ihrer Gestalt: kreisrund *w*), eyrund *x*), länglichtrund *y*), mondförmig *z*), gespalten *a*), gewunden *b*), röhrig *c*), kammförmig *d*), warzig *e*), hervorstehend *f*). 2) Nach ihrer Größe: weit *g*), eng *h*). 3) Nach ihrer Bekleidung: nackend *i*), inwendig behaart *k*).

Viele Raubthiere sind mit einem sehr scharfen Geruch begabt. Die mehresten Säugethiere haben ein äußeres Ohr.

Dieß

i) R. truncatum. *k*) acuminatum. *l*) subulatum. *m*) repandum. *n*) mobile, immobile. *o*) proboscideus; proboscis. *p*) Proboscis cylindrica. *q*) acuminata. *r*) retractilis. *s*) prehensilis. *t*) N. simplex. *u*) foliatus. *v*) cornutus. *w*) Nares orbiculatae. *x*) ovalae. *y*) oblongae. *z*) lunatae. *a*) fissae. *b*) spirales. *c*) tubulatae. *d*) cristatae. *e*) carunculatae. *f*) prominulae. *g*) amplae. *h*) angustae. *i*) nudae. *k*) hirtae.

Dieß ist 1) nach Verhältniß zum Kopfe: groß *l*), klein *m*), sehr lang *n*), wenn es die Kopfslänge übertrifft. 2) Der Gestalt nach: zugespitzt *o*), breit *p*), schmal *q*), eyrund *r*), dreyeckig *s*), mondförmig *t*), krugförmig *u*), trichterförmig *v*), einfach *w*), doppelt *x*), bedeckelt *y*), mit Anhängen versehen *z*). 3) Nach der Spitze: spitzig *a*), abgerundet *b*), etwas gewölbt *c*), ausgebreitet *d*), ganz *e*), gespalten *f*). 4) Nach seiner Steifigkeit: aufgerichtet *g*), ganz hängend *h*), halb hängend *i*) und an der Spitze hängend *k*). 5) Nach der äußern Bekleidung: nackt *l*), behaart *m*), dünnbehaart *n*), an der Spitze mit einem Haarbüschel versehen *o*), am Rande nackt *p*). 6) Nach seiner Beweglichkeit: beweglich, unbeweglich *q*).

Die äußern Ohren dienen vorzüglich dazu, daß die Thiere auch einen schwachen Schall noch bemerken können, da sie mit denselben viele schallende Strahlen auffangen können.

l) Auricula s. auris longa. *m*) brevis. *n*) longissima. *o*) acuminata. *p*) lata. *q*) angusta. *r*) ovata. *s*) triangula. *t*) lunata. *u*) urceolata. *v*) infundibuliformis. *w*) simplex. *x*) biplicata. *y*) aperculata. *z*) appendiculata. *a*) acuta. *b*) rotunda. *c*) gibba. *d*) patula. *e*) integra. *f*) bifida. *g*) erecta. *h*) pendula. *i*) semipendula. *k*) apicibus pendulis. *l*) nuda. *m*) pilosa. *n*) subpilosa. o) apice barbata. *p*) margine nuda. *r*) mobilis, immobilis.

können. Die wehrlosesten Thiere, z. B. die Mäuse, sind von der Natur als eine Entschädigung für die Entbehrung starker körperlicher Waffen, womit sie sich gegen ihre Feinde vertheidigen könnten, mit einem sehr feinen Gehör begabt, wodurch sie sich zu retten im Stande sind.

Der Fledermaus, deren innerer vorderer Ohrknorpel sehr verlängert ist, aufrecht steht, und gleichsam noch ein eignes inneres Ohr zu bilden scheint, schreibt man ein doppeltes Ohr auf jeder Seite zu. Es ist dieß aber nichts anders, als eine Ohrdecke, womit die Fledermäuse bey ihrem Schlaf, wenn sie den äußern größern Ohrlöffel in Falten legen, die Oeffnung des Ohrs verschließen, damit, vornehmlich bey ihrem Winterschlafe, Insekten und andere Unreinigkeiten, welche dieses Sinnwerkzeug zerstöhren könnten, abgehalten werden.

Der Mund *r*) der meisten Säugethiere hat zwar im Ganzen durch seine zwey horizontal liegenden Kinnladen einerley Hauptanlage, allein ohne daß diese entweder von gleicher oder ungleicher Länge sind, so leidet seine Gestalt durch die innern und äußern Theile desselben gar merkliche Abweichungen.

Aeußerlich sind die beyden Kinnladen von den Lippen bedeckt, durch deren Muskeln die untere bewegt und dadurch der Mund geöffnet und geschlossen werden kann. Die Oberlippe *s*) bedeckt die obere und die Unterlippe *t*) die untere Kinnlade. Diese Lippen sind:

r) Os. *s*) Labium superius. *t*) inferius.

sind: dünn *u*), aufgeworfen *v*), schlaff hinterhängend *w*), gespalten *x*) (daher der Hasenschart *y*)), gefurcht *z*), wenn oben eine Vertiefung von der Nase nach dem Munde läuft. Wenn die Kinnladen, besonders die obere, weit hervorragen, und die Nase länger ist, als die Lippe, oder mit ihr gleiche Länge hat, so nennt man dieß eine Schnauze. Diese ist: kurz, lang, kegelförmig, zugespitzt, abgerundet, abgestumpft, vorne gefurcht. Bisweilen ragen die Kinnladen mit den Lippen und der Nase sehr weit hervor und bilden einen Rüssel, an dessen Ende sich der Mund befindet. Dieser Rüssel ist 1) in Absicht seiner Gestalt: röhrenförmig *a*), trichterförmig *b*), kegelförmig *c*), pfriemenförmig *d*). 2) In Absicht seiner Spitze: zugespitzt *e*), stumpf *f*), abgestumpft *g*), abgerundet *h*). 3) Nach seiner Oberfläche: behaart *i*), dünnbehaart *k*), nackt *l*).

Außer der Zunge, der weiter nicht gedacht werden soll, haben mehrere Thiere, wie viele Affen, der Hamster u. s. w. in dem Munde Backentaschen *m*). Es sind dieß häutige Säcke, die sich an den Backen befinden, und

u) Labia tenuia. *v*) tumida. *w*) pendula. *x*) fossa. *y*) Fissura leporina. *z*) sulcata. *a*) Rostrum cylindricum. *b*) infundibuliforme. *c*) conicum. *d*) subulatum. *e*) acuminatum. *f*) obtusum. *g*) truncatum. *h*) rotundatum. *i*) pilosum. *k*) subpilosum. *l*) nudum. *m*) Sacculi s. Ventriculi buccales.

und zum Verbergen oder zum Einschleppen der Speisen dienen.

Der unterste Theil des Gesichts ist das Kinn. Es wird von der untern Kinnlade gebildet, und ist 1) in Absicht seiner Gestalt: breit *n*), schmal *o*), kurz *p*), verlängert *q*), zugespitzt *r*), abgerundet *s*), gefurcht *t*). 2) Nach seiner Richtung: hervorstehend *u*), verborgen *v*). 3) In Absicht seiner Bekleidung: bärtig *w*), bartlos *x*).

Einigen Thieren hat die Natur Hörner *y*) mitgetheilt, um sich damit wie andere mit den Zähnen oder Krallen zu vertheidigen. Es sind Gewächse, deren Wurzeln in der Hirnschale und ihrer Bedeckung liegen und welche eine kürzere oder längere Zeit nach ihrer Geburt hervorbrechen und nach einer gewissen Größe als ein Zeichen der Mannbarkeit angesehen werden können. Bey einigen Gattungen, z. B. der Hirschgattung, sind die Weibchen gewöhnlich ungehörnt, bey andern aber, wie bey der Ziegengattung, haben sie kleinere Hörner.

Sie sind 1) nach ihrer Dichtigkeit: hohl *z*), dicht *a*). 2) Nach ihrer Dauer: beständig *b*), jährlich abfallend *c*). 3) Nach ihren Enden oder Auswüchsen:

n) Mentura latum. *o*) angustum. *p*) breve. *q*) elongatum. *r*) acuminatum. *s*) rotundatum. *t*) sulcatum. *u*) prominulum. *v*) reconditum. *w*) barbatum. *x*) imberbe. *y*) Cornua. *z*) C. cava. *a*) solida. *b*) perennia. *c*) decidua.

wüchsen: einfach *d*), ästig *e*). Dieß letztere giebt die Geweihe, deren Hauptstamm, woran die Enden stehen, Stange *f*) heißt. 4) Nach der Spitze: spitzig *g*), stumpf *h*), mit einfacher Spitze *i*), gespalten *k*), handförmig *l*). 5) In Absicht ihrer Oberfläche: eben *m*), runzlich *n*), gefurcht *o*), knotig *p*), geringelt *q*), gewunden *r*). Nach ihrem Umrisse: rund *s*), platt *t*), zusammengedrückt *u*), dreyseitig *v*), scharfgerandet *w*). 7) Nach ihrer Gestalt: ganz gerade ∝), schlängelnd gebogen *y*), oben in einen Haken gebogen *z*), bogenförmig gekrümmt *a*), mondförmig *b*), spiralförmig gewunden *c*). 8) In Absicht ihrer eigenen Richtung ohne Beziehung auf einander: gerade aufgerichtet *d*), vorwärts gerichtet *e*), rückwärtsliegend *f*), nach außen gekrümmt *g*), nach innen gekrümmt *h*). 9) In Absicht ihrer Richtung in Beziehung auf einander: aus einander gesperrt *i*), zusammenneigend *k*). 10) Nach ihrem Stande gegen einander: weit aus einander *l*), dicht beysammen *m*).

Noch

d) simplicia. *e*) ramosa. *f*) Caulis. *g*) C. acuta. *h*) obtusa. *i*) apice simplici. *k*) bifida. *l*) palmata. *m*) laevia. *n*) rugosa. *o*) sulcata. *p*) nodosa. *q*) annulata. *r*) torta. *s*) teretia. *t*) plana. *u*) compressa. *v*) trigona. *w*) carinata. ∝) recta. *y*) flexuosa. *z*) uncinata. *a*) arcuata. *b*) lunata. *c*) spiralia. *d*) erecta. *e*) reduncа. *f*) reclinata. *g*) extrorsum curvata. *h*) introrsum curvata. *i*) divaricata. *k*) conniventia. *l*) distantia. *m*) approximata.

Noch andere Vertheidigungsmittel, die wir im Vorbeygehen nur berühren wollen, enthalten die Drüsen, welche manche Thiere am After haben, in welchen sich eine übelriechende Feuchtigkeit sammelt, die ihre Feinde von ihnen abhält. So verabscheuen die mehresten Katzen und Hunde die stinkende Feuchtigkeit, die sich in den Bisamdrüsen der Wieselarten befindet. Auch scheint das Schwimmen, das fast alle Thiere verstehen, ein allgemeines Rettungsmittel vor ihren Feinden zu seyn.

Der Scheitel ist platt oder niedergedrückt *n*), gewölbt *o*), zugespitzt *p*), gefurcht *q*), gekielt *r*), mit erhabnen Knöpfchen oder Warzen besetzt *s*), mit einem Haarbüschel versehen *t*).

Der dünnere Theil, welcher bey den meisten Säugethieren den Kopf mit dem Rumpfe verbindet, ist der Hals. Er ist 1) in Rücksicht der Länge: lang *u*), d. i. länger als der Kopf, kurz *v*). 2) In Absicht seiner Gestalt: rund *w*), fast rund *x*), zusammengedrückt *y*). 3) In Absicht seiner Bekleidung: nackt *z*), behaart *a*). Die obere Seite heißt der Nacken *b*); wo dieser sich mit dem Hinterkopfe verbindet, das Genick *c*), welches bey vielen Thieren, z. B. bey den Haasen, sehr zerbrechlich

n) Vertex planus s. depressus. *o*) convexus. *p*) acuminatus. *q*) sulcatus. *r*) carinatus. *s*) tuberculatus. *t*) cristatus. *u*) Collum longum. *v*) breve. *w*) teres. *x*) teretiusculum. *y*) compressum. *z*) nudum. *a*) pilosum. *b*) Cervix. *c*) Nucha.

brechlich ist. Der Nacken ist bey vielen Thieren mit einer Mähne *d*) bekleidet. Der untere Theil heißt die Kehle *e*); die Vertiefung, welche in dem Brustknochen, da, wo sich der vordere Theil des Halses mit der Brust verbindet, gebildet wird, nennt man die Gurgel *f*). Auch die Kehle ist bisweilen mit einer Mähne besetzt, oder hat eine schlaffe Haut *g*), wie beym Rindvieh.

Das siebente Kapitel.

Von dem Rumpfe, dessen Theilen und dem Schwanze.

Am Rumpfe *h*) der Säugethiere bemerkt man die untere und die obere Seite. Die untere Seite besteht aus der Brust *i*) und dem Bauche *k*) und die obere aus dem Rücken *l*). Dieser wird in den Vorderrücken *m*) und Hinterrücken *n*) eingetheilt, jenes ist die Gegend über der Brust und dieß die über dem Bauche. Die knochenlose Gegend zu beyden Seiten unter den falschen Rippen nennt man die Weichen (Wammen) *nn*). Nach den verschiedenen Krümmungen und Wölbungen der Rippen, nach der verschiedenen Erhabenheit des Brustbeins *o*) und nach der Oberfläche ist die

d) C. iubata. *e*) Iula. *f*) Iugulum. *g*) Palearia *h*) Truncus *i*) Thorax s. pectus. *k*) Abdomen. *l*) Dorsum. *m*) Interscapulinum. *n*) Tergus. *nn*) Hypochondria. *o*) Sternum.

die Brust in ihrer Gestalt und Ausdehnung sehr verschieden. 1) Nach ihrer Gestalt ist sie: flach *p*), gewölbt *q*), erhaben *r*), hoch *s*), eingedrückt *t*), kielförmig *u*), rinnenförmig *v*). 2) In Absicht ihrer Ausdehnung: breit *w*), schmal *x*). 3) Nach der Oberfläche: höckerig *y*), mit einer Mähne bewachsen *z*).

Der Bauch ist 1) in Absicht seiner Gestalt: cylindrisch *a*), gewölbt *b*), flach *c*), ausgedehnt *d*), geschwollen oder aufgeblasen *e*), schmal *f*), zusammengezogen oder hohlbäuchig *g*), wie beym Windhund. 2) In Hinsicht der Oberfläche: eben *h*), runzlich *i*).

Ohngefähr in der Mitte des Bauchs ist der Nabel *k*), zu beyden Seiten die Weichen, und am Ende befinden sich die Schaamtheile oder Zeugungsglieder. Bey dem Nabel befindet sich an einigen Thieren auch ein besonderer Beutel *l*), in welchem sich eine Flüssigkeit absondert. Der Brüste oder Euter, als Theile des Unterleibes, ist oben schon gedacht worden. (Kap. 3. S. 66.)

p) Pectus planum. *q*) convexum. *r*) elevatum. *s*) altum. *t*) depressum. *u*) carinatum. *v*) canaliculatum. *w*) latum. *x*) angustum. *y*) gibbosum. *z*) iubatum. *a*) Abdomen cylindricum. *b*) convexum. *c*) planum. *d*) extensum. *e*) tumidum. *f*) tenue. *g*) constrictum. *h*) laeve. *i*) rugosum. *k*) Umbilicus. *l*) Umbilicus cystiferus.

Der Rücken ist 1) in Absicht seiner Ausdehnung: breit *m*), schmal *n*), kielförmig *o*). 2) Nach seiner Erhabenheit: gerade oder flach *p*), ausgebogen *q*), eingebogen *r*), höckerig *s*), und abhängig *t*). 3) Nach seiner Bekleidung: borstig *u*), mit einer Mähne *v*), Finne oder Flosse besetzt *w*), oder ohne Flosse *x*).

Am äußersten Theile des Rumpfes befindet sich als eine Fortsetzung des Rückgrates bey den meisten Säugethieren der Schwanz. Dieser ist 1) nach seiner Länge: lang *y*), d. i. länger als das Hüftbein, sehr lang *z*), d. i. länger als das Thier, kurz oder abgekürzt *a*), d. i. kürzer als das Hüftbein. 2) Nach seiner Gestalt: zugespitzt *b*), walzenförmig *c*), eyförmig *d*). 3) Nach dem Umfange: rund *e*), platt gedrückt oder flach *f*). 4) Nach der Bekleidung: nackt *g*), behaart *h*), wollig *i*), dünnbehaart *k*), ein Schweif *l*), flockig oder gebüschelt *m*), d. i. am Ende mit einem Büschel langer Haare bewachsen, gefächert *n*), d. i. wenn die Haare nach

m) Dorsum latum. *n*) angustum. *o*) carinatum. *p*) rectum s. planum. *q*) convexum. *r*) incurvatum. *s*) gibbosum. *t*) declive. *u*) setosum. *v*) iubatum. *w*) pinnatum. *x*) impinne. *y*) Cauda elongata. *z*) longissima. *a*) abbreviata. *b*) attenuata. *c*) cylindrica. *d*) ovata. *e*) teres. *f*) depressa. *g*) nuda. *h*) pilosa. *i*) lanata. *k*) subpilosa. *l*) iubata s. comosa. *m*) floccosa. *n*) disticha.

nach zwey Seiten ausgebreitet stehen, stachlig *o*), beschuppt *p*), geringelt *q*). 5) Nach seiner Spitze: spitzig *r*), stumpf *s*), abgerundet *t*), oder abgestumpft *u*). 6) Nach der Art, wie ihn das Thier trägt: gerade *v*), herunterhängend *w*), überwärts gebogen *x*), unterwärts gebogen *y*), rückwärts geschlagen *z*); schneckenförmig gewunden *a*). Wenn die Thiere mit dem Schwanze als mit einer Hand etwas greifen können, so heißt er ein Roll- oder Wickelschwanz *b*). Thiere, die gar keinen Schwanz haben, heißen ungeschwänzte oder schwanzlose *bb*). Der Schwanz dient den Säugethieren theils zur Bedeckung des Afters und der Zeugungstheile, theils zur Verjagung quälender Insecten, theils zur geschwindern und geschicktern Bewegung von einem Orte zum andern, theils zum Schutz gegen unangenehme Witterung.

Das achte Kapitel.

Von den Bewegungswerkzeugen.

Die gewöhnlichsten Werkzeuge der Bewegung sind bey den Landthieren vier Beine. Die Vorder-

p) C. squamosa. *q*) annulata. *r*) acuta. *s*) obtusa. *t*) rotundata. *u*) truncata. *v*) recta. *w*) pendula. *x*) recurva. *y*) incurva. *z*) reflexa. *a*) intorta. *b*) Cauda prehensilis. *bb*) Animalia ecaudata.

beine hängen durch das Schulterblatt *c*) mit den Schultern *d*), welche zu beyden Seiten des Vorderrückens hervorstehen, zusammen, und besteht 1) aus dem Hinterarm oder Bug *e*), vom Schulterblatt bis zum nächsten Gelenke, welches, wenn es sich nach hinten krümmt, Knie *f*) (das zuweilen, wie bey einigen Antilopen, mit einem Haarbüschel *ff*) versehen ist), und wenn es sich nach vorne beugt, daß die Spitze noch hinten steht, Ellenbogen *g*) genannt wird; ferner 2) aus dem Vorderbein *h*), unter dem Ellenbogen, und 3) aus dem Fußblatt oder eigentlichem Vorderfuß *i*), welcher aus der Handwurzel *k*), der Mittelhand *l*) und den Fingern *m*) oder Klauen (Hufen) *n*) besteht. Die Stelle unter dem Arme heißt die Achsel *o*). Die Theile des Hinterfußes sind: 1) das Hüftbein oder der Schenkel *p*); 2) das Schienbein *q*) und 3) das Fußblatt oder der eigentliche Hinterfuß *r*), welcher aus der Fußwurzel oder Ferse *s*), dem Mittelfuße *t*) und den Zehen oder Klauen besteht.

In

c) Scapula. *d*) Humeri. *e*) Brachium, lacertus, armus. *f*) genu. *ff*) scapae genuum. *g*) Cubitus. *h*) antibrachium, ulna. *i*) palma. *k*) carpus. *l*) metacarpus. *m*) digiti, dactyli. *n*) ungulae. *o*) axilla. *p*) tempus. *q*) crus. *r*) planta. *s*) tarsus. *t*) metatarsus.

In Ansehung der Größe findet sich zwischen den Beinen noch die Verschiedenheit, daß sie entweder alle vier von einerley Länge, oder wie gewöhnlich, die Hinterbeine länger als die vordern, oder wie am seltensten, die Vorderbeine länger als die Hinterbeine sind.

Das Fußblatt ist bey vielen Thieren in Zehen oder Finger, die mit deutlichen Gelenken oder Gliedern versehen sind, zertheilt. Nach der verschiedenen Anzahl erhalten die Füße folgende Namen: zweyzehige, dreyzehige, vierzehige, und fünfzehige *u*). Diejenige kleine Zehe, über den wahren Zehen, die manche Thiere haben, und welche im Gange die Erde nicht berührt, heißt die After- oder falsche Zehe.

Die Zehen sind an ihrem letzten Gliede entweder mit breiten Nägeln *w*) oder mit spitzigen, gekrümmten Krallen *x*) besetzt, oder sind ganz wehrlos. *y*) Diese Krallen sind rundlich *z*), erhaben *a*), zugespitzt *b*), pfriemenförmig *c*), eingebogen *d*), haakenförmig *e*), unbeweglich *f*), beweglich *g*) und können bisweilen in eine Scheide eingezogen werden.

Nach der verschiedenen Lebensart der Thiere sind die Zehen auch verschiedentlich eingerichtet und mit den

u) Pedes didactyli, tridactyli, tetradactyli, pentadactyli. *v*) digitus spurius. *w*) Ungues. *x*) unguiculae. *y*) Digiti mutici. *z*) Ungues s. Unguiculae subrotundae. *a*) convexae. *b*) acuminatae. *c*) subulatae. *d*) incurvae. *e*) uncinatae. *f*) immobiles. *g*) retractiles.

Fußblättern verschieden gebaut. Die Füße bekommen daher verschiedene Namen: 1) Gangfüße *h*), die blos zum Gehen eingerichtet sind. Hier sind die Zehen mit stumpfen unbeweglichen Krallen besetzt und entweder ganz gespalten *i*) oder nur etwas gespalten *k*). 2) Fangfüße *l*), die zum Fangen und Zerreißen der Beute dienen und aus beweglichen scharfen Krallen bestehen, welche außer dem Gebrauche in einer Scheide liegen. 3) Kletterfüße *m*), mit sehr langen scharfen Krallen besetzt, welche die Thiere beym Erklettern der Bäume in die Rinde einsetzen können. 4) Grabfüße *o*), um in der Erde Höhlungen zu graben. Diese sind mit starken, oft ziemlich langen Zehen, an welchen starke, scharfe Krallen stehen, versehen, und bey manchen z. B. dem Maulwurf, ziemlich breit. 5) Schwimmfüße *p*), welche denjenigen Thieren eigen sind, welche ihre Nahrung auf dem Lande und im Wasser zugleich, oder in letztern allein suchen. Die Zehen sind alsdann entweder ganz mit einer Haut verbunden *q*) oder nur zum Theil *r*), oder gefranzt *s*), wenn jede Zehe zu beyden Seiten dicht mit steifen Haaren besetzt ist, wie an der Wasserspitzmaus. 6) Flugfüße *t*), die zum Fluge geschickt sind. Die Zehen sind ausserordentlich lang, alle durch eine florähnliche Haut und durch

h) Pedes ambulatorii. *i*) fissi. *k*) subfissi. *l*) P. captatorii. *m*) scansotii. *o*) fossorii. *p*) natatorii. *q*) palmati. *r*) subpalmati. *s*) ciliati. *t*) chiropteri.

durch dieselbe mit den Hinterfüßen verbunden (Fledermäuse). 7) Hände *u*), wenn der innere Finger oder der Daumen *v*) von den übrigen entfernt oder etwas tiefer steht, so daß die Thiere vermittelst desselben etwas fassen und fest halten können. Die Menschen haben zwey und die Affen vier Hände. 8) Springfüße *w*). So nennt man bloß die hintern, wenn sie weit länger als die vordern sind, so daß die Thiere damit sehr weite Sprünge thun können.

Bey vielen Säugethieren ist das Fußblatt in keine deutlichen Zehen getheilt, sondern eine hornartige, schuhförmige, bald härtere bald weichere Bekleidung, welche man Huf oder Klaue *y*) nennt, und vertritt die Stelle der Nägel oder Krallen. Diese Hufe und Klauen sind ungetheilt (einhufig) *z*) und wie beym Pferde; gespalten (zweyhufig) *a*), wie beym Hirsch; nicht ganz gespalten *b*), wie beym Kameel; dreyhufig *c*), durch zwey Einschnitte in drey Klauen getheilt; vierhufig *d*), durch drey Einschnitte in vier Klauen getheilt; fünfhufig *e*), durch vier Einschnitte in fünf Hufe getheilt. Falsche Hufe oder Afterklauen *f*) nennt man bey einigen Thieren die hinten etwas über den Klauen befindliche kleine Hufe, welche beym gewöhnlichen Gange die Erde

u) manus. *v*) pollex. *w*) P. saltatorii. *y*) Ungula. *z*) Solidungula. *a*) bisulca. *b*) subbisulca. *c*) triungula. *d*) quadrungula. *e*) quinquungula. *f*) Ungulae spuriae s. Tali succenturiati.

nicht berühren, aber im Springen und Klettern Dienste thun. Bey den meisten Säugethieren sind die Füße deutlich, bey den im Wasser lebenden aber sind sie mit einer Haut umwachsen und den Flossen der Fische ähnlich *g*). Die vordern sind nach unten gekehrt und die hintern in einen wagerechten Schwanz *h*) verwachsen; doch findet man gewöhnlich sowohl in den vordern als hintern die Fußknochen verborgen.

Wenn die Thiere mit gefingerten Füßen bloß auf den Zehen gehen, so nennt man die Zehen Pfoten, wenn sie aber auf den ganzen Fußblatt gehen und Raubthiere sind wie die Bären, Tatzen.

Ueber den Schenkeln bilden sich zu beyden Seiten des Afters die Keulen oder Hinterbacken *i*), die 1) nach ihrer Substanz: fleischig sind *k*), d. i. aus großen und vielen Fleischmuskeln bestehen, schwielig *l*) und knotig *m*) oder mit großen Verhärtungen besetzt sind; 2) nach ihrer Gestalt: gewölbt *n*), zusammengedrückt *o*), etwas plattgedrückt *p*), und 3) nach ihrer Bekleidung; behaart *q*), nackt *r*), und in diesem Fall auch wohl gefärbt *s*) sind.

g) P. penniformes. *h*) Cauda horizontalis. *i*) Nates. *k*) carnosae. *l*) callosae. *m*) nodosae. *n*) convexae. *o*) compressae. *p*) compressiusculae. *q*) pilosae. *r*) nudae. *s*) coloratae.

E. In-

B. Innerer Bau. *)

a) Feste Theile.

Das neunte Kapitel.

Besondere Einrichtung der Sinneswerkzeuge.

Die Nerven sind, wie wir wissen, diejenigen Theile des thierischen Körpers, wodurch die Empfindungen in der Seele bewirkt werden. So verschieden aber nun die Eigenschaften der Körper sind, so verschiedene Empfindungen können sie auch in den Nerven und in der Seele der Thiere erwecken, weil nicht jeder Nerve eine jede Eigenschaft des auf ihn wirkenden Körpers zu empfinden fähig ist, sondern der eine diese, der andere jene. Wir finden daher an dem thierischen Körper an verschiedenen Orten eine Vereinigung, Verwebung und Verbindung verschiedener Nerven zu besondern Maschinen, wodurch die Empfindungen gewisser Eigenschaften der Körper hervorgebracht werden. Wir nennen sie Werkzeuge der Sinnen und zählen ihrer bey den Säugethieren fünfe, als Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Gefühl. Wir wollen sie hier etwas genauer betrachten.

Das Werkzeug des Gesichts ist das Auge. Es ist ein kugelförmiger Körper, der aus neun Häuten, zwey Kammern und vier Feuchtigkeiten besteht. Die weiße oder Vereinigungs-Haut *a*) ist eine

Fort-

*) s. Busch Grundriß einer zootomischen Beschr. S. 216. ꝛc.

a) Tunica adnata.

Fortsetzung der innern Augenlieder-Haut. Sie überzieht die Außenseite des Augapfels bis nahe an den Regenbogen, und man sieht in derselben viele kleine Blutgefäße. Die harte oder undurchsichtige Hornhaut *b*) ist die stärkste und härteste, weiß von Farbe und bildet die Kugel des Augapfels vom Sehnerven an bis an den Rand der durchsichtigen Hornhaut *c*). Diese ist gleichsam in jene eingespündet und besteht aus einer Menge durchsichtiger Blättchen. Die Adernhaut *d*) überzieht die innere Fläche der harten Hornhaut, an derem Rande sie sich in lockrer Gestalt umschlägt, und nach außen die Regenbogenhäutchen *e*), nach innen aber das Traubenhäutchen *f*) bildet. Sie macht den sogenannten Augenstern. Die runde durchsichtige Stelle, heißt das Sehloch oder die Pupille (Sehe) *g*), in welche die Lichtstrahlen einfallen, welche sich nach dem Grade des Lichts vor dem bloßen Auge unsichtbaren Fäserchen erweitert und verengert, und bey den Säugethieren von verschiedener Gestalt ist. Die Netzhaut (Nerven- oder Markhäutchen, Retine) *h*), ist die innerste Haut des Augapfels, weiß von Farbe und schleimig. Sie ist nichts anders als der im Hintergrund des Augapfels verbreitete Sehnerve, der sich bis an den Rand der Krystalllinse ausbreitet, aus den feinsten Nervenfäden und Blutgefäßen zusammengewebt und der empfindlichste Theil am ganzen Körper ist.

Die

b) sclerotica. *c*) cornea. *d*) choricidea. *e*) iris. *f*) uvea. *g*) pupilla. *h*) retina.

Die vordere Augenkammer ist der Raum zwischen der durchsichtigen Hornhaut und der Regenbogenhaut, und die hintere geht von der Traubenhaut bis zur vordern Fläche der Krystalllinse.

Beyde Kammern füllt die wässerige Feuchtigkeit *i*), ein wahrer flüßiger, wässeriger Saft aus, der vielleicht blos dazu da ist, das Zusammenwachsen, Austrocknen und Verschrumpfen der Häute zu verhindern, und wieder nachwächst, wenn er verlohren geht. Hinter der Pupille liegt in einer schüsselförmigen Vertiefung die Krystalllinse (Sehlinse, krystallene Feuchtigkeit, Augenkrystall) *k*). Es ist ein plattgedrückter, linsenförmiger, sehr durchsichtiger Körper von mehr fester als schleimiger Beschaffenheit, ein wahrer durchsichtiger Muskel, der aus unzähligen dünnen Blättchen besteht. Sie wird von einem äußerst zarten und durchsichtigen Häutchen locker umgeben, welches die sogenannte Kapsel der Krystalllinse *l*) ist, in welchem die Linse von der etwas schleimigen Morgagnischen Feuchtigkeit *m*) umflossen wird, und durch dessen Beweglichkeit das gute Nah- und Entferntsehen mit abhängt. Den beträchtlichsten hintern Theil des Augapfels nimmt die helle, durchsichtige, gallertartige gläserne Feuchtigkeit (Glaskörper) *n*) ein. Ihre vordere Fläche ist mit einer zwar starken, aber äußerst durchsichtigen

i) Humor aqueus. *k*) humor vitreus. *l*) capsula lentis crystallinae. *m*) aquula Morgagni, *n*) humor vitreus.

sichtigen Haut überzogen, welche das Glashäutchen *o*) genannt wird. Um den Umfang der Krystallinse auf dem Glaskörper strahlenförmige schwarze Streifen, welche man das Strahlenband zu nennen pflegt *p*).

Das Thier sieht nun auf folgende Weise. Die Lichtstrahlen, die von einem Körper ausgehen oder zurückprallen, dringen durch die durchsichtige Hornhaut und durch die in dem Sterne befindliche Oeffnung in das Auge ein, werden in den Feuchtigkeiten des Auges, sonderlich aber in der Krystallinse gebrochen, und bilden den Gegenstand, von dem sie ausgegangen sind, auf der Netzhaut auf eben die Art ab, nämlich umgekehrt, wie es in einer verfinsterten Kammer (Camera obscura) geschieht. Von der Netzhaut bekommt die Seele die deutliche Empfindung und Vorstellung des Gegenstandes in dem Gehirne vermittelst des Sehnervens *pp*) auf eine uns noch unerklärbare Art und zwar nach seiner natürlichen Gestalt und Lage mitgetheilt.

Dieses Werkzeug ist nun bey den verschiedenen Säugethieren von verschiedener Schärfe oder Schwäche und thut gewöhnlich am Tage seine gehörige Wirkung; doch giebt es auch Thiere z. B. die Katzen, welche des Nachts deutlich sehen können, und dieß rührt von der Empfindlichkeit ihrer Augennerven her, die auch die wenigen Lichtstrahlen, die des Nachts noch in der Luft sind, auffangen, und durch sie in Bewegung gesetzt werden können.

Die

o) tunica hyalcidea. *p*) ligamentum s. corpus cileare. *pp*) nervus opticus.

Die Bewegung des Auges durch die Muskeln und die willkührliche Ausdehnung und Zusammenziehung des Augensterns bey vielen Thieren, wodurch die Augenöffnung groß oder klein wird, machen, daß sie die Gegenstände nach gewissen Entfernungen allzeit deutlich sehen können.

Bey vielen Thieren sind die Augen matt, bey andern aber leuchten sie und zwar besonders stark, wenn sie in Affekt sind. Eben so ist auch nach Verschiedenheit der Thiere der Blick des einen sprechender als der des andern, bey vielen sogar grausam und wild.

Das Werkzeug des Gehörs ist das Ohr, welches meistentheils aus elastischen Knorpeln oder harten Knöchen besteht, um welche der Gehörnerve sich inwendig verbreitet. Nicht bey allen Thieren findet man den äußern knorpelichen Theil, das sogenannte äußere Ohr, oder die Ohrmuschel *q*), welche aus dem großen trichterförmigen, dem dreyeckigen und ringförmigen Knorpel besteht, und wie ein Trichter da steht, um durch einige bewegliche Muskeln den Schall aufzufangen, zu mäßigen und in den Gehörgang *r*) zu leiten. Dieser Gang ist eine krumme, knorpeliche oder knöcherne Röhre, an deren Ende das Trommelfell *s*) sich befindet, welches aus einem dünnen, pergamentartigen Häutchen besteht, das über die Pauke *t*), oder Trommelhöhle ausgespannt ist. In dieser unregelmäßigen Höhle liegen

q) Auris externa. *r*) meatus auditorius. *s*) tympanum s. membrana tympani. *t*) cavitas tympani.

gen die vier Gehörknochen, wovon der erste der Hammer *u*) ist, welcher mit seinem Stiele an dem Trommelfelle anhängt, und mit seinem Kopfe den zweyten Gehörknochen, den Ambos *v*) berührt, an dessen längern Schenkel der dritte, das rundliche oder hirsenförmige Knöchelchen *w*) den vierten, den Stegreif (Steigbügel) *x*) mit dem Ambos vereiniget. Ihrer Aehnlichkeit halber haben diese Gehörknochen solche Namen, und sie scheinen durch kleine Muskeln in Bewegung gesetzt zu werden. Zwey davon sind am Hammer, eine am Ambos und der vierte am Stegreif befestigt. Aus der Trommelhöhlung geht die Hörtrompete oder Eustachianische Röhre *y*) in den Mund; die Luft dringt durch dieselbe von innen herein, und hält mit der äußern, die durch den Gehörgang kömmt, das Gleichgewicht. Aus der nämlichen Höhle geht auch das eyrunde Fenster *z*), ein Loch, welches der Stegreif mit seiner Grundfläche füllt, und welches sich in das Innerste des Ohrs (innre Ohr) *a*), in den Labyrinth (Irrgang) *b*) öffnet. Dieser besteht aus dem Vorhofe *c*), einer runden mit Wasser erfüllten Höhle, aus den drey halbzirkelförmigen Kanälen *d*), welche sich in den Vorsaal öffnen, und aus der

u) malleus. *v*) incus. *w*) os orbiculare. *x*) os stapeeis. *y*) tuba Eustachii. *z*) fenestra ovalis. *a*) Auris intima. *b*) Labyrinthus. *c*) vestibulum. *d*) canales semicirculares.

der Schnecke *e*), welche vorwärts liegt, und aus einem hohlen schneckenförmig gewundenen Gange besteht, der durch eine halbknöcherne, halbnervige Haut in zwey Kanäle getheilt wird, wovon sich der vordere in den Vorhof, der hintere aber durch das runde oder besser dreyeckige Fenster *f*) in die Trommelhöhlung öffnet. Der Gehörnerve *g*) endlich breitet sich durch alle Theile des Labyrinths aus.

Die Empfindung des Gehörs scheint nun auf folgende Weise in die Seele gebracht zu werden. Die äußere durch einen Schall gleichsam wellenförmig bewegte Luft dringt durch die verstärkenden Biegungen des elastischen Gehörganges auf das ausgespannte Trommelfell, und setzt dieses und die damit verbundenen Gehörknochen in eine zitternde Bewegung, die sich durch den Labyrinth den ausgespannten Nervenfäden mittheilt, und den Schall in das Gehirn fortpflanzt, wo sich die Seele desselben bewußt wird, und nach der Verschiedenheit, der in den Gehörnerven gemachten Eindrücke, auch, auf eine uns unbegreifliche Weise, verschiedene Vorstellungen von dem Schalle erhält, durch welche diese Eindrücke verursacht worden sind. Nach dem verschiedenem Baue, besonders des äußern Ohres richten sich dann auch die verschiedenen Grade der Feinheit desselben, die man an den Thieren bemerkt, und wenn der Mensch von den meisten darin

übers

e) cochlea. *f*) fenestra rotunda. *g*) nervus acusticus.

übertroffen wird, so liegt hauptsächlich die Schuld an dem Mangel der Beweglichkeit, die unserm Ohre fehlt.*)

Die Nase ist das Werkzeug des Geruchs. Sie besteht aus verschiedenen Knorpeln und Knochen, die bey den verschiedenen Thierarten in der Gestalt etwas von einander abweichen, und aus Muskeln, Häuten, Blutgefäßen und Nerven bestehen. Die ganze innere Nasenfläche sind mit der zarten Schneidrischen Haut *h*) überspannt, die aus Blutgefäßen, aushauchenden und einsaugenden Gefäßen, Nerven und einem Zellgewebe besteht und in welchem vorzüglich in einigen kleinen Drüschen der Nasenschleim abgesondert wird. An die Nerven dieser Haut stoßen die von den Körpern ausdünstenden flüchtigen salzigen und öhligen ꝛc. Theilchen, wenn sie durch das Einathmen in die Nase gezogen werden, setzen dieselbe in Bewegung, und erregen dadurch in der Seele die Empfindung des Geruchs. Diese Haut muß beständig durch jenen bekannten Schleim feucht erhalten werden, damit sowohl die riechenden Theilchen sich desto leichter anhängen können, als auch die zarten Nerven geschützt sind.

Die Nasenlöcher dienen auch noch zum Athemholen, zur Stimme und zur Ausführung des überflüßigen Schleims. **)

Das

*) S. Disquisitiones anatomicae de auditu et olfactu. *Ant. Scarpa.* Ticini. 1789. fol.

h) membrana pituitoria.

**) Bey wallfischähnlichen Thieren (Cetacea) dienen die Nasenlöcher zu Spritzröhren. Sie sind aber mit keiner

Riech-

Das Werkzeug des Geschmacks ist vornämlich die Zunge, welche ein muskulöser, dicker, länglicher und mit vielen Nerven versehener Theil ist. Sie liegt mitten in der Höhle des Mundes, ist nach allen Richtungen beweglich und mit ihrer Wurzel zum Theil mit dem Schlunde, zum Theil mit dem Luftröhrenkopf, vermittelst des Zungenbeins und verschiedener Muskeln verbunden. Unten ist sie mit dem Zungenknochen befestigt und an den Seiten durch andere häutige Bänder. Das blinde Loch befindet sich auf dem Rücken der Zungenwurzel. Es ist voller Schleim, und der gewöhnliche Sitz des Zungenkrebses beym Rindvieh. Die Schmeckkraft liegt vorzüglich an der Spitze auf der Oberfläche und an den Seitenwänden. Die Nerven endigen sich nämlich in Wärzchen, welches eigentlich die empfindenden Theile der Zunge sind und Nervenwärzchen oder Geschmackskörnerchen i) heißen, und mancherley Gestalt haben, denn einige sind pyramidenförmig, andere kegelförmig, andere sehen wie Hütchen und noch andere wie Schwämmchen

Riechnervenhaut überzogen, sondern wenn diese Thiere riechen sollen, so geschieht es wohl in gewissen Nervengruben, die sich im Bezirke des Ohrs, des Auges und der Hirnschale befinden und aus einem irregulären Sack bestehen, der inwendig mit zarten schleimigen und schwärzlichen Membranen bekleidet ist. Die dazu führende Oeffnung ist mit einer häutigen Klappe verschlossen, die wohl Luft und riechende Theile einläßt, aber kein Wasser. Magaz. Encycl. Voigts Magazin der Naturkunde. I. 3. S. 39.

i) papillae nerveae.

aus. Zwischen diesen öffnen sich feine Gefäße, die einen Saft absondern, der die Zunge anfeuchtet, und die Salze auflöst. Wenn diese aufgelösten Salze die Geschmackskörner berühren, so entsteht daraus der verschiedene Geschmack, des bittern, süßen, sauern, herben, gesalzenen, gewürzhaften und so ferner.

Die Zunge ist verschieden 1) nach ihrer Gestalt: wurmförmig *a*), vorne zugespitzt *b*), schwerdförmig *c*), vorne ausgebreitet *d*), durchaus rund *e*). 2) Nach der Spitze: spitzig *f*), abgerundet *g*), gespalten oder zweyspaltig *h*), lappig *i*). 3) Nach ihrer Oberfläche: eben und glatt *k*), rauh *l*), haarig *m*), warzig *n*), stachlig *o*), rückwärts gestachelt *p*). — Einige Thiere können auch die Zunge weit hervorstrecken und wieder zurückziehen *q*).

Das Werkzeug des Gefühls endlich besteht aus den äußersten Enden der Nerven, welche sich aus dem Gehirn und Rückenmark in die Muskeln und von hieraus mit den zärtesten Zweigen in Gestalt feiner Wärzchen sammeln, und durch die ganze Haut vertheilen. Sie werden von einem netzförmigen Schleim und der empfindlichen Oberhaut des Körpers beschützt. Diese

Nerven-

a) Lingua filiformis. *b*) acuminata. *c*) ensiformis. *d*) antice dilatata. *e*) teres. *f*) acuta. *g*) rotundata. *h*) fissa. *i*) lobata. *k*) laevis et glabra. *l*) scabra. *m*) barbata. *n*) verrucosa. *o*) aculeata. *p*) retrorsum aculeata. *q*) retractilis.

Nervenwärzchen sind an manchen Theilen, z. B. an den Spitzen der Finger größer, oder häufiger, wie an den steifen Barthaaren mancher Raubthiere, daher ist auch das Gefühl an solchen Orten um so viel feiner, als an andern Theilen des Körpers. Hierdurch empfinden also die Thiere allerley besondere Eigenschaften der Körper, z. B. ob sie hart oder weich, rauh oder glatt, feucht oder trocken, warm oder kalt u. s. w. sind.

Dieß sind die Werkzeuge der fünf Sinne, deren einige bey den verschiedenen Thierarten ihrer Bestimmung nach die Schärfe der menschlichen, das Gefühl ausgenommen, weit übertreffen und untrüglicher sind, deren Bau aber auch, wie wir schon bey jedem einzelnen Sinn kürzlich bemerkt haben, sehr verschieden ist.

Das zehnte Kapitel.

Vom Schlafen und Wachen.

So lange die Thiere in ihrem natürlichen Zustande durch ihre Sinne die Eindrücke der äußern Gegenstände mit Bewußtseyn und eigner Thätigkeit erhalten, empfinden, und ihren Körper willkührlich bewegen können, so wachen sie; sind sie aber in einem Zustande, daß sie dieser Fähigkeiten zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu empfinden, sich zu bewegen, beraubt sind, so schlafen sie. In diesem letztern Zustande hören aber demohngeachtet, die unwillkührlichen Bewegungen in dem Körper, als die Bewegung des Herzens, der Luftwerkzeuge, der Kreislauf des Bluts, die Abscheidung

der Säfte u. s. w. nicht auf. Ja, es geschieht zuweilen, daß die innern Eindrücke in der Seele durch die Einbildungskraft und das Gedächtniß wirken, und allerhand entweder schon gehabte oder neu zusammengesetzte Vorstellungen in derselben abbilden, wodurch mancherley Empfindungen und nicht selten freywillige Bewegungen des Körpers im Schlafe hervorgebracht werden, und dieß sind denn Träume. Man hat auch an vielen Säugethieren durch äußere Zeichen, z. B. an Hunden, welche im Schlafe gebellt, und sonst mancherley Bewegungen gemacht haben, bemerkt, daß sie träumen.

Was aber nun den Schlaf selbst anbelangt, so entsteht er durch den anhaltenden Gebrauch der Nerven, entweder durch die daraus entspringende Stockung, Ermattung oder Verhinderung des Nervensafts, oder durch die Schlaffheit der Nerven. Er ist der thierischen Natur zur Sammlung neuer Kräfte durchaus nothwendig; ob er gleich sowohl in Ansehung der Zeit, als der Dauer und Stellung des Körpers bey den verschiedenen Thieren sehr verschieden ist. In Ansehung der Zeit — die grasfressenden Thiere schlafen mehrentheils des Nachts, die fleischfressenden hingegen verrichten ihre Geschäffte des Nachts, und ruhen am Tage aus; deswegen lauert man dem Fuchs des Abends auf, und sieht die Fledermäuse zu dieser Zeit herumfliegen. In Ansehung der Dauer — der Dachs bedarf z. B. eines sehr langen und das Pferd eines kurzen Schlafes. In Ansehung der Stellung — so legen sich die meisten Säugethiere nieder, wenn sie schlafen wollen, das Pferd aber ruht auch stehend.

Außer dieſem Schlafe der Erholung haben auch noch viele Thiere die wunderbare Einrichtung vom Schöpfer erhalten, daß ſie die kälteſten Monate des Jahrs, wo es ihnen an den nöthigen Nahrungsmitteln fehlen würde, in einen tiefen Winterſchlaf zubringen. Verſchiedene Säugethiere haben dieſe Einrichtung, und ſuchen, wenn die Zeit heran naht, bequeme Orte, wo ſie den Winter ſicher in dieſer Erſtarrung oder Betäubung zubringen können. Der Hamſter verbirgt ſich daher tief unter der Erde in ſeiner zubereiteten Winterwohnung und verſtopft die Aus- und Eingänge zu derſelben. Nicht alle Winterſchläfer aber ſchlafen bis der warme Frühling wieder heran nahet, ſondern einige von ihnen, z. B. die Fledermaus, der Dachs, erwachen ſogleich, wenn im Winter einige warme Tage eintreten, und erſtarren bey einfallender Kälte wieder. Auch bey der Betäubung der Winterſchläfer findet noch ein langſamer Kreislauf, ſo wie eine, obgleich kaum merkliche, Wärme des Blutes ſtatt.

Das eilfte Kapitel.

Beſondere Einrichtung der Knochen.

Daß die Knochen der Thiere diejenigen unempfindlichen, bald mehr bald weniger weißen, härteſten, feſteſten und dichteſten Theile ſind, die dem Körper die Bildung, Haltung, Feſtigkeit u. ſ. w. geben, iſt ſchon oben bey der allgemeinen Beſchreibung des äußern Baues der Säugethiere kürzlich bemerkt worden. Wir

begnügen uns hier zu unserer Absicht mit folgenden wenigen allgemeinen Bemerkungen. Denn die nähere Betrachtung von ihren Eigenschaften, ihrer Ausbildung, ihren Theilen, ihrer Größe, Anzahl, ihren Namen, ihrer Lage, Verbindung und ihrem Nutzen ist ein Theil der Zergliederungskunst, der unter dem Namen Osteologie (Knochenlehre) bekannt ist *).

Alle Knochen a) sind theils aus mehrern feinen Fasern, theils aus dünnen, schichtweise übereinander liegenden Blättchen zusammengesetzt, deren Grundstoff, kalkartige, salzige und öhlige Theile sind. Bey ihrem Ursprunge sind sie weich, und ehe sie diejenige Festigkeit erhalten, die sie von den weichen Theilen unterscheidet, müssen sie alle Stufen des Wachsthums und der Verdichtung durchlaufen.

Bey Embryonen kann man ihren weichen Zustand deutlich sehen. Ihre, den Streifen im Eyweiß ähnlichen Fasern, die im Anfang durchgehends weich und beweglich sind, hängen ihrer Natur nach genauer zusammen, als die Theilchen der andern Fasern, woraus andere Theile des Körpers gebildet werden, verursachen Stockung und Austrocknung der gallartigen Theile, oder vielmehr gröbern Theile des Fließwassers (Lympha) aus dem Blute, und Vereinigung, Verhärtung und Festigkeit unter einander. Daraus entstehen dann Knorpel,

so

*) Busch Grundriß einer zootomischen Beschreibung. S. 14—94. Hier kann man sich über das Nothwendigste, was hierher gehört, weitläuftiger Raths erholen.

a) Ossa.

ſo wie wir ſie an den Enden verſchiedener Knochen finden, die ſich nach und nach, an Härte und Federkraft verſtärkt, in wahre Knochen verwandeln. Denn alle Knochen ſind vorher Knorpel geweſen, und vieles, was bey jungen Säugethieren anfangs bloß Knorpel iſt, wird mit zunehmenden Jahren zu Knochen.

Näher wird die Entſtehung der Knochen ſo erklärt und beſtimmt. Nach Verlauf des fünfen Theils der Trächtigkeit entſtehen in den bisher durchſichtig geweſenen Knorpeln der zarten Frucht in der Mitte, auch hier und da am Ende, weiße und durchſichtige Punkte. Dieſe werden Knochenkerne oder Verbeinerungspunkte genannt, und dieß ſind die Stellen, wo der Knochen anfängt ſeine eigenthümliche Härte zu erlangen. Der Knochenkern verbreitet ſich nun von Zeit zu Zeit im Umfang immer mehr und mehr, und der undurchſichtige Knorpel nimmt den ganzen zum Knochen beſtimmten Raum ein, worauf dann endlich allmählig der Knochen zu ſeiner Vollkommenheit gelangt. Auf dieſe Art entſtehen nicht nur alle Knochen des thieriſchen Körpers, ſondern auch alle widernatürliche Knochenauswüchſe werden nach ähnlichen Geſetzen gebildet.

Wenn man die Knochen in Abſicht ihres innern Baues (Struktur) betrachtet, ſo unterſcheidet man dreyerley Theile (Subſtanzen) oder dreyerley verſchiedene Gewebe der knochigen Faſern. Man bemerkt nämlich:

1) einen dichten feſten Theil *b*), der aus einem dichten Faſergewebe ohne merklichen Zwiſchenräume

 beſteht,

b) Substantia ossea.

besteht, sehr elastisch ist, gleichsam den Körper der Knochens ausmacht, seine Gestalt von außen bildet, seine Stärke und Festigkeit ausmacht und am weißesten von Farbe ist.

2) Der zellige oder schwammige Theil *c*) befindet sich in dünnen langen Knochen, die Höhlen haben, an beyden Enden, oder in den platten Knochen, die keine Höhlen haben, in der Mitte durchgehends. Er giebt ihnen Leichtigkeit, und entsteht aus den Zwischenräumen, welche die locker gewebten Beinfasern und Blättchen an den beyden Enden der ausgehöhlten Knochen, in einem größern Umfange, als der übrige Körper des Knochens ist, und in den platten ungehöhlten Knochen, in ihrer Mitte, unter sich zurück lassen. Diese Zwischenräume sind eben so viele besondere kleine Fächer, die eine Gemeinschaft unter einander haben, und die sowohl die Blutgefäße, als auch den fetten Saft, welcher unter den Namen des markigen Saftes oder der rothen Thiergallerte bekannt ist, empfangen und letztern darinn absetzen.

3) Den netzförmigen Theil *d*) trifft man nur allein in den Höhlen der langen Knochen an. Verschiedene Fasern sondern sich darinn deutlich von einander ab, und indem sie sich ohne Ordnung weiter ausbreiten, so machen sie eine Art von dünnem Netze. Es ist dieses ungleiche weitschichtige Gewebe dazu bestimmt, daß es die Vertheilung der Blutgefäße, welche das Mark hinzuführen,

c) sponsiosa. *d*) reticularis.

zuführen, unterſtützen, und das Mark ſelbſt enthalten ſoll.

Was die äußere Bildung der Knochen anlangt, ſo iſt ihr Umfang von dicker, mittlerer und kleinerer Art, und ihre Geſtalt nach der verſchiedenen Richtung ihrer Faſern verſchieden. Man bemerkt an dem Ende derſelben gewöhnlich Vorſprünge oder Verlängerungen, die man mit den Namen der Erhöhungen *e*) belegt. Diejenigen, welche mit den Knochen einen und denſelben Körper ausmachen, und entſtehen, wenn die Knochenlamellen von der gewöhnlichen Ordnung abweichen, werden der Fortſatz (Apophyſe) *f*) des Knochens genennt, und der Knochen bildet allemal an ſolchen Orten einen mehr oder minder ſchwammigen Auswuchs. Diejenigen aber von ſolchen Hervorragungen, die nur ſchlechtweg an den Knochen anliegen, nicht durch die Knochenfibern der großen gebildet, ſondern nur angeſchloſſen und mit denſelben vereinte Knöchelchen ſind, heißen der Anſatz oder Anhang (Epiphyſe) *g*) des Knochens. Sie verwachſen mit der Zeit vollkommen mit dem großen Knochen, und dienen dazu, die Knochenhöhle und Ränder zu bilden. Dieſe Fortſätze und Anſätze verſchaffen vorzüglich vermöge der ſchicklichern Figur, die ſie bilden, eine leichtere und ungehinderte Bewegung und Einfügung der Muskeln und Bänder.

Was nun die Figur der ganzen Knochen anlangt, ſo bilden ſie, wenn ſie in Bündel und auf Art der

Cylinder

e) tubercula. *f*) Apophysis. *g*) Epiphysis.

Cylinder zusammengestellt sind, cylindrische Knochen *h*), so wie die Fasern, welche nur breitgedrückte doppelte Blätter darstellen, platte Knochen *i*), als die Hirnschädelknochen, das Schulterblatt; und so verhält es sich auch mit den andern knochigen Fasern.

Die verschiedene Verbindung, Vereinigung und Zusammensetzung der Knochen erhält überhaupt den Namen von Gelenken *k*), die vorzüglich zur Bewegung und Veränderung der Lage des Körpers und dessen Theile bestimmt sind. Alle die zur Verbindung unter sich bestimmte Knochen und diejenigen, welche eine öftere Bewegung aushalten sollten, sind mit einem festanhangenden Knorpel *l*) bewaffnet worden, welcher die leichtere Beweglichkeit befördert, und den Druck des einen Knochens auf den andern mäßigt. Diese Knorpel, welche biegsam und elastisch sind, werden durch einen schleimigen Saft, der sie ohne Unterlaß befeuchtet, immer geschmeidig und schlüpfrig erhalten. Dieser Saft, welcher Gelenkschmiere *m*) heißt, und aus den Drüschen eines Häutchens, mit welchem die Knorpel überzogen sind, quillt, erleichtert die Bewegung, vermindert und verhindert das Reiben bey der häufigen Bewegung der Gelenke, und die Vertrockniß und Abnutzung der Knorpel.

Bey allen Gelenken bemerkt man breite Bänder (Ligamenten, Sehnen) *n*), oder besser Membranen, welche

h) ossa cylindracea. *i*) lata. *k*) articulatio. *l*) cartilago. *m*) synovia s. unguen articulare. *n*) ligamenta.

welche sich an den beyden, das Gelenk ausmachenden, Knochen fest anlegen und dasselbe umhüllen. Sie dienen dazu, daß sie die Gelenkschmiere, wie in eine Büchse einschließen, und das Verschütten oder den Verlust dieser kostbaren Feuchtigkeit verhüten. Außer diesen umhüllenden oder Kapselligamenten trifft man auch oft noch außerhalb denselben liegende Seitenligamente an, z. B. bey den Wirbelbeinen, Kniegelenken, Kniekehlen u. dergl.

Die äußere Oberfläche der Knochen ist mit einer Membrane, die Beinhaut o) genannt, umgeben, die aus verschiedenen Schichten von Fasern und Gefäßen besteht, die der knochigen Substanz und allen andern zu den Knochen gehörigen Theilen die Nahrung zuführen, und die gefühllosen Knochen gefühlvoll machen. Eben diese Oberfläche wird durch den klebrigen Saft, der aus den Drüsen der Beinhaut dringt, schlüpfrig erhalten, und von innen thut das Mark diesen Dienst.

Das zwölfte Kapitel.

Von den Zähnen.

Zu den Knochen gehören auch die Zähne. Es sind diejenigen Werkzeuge, wodurch die Säugethiere, einige wenige, als der Ameisenfresser und Wallfisch, ausgenommen, ihre Speisen abrupfen, abbeißen, zerreißen, zernagen, oder zermalmen. Der obere äußere Theil dieser einzelnen

o) periosteum.

einzelnen Knochen ist sehr hart und mit einer glänzenden Materie überzogen, welche man den Schmelz des Zahns nennt, der untere aber, oder die Wurzeln sind in besondern Höhlen befestiget, und enthalten Blutgefäße und Nerven. Die äußere harte Materie macht, daß sie nicht so leicht zerbrechen, verfaulen oder abgenutzt werden können, und durch die Wurzeln ziehen sie ihre Nahrung an sich.

1) Ihrer Lage nach theilt man sie in Vorderzähne *a*), oder Schneidezähne im weitläuftigen Sinne, in Eckzähne (Spitz- Hunde- auch Seitenzähne) *b*) und in Backenzähne *c*) (Stock- oder Mühlzähne) ein. Sie sind vieler Verrichtungen, sonderlich aber der Nahrung gemäß an Bildung, Größe und Härte verschieden; und man nimmt von ihnen besonders die Gattungskennzeichen bey Beschreibung der Thiere her.

Die Eckzähne sind gemeiniglich spitzig, etwas gebogen und länger als die übrigen Zähne. Meistentheils liegt nur an jeder Seite der Kinnlade zwischen den Vorder- und Backzähnen ein einzelner, doch giebt es auch Thiere, z. B. einige Fledermäuse, welche noch Nebeneckzähne (Seitenzähne) haben.

Die Backenzähne sind vornehmlich, der verschiedenen Nahrung der Thiere nach, verschieden gestaltet. Bey den fleischfressenden ist die Krone allezeit scharf und zackig, bey den grasfressenden aber stumpf und eingefurcht.

Nach

a) Dentes primores. *b*) laniarii s. canini. *c*) molares.

Nach ihrer Gestalt sind 2) die Zähne: Schneidezähne *d*), wenn die Vorderzähne breit und scharfrandig sind, schaufelförmig *e*), walzenförmig *f*), pfriemenförmig *g*), vierseitig *h*), dreyseitig *i*), zusammengedrückt *k*), gekrümmt *l*), wie Hauer gebogen *m*), gerade *n*). 3) Nach ihrer Spitze oder Schärfe: eingekerbt oder gelappt *o*), sägenförmig eingeschnitten *p*), spitzig *q*), stumpf *r*), schief abgestumpft *s*), abgerundet *t*), gespalten *u*), flach *v*), auf der Oberfläche etwas ausgehöhlt *w*), mit drey Spitzen versehen *x*). 4) Nach der Oberfläche: eben *y*), gewunden *z*), zackig gefurcht *a*). 5) Nach ihrer Richtung: geradestehend *b*), zurückgebogen *c*), hervorgebogen *d*), herausgestreckt *e*), eingeschlossen *f*). 6) Nach ihrem Stande neben einander: dicht zusammenstehend *g*), entfernt stehend *h*), in gleicher Richtung stehend *i*).

Die Thiere bringen die Zähne theils mit auf die Welt, theils und mehrentheils aber brechen sie nach einer kurzen

d) Incisores in sensu stricto. *e*) spathulati. *f*) cylindrici. *g*) subulati. *h*) tetragoni. *i*) trigoni. *k*) compressi. *l*) incurvi. *m*) arcuati. *n*) recti. *o*) lobati, *p*) ferrati. *q*) acuti. *r*) obtusi. *s*) oblique truncati. *t*) rotundati. *u*) fissi. *v*) plani. *w*) superficie concavata. *x*) tricuspidati. *y*) leves. *z*) torti. *a*) denticulati. *b*) recti. *c*) retusi. *d*) recumbentes. *e*) exserti. *f*) inclusi. *g*) approximati. *h*) remoti. *i*) paralleli.

kurzen oder langen Zeit nach ihrer Geburt hervor und die vordern werden bey den meisten in einem gewissen Alter mit neuen verwechselt.

Nicht alle Thiere haben Zähne, und einigen fehlen die Vorderzähne, oder die Eckzähne; und bey den Wallfischen findet man statt derselben beinerne Reifen *k*).

Das dreyzehnte Kapitel.

Vom Schlunde, Magen, Zwerchfell, der Milz, Leber, den Därmen, dem Darmfell, Netz, Gekröse und Milchbehälter.

Das vornehmste Werkzeug des Verschluckens der Speisen, die im Munde für den Magen gehörig zubereitet sind, ist der Schlund oder die Speiseröhre *l*): ein trichterförmiger, oben weiterer und unten sich verengernder Schlauch, aus Häuten und Muskeln gebildet. Die Speiseröhre, welche Einige von dem Schlund, dem Anfang derselben, trennen, geht hinter der Luftröhre längs der innern linken Seite des Halses und den Rückenwirbeln hinab bis in den Magen. Ist ein Bissen durch die Zunge in den Schlund hinabgestoßen, so ziehen sich die Muskeln, deren Fasern die dazu gehörige Verwebung und Bildung haben, über demselben zusammen, und pressen oder schrauben ihn gleichsam immer weiter hinunter. Man kann das Hinuntergleiten des Futters, ja selbst des Getränkes in diesem Kanale bey sehr vielen

k) Laminae corneae. *l*) Oesophagus.

vielen Säugethieren von außen an der linken Seite sehr deutlich beobachten. In den vielen Runzeln derselben liegen Schleimdrüsen verborgen, wodurch er immer schlüpfrig erhalten wird, damit die Speisen desto ungehinderter durchlaufen können.

Alles, was den Schlund herabkömmt, sammelt sich in dem großen, festen, häutigen Sack, den wir den Magen *m*) nennen, der die Nahrungsmittel empfängt, verdauet und weiter an die bestimmten Orte versendet. Er ist immer feucht und warm, welches seine Blutgefäße und die benachbarten Eingeweide verursachen. Seine Bildung ist verschieden. Er ist bey einigen Thieren mehr rund, bey andern mehr lang, und besteht aus mehrern übereinander liegenden Häuten, welche mit unterschiedlichen Muskelfasern und Nerven durchflochten sind, um das zur Verdauung dienliche Ausdehnen und Zusammenziehen befördern zu können. Bey den fleischfressenden Thieren gehen die Speisen aus dem Munde in einem einfachen häutigen Sack, den Magen, und werden hier sogleich verdauet; bey andern Thierarten aber leiden sie mehrere Veränderungen. Die meisten pflanzenfressenden Thiere, wenigstens die mit gespaltenen Klauen haben daher vier Mägen, erstlich den Pansen, (Wanst, Wampe,) *n*) zweytens die Haube *o*), (Mütze, Netz, Garn,) drittens den Psalter, (Kalender, das Buch, Mannichfalt, den Falten- oder Blättermagen) *p*), und

m) ventriculus. *n*) rumen. *o*) reticulum. *p*) echinus s. omasus.

und viertens den Rohm (Laab, Fettmagen, die Ruthe) *q*). Diese Thiere würgen die Speisen aus dem Pansen wieder in den Mund zurück, kauen sie noch einmal, und heißen daher wiederkäuende Thiere *r*). Ihre Speiseröhre öffnet sich in die Haube, ein Behältniß von vielen viereckigen, mit Wärzchen besetzten Fächern, und die Nahrungsmittel werden dadurch in dieselbe, und durch eine Seitenöffnung in den Pansen, das größte mit unzähligen Blättchen besetzte Behältniß, geführt. Hier erweichen sie, und gehen in kleinen Portionen durch eine Zusammenziehung desselben wieder in den Mund zurück. Wenn sie hier feiner gekauet sind, nehmen sie den vorigen Weg in die Haube und von da in den Pfalter. Dieser mit vielen Falten und Warzen versehene Magen reibt sie vollends fein und läßt sie in den Rohm übergehen, wo sie den Gehalt der Speisen einfachmägiger Thiere bekommen.

Der Nutzen dieses Wiederkäuens besteht ohne Zweifel auch mit darin, daß diese Thiere, denen vorzüglich heftig von den Raubthieren nachgestellt wird, ihr Futter auf offener Weide nur geschwind und flüchtig abzugrasen nöthig haben, und es alsdann an verborgenen Orten in Ruhe und Sicherheit gemächlich klein zermalmen und zur Verdauung geschickt machen können.

Der Magen der Thiere ist in einer steten Bewegung, welche theils durch das Athemholen, das Schlagen seiner Pulsadern und aus dem wechselsweisen Zusam-

q) abomasus. *r*) Animalia ruminantia.

sammenziehen und Erweitern seiner muskulösen Haut entsteht, durch welche in Verbindung der gehörigen Wärme, Luft und allerley Flüßigkeiten die Verdauung oder Auflösung der Speisen geschieht. Diese Bewegung dauert auch außerdem noch fort, wenn die Speisen schon aus dem Magen sind. Daraus entsteht denn in demselben bey fehlenden Nahrungsmitteln die unangenehme Empfindung, die wir Hunger nennen; und fehlt es an der nöthigen Feuchtigkeit, so empfindet das Thier den Durst.

Bey den Säugethieren ist der Oberleib vom Unterleibe innerlich, oder die Brust vom Bauch durch das Zwergfell oder Querfell *s*) geschieden.

Es liegt dasselbe über dem Magen, durchschneidet den Leib, wo die Rippen aufhören, in die Queere, und ist eine große, theils sehnige, theils muskulöse Haut, oder vielmehr ein eigentlicher großer Muskel, welcher viele Blutgefäße, Nerven und verschiedene Oeffnungen hat, welche die aus dem obern Theil des Körpers herabsteigenden Adern, Nerven und andere Kanäle durchlassen. Es geht beym Athemholen auf und nieder, drückt auf den Magen, die Därme, den ganzen Unterleib, befördert selbst das Aus- und Einathmen und die Bewegung verschiedener Flüßigkeiten im Körper.

Zur linken Seite des Magens liegt die Milz *t*). Sie ist ein plattlängliches, schmales, wie eine Zunge gestaltetes Eingeweide, und enthält eine Menge zarter Aederchen, mit Mark erfüllter Zellen und anderer Gefäße.

s) Diaphragma. *t*) Splen.

Sie ist vorne gewölbt, hinten ausgehöhlt, von Farbe bräunlich oder graulich, und bey den verschiedenen Thieren nicht sehr verschieden. Die Spitze ist unterwärts über den Magen übergelegt, und das breite Ende dem Rückgrat am nächsten, und an das Zwergfell und die linke Niere befestigt.

Ihr Nutzen ist noch nicht hinlänglich bekannt; jedoch wird er dahin bestimmt, daß sie das dicke und zähe Blut verdünne, das Gerinnen und Verstopfen desselben verhüte, und eine wässerige, laugenhafte Feuchtigkeit zur Bereitung der Galle liefere, oder nach neuern Zergliederern, daß die zur Absonderung geschickten Kräfte des Arterienblutes, dessen größere Menge die Milz aufzunehmen vermag, in diesem Eingeweide, weil das Blut viel dünne Lymphe verliert, mehr concentrirt werden, und daß die Milzblutader dieses Blut der Pfortader, der sonst alles Arterienblut mangelt, zuführe, und dadurch in ihrem Blute die Absonderungsfähigkeit, oder die Eigenschaft, den zur Absonderung hinreichenden Reiz gegen die Absonderungsgefäße zu bewirken, eigentlich hervorbringe. Zum eigentlichen Leben scheint sie aber nicht so nothwendig, wie ein anderes Eingeweide zu seyn, da man nach wiederholten Versuchen an Thieren, denen sie ausgeschnitten worden ist, gefunden hat, daß sie, wie zuvor, fortgelebet haben, ob man gleich auch dabey beobachtet hat, daß die Leber, auf welche sie am unmittelbarsten wirket, dadurch sehr vergrößert, und nach und nach erhärtet ist.

Auf der rechten Seite, gleich unter dem Zwerchfelle, liegt die Leber *u*) und bedeckt die rechte Seite des Magens. Sie ist ein schwammiger, mit vielen Fasern, Blut- und Fließwassergefäßen, Drüsenkörnchen und Nerven durchwebter Theil, der zwey oder drey große, oft auch mehrere kleine ungleiche Lappen bildet, und das größte Eingeweide des Unterleibes ausmacht. Sie ist von blaulicher oder brauner Farbe, enthält die Gallenblase und Gallengänge *v*), und sondert die Galle von dem Geblüte ab. Nicht alle Säugethiere haben eine Gallenblase, wie z. B. das Pferd und der Esel, aber dafür haben sie einen weiten Gallengang, der sich in den Zwölffingerdarm öffnet.

Mit dem häutigen Magen hängen die Därme *w*) unmittelbar zusammen, sind eine Fortsetzung desselben, haben mit ihm einerley Bau, und bestehen aus einem langen, bald engen, bald weiten Kanal mit vielen Wendungen, der bis ans Ende des Körpers fortläuft. Sie sind bey dem Menschen und andern großen Thieren mannichfaltig, und man giebt den einzelnen Stücken derselben verschiedene Namen, obgleich sonst kein Unterschied in denselben ist, als daß das vordere Stück der Därme viel enger und länger ist, als das hintere. Man theilt sie daher ein in dicke oder weite, und dünne oder enge Därme *x*).

u) Hepar. *v*) Vesica fellea et ductus choledochi. *w*) Intestina. *x*) crassa et tenuia.

Zu den dünnen Därmen gehören der Zwölffingerdarm *y*), der unmittelbar an den Magen anschließt, und von seiner Länge, weil er bey dem Menschen zwölf Finger breit oder zwölf Zoll lang ist, diesen Namen bekommen hat. Der zweyte dünne Darm ist der Leerdarm (leere Darm) *z*), welcher schmäler, aber viel länger ist, an den vorigen gränzet, und daher seinen Namen führet, weil er den Nahrungsbrey nicht lange bey sich behält und daher fast immer leer ist. Der dritte darauf folgende ist der Krummdarm (krumme oder gewundene Darm) *a*), der sehr lang ist, und daher so heißt, weil er vielerley Krümmungen macht. Letztere beyde Därme könnte man auch für einen annehmen, da sich die Gränzlinie zwischen beyden nicht wohl bestimmen läßt. Bey den wiederkäuenden Thieren sind die dünnen Gedärme gewöhnlich doppelt so lang, als bey den andern und haben auch weit mehr Milchgefäße.

Hierauf folgen die dicken Därme. Sie sind der Reihe nach der Blinddarm *b*), welcher deswegen so genennt wird, weil er gleichsam nur ein Nebenbeutel ist, sich wohl in eine Spitze endiget, die aber keinen Ausgang hat; der Grimmdarm *c*), weil in ihm vornämlich die Schmerzen, die man die Kolikschmerzen oder das Bauchgrimmen nennt, entstehen. Er steigt ein- oder etlichemal an der rechten Seite in die Höhe bis an das Zwerchfell, und an der linken Seite wieder herun-

y) Intestinum duodenum. *z*) jejunum. *a*) ileum. *b*) coecum. *c*) colon.

herunter, und endigt sich in dem Mastdarm *d*), welches nur eine Fortsetzung des vorigen ist, und in grader Linie bis zur hintern Oeffnung des Leibes oder dem After läuft. Sein Ende wird von dem großen zuschließenden Muskel am After umschlossen.

Alle diese Därme machen nun, wie wir gesehen haben, ein Ganzes aus, und in ihnen werden die Speisen ganz und völlig verdauet, der Nahrungssaft von dem Unrath abgesondert, und beydes seiner Bestimmung nach weiter fortgeleitet. Die Bewegung, wodurch sie die Speisen weiter forttreiben, heißt die wurmförmige Bewegung, deswegen, weil sie der Bewegung der Würmer, wenn sie fortkriechen, gleicht. Sie entsteht durch die ineinander laufenden Fleischfasern, womit eine eigne Haut an dem Gedärme versehen ist. Damit nun die Speisen nur immer weiter hinterwärts rücken, so sind hin und wieder in den Därmen Klappen oder Fallthüren angebracht, die die Rückkehr derselben nach dem Magen verhindern.

Die ganze Bauchhöhle wird vom Bauch- oder Darmfelle *e*), einer zelligen Membrane umkleidet. Es ist dasselbe hinten am Rückgrate angewachsen, breitet sich in viele Falten aus, und schließt an seinem Rande den ganzen Darmkanal, wie in einem Saum, ein.

Nimmt man diese Membrane weg, so erscheint das Netz *f*), ein Sack, der aus zwey Häuten besteht, und der Sitz des Fettes ist. Es bedeckt die Gedärme

d) Intestinum rectum. *e*) Peritoneum.
f) Omentum.

bis an den Nabel, dringt in ihre Krümmungen, beschützt sie auf allen Seiten, glättet und befeuchtet sie. Es sondert in seinen Blutgefäßen dünnöhlige Säfte ab, die zur Bereitung der Galle dienen.

Zwischen den Biegungen und Krümmungen der Därme liegt das Gekröse *g*), welches die Bauchhöhle gleichsam in zwey Theile in den obern und untern eintheilt. Es nimmt seinen Ursprung vom Bauchfell, indem es sich in der Gegend der Lendenwirbelbeine nach vorne zu mit sich selbst so wieder vereiniget, daß es in seiner eignen Höhle mit einer doppelten Fläche fortläuft, in welcher die Därme eingeschlossen liegen, und besteht aus einer doppelt gefaltenen, mit Fett, Drüsen, Milchgefäßen, Nerven und sehr feinen Adern durchwachsenen Haut. Es verbindet die Gedärme miteinander, erhält sie schlüpfrig, und im Schweben, erleichtert dadurch ihre Bewegung, schützt sie vor Verwickelung und führt besonders aus der beweglichen sogenannten Gekrösdrüse, (große Drüse) *h*), die aus einer Menge Drüschen, oder Drüsenkörnchen, Röhren und Adern zusammengesetzt ist, aber nicht bey allen Säugethieren angetroffen wird, einen speichelartigen Saft in den Zwölffingerdarm, und den Milch- und Nahrungssaft in die Blutadern. Diese Gekrösdrüse ist mit ihrem dicken Ende an den Zwölffingerdarm, und auf der linken Seite mit Gefäßen und Membranen an die Milz befestiget.

Zwischen

g) mesanterium. *h*) Pancreas.

Zwischen den beyden Häuten des Gekröses ist eine Menge dünner weißer Röhrchen, die den Namen Milchadern (Milchgefäße) *i*) führen. Diese saugen aus den Därmen einen milchartigen Saft ein und vereinigen sich in der Gegend der untern Lendenwirbel in einen kleinen Beutel oder häutigen Sack, welcher das Milchbehälter (Milchsack, Sammelkasten, Sammelbeutel) *k*) genennt wird, ergießen sich in demselben, und von da steigt der Milchsaft durch den Milchbrustgang am Rückgrat gerade in die Höhe durch das Zwerchfell in die Brust, und schüttet sich in der linken Achselblutader aus.

Das vierzehnte Kapitel.

Von dem Herzen und den Adern.

(Taf. I. Fig. 1.)

Das Herz *l*) ist eine fleischige oder aus starken Muskeln bestehende Maschine, deren Figur jedermann kennt, und die im Ganzen genommen bey allen Säugethieren gleich ist, nämlich einem Kegel ähnelt, dessen Spitze zugerundet, dessen Grund länglich rund, und dessen Seiten platt sind, obgleich die Bildung bey den verschiedenen Säugethieren zuweilen Abweichungen leidet. Es ist mit einer membranösen Kapsel umwickelt

i) Vasa lactea. *k*) Cisterna lumbaris. *l*) Cor.

und begränzt, die man den Herzbeutel *m*) nennt. Dieser ist das Band, welches das Herz fest hält, seine Bewegung mäßigt, verhindert, daß keine von den benachbarten Theilen kommende Befestigung entstehe, in die Substanz des Herzens eindringe, die Freyheit seiner Wirkung stöhre, und einen schlüpfrigen Dunst absondert, der das Herz schlüpfrig erhält, das Reiben an demselben unschädlich macht und das Verwachsen beyder abhält.

Der obere breite Theil oder der Kopf des Herzens ist an dem Mittelfell befestiget, welches die beyden Lungen voneinander scheidet. Die Lage ist beym Menschen schräge, bey den andern Säugethieren aber fast senkrecht oder in einer von den Rückenwirbelbeinen bis an das Brustbein gezogenen und ein wenig sich senkenden Linie. Die Spitze des Herzens aber stößt demohnerachtet nicht an das Brustbein, sondern hängt schwebend und frey. Der Grund des Herzens liegt also oberhalb, die Spitze unterhalb, die beyden Flächen zur Seite, eine auf der rechten, die andern auf der linken, und von den beyden Rändern ist einer der vordere, der andere der hintere. Es liegt aber auch das Herz nicht gerade in der Mitte des Oberleibes, sondern mehr nach der linken Seite zu.

Durch eine von oben nach unten, und von der rechten zur linken Seite zu gehende Haut, welche die Scheidewand des Herzens heißt, wird das Herz in zwey verschiedene Behältnisse oder Herzkammern *n*) abgetheilt. Es sind dieß zwey große Höhlen, welche in der Dicke dieser kegelförmigen Masse eingeschlossen sind, und eigentlich dieses edle Eingeweide bilden, und

wo-

m) Pericardium. *n*) Ventriculi.

wovon eine die vordere, nach der rechten Seite zu (1), die andere die hintere Herzkammer nach der linken Seite zu (10) ausmachet. Ueber ihnen, an der nach oben gekehrten Grundfläche des Herzens, liegen zwey Vorkammern, die beyden sogenannten Herzohren, die unter sich keine Gemeinschaft, jede aber mit ihrer Herzkammer haben, zu welcher der Weg durch Klappen oder Ventile wechselsweise eröffnet und verschlossen wird. Das linke Herzohr (3), welches auch das Lungenherzohr heißt, stößt mit seiner Oeffnung auf die hintere Herzkammer, und das rechte Herzohr der Hohlader auf die vordere Herzkammer.

Mit dem Herzen hängen nun diejenigen röhrigen Gefäße zusammen, die wir die Adern nennen. Sie bestehen aus etlichen übereinander liegenden Häutchen, die aus Zellen, Nerven, Fibern und Drüschen zusammengesetzt sind. Ihrer Bestimmung nach sind sie von zweyerley Art, Schlagadern (Pulsadern, Arterien) *o*) und Blutadern (zurückführende Adern, Venen) *p*). Sie vertheilen sich vom Herzen aus in unzählige Aeste und Zweige, die immer zärter werden, je weiter sie vom Herzen entfernt sind, und sich zuletzt in einer solchen Feinheit verlieren, welche die Feinheit eines Haares weit übertrifft. Die erstern bringen das Blut vom Herzen zu allen Theilen des Körpers, haben ihren Anfang eigentlich in den Herzkammern, verengern sich allmählig, und haben eine schlagende Bewegung, indem sie sich wechselsweise erweitern und zusammenziehen. Die letztern, welche im Ganzen weiter sind, als die erstern,

stoßen

o) Arteriae. *p*) Venae.

stoßen an die Herzohren, bringen das Blut zum Herzen, erweitern sich immer mehr nach dem Herzen hin, und haben größtentheils, um das Zurücktreten des Bluts zu verhindern, hin und wieder Klappen. Die beyden Stämme der Pulsadern sind die Lungenpulsader *q*) (8), und die große Pulsader *r*) (7). Jene entspringt in der rechten Herzkammer, und geht in die Lunge, wo sie sich in unzählige Aeste vertheilt (5). Diese geht von der linken Herzkammer nach allen Theilen des Körpers. Eben so sind auch zwey Hauptblutadern vorhanden. Die große Hohlader *s*) (6) bringt das aus allen Theilen des Körpers gesammelte Blut in das rechte Herzohr, woraus es in die rechte Herzkammer, und weiter durch die Lungenpulsader in die Lunge geführt wird; hier empfängt es die zweyte große Blutader die Lungenblutader *t*) bringt es in das linke Herzohr und von da in die linke Herzkammer. An allen diesen vier großen Adern sind besonders merkwürdige Fallen oder Klappen angebracht, welche beym Ein- und Ausströmen des Bluts sehr wichtige Dienste thun. Uebrigens bekommen beyde Arten von Adern nach der Zertheilung ihrer Aeste und nach der Gegend des Körpers, in welcher sie sich befinden, noch verschiedene Namen, z. B. Brustschlagader, Schlafpulsader; Brustblut- oder Leberader

u.

q) Arteria pulmonalis. *r*) aosta. *s*) vena cava. *t*) vena pulmonalis.

u. s. f. Die nähere Beschreibung des Umlaufs des Bluts folgt weiter unten.

Das funfzehnte Kapitel.

Von der Lunge und Luftröhre.

Zu beyden Seiten des Herzens liegt in der Brust die Lunge *u*). Sie ist ein lockeres, fleischiges, grosses, röthliches Eingeweide, das ausser einigen Nerven eine Menge Blut- und Luftgefäße enthält. Letztere sind sehr fein, und entspringen aus der Luftröhre, und über sie sind die Aeste der Lungenpulsader und Lungenblutader auf das wunderbarste gleichsam hergespannt. Sie ist oben mit der Luftröhre und durch das Mittelfell mit dem Brustbeine und Rückgrat verbunden. Durch die Mittelhaut wird sie in zwey Stücke, die man Lappen nennt, also in den rechten und linken Lappen, eingetheilt. Wenn das Thier Luft schöpft, worzu es durch das stockende Blut in den Luftwerkzeugen gereizt wird, und welches die mit Muskeln versehene Brust befördert, so drücket es das Zwerchfell abwärts, dadurch erweitern sich die Lungen, und die äußere Luft dringt in die vielen kleinen Bläschen der Lunge ein; wenn es aber wieder aushaucht, so geht das Zwerchfell wieder in die Höhe, wodurch die Lunge verengert und die Luft wieder herausgepreßt wird.

Die

u) Pulmo.

Die frische Luft ist den Thieren so nothwendig, daß sie ohne dieselbe nicht leben können. Sie sterben daher in einem völlig luftleeren Raume, und an einem Orte, wo ihnen die frische Luft abgeschnitten wird; denn dieselbe Luft taugt nicht mehrmal zum Athemholen, weil sie durch den Aufenthalt in der Lunge verdorben wird. Wie die Luft hierbey eigentlich nützt, ist noch nicht genau bekannt. Daß sie den Körper wirklich erhält und ernährt, ist gewiß, ob aber dieß dadurch geschehe, daß das Thier gewisse nahrhafte Theile einathmet, die in der Luft schwimmen, oder die Luft selbst etwas belebendes und nährendes in sich hat, ist ungewiß. Daß sie durch den Ab- und Zufluß den Umlauf des Bluts befördert, ist gewiß, ob aber, wie man neulich zu behaupten angefangen hat, das Blut sich der überflüssigen brennbaren Theile, die wirklich im Blute enthalten sind, in der Lunge entledige, und dadurch das gehörige Verhältniß derselben gegen die übrigen Bestandtheile des Bluts bewirke, oder ob es nur darinnen abgekühlt werde, damit es sich nicht allzusehr erhitze, ist noch ungewiß. Außer dem Nutzen, den die Luft in Absicht auf das Blut leistet, dient sie noch zur Hervorbringung einer Stimme, beym Riechen, zur Bewegung des Unterleibes, des Magens, der Gedärme, zur Scheidung verschiedener Säfte, Austreibung des Harns und der Exkremente, nach einigen auch zur rothen Farbe, Dichtigkeit und Wärme des Bluts u. s. w. Da die Lunge sehr zart ist, so leidet sie oft von Verstopfungen und andern Zufällen.

Die Lunge aber erhält nun, wie schon bemerkt worden ist, die nöthige Luft durch die Luftröhre, (Kehle,

Gur-

Gurgel) *v*), einen aus Häuten und ringförmigen Knorpeln zusammengesetzten Kanal, der von oben nach unten sich verengert und zuletzt in unzählige Aeste vertheilet. Er läuft vor der Speiseröhre herunter, und ist deswegen oben mit dem Kehldeckel *w*), einem Knorpel, der an der Zungenwurzel angewachsen ist, und bey den verschiedenen Säugethieren mancherley Bildung hat, versehen, damit beym Verschlucken der Speisen nichts in die Luftröhre komme. Die Speisen stoßen den Deckel selbst zu.

Die Oeffnung der Luftröhre, die Stimmritze *x*) ist nebst dem Luftröhrenknopfe *y*), einer aus verschiedenen Knorpeln *) zusammengesetzten Büchse, das vornehmste Werkzeug der Stimme. Die größere oder kleinere Oeffnung macht den Ton der Stimme, den Schall, grob oder fein, und er entsteht, wenn die Luft vermittelst des Ausathmens zwischen dieser verengerten Stimmritze durch, mit einer gewissen Geschwindigkeit in den Mund gestoßen wird. An den Seiten der Luftröhre liegt eine große Drüse, welche starke Blutgefäße hat. Wenn sich diese verstopft, so entstehen daher die Kröpfe.

v) Trochea. *w*) Epiglottis. *x*) rima glottidis. *y*) larynx.

*) Die unter dem Namen des Adamsapfels bekannte Hervorragung an der vordern Seite des Halses bey dem Menschen ist nichts anders, als der etwas hervorstehende Theil des größten von diesen Knorpeln.

Das sechzehnte Kapitel.

Von den Drüsen und Nieren.

Aus den Pulsadern werden viele Theilchen durch gewisse Maschinen abgesondert, die man mit den allgemeinen Namen der Drüsen z) belegt. So giebt es im thierischen Körper sehr zarte Nebengefäße, welche nur die feinsten Feuchtigkeiten aufnehmen, an allen Orten des Körpers, welche dem Ungestüm der Luft, dem Reiben ꝛc. ausgesetzt sind, liegen, und aus einfachen feinen Röhrchen oder Bläschen bestehen, wodurch vorzüglich die unmerkliche Ausdünstung und der Schweiß geschieht. Diese nennt man im uneigentlichen Verstande Drüsen, und es sind die sogenannten Gruften.

Die eigentlichen Drüsen sind eigene lockere Absonderungsmaschinen, welche aus einer Membrane und sehr vielen zarten, mit einer Pulsader, Blutader und einem Nerven verflochtenen Gefaße bestehen, einen kleinen Ableitungskanal oder Abführungsschlauch haben und rundlich sind.

Sie sind von einfacher und zusammengesetzter Art *a*). Diese letztern sind eine Sammlung verschiedener durch gemeinschaftliche Gefäße untereinander verbundener drüsiger Körper, welche in eine einzige Membrane eingeschlossen sind, und so ein einziges Werkzeug ausmachen.

Die

z) Glandulae. *a*) Gl. simplices et conglomeratae.

Die Anzahl der Drüsen in einem thierischen Körper erstreckt sich auf tausende; sie sind allenthalben verbreitet und saugen an jedem Orte denjenigen Saft aus den Schlagadern, welcher gerade da am nützlichsten und nöthigsten ist. Sie bekommen nach den Theilen des Körpers, neben welchen sie liegen, und nach ihren Verrichtungen verschiedene Namen, am Halse z. B. die Mandeln, am Rücken die Rückendrüsen u. s. f. und man rechnet die Hoden *b*), die die Saamenfeuchtigkeit beym männlichen Thiere absondern, auch hierher.

Die Theile, welche sie absondern, dienen erstlich zur Nahrung oder zur Ersetzung der verlohrnen Theilchen, und zum Wachsthum, so lange der Körper noch zunimmt, indem sie mit dem schon vorhandenen sich verbinden, nämlich die ähnlichen mit ähnlichen Theilen; zweytens werden sie zu gewissen Absichten gebraucht, als Galle, Thränen, Speichel, Ohrenschmalz, Gekröfesaft, Magensaft, Gelenkschmiere abzuscheiden; drittens sondern sie solche Theile ab, die als überflüßig aus dem Körper ausgeführt werden sollen, als Schleim z. B. in der Nase, Harn.

Im Unterleibe hinten in der Nachbarschaft der Lendenwirbelbeine zwischen den beyden letzten falschen Rippen, außerhalb des Darmfells, liegen die Nieren *bb*). Es sind dieß zwey gewöhnlich länglicht runde, drüsenartige braune Körper, an denen man bey allen Thieren eine doppelte Substanz, eine markige und rindige, bemerkt, und

b) T. testiculi. *bb*) Renes.

und die aus kleinen von der Mitte strahlenweise auslaufenden Röhrchen und verschiedenen andern Gefäßchen und Wärzchen bestehen und inwendig ein ziemlich geräumiges Becken enthalten. Auf der rechten Niere liegt die Leber, auf der linken die Milz, und auf beyden die Gedärme. Man findet sie in allen Thieren, die Blut haben.

Sie dienen dazu, aus dem Blute, das ihnen durch die Pulsadern zugeführt wird, die überflüßigen scharfen Feuchtigkeiten an sich zu ziehen, als Harn in die Harnblase *c*), die eine flaschenförmige Gestalt hat, durch zwey enge länglichtrunde Oeffnungen zu leiten, und durch eine dritte und größere Oeffnung unten am Blasenhalse abzuführen. Um dem Blasenhalse sind zwey besondere Muskeln angebracht, wovon der eine zur Verschließung, der andere aber zur Oeffnung der Blase dient.

Vor den Nieren oder in ihrem Fettgewebe findet man noch die Nebennieren *d*) oder Nierendrüsen, als zwey kleine längliche, mit einem bräunlichen Safte angefüllte Drüsen, die nie mit den eigentlichen Nieren in Verbindung stehende Schlag- und Pulsader, aber keinen deutlichen Ausführungsgang haben, und deren Nutzen man bis jetzt noch nicht entdeckt hat.

In den Nieren werden häufig Steine angetroffen.

Das

c) Vesica urinaria. *d*) Renes succenturiati.

Das siebenzehnte Kapitel.

Von den Zeugungstheilen und der Fortpflanzung der Säugethiere.

Daß bey den Säugethieren die Geschlechter getheilt sind, so daß ein Theil bloß männlich und der andere bloß weiblich ist, bedarf keiner Erwähnung *). Jeder von diesen Theilen ist nun, und wenn alle übrigen wesentlichen Stücke an beyden übereinstimmend sind, in denen zum Geschäffte der Zeugung nöthigen Theilen verschieden. In dieser Absicht hat das Männchen andere Zeugungsgliedmaßen, als das Weibchen. Zu den äußern Zeugungstheilen des Männchens gehören, wie bekannt, die Ruthe c) und die Hoden. Die Lage beyder ist genugsam bekannt. Die erstere besteht aus der Wurzel, dem Mittelstück und dem Kopf oder der Eichel, welche theils flach, theils abgerundet, theils spitzig ist. Die gemeinen Decken der Ruthe bilden entweder eine Scheide, die vorn als Bedeckung der Eichel Vorhaut heißt, oder erweitert den sogenannten Schlauch, wie beym Pferde. Die Harnröhre wird mit einem schwammigen Körper umgeben, dessen Gewebe bey der Begattung mit Blut durchströmt und so die gehörige Steifigkeit erhalten

 wird.

*) Die Zwitter, oder solche organisirte Körper, welche männlichen und weiblichen Geschlechts zugleich sind, und welche man unter den Säugethieren finden will, sind bloße Mißgeburten und keine wahren Zwitter.

c) Penis, membrum virile.

wird. Letztere, deren an der Anzahl zwey sind und im Hodensacke *f*) sich befinden, bestehen aus Häuten, verschiedenen zarten Gefäßen, aus Pulsadern, Blutadern und Nerven, und sind wahre Drüsen, in welchen die feine Flüssigkeit, die man den männlichen Saamen nennt, bereitet und in den Nebenhoden *g*), ähnlichen kleineren, und höherliegenden Gefäßen verfeinert wird. Dieser Saamen steigt alsdann durch die zurückführenden Gefäße *h*), welches zwey häutige Kanäle sind, wovon sich an jeder Hode einer befindet, bis zur Harnblase in die Höhe, und bildet daselbst auf jeder Seite eine Blase, die die Membranen der Harnblase, nur zarter, hat, welche man die zwey Saamenbläschen *i*) nennt. Von da kömmt er in die häutige Harnröhre *k*) der Ruthe, und wird durch den sogenannten Hahnenkamm oder Schnepfenkopf *l*), welches ein kleines durchlöchertes Wärzchen ist, ausgeleert.

Bey den Weibchen führt ein Kanal, den man die Scheide *m*) nennt, von dem Eingang oder den Schaamlefzen bis an die Gebärmutter *o*). Die Oeffnung derselben oder der Muttermund befindet sich an einem Halse, der sich in einem größern rundlichen Körper von verschiedener Gestalt verliert, welcher aus einem Gewebe von Membranen und Gefäßen besteht, die durch

Fasern

f) Scrotum. *g*) Epididymides. *h*) ductus deferentes. *i*) Vesiculae seminales. *k*) Urethra. *l*) caput gallinaginis s. verumontanum. *m*) vagina uteri. *n*) labia vulvae. *o*) uterus.

Fasern unterstützt werden, die fast die Eigenschaft der Muskeln haben, markig und mit einer erstaunenden Schnellkraft begabt sind, wodurch sie sich auszudehnen und zusammenzuziehen fähig sind. An jeder Seite derselben schlängelt sich ein enger Kanal nach außen in die Höhe, der oben an dem breitern Ende die Muttertrompete *p*) heißt. An diese schließt auf jeder Seite der Eyerstock *q*), in welchem kleine runde, mit einem Safte angefüllte Bläschen enthalten sind, welche man mit den Eyern der eyerlegenden Thiere vergleicht.

Was nun das Geschäffte der Befruchtung der Säugethiere, die Begattung, selbst anlangt, so geschieht sie durch die Vermischung des männlichen Saamens mit den in der Mutter enthaltenen Eyern innerhalb derselben, nämlich in dem Eyerstocke. Bey einer fruchtbaren Begattung wird, was wir mit einiger Sicherheit behaupten können, eins oder mehrere solcher Bläschen, die den ersten Keim des Thiers enthalten, von dem Eyerstocke losgerissen, und durch die Muttertrompete in die Gebärmutter getrieben. Hier hängt sich dieß sogenannte Ey mit gewissen Gefäßen, die aus seiner Haut entspringen, fest an, und nach einiger Zeit wird die Leibesfrucht in demselben sichtbar. Man bemerkt jetzt ebenfalls, daß diese Frucht in gewisse Häute, in die äußere schwammige Haut *r*), in die mittlere Lederhaut *s*), und die innere Wasserhaut oder Schafhaut *t*) eingeschlos-

 sen

p) Tuba Fallopiana. *q*) Ovarium. *r*) membrana decidia. *s*) Chorion laeve. *t*) membrana amnios.

sen ist, und in dem Wasser, welches die letzte Haut enthält, schwimmt. Sie hängt vermittelst der Nabelschnur *u*), einem häutigen Gefäße, das aus einem zelligen Gewebe besteht, welches zu- und abführende Adern sind, mit dem Mutterkuchen *v*), dem schwammigen Theile des Eyes, wodurch dasselbe mit der Gebärmutter verbunden ist, zusammen, und hierdurch bekommt sie die erste Nahrung aus dem Blute der Mutter. Die Frucht (der Embrio) ernährt sich also in Mutterleibe nicht durch den Mund, sondern durch die Adern der Nabelschnur, durch welche das Blut aus der Mutter dem Herzen des Embryo unmittelbar zufließt, von da sich in alle Theile desselben vertheilt, und seine Bildung bewirkt. Während des Wachsthums der Frucht dehnt sich dann auch die Gebärmutter aus, und wenn jene ganz ausgewachsen ist, und keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann, so vermögen in dieser gewisse Reize sich von hinten zusammen zu ziehen, die Frucht von sich zu pressen, und hiermit endigt sich die Schwangerschaft des alten Thiers, und das junge wird gebohren.

Bey den meisten Säugethieren begatten sich Männchen und Weibchen ohne alle Wahl und Unterschied untereinander, ein Männchen hält sich oft zu mehrern Weibchen, und ein Weibchen läßt oft mehrere Männchen zu, und dem Männchen liegt bey der Zeugung fast weiter nichts ob, als das Geschäffte der Begattung. Doch findet man auch solche, die paarweise

u) nervus umbilicaris. *v*) placenta.

weise ihr Geschlecht fortpflanzen, als die Fledermäuse, und das Reh mehrentheils.

Nun findet aber in Ansehung des Alters, wenn die Thiere zur Begattung tüchtig sind, der Jahrszeit, die ihnen zu diesem Geschäffte bestimmt ist, der einmaligen oder öftern Befruchtung in einem Jahre, der Anzahl der erzeugten Jungen, des Orts, wo sie die Jungen ablegen, der Zeit, wie lange sie schwanger sind, der Liebe und Sorgfalt, die sie gegen ihre Jungen hegen, bey den verschiedenen Arten ein großer Unterschied statt. Es ist nöthig, dieß alles ein wenig zu entwickeln.

Die größern Thiere müssen eine längere Zeit leben, ehe sich ihre Zeugungskräfte entwickeln, als die kleinern, und diese Zeit steht mit dem längern oder kürzern Leben derselben in gehörigem Verhältniß; daher es kommt, daß sich jene später und diese früher vermehren, so der Hirsch, und die Maus; und in einem gewissen Alter verliert sich dann auch bey allen wiederum der Begattungstrieb und die Zeugungskraft.

Ferner haben fast alle Thiere, wenigstens die ungezähmten ihre bestimmte Zeit der Begattung, und hierzu dringt sie mehrentheils ein heftiger Reiz im Frühjahr. Doch steht auch hier, wie wir es an vielen Säugethieren deutlich bemerken können, die Zeit der Begattung mit der Zeit, wenn die Aeltern zu diesem Geschäffte gerade die gehörige körperliche Vollkommenheit haben, mit der Zeit der Niederkunft, der Erhaltung und dem Gedeihen der Jungen in richtigem Verhältniß, so daß wenigstens das Wild und die Raubthiere diesen Trieb zur Begattung

erst dann fühlen, wenn sie am fettesten sind, und die Jungen dann erst zur Welt kommen, wenn es ihnen an den gehörigen Nahrungsmitteln nicht fehlen kann. Daher tritt der Hirsch nicht im Frühjahr, sondern zu Ende Augusts und Anfang des Septembers auf die Brunft. Dagegen finden wir andere Säugethiere, die allezeit im Frühjahr sich zu begatten anfangen, und dieß Geschäffte wohl mehrmal des Jahrs fortsetzen, weil sie theils zu dieser Zeit solche angenehme Speisen genießen, die ihren Begattungstrieb reizen, und die ihnen der rauhe Winter versagte, theils ihre Jungen kürzere Zeit zur Erreichung ihrer gehörigen Vollkommenheit in Mutterleibe brauchen, und auch nach ihrer Geburt immer ihre nöthige Speisen finden können. Die Mäuse vervielfältigen sich daher im Freyen bis im späten October. Der Fortpflanzungstrieb hört endlich bey solchen Thieren zu der Zeit im Jahre auf, wenn er nicht mehr mit Nutzen wirken würde.

Wiederum so zeugen einige Thiere auf einmal nur ein Junges, andere zwey, und noch andere mehrere, welche weise Einrichtung mit dem mehr oder wenigern Gebrauch, der Menge der Nahrungsmittel, welche die Erde für die verschiedenen Arten hervorbringt, und mit dem Nutzen, den sie leisten, in richtigem Verhältniß steht. Daher läßt sich erklären, warum sich die kleinen Thiere häufiger fortpflanzen, als die größern.

Wir finden weiter eine große Auswahl, welche die Thiere in Rücksicht der Gegend und des Orts machen, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen. Sie suchen alle die Gegend auf, wo sie einen gehörigen Vorrath von Nahrungsmitteln für sich und ihre Jungen in der Nähe haben,

haben, und wählen einen Platz, und bereiten ihn, wie ihn die Natur und die Sicherheit ihrer Jungen erfordert.

Auch in der Zeit der Schwangerschaft findet eine Verschiedenheit statt, welche sich meist nach der Größe der Thiere richtet, so daß die größern Säugethiere eine längere Zeit schwanger sind, als die kleinern.

Die Liebe und Sorgfalt, welche die mancherley Thierarten gegen ihre Jungen hegen, ist auch gar sehr verschieden, und die Grade derselben richten sich mehrentheils nach dem längern und kürzern Umgange mit denselben. Diejenige Mutter der Säugethiere, die ihre Jungen lange durch die in ihren Brüsten abgesonderte Milch nähren, und diejenige, die ihnen lange Zeit Nahrung herbey schaffen, oder sie selbst zu suchen, lange Zeit anweisen muß, ehe sie sich selbst fortzuhelfen im Stande sind, zeigt auch mehr Liebe für dieselben, als eine dritte, die dieß nicht nöthig hat, und die Aeltern solcher Jungen wagen oft ihr Leben bey den Gefahren, die ihren ohnmächtigen Jungen zustoßen.

Noch müssen wir auch in Ansehung des Gebrauchs der Sinne bey den jungen Thieren einen Unterschied bemerken. Es haben nämlich unter den Säugethieren einige nicht sogleich den Gebrauch des Gesichts, wenn sie auf die Welt treten, z. B. die Raubthiere; sondern ihre Augen sind einige Zeit vermittelst eines Häutchens, das zwischen beyden Augenliedern liegt, und sich nur nach und nach lostrennt und zerreißt, verschlossen; vielleicht deswegen, weil die feinen Gesichtsnerven derjenigen Augen, die die einzelnen Lichtstrahlen der Nacht auf-

fangen sollen, das Tageslicht nicht sogleich aushalten würden, sondern erst durch die dünnen Augenlieder, und alsdenn bey der Trennung des Häutchens, das sie zusammenklebte, durch die kleinern Augenritzen dasselbe vertragen lernen müssen; andere hingegen, sonderlich diejenigen, welche bald sich selbst ernähren können, ihre Nahrung immer nahe vor sich haben, und also eine solche Schärfe der Augen nicht, wie jene, brauchen, öffnen sie sogleich, wenn sie zur Welt kommen, z. B. die wiederkäuenden Thiere.

a) Flüßige Theile.

Das achtzehnte Kapitel.

Von den Drüsensäften, dem Speichel, Magensaft, Gekrösdrüsensaft.

Wir haben in dem vorhergehenden an dem Körperbau der Säugethiere die große Verschiedenheit der festen Theile bemerkt, die ihnen ihrer Bestimmung nach nothwendig waren. Jetzt kommen wir auf die große Mannichfaltigkeit der flüßigen Theile, so wie wir schon eine Flüßigkeit, die wir den männlichen Saamen nennen, des Zusammenhangs halber im vorigen Kapitel abgehandelt haben. Wir begnügen uns unterdessen, von den vielen Arten derselben nur die hauptsächlichsten anzuführen, die allen Säugethieren gemein sind.

Die Drüsensäfte, die durch die rundlichen Maschinen, die wir an allen Theilen des Körpers antreffen, aus

aus den Pulsadern ausgesogen, und in denselben zubereitet werden, sind von sehr verschiedener Art, und helfen theils den Körper ernähren, theils ihre nächsten festen Theile schlüpfrig erhalten, theils fließen und dünsten sie, als überflüßig, weg.

So ist der Speichel ein solcher Drüsensaft von Salzwasserart, der aus dem Blute durch die Speicheldrüsen, die theils unter der Zunge, theils in andern Gegenden der obern und untern Kinnlade liegen, vornehmlich aus den Ohrendrüsen, die um die Ohren herum unter der Haut liegen, abgesondert wird, und sich im Munde befindet. Er dient dazu, daß die Speisen im Munde leichter gekauet, verschluckt und verdauet werden können. Der Mangel desselben mindert die Eßlust und hemmt die Verdauung. Man muß aber den Speichel nicht mit dem groben zähen Schleime verwechseln, der in der Lunge, als eine Unreinigkeit, aus dem Blute abgesondert, und gemeiniglich durch Husten und Räuspern ausgeworfen wird, noch mit dem Rotze, der aus der Schleimhaut der Nase zur Befeuchtung derselben fließt.

Aus den Drüsen zwischen dem zelligen Gewebe und der innersten zelligen Haut des Magens quillt der Magensaft, ein schleimiger, seifenartiger, säuerlicher Saft, der die innere sehr empfindliche Oberhaut des Magens anfeuchtet, und als ein vortreffliches Auflösungsmittel die Verdauung der Speisen befördert. Nach dem Abgange der Speisen aus dem Magen wirkt dieser Saft immer fort auf die Nerven desselben, und erweckt unter dem beständigen Reiben der Magenfibern die oben schon erwähnte Empfindung des Hungers und Durstes.

In

In den ersten Darm, der zunächst an den Magen stößt (Zwölffingerdarm), ergießt sich der speichelartige Gekrösdrüsensaft, der in der Gekrösdrüse zubereitet wird, die Mischung der fetten und wässerigen Theile in den Speisen und dadurch die bessere Verdauung des Nahrungsbreyes befördert.

Das neunzehnte Kapitel.

Von der Galle, dem Milchsaft, und Fließwasser.

Ehe noch der im vorhergehenden Kapitel beschriebene Gekrösdrüsensaft in den Zwölffingerdarm kömmt, vermischt sich mit demselben die Galle. Sie ist eine bittere, seifenartige Flüßigkeit, die in der Leber aus dem Geblüte ausgezogen, bereitet, in der Gallenblase gesammelt, und aus derselben, so wie aus der Leber, in den Gekrösdrüsengang abgeführt und in dem ersten Darme ausgeleert wird. Sie besitzt die Kraft, die noch nicht gehörig verdauten Speisen zu zertheilen, widersteht vermöge ihrer Bitterkeit aller Säure, hilft die überflüßigen Theile in den Gedärmen durch die natürlichen Wege ausführen, hält die Fäulniß ab, verhindert die Absonderung der Luft aus den genossenen Nahrungsmitteln, beugt so den nachtheiligen Wirkungen, die Folgen dieser Absonderung seyn würden, vor, und verwandelt vorzüglich die verdauten Speisen in Nahrungssaft, indem sie wie jede Seife die fetten und wässerigen Theile mit einander in genaue Verbindung bringt, den Nahrungssaft von seinen erdigen Banden befreyt, und daraus einen Milchsaft bereitet.

Dieser

Dieser Milchsaft, (Nahrungsmilch, Chylus) hat von seiner weißen milchigen Farbe den Namen bekommen. Er scheidet sich besonders in den untern dünnen Därmen von den gröbern Theilen der verdauten Speisen ab, wird von den Oeffnungen der, in den beyden Häuten des Gekröses liegenden, Milchgefäße (Milchadern) eingesaugt, in das Milchbehälter geleitet, und durch den Milchbrustgang in die Höhe geführt. Außer dem Milchsafte sammelt sich auch eine Menge Fließwasser, oder eine wässerige Feuchtigkeit aus einer großen Anzahl dahin gehender Fließwassergänge in dem Milchbehältniß. Dieses verdünnet den Nahrungssaft, indem es sich mit ihm vermischt. Dieser so verdünnte Nahrungssaft enthält nun die eigentliche Nahrung des ganzen Körpers.

Es ergießet sich in diesem Zustande, indem er in der verengerten Röhre, dem Brustgang in die Höhe gestiegen ist, in eine nahe am Herzen liegende Blutader und wird auf diese Art mit dem Blute vermischt.

Das zwanzigste Kapitel.

Vom Blute und von dessen Umlauf.

(Vergl. Taf. I. Fig. 1.)

Die kostbarste Flüßigkeit in dem thierischen Körper ist das Blut; weil ohne dasselbe das Thier nicht leben kann. Es ist warm und besteht, wie einige behaupten, aus

aus sehr feinen plattchen Bläschen, nach andern aber vielmehr aus sehr feinen kugelrunden dichten Kügelchen *), welche mit einer Flüßigkeit, die man das Blutwasser nennt, umflossen sind. Die rothe Farbe schreiben einige den im Blute enthaltenen Eisentheilchen, und andere dem brennbaren Wesen zu, und die Flüssigkeit desselben

*) Nach den neuesten Untersuchungen ist im Blute außer dem rothen Theile (dem Cruor) und dem Blutwasser, das aus dem Serum und der in der Hitze gerinnenden Lymphe besteht, noch die Gallerte (gelatina sanguinis) zu unterscheiden, welche an abgelassenem Blute und in Leichen von selbst gerinnt, und mit dem Cruor den sogenannten Blutkuchen ausmacht.

Die neuesten und sorgfältigsten Microscopischen Beobachtungen haben gezeigt, daß die Blutkügelchen im Menschen völlig sphärisch sind, und dieß auch in allen Säugethieren. In den Vögeln, besonders in den Hausvögeln, den Amphibien und Fischen, sind sie eyförmig und elliptisch; nur in der Blindschleiche cylindrisch. In den eyförmigen Blutkügelchen unterscheidet man einen Kern in der Mitte von einer lymphatisch gallerigen Hülle umgeben; dieß läßt sich nicht, wenigstens nicht so deutlich bey den sphärischen bemerken. Der Durchmesser eines menschlichen Blutkügelchens ist $\frac{1}{200}$"; dieser ist bey jeder Thierart sich immer gleich, nur verschieden bey den Gattungen. Bey den Froschkügelchen ist er dreymal größer, bey dem Ochsen um die Hälfte kleiner, als im Menschen. Daraus erhellet die Unanwendbarkeit der Transfusion. Bey dieser sich immer gleichförmigen Größe der Blutkügelchen, sind sie doch weich, verändern sich durch den Druck und lassen sich selbst auflösen.

selben bewirken, außer Bewegung und Wärme, vorzüglich die zwischen derselben befindlichen Lufttheile, wodurch die Bestandtheile voneinander gehalten werden.

Es entsteht das Blut, wie wir schon wissen, aus dem Milchsafte, und verschafft allen Theilen des Körpers die nöthige Nahrung, und das Wachsthum, indem sich nämlich in besondern kleinen Gefäßen aus demselben gewisse Säfte abscheiden, und den Nahrungssaft bereiten, welcher sich mit den festen Theilen des Körpers verbindet.

Wenn aber die verschiedenen Theile des Körpers durch das Blut ernährt werden sollen, so ist nöthig, daß dasselbe nach allen seinen Theilen herumgeführt wird. Dieser allgemeine Umlauf (Circulation, Kreislauf) des Bluts nun, der von dem berühmten englischen Arzte und Naturkundiger Harvey im vorigen Jahrhunderte entdeckt wurde, wird zuerst und vornämlich durch das Herz bewirkt. Das Herz hat nämlich eine doppelte Bewegung, die beständig abwechselt. Die eine verursacht also das Zusammenziehen, die andere die Erweiterung des Herzens. Mit dem Herzen verbinden sich die vier großen Adern, die große Schlagader, die Lungenblutader, die große Hohlader, und die Lungenschlagader. Wenn sich nun das Herz zusammenzieht, so ergießt sich das Blut aus der linken Herzkammer durch die große Schlagader in die übrigen damit zusammenhängenden Adern des Körpers; aus der rechten aber durch die Lungenschlagader in die Lunge. Sobald es sich aber wieder eröffnet, nimmt es das zuströmende Blut wieder ein; und zwar empfängt die linke Herzkammer

kammer neues Blut, das aus der Lunge kömmt, durch die Lungenblutader, die rechte aber das Blut, das aus den übrigen Theilen des Körpers durch die zurückführenden Adern zusammenkömmt, durch die Hohlader. Die Klappen an diesen vier großen Adern lassen das Blut ein, verwehren ihm aber den Rücklauf; denn bey der großen Schlagader und der Lungenschlagader gehen sie vom Herzen auswärts, und wenn sich das Herz zusammenzieht, werden sie mit Gewalt von dem ausströmenden Blute aufgestoßen, worauf sie sogleich wieder zufallen, damit das Blut nicht wieder zurücktreten könne. Hingegen bey der Lungenblutader und Hohlader öffnen sich diese Fallen nach dem Herzen einwärts. Indem sich also das Herz erweitert, stößt das in diesen Adern ankommende Blut die Fallen mit Gewalt einwärts nach dem Herzen auf, und dringt hinein; worauf die Klappen sogleich wieder zufallen, damit nicht bey der neuen Verengerung des Herzens, das Blut durch eben diese Adern wieder zurückgetrieben werde, sondern vielmehr seinen Ausgang durch die große Schlagader oder Lungenschlagader nehme.

Die große Schlagader vertheilt sich vorzüglich in zwey Aeste, davon einer aufwärts, der andere niederwärts geht, und aus diesen entspringen wieder unzählig viele Nebenäste, die immer dünner werden, und so breiten sie sich nach den äußersten Theilen des Leibes aus, um das Blut dahin zu leiten. Da nun aber alle diese Adern, je näher sie dem Herzen sind, desto weiter, je entfernter sie aber davon sind, desto enger werden, so ist klar, daß das Blut, wenn sich das Herz zusammenzieht,

aus

aus weitern Röhren mit Gewalt in engere hineingepreßt wird; daher es denn auch kommt, daß bey jedem solchen Stoße des eindringenden Bluts die Häute dieser Adern sich erheben. Diese Erhebung nennt man den Schlag oder Puls, und daher ist auch der Name Schlagadern und Pulsadern entstanden.

An den äußersten Enden dieser Pulsadern verbinden sich mit ihnen, wie wir aus obigen schon wissen, die Blutadern, welche ebenfalls da, wo sie am weitesten vom Herzen entfernt sind, am engsten sind, und je näher sie ihm kommen, immer weiter werden. Sie kommen endlich alle in der großen Hohlader zusammen; und da in ihnen das Blut, aus dem engern Raume in den weitern läuft, so behält es Platz genug vorwärts zu strömen, ohne daß es die Häute der Adern erhebe. Daher haben diese Blutadern keinen Schlag, oder welches eben so viel ist, sie pulsiren nicht.

Der Schlag des Herzens selbst, den wir Menschen fühlen, wenn wir die Hand auf die linke Brust legen, kömmt daher, weil das Herz, indem es sich zusammenzieht oder verengert, eben dadurch auch länger wird, und mit seiner Spitze an die Brust anprallt.

Das Herz kann aber nicht bloß durch seine Kraft, d. i. durch die Kraft der Muskelfasern, woraus es zusammengesetzt ist, und welche durch das Blut, vermittelst ihrer Reizbarkeit und der Mitwirkung der Herznerven gereizt werden, sich zusammen zu ziehen, das Blut in dem ganzen Körper herumtreiben. Daher sind die Pulsadern hie und da mit reizbaren Muskelfäden umwunden

wunden, durch deren Kraft sich diese Adern zusammenziehen und erweitern, so daß das Blut von einer Stelle zur andern weiter fortgedrängt wird. Es erfolgt also beym Umlauf die Ausdehnung und Zusammenziehung nicht in einem Augenblicke von den Schlägen des Herzens, sondern es ist dieß bloß eine Kette von einzelnen Ausdehnungen und Zusammenziehungen der Pulsadern.

Die feinsten Blutadern saugen, wo sie mit den feinsten Pulsadern zusammenhängen, das Blut wieder in sich, und so läuft es wieder in den immer weitern Röhren fort; doch mit dem Unterschiede, daß es in den Blutadern, die über dem Herzen liegen, mehrentheils durch seine eigene Schwere niedersteigt, in den Blutadern aber, die unter dem Herzen liegen, ordentlich wie in Pumpen in die Höhe steigen muß. In diesen Blutadern z. B. der Füße und Schenkel sind nämlich in gewissen kleinen Entfernungen häutige Fallen oder Klappen angebracht, die sich aufwärts öffnen. Durch das Drücken der Muskeln beym Stehen, Gehen, und andern solchen Bewegungen, und durch noch andere Ursachen, wird das Blut von einer Klappe zur andern in die Höhe gepreßt. Wenn es bis zu der Klappe aufgestiegen, stößt es dieselbe auf, und steigt durch die Oeffnung in die Höhe; sogleich aber fällt diese Klappe wieder zu, und versperrt dem hinauf gestiegenen Blute den Weg, daß es nicht wieder zurück sinken kann. Es giebt auch in verschiedenen Adern über dem Herzen solche Klappen, die sich unterwärts öffnen; diese haben aber, wie man leicht begreift, nicht den Endzweck, den Rücklauf des Bluts zu befördern, sondern vielmehr es etwas aufzuhalten, damit

es

es nicht zu geschwind niedersinke, und das Herz durch allzu schnellen Zufluß überlade.

Nun können wir den ganzen Weg, den das Blut macht, mit größerer Deutlichkeit übersehen. Hier ist er.

Wenn sich das Herz zusammenzieht, wird das Blut zu gleicher Zeit aus der linken Herzkammer in die große Schlagader, und aus der rechten Herzkammer in die Lungenschlagader getrieben.

Wenn sich das Herz erweitert, empfängt die linke Herzkammer neues Blut aus der Lungenblutader, und die rechte Herzkammer aus der Hohlader.

Das Blut, das nun in diesem Augenblicke aus der rechten Herzkammer in die Lungenschlagader übergeht, kommt durch deren beyde Hauptäste, theils nach der rechten, theils nach der linken Lunge, wo es sich in unzählige Nebenäste, die immer feiner werden, vertheilt. Aus diesen feinsten Pulsadern der Lunge saugen es die feinsten Blutadern wieder zurück, die sich endlich zusammen in der Lungenblutader vereinigen. Diese Lungenblutader gießt, bey einer Erweiterung des Herzens, das Blut in die linke Herzkammer. Aus dieser wird es bey einer neuen Verengerung sogleich wieder durch die große Schlagader hinausgetrieben, deren fortgesetzte Aeste es nach allen obern und untern Gegenden des Körpers fortleiten. Wo mit den feinern Aesten dieser Pulsadern die kleinen Blutadern zusammenstoßen, saugen diese das Blut wieder in sich, und leiten es wie kleine Bäche, die sich nach und nach in größere, dann in kleine Flüße, und hierauf in größere, endlich in die größten Ströme vereinigen, in die immer an Dicke zunehmenden Adern fort, bis end-

lich alle diese Adern in der großen Hohlader zusammen kommen, welche das empfangene Blut bey einer neuen Erweiterung des Herzens in die rechte Herzkammer ergießt. Aus dieser strömt es nun wieder in die Lunge, aus der Lunge wieder in die linke Herzkammer, aus dieser wieder durch die große Schlagader in alle übrigen Pulsadern, aus diesen durch die Blutadern wieder zurück in die große Hohlader, aus dieser wieder in die rechte Herzkammer; und so geht dieser Umlauf, so lange das Thier lebt, ununterbrochen fort.

Das Herz des Menschen treibt das Blut in weniger Zeit als der tausendste Theil einer Minute beträgt, durch einen Raum von 3 Schuh; oder wenn das Blut, anstatt einen Kreislauf zu nehmen, gerade fortströmte, würde es in weniger als einer Minute einen Raum von 30000 Schuh durchlaufen. Welch eine erstaunliche Geschwindigkeit! doch behält es diese Geschwindigkeit nicht während seines ganzen Umlaufes, sondern sie wird durch dessen Aufenthalt in den kleinern und kleinsten Blutgefäßen merklich vermindert. Die ganze Zeit, welche das Blut nöthig hat, um von der linken Herzkammer wieder in die rechte zurück zu kehren, beträgt nach der wahrscheinlichsten Berechnung doch noch nicht volle 3 Minuten.

Aus diesem Umlaufe kann man sich erklären:

1) Das Wachsthum und die Nahrung des Menschen.
2) Den Ursprung der Versetzungskrankheiten durch den Umlauf der Säfte.
3) Die Wirkung der Arzneymittel in die entferntesten Theile des Körpers.

In

In einem erwachsenen gesunden Körper sind 15 Pfund Blut, davon durch die linke Herzkammer allzeit nur eine Unze auf einmal durchgeht.

Der Weg des Blutes, den es in seinem gänzlichen viertelstündigen Umlauf gemacht hat, beträgt 149 Schuh oder 74 1/2 Elle. Soll das Blut nur zwey Fuß weit getrieben werden, so muß das Herz eine Kraft und ein Gewicht von 900 Centn., und also in 24 Stunden mehr, als 16 Millionen Centnerkraft anwenden.

Bey einem gesunden Menschen schlägt ferner der Puls in einer Minute 70mal. Wenn man also durch eine leichte Multiplicationsrechnung ausrechnet, wie vielmal der Puls bey einem achtzigjährigen Greiß geschlagen hat, so erstaunt man über diesen unförmlich scheinenden Fleischklumpen, den wir das Herz nennen, und versinkt in Betrachtung der großen Macht, Weisheit und Güte des Schöpfers.

Das ein und zwanzigste Kapitel.

Vom Fett, Gehirn, Mark, Marksaft.

Unter der Haut und zwischen verschiedenen Theilen des thierischen Körpers liegt das Fett in einem zelligen Gewebe. Es ist ein öhliges, beym Leben der Thiere flüssiges, und bey der geringsten Kälte gerinnendes Wesen, welches in besondern Gefäßen des zelligen Gewebes abgesondert wird. Es füllt gewöhnlich die äußern Theile des thierischen Körpers aus, und verschafft ihm seine Biegsamkeit, Geschmeidigkeit und

Schönheit. Es beschützt verschiedene zärtere Theile, erwärmt den Körper, und erhält ihn einige Zeit in Krankheiten, und bey Mangel der Nahrung. Hieraus ergiebt sich, wenn man ein Thier mager nennen kann, wenn nämlich das Blut wenig solcher Theile absetzt, oder wenn durch zu große Hitze und durch zu große Arbeit dieselben geschmolzen werden, oder wenn die Absonderungsgefäße schadhaft sind. Schrumpfen dann bey solchen magern Thieren diese Absonderungsdrüsen zusammen, so entstehen Runzeln. Dieses Fett ist ohne Nerven, und die Thiere haben also keine Empfindung in demselben. Daher höret man oft, daß die Mäuse Löcher in die fetten Seiten lebendiger Schweine gefressen haben.

Die feinsten und wichtigsten Theile des Körpers enthält das Gehirn *a*), der Sitz aller Empfindung, die Quelle aller Bewegungen. Man sagt, kein Theil bekäme so viel Blut als das Gehirn, nach welchem verschiedene Aeste der Pulsadern laufen (beym Menschen fast der zehnte Theil); und daraus hat man schon auf die Absonderung eines sehr nothwendigen und edlen Saftes geschlossen. Das Gehirn liegt bey den Säugethieren, wie bekannt, in dem obern Theile des Kopfs, wird von der Hirnschale eingeschlossen und geschützt, und ist eine weiche, röthlichgraue und weißliche Materie, die mit vielen einander durchkreuzenden kleinen Adern durchwebt, und mit verschiedenen Häuten umgeben ist. Das Aeußere des Gehirns ist sehr weich, röthlichgrau und

heißt

a) Cerebrum.

heißt die Borke oder Hirnrinde *b*); das Mark *c*) ist mehr inwendig, weiß, und etwas fester als die Borke.

Es theilt sich das Gehirn in zwey Haupttheile, welche aber durch feine Fasern und Adern verbunden sind. Der größere Theil nimmt den vordern Kopf ein, und den hintern das kleine Gehirn oder die sogenannte Zirbeldrüse *d*), welche sich in den hohlen Gang der Nacken- und Rückenwirbel fortpflanzt, und alsdann das Rückenmark, den Stamm des Nervenbaums ausmacht. In dem Marke der Zirbeldrüse finden die meisten Naturforscher den großen Sammelplatz der Nerven und einige den Sitz der Seele.

Ob in dem Gehirn aus dem Blute eine zarte, unsern Augen unsichtbare Flüssigkeit abgeschieden, und den Nerven mitgetheilt werde, und also ein wirklicher Nervensaft existire, ist noch unentschieden.

Beynahe noch wichtiger als das Gehirn scheint in dem Körper der unvernünftigen Thiere das Rückenmark *e*) zu seyn, welches, wie wir eben bemerkt haben, eine Verlängerung des Gehirns ist. Wenn alle Wunden an demselben geheilt werden können, im Herzen, Gehirn, in der Lunge, so heilt keine Arzeney eine Verletzung des Rückenmarks. Der größte Ochse stürzt augenblicklichst dahin, wenn man ihm mit einem Messer geschickt zwischen zweyen Rückenwirbeln das Rückenmark abschneiden kann.

b) Substantia cinerea s. corticalis. *c*) Subst. alba s. medullaris. *d*) Cerebellum. *e*) Medulla spinalis.

Das übrige Mark, das sich in den Knochen und besonders in den Höhlen der großen Knochen beständig in Vorrath befindet, ist eine weißliche, zuweilen auch röthliche, weiche, öhlige, bald mehr bald weniger dichte Masse, welche mit einer sehr zarten Haut, die man als eine innere Beinhaut ansehen kann, umhüllt ist. Der flüßigste Theil dieses Oehls dringt, wenn es aus dem Blute abgesondert ist, durch die löcherige Substanz der Knochen, stärket dieselben, und giebt ihnen die gehörige Geschmeidigkeit, damit sie bey zu starker Anstrengung durch Lasttragen oder Bewegungen nicht austrocknen oder zerbrechen.

Der Markſaft ist ein schmieriger, fetter und flüßiger Saft, welcher in den kleinen zelligen Höhlen der Knochen angetroffen wird.

Das zwey und zwanzigste Kapitel.

Von den Thränen, dem Nasenschleim, Ohrenschmalz, Schweiß, Harn.

Die Thränen sind eine wässerige Feuchtigkeit, welche aus der Thränendrüse, die über dem äußern Augenwinkel unter dem obern Augenliede liegt, quillt. Vermittelst verschiedener ausführenden Gänge, die man inwendig längs dem obern Augenliede wahrnimmt, ergießt sich diese Drüse, befeuchtet und reinigt den vordern Theil des Augapfels. Dadurch wird nicht allein die Bewegung des obern Augenliedes und des ganzen Auges erleichtert, sondern auch die Durchsichtigkeit der leuchtenden

den Hornhaut unterhalten und jede Unreinigkeit aus dem Auge gewaschen. Der Ueberfluß von dieser Feuchtigkeit wird in den Thränenpunkten, zwey Oeffnungen an dem Rande der Augenlieder aufgenommen; ist aber der Zufluß zu stark, so übersteigt diese Feuchtigkeit den Damm der Augenlieder und ergießt sich in hellen Tropfen außerhalb des Auges.

Außerdem giebt es auch noch eine fette Materie in der Augenhöhle, die dazu dient, daß sich das Auge geschmeidiger herumbewegen kann und nicht gerieben wird. Wenn sich diese vorne mit den Thränen vermischt, so entstehet daraus die gelbe Unreinigkeit, die man Augenbutter nennt.

Der Nasenschleim, welcher aus den Schleimdrüsen, die sich in der lockern und schwammigen Nasenhaut befinden, ausseigert, ist zur Beförderung des Geruchs nothwendig, weil die Nerven dadurch geschützt werden, und die Nase von der Luft, die immer aus- und eingeht, nicht ausgetrocknet wird. Wenn er in Menge ausschwitzt oder zähe wird, so wird er ausgeschneuzt.

Hinten am Gehörgange sitzt das sogenannte Ohrenschmalz, ein fettes, brennbares, gallenähnliches Wesen, das aus einer zelligen Haut jener Gegend ausgeschwitzt wird. Es ist vermuthlich dazu bestimmt, die Trommelhöhle beständig feucht zu erhalten, und dem allzu starken Eindruck der Luft auf die innern Theile des Ohrs zu vermindern.

Der Schweiß ist eine wässerige, mehrentheils mit Fett und Salztheilchen vermischte Feuchtigkeit, welche in den äußern Theilen des Leibes abgeschieden, und durch

die Schweißlöcher der Haut, entweder auf eine unsichtbare Weise ausdünstet, oder in sichtbaren Tropfen ausbricht. Durch die Ausdünstung, wozu auch das Ausathmen gehört, verliert das Thier durchgehends in 24 Stunden über die Hälfte mehr, als durch die andern Ausleerungskanäle. Die Ausdünstung sowohl, als auch zuweilen ein heftiger Schweiß, ist zur Erhaltung der Gesundheit nöthig, wenn dadurch eine schädliche Materie aus dem Körper geschafft wird. Ein übertriebner Schweiß aber wird schädlich, weil er den Körper schwächt, indem er ihm zuviel nützliche Säfte entführt.

Der Harn (Urin) ist eine unreine Flüßigkeit, deren Bestandtheile wässerig und mit einem flüchtigen Alkali und brennbaren Wesen vermischt sind. Er wird als überflüßig in den Nieren abgesondert, in der Blase gesammelt, und durch besondere Gänge aus dem Körper geführt. Der Geruch, die Farbe, der Geschmack und die Durchsichtigkeit ist bey den Säugethieren sehr unbestimmt und veränderlich. Es kömmt dabey bloß auf die Speisen an, die die Thiere genießen. Das Rindvieh z. B. giebt im Winter fast immer einen trüben Harn von sich, der viel Erde bey sich führt, weil es dürres Heu frißt. Im Sommer hingegen ist er ein klares helles Wasser, das fast nichts zurück läßt, weil es da mehr grünes Gras, und frische Pflanzen genießt, die sich selbst voll Wasser gesogen haben. Wenn die Thiere im Frühjahr zum erstenmal junges Laub fressen, besonders die gelben Pfriemen- und Weißdornblüten, junge Schößlinge und Knospen von Eichen, Buchen ꝛc., so bekommen

men sie davon einen rothgefärbten Urin, den der Abergläubige für Blut hält.

Das drey und zwanzigste Kapitel.

Von dem Aufenthalte und Alter der Säugethiere.

Der Aufenthalt dieser Thiere überhaupt erstreckt sich über die ganze Erde. Einige, die auf dem Trocknen wohnen, leben entweder auf den Bäumen, wie die Eichhörnchen, oder in Gebäuden, wie die Mäuse, oder machen sich unterirrdische Wohnungen, wie der Fuchs und Hamster; andere leben entweder als Amphibien im Wasser und auf dem Lande zugleich, wie die Wasserratten und Robben, oder im Wasser allein, wie die Wallfische. Manche von ihnen leben einzeln oder paarweise, andere aber in ganzen Familien, Gesellschaften, und Republiken.

Verschiedene, besonders nagende, Säugethiere stellen zu gewissen Zeiten Wanderungen aus einer Gegend in die andere an.

Die mehresten gehen ihren Geschäfften bey Tage nach; viele Raubthiere aber suchen mit Vorsatz ihre Beute des Nachts auf, um sie desto leichter und gewisser zu erschleichen, und die übrigen Thiere, als Mäuse und Hasen, bleiben oft aus Furcht in ihren Lagern am Tage verborgen liegen.

Einige bauen sich besonders künstliche Wohnungen, in welche sie für den Winter diejenigen Nahrungsmittel einsammeln, die sie alsdann entbehren müßten, z. B., der

Hamster

Hamster, und viele Mäusearten, und andere werden zu dieser Zeit so lange mit der Schlafsucht befallen, bis sie ihre ordentlichen Speisen wieder finden können, wie z. B. die Fledermäuse.

Was das Alter dieser Thiere anlangt, so ist es sehr verschieden, und ihr natürliches Lebensziel läßt sich schwer bestimmen, da theils die vielen Veränderungen ihres Zustandes ihre Natur schwächen, theils ihr Leben durch Gewalt verkürzt wird. Verlust der Zähne und daraus folgende verminderte Verdauungsfähigkeit, Schlechtheit und Mangel der Nahrungsmittel, schädliche Witterung u. dergl. scheinen vornämlich die ungewaltsame Abkürzung des Lebens zu bewirken.

Außerdem aber erlangen einige Säugethiere, z. B. der Hirsch, ein beträchtliches Alter, andere aber ein geringeres, wie z. B. verschiedene Mäusearten.

Das vier und zwanzigste Kapitel.

Von den verschiedenen Arten die Säugethiere zu jagen und zu fangen.

Da diese Thiere sonst alle in ihrer natürlichen Freyheit lebten, und wild waren, so mußte der Mensch auf Mittel denken, sich ihrer zu bemächtigen, theils um die ihm nützlichen zur Befriedigung seiner Bedürfnisse anzuwenden, theils um die schädlichen zu verringern, und ihrer allzu großen Vermehrung zu steuern, und so entstand denn die Jagd. Da nun die mehrsten dieser

Thiere

Thiere noch frey sind, so ist auch diese Beschäfftigung der Menschen noch immer nicht überflüßig geworden.

Unter Jagd überhaupt versteht man:

Erstlich: Die Kenntniß und Geschicklichkeit, das Wild aufzusuchen, es zu beschleichen, und mit Schießgewehr zu erlegen, oder mit Netzen und Fallen zu fangen.

Dieses ist ein vorzügliches Geschäffte des Jägers, der daher besonders die Fährten der Thiere genau kennen, und die Witterung für manche derselben gut zu machen wissen muß.

Die Fährten sind diejenige Spur, welche die wilden Thiere im feuchten Boden, Sand und Schnee durch ihre Tritte von sich zurück lassen.

Durch die genaue Kenntniß der einzelnen Spuren sowohl, als vorzüglich der Zusammenstellung derselben im Gehen, Traben und Laufen ist der Jäger fast immer im Stande zu bestimmen, welche Thiere, und wie viel derselben in seinem Reviere sich befinden, und kann sich derselben, wenn es nöthig ist, bemächtigen.

Unter Witterung aber versteht man, Materialien an einem Orte hinstreuen, die die Thiere lieben, und sich daselbst versammeln, oder die sie verabscheuen, und sich von da entfernen.

Das Jagen selbst und die Werkzeuche dazu sind, wie sich aus dem Begriff von selbst ergiebt, sehr verschieden, und es ist dasselbe beynahe so mancherley, so mancherley die Thiere sind. Denn einige Thiere werden gepürschet, andere mit Hunden aufgesucht, und mit dem Fangeisen oder Hirschfänger erstochen (abgefangen); einige werden

mit

mit Hunden gehetzt; andern werden Gruben gegraben; einigen werden Fallen gelegt; andere werden in Netze getrieben u. s. f.

Wir wollen die vorzüglichsten Arten, wie der Jäger dieselbe in seine Gewalt bekömmt, und die Werkzeuge, deren er sich dabey bedient, hier kürzlich angeben.

Der Hirsch wird auf dem Anstand gepürschet, d. h. er wird vom Jäger, der sich des Abends und Morgens an demjenigen Orte, wo dieses Wild seiner Nahrung (Aesung) halber aus dem Holze ins Feld und wieder zurück geht (wo es seinen Wechsel hat) verbirgt, mit der Kugelbüchse (Pürschbüchse) erlegt.

In der Brunftzeit kommt der Hirsch auf den Hirschruf, wo man durch ein Horn, das eine sehr weite Mündung hat, wie ein Hirsch oder Hirschkuh schreyt, in der größten Eile herbeygerennt, und muß seinen Irrthum auf eben diese Art mit dem Tode bezahlen *).

Die wilden Schweine sucht der Jäger, indem er einen Wald durchstreift, mit den Hunden, die Saufinder heißen, auf, läßt sie von den Hetzhunden packen, und fängt sie mit dem Hirschfänger oder Fangeisen ab.

Die Wölfe umkreiset man mit Tücherlappen, welche 1 1/2 Ellen lange, und 3/4 Ellen breite Stücken Leinwand sind, die an einer Leine 3/4 Ellen weit von einander befestiget werden, oder mit Federlappen, welche

*) Die Dammhirschjagd hat fast alles mit der Hirschjagd gemein. Die Jagd der Steinböcke und Gemsen aber findet man unter ihren Beschreibungen.

welche aus Federn aus den Flügeln und Schwänzen der Gänse, Hüner und großen Raubvögel bestehen, die mit ihren Kielen an einem Bindfaden, der mit Leinöl und Schießpulver bestrichen ist, zwey Spannen weit von einander angebunden, und auf Haspeln gewunden sind, von denen jede Haspel gewöhnlich 600 Ellen enthält. Wenn die Gegend, wo man diese Thiere bemerkt hat, mit diesem Zeuche umgeben ist, so stellt man Schützen an die Oeffnung des eingelappten Kreises, läßt die Wölfe hierher treiben, und erlegt sie durch Schießgewehr. Man fängt sie auch in großen eisernen Fallen, Schwanenhälse, oder Berliner Eisen genannt, welche die Gestalt der kleinen eisernen Mäusefallen ohne Teller haben, und in der Mitte mit ihren beyden Biegeln, wenn der Haaken, an den sie aufgestellt werden, berührt wird, zusammen schlagen.

Die Luchse kreiset man gewöhnlich mit Jagdtüchern und Netzen ein, wodurch sie oft genöthiget werden ihre Zuflucht auf die Bäume zu nehmen (zu bäumen), von welchen sie dann leicht herabgeschossen werden können. Sonst werden sie auch in den nämlichen Fällen, wie die Wölfe gefangen, oder man reizt sie, indem man sie durch den Ton, den ein Kramtsvogel, wenn er sich in einer Schlinge gefangen hat, von sich giebt, herbeylockt, und aus einem Hinterhalte mit der Büchse tödet.

Die Rehe werden, wie die Hirsche, gepürschet, und der Rehbock kann in der Brunftzeit, wenn der Jäger auf einem Stückchen von der äußersten Rindenschaale der Birke oder auf einem Apfel- oder Birnblatte, so zweystimmig, wie das Reh nach dem Männchen, oder

zur

zur Setzzeit ängstlich nach ihren Jungen schreyt (ruft), da er spornstreichs nach dem Orte, wo der Schall herkommt, zu läuft, leicht erlegt werden. Man nennt dieß das Rehblatten, oder aufs Blatt schießen *).

Die Dachse werden gewöhnlich in einem Tellereisen, das dem eisernen zusammenschlagenden Mäusefallen mit blechernen Tellern gleicht, und welches man bedeckt vor die Hauptröhre legt, gefangen.

Die Füchse werden aus Hütten, die man im Walde an solche Plätze bauet, wo sie nach dem dahin gelegten Aase gehen, geschossen. Man fängt sie auch in Schwanhälsen, indem sie mit Reh- oder Haseneingeweiden (Hasengescheide) gekirrt worden sind, oder in Tellereisen, welche man in flache Waldbäche legt, und darneben auf eine Gabel obige Kirrung befestigt. Man reizt sie auch, indem man den ängstlichen Ton eines gefangenen Hasens nachahmt.

Die Fischottern werden in eben solchen Tellerfallen gefangen, indem sie der Jäger ins Wasser, wo sie ihren Gang hin nehmen, verbirgt, oder sie mit Krausemünze bestrichen (die Witterung gemacht) an denjenigen Ort legt, wo sie gewöhnlich ans Land steigen.

Die wilden Katzen, Marder, Iltisse, Wiesel ꝛc. fängt man ebenfalls mit Tellereisen, die nur nach Verhältniß der Thiere größer oder kleiner sind. Sonst bemächtigt man sich ihrer noch durch die Schlagbäume (Schnellbäume, Schneller). Man nimmt nämlich

*) Bärenjagd, siehe Beschreibung des Thiers.

lich 4 Stangen eines Arms stark, und 4 Fuß lang, und bohrt an einem Ende durch alle 4 Stangen ein Loch, wodurch ein Nagel eines Daumens dick kömmt; die 2 mittlern Stangen müssen sich am Nagel leicht hin und her bewegen lassen, und etwas kürzer am andern Ende seyn, wo sie auch mit einem hölzernen Nagel befestigt werden. Die beyden Seitenstangen werden auch mit einem solchen Nagel verbunden. Auf jede Stange wird eine kleine Säule 12 Zoll stark angebracht, und oben mit einem Queerholze fest zusammen gemacht. In und durch den Schlagbaum geht ein Stock eines Fingers stark, und an einem Ende angebunden; vorne wird eine Kerbe eingeschnitten, dazu ein Stellholz 6 Zoll lang, und an dieses eine dünne Leine gemacht, welche an die obersten Bäume angebunden ist, womit diese aufgezogen und dadurch einer hölzernen Rattenfalle gleich werden. Auf die Mittelbäume legt man einen Stein. Wenn ein Thier an das Stellholz oder die Zunge stößt, so schlagen die Fallbäume herunter, und es wird solchergestalt gefangen, oder zerquetscht.

Um aber mehrerer Thiere sich zu gleicher Zeit zu bemächtigen, stellt der Jäger besonders im Herbste und Winter eine Streif- Klopf- Treib- oder Klapperjagd an. Dieß geschieht in Feldern und Wäldern, wenn durch Personen (Treiber), die man gern vor den Wind stellt, das Wild mit Geschrey und Lärm vermittelst einiger Stücken Holz, die sie gegen einander schlagen, den Schützen, die sich gegen den Wind angestellt haben, zugetrieben, und mit Schießgewehr erlegt wird. Es werden auf diese Art Hirsche, Rehe, besonders aber

Füchse und Hasen gejagt. Es gehört zu dieser Treibjagd, so leicht sie an sich zu seyn scheint, eine große Accuratesse in Ansehung des Anstellens der Schützen und Treibleute, wenn nicht das Jagen unangenehm ausfallen soll. Wenn geklappert wird, so schleicht gewöhnlich der Fuchs zuerst ganz leise und vorsichtig ab, daher auch dieser zuerst geschossen wird, alsdann gehen die Rehe, dann die Hirsche, am festesten sitzt immer der Hase, der sogar oft die Treiber über sich weggehen läßt, und alsdann erst hinter ihnen aufspringt, und rückwärts davon läuft.

Außer diesen giebt es auch noch mancherley Netze, worinn die Thiere dieser Klasse, die ein Gegenstand der Jagd sind, gefangen werden.

Für das Hirschgeschlecht giebt es Hirschnetze, deren Maschen 8 Zou breit und lang, und die 24 Maschen hoch sind. Sie werden in Gabeln von 4 Ellen Höhe mit einer Einbiegung (Busen) so aufgestellt, daß sie, wenn der Hirsch in dieselben gejagt wird, von den Gabeln abspringen, und er sich in denselben verwickelt.

Die Saunetze haben 6 Zoll hohe und breite Maschen, sind von stärkern Leinen, und 8 bis 10 Maschen höher, als die Hirschnetze, weil das Schwarzwild mit mehr Gewalt in dieselben einläuft; da es aber nicht so leicht, wie das Rothwild überspringt, so sind die Gabeln, womit sie aufgestellt werden, auch nur 2 1/2 Ellen hoch, der Busen aber zur Verwickelung desto größer.

Die Wolfsnetze werden aus federkieldicken Fäden gestrickt, und die Maschen müssen 5 Zoll lang und breit, und das Garn 24 bis 30 solcher Maschen hoch seyn,

seyn, damit sie beym Aufstellen auf 3 1/2 Ellen hohe Gabeln einen großen Busen geben.

Ein Fischotternetz muß die Breite und Tiefe des Stroms haben, in welchem man jagen will. Die Maschen müssen 2 Zoll ins Gevierte enthalten, und das Netz muß oben mit Kork und unten mit Bley versehen seyn. Die obern und untern Seiten des Netzes müssen so lang seyn, daß, wenn es aufgestellt ist, ein Mann beyde Enden von jenen fest und unbeweglich halten kann. Durch Leit- oder Spürhunde werden dann die Fährten des Otters gesucht, wo man ihn anzutreffen glaubt, wird das Netz aufgestellt, er wird durch Hunde und Lerm in dasselbe gejagt, und wenn er darinne gefühlt wird, so wird es zusammen geschlagen. Er geht aber ungern hinein, und wird meist auf dieser Jagd beym Athem, schöpfen außer dem Wasser erschossen.

Die Maschen der Reh- Fuchs- und Hasennetze sind 3 Zoll breit und lang, und 18 bis 20 Maschen hoch. Sie werden auf Gabeln von 3 Ellen Höhe aufgestellt.

Die übrigen Arten, wodurch der Jäger sich der Säugethiere, besonders der kleinern bemächtigt, sollen bey der Geschichte jeder Art hinlänglich angegeben werden.

Zweytens: versteht man unter Jagd besonders, eine Art Lustbarkeit großer Herrn, die gewöhnlich mit gewissen Feyerlichkeiten und glänzenden Anstalten verbunden zu seyn pflegt, wo entweder eine Anzahl von Wild auf einen Platz zusammen getrieben,

trieben, und dann von den jagenden Personen erlegt wird, oder wo man nur ein einzelnes Thier so lange verfolgt, bis es liegen bleibt. Darunter gehört denn vorzüglich die Hauptjagd, die Bestätigungsjagd, und die Parforcejagd.

Bey einer Hauptjagd, die fürstliche Personen zuweilen bey einer großen Anzahl Roth- und Schwarzwildpret in einer Gegend anstellen, wird ein großer Strich Wald mit dem Jagdzeuche umstellt, in welches das Wild von 3 bis 4 Meilen weit getrieben, und an dessen Ende auf einem freyen Platze aus einem Jagdschirme erschossen wird.

Die Erfordernisse zu einer solchen Jagd sind die hohen Tücher, welche aus grober fester Leinwand bestehen, 5 Ellen hoch sind, und von welchen jedes einzelne, das gewöhnlich 200 Ellen lang ist, eine Linie von 130 Waldschritten bestellt. Diese Tücher werden, so wie alles hierher gehörige Jagdzeuch, mit tannenen Gabeln (Forkeln) an ihren Leinen, welche in Ringen laufen, am obern Ende aufgerichtet und am untern mit Pflöcken in der Erde befestigt, und man bedient sich ihrer in engen Kreisen, wohin das Wild aus den weitern getrieben werden soll.

Die Mitteltücher (dänischen Tücher) haben nur 3 1/2 Ellen Höhe, aber eben dieselbe Länge, und werden in weitern Kreisen gebraucht, weil hier das Wild seine Einschränkung noch nicht gewahr wird, und daher nicht überspringt. Den weitesten Umfang der Jagd umstellt man mit den vorhin beschriebenen Tücher- und

Feder-

Federlappen. Hinter diesem offenen Zeuche aber muß ein stätes Feuer lodern, damit das Wild, das seine Gefahr bemerkt, zurück gescheucht wird, und nicht durchbricht. Wenn das Wild aus den entferntesten Orten in den umstellten Platz, der allemal da, wo der neue Zug, (Trieb) herkömmt, geöffnet werden muß, getrieben worden ist, so wird dieser immer mehr und mehr verengert, bis die Thiere endlich in etlichen sogenannten Kammern (Böden) oder eingeschlossenen dicht mit Holz bewachsen Bezirken von 1500 bis 2000 Schritten, je nachdem die Anzahl groß oder klein ist, zusammengedrängt worden sind. Diese Kammern müssen außer den hohen Tüchern beym Schwarzwildpret inwendig, beym Rothwildpret auswendig noch mit Spiegelzeuch (Prellnetzen), oder Netzen von starken Leinen von der Höhe der Tücher, zur Verhinderung des Durchbruchs, umstellet werden.

An die letzte Kammer schließt sich der Lauf (Auslauf), derjenige geräumige freye Platz, auf welchem das blutige Schauspiel (das Abjagen) gegeben werden soll, durch das Rolltuch an. Dieser ist eben so, wie die Kammern, mit hohen Tüchern und Spielzeuch verwahrt, und hat in seiner Mitte den Jagdschirm, aus welchem das Wild, wenn es von den Jägern aus der letzten Kammer mit Jagdgeschrey und dem Schall der Wald- und Hüfthörner, bey zurückgezogenem Rolltuch, herausgetrieben worden ist, geschossen wird.

Geschieht das Abjagen in einer Gegend, wo das Wild durch einen großen Teich oder Fluß gesprengt wer-

den kann, so nennt man eine solche Jagd eine Wasserjagd.

Eine Bestätigungsjagd wird alsdann gehalten, wenn der Jäger in einem kleinen Districte einige Stücken Wild durch Hülfe seines Leithundes *), welcher die frische Spur derselben gewittert, bemerkt hat. Sie hat mit einer Hauptjagd darin einige Aehnlichkeit, daß, wenn der Jäger etlichemal mit dem Leithunde die Gegend umgangen ist (bestätigt hat), und mit Gewißheit behaupten kann, daß sich das Wild in dem umgangenen Bezirke befindet, alsdann eben jene Tücher aufgestellt werden, und ein Abjagen entweder in einem besondern Lauf gehalten, oder das Wild innerhalb des Zeuches aufgesucht und erlegt wird.

Mit dieser Jagd stimmt die Kesseljagd am meisten überein. Man hält nämlich da eine Kesseljagd, wo der Jäger den Stand eines oder etlicher Stücke Wildpret weiß. Ein solcher Platz wird mit dem Zeuch in der Runde umstellt, die Schützen stellen sich an, und lassen sich das Wild entweder herbey hetzen oder treiben. Eine solche Jagd kann in einem Tage bewerkstelliget werden. Die Herrschaften bestellen sie den Abend vorher, und des andern Morgens muß in dem Reviere eines erfahrnen Jägers auch sogleich dieselbe gehalten werden können.

Die Parforcejagden (Lauf- oder Rennjagden), bey welchen besonders einzelne Hirsche durch berittene Jäger und grimmige Hunde so lange herum gejagt werden, bis sie ganz ermattet, fast todt, zur Erde niederstürzen,

*) s. Leithund.

zen, scheinen zur Ehre der Menschheit ihrem Ende nahe zu seyn; wenigstens sind sie in Thüringen schon seit einiger Zeit unerhört.

Endlich drittens, versteht man unter Jagd auch bisweilen das Recht, innerhalb eines gewissen Bezirkes gewisse Thiere jagen und fangen zu dürfen.

Man theilt in dieser Rücksicht die Jagd ein, in die hohe und niedere, und unter den Säugethieren gehören zur hohen Jagd, Hirsche, Dammhirsche, Steinböcke, Gemsen, wilde Schweine, Bären*), Luchse und Biber, und zur niedern die übrigen Thiere, als Rehe, Hasen, Wölfe, Füchse, Dachse, Fischottern, wilde Katzen, Marder, Iltisse, Eichhörner, Wieseln und Hamster **). Andere geben dieser Eintheilung eine

 nähere

*) Die Bärenjagd gehört nicht nur zur hohen Jagd, sondern ist auch überdieß ein ganz vorzügliches fürstliches Regalstück; daher unter Verleihung der hohen Jagd die Bärenjagd niemals mit begriffen ist.

**) Der Landesherr hat mehrentheils ausschließungsweise das Recht der hohen Jagd, wenn nicht seine Vasallen durch das Herkommen im Besitz derselben sind. Die Gerechtigkeit der niedern Jagd liegt aber immer auf allen Rittergütern. Wenn der Landesherr und Vasall zugleich in einem und eben demselben Bezirke die Jagd exercitren, so heißt dieß die Mitjagd (das Mitjagen); Vorjagd aber, wenn der Landsasse nicht eher in dem Reviere jagen darf, als bis es der Landesherr schon einmal durchgejagt hat; und Koppeljagd, wenn zwey oder mehrere Rittergutsbesitzer die Jagd gemein haben.

nähere Bestimmung, und nehmen eine hohe, mittlere und niedere Jagd an. Zur hohen Jagd rechnen sie den Hirsch, Dammhirsch, Steinbock, die Gems, den Luchs, Biber und Bär, zur mittlern das Reh, Schwein, und den Wolf, und zur niedern den Hasen, Fuchs, und die übrigen oben aufgezählten Thiere. Bey dieser doppelten Eintheilung kömmt es auf die besondere Jagdordnung jedes Landes an. In Thüringen hat man meist die erstere gewählt, und in Churfachsen die letztere.

Das fünf und zwanzigste Kapitel.

Vom Nutzen und Schaden der Säugethiere.

In der Haushaltung der Natur sind die Säugethiere von der größten Wichtigkeit und verwalten darin sehr ansehnliche Geschäffte. Sie sind auch unter den Thieren diejenigen, welche dem Menschen fast alle unmittelbar nützlich sind. Die andern scheinen nicht so geradezu in dieser Absicht ihr Daseyn erhalten zu haben, sondern ihr Nutzen scheint sich überhaupt mehr auf die Erhaltung der Vollkommenheit des Ganzen, auf die Erhaltung des Gleichgewichts in den Naturreichen zu erstrecken, welches doch aber allzeit wiederum nützlichen Einfluß auf ihn hat.

Aus dieser Classe sind die meisten Hausthiere, welche dem Menschen entweder zu seiner Selbsterhaltung so schlechterdings nothwendig geworden sind, wie die Kühe,

Schafe

Schafe, Pferde, Ziegen, oder die ihm durch ihre Treue, Wachsamkeit, durch ihre Fähigkeiten und erlangte Geschicklichkeiten, durch ihre Stärke u. d. gl. nützen, als Pferde und Ochsen, Hunde und Katzen.

Der vielfache Nutzen der Säugethiere für den Menschen besteht im allgemeinen in folgenden Stücken. Er braucht einige zum Ackerbau, zum Fuhrwerk, zum Lasttragen und Reiten, als die Pferde, Ochsen und Esel, andere zur Jagd, zu Aufsuchung der Trüffeln, zur Bewachung der Häuser und Heerden, wie die Hunde. Einige, als die Katzen, vertilgen ihm manche schädlichen Thiere, z. B. die Mäuse, andere nützen ihm zur Speise entweder durch ihr Fleisch, wie das Rindvieh, das Wild, Schafe, Ziegen, Schweine, Hasen, oder durch ihre Milch, die Kuh, die Ziege, das Schaf; einige müssen ihm durch ihre Bedeckungen, die die Handwerker als Leder, oder Pelzwerk, oder als Garn verarbeiten, Kleidungen, Decken und dergl. verschaffen, so die Schafe, Marder, Wieseln, Füchse, Pferde, das Rindvieh und Wildpret. Von einigen braucht er das Fett zum Verbrennen, und zum Einschmieren mancherley Werkzeuche und des Lederwerks, so den Talg und Fischthran. Andere Künstler und Handwerker haben Borsten, Haare, Geweihe, Hörner, Klauen, Zähne, Knochen, Sehnen, Blasen, u. d. gl. nöthig, um nützliche Dinge daraus zu verfertigen. Aus den Füßen, Knochen, Knorpeln, Sehnen und andern Abgängen des Felles der Thiere wird der Leim gemacht, den so viele Professionisten brauchen. Mancher Thiere Därme geben Saiten. Das Blut von den Schweinen wird zu

Würsten und das von Rindern zum Berlinerblau und zur Reinigung des Zuckers gebraucht. Der Mist giebt den nothwendigen Dünger, der Harn den Phosphorus, und wie viele Theile wurden nicht sonst, da es Mode war, in den Bestandtheilen der Säugethiere die Heilkräfte für alle Krankheiten zu suchen und zu finden, in der Arzney gebraucht, wie viele werden noch jetzt darin gebraucht, als Hirschhorn, Fett, Milch, Bisam, Eingeweide, Fleisch, Knochen u. s. f. und wie viele werden ins künftige wieder darin gebraucht werden?

Auf der andern Seite ist freylich nicht zu läugnen, daß auch manche Thiere dieser Classe den Menschen unmittelbar oder mittelbar Schaden zufügen; allein da dieser Schade mehrentheils nur zufällig oder doch sehr gering, und mit der nützlichen Einrichtung der Natur dieser Thiere unzertrennlich verknüpft ist, so kann er fast gar nicht in Erwähnung gezogen werden. So tödten z. B. die größern reissenden Thiere, Löwen, Tiger und Bären in der Hungersnoth Menschen; so erwürgen Wieseln, Marder, Iltisse viel nützliches Federvieh; so rauben die Fischottern Fische; so schaden Hirsche, Rehe, Hasen, Hamster dem Getreide und den Gewächsen des Feldes; so benagen die Erdwölfe (Wasserratten) und Hasen die Obstbäume, die Waldbäume, und nähren sich oft zu unserm Schaden von den Gartenfrüchten; so gehen die Wieseln und Mäuse in Häusern den Eßwaaren nach; so verderben letztere durch ihr Nagen das Hausgeräthe, Bücher, Zeuche und andere nützliche Dinge; so verwüsten die wilden Schweine, Maulwürfe und Erdwölfe durch ihr Graben Aecker, Wiesen und

Gärten,

Gärten, und so tödten die wüthenden Hunde durch ihren giftigen Biß zuweilen nützliche Thiere und selbst den Menschen. Aber beynahe allen diesen nachtheiligen Folgen kann der Mensch durch Gegenmittel vorbeugen, und alle dieser Schade wird durch den Nutzen, den diese Thiere in der Schöpfung stiften, weit überwogen. Bey der besondern Geschichte dieser Thiere wird dieß alles näher angegeben werden. *)

Das sechs und zwanzigste Kapitel.

Von Aufbewahrung der Säugethiere in Naturalienkabinetten.

Die Bälge der meisten Säugethieren, die in Kabinetten aufgestellt werden sollen, lassen sich gerben und ausstopfen. **)

Die sicherste Verfahrungsart bey größern ist folgende: Vor allen Dingen muß man genaue Maaße von den meisten Theilen des Thieres, in der Stellung, die es haben soll, nehmen. Alsdann schälet man es, indem ein Auffschnitt von Anfang des obern Brustknochens bis zum Ausgange des blinden Darms oder umgekehrt gemacht ist, aus; wobey, wenn das Thier sehr groß

*) s. G. A. Suckow's Anfangsgründe der Naturgeschichte der Thiere I. S. 67—83.

**) Die beste und nachahmungswürdigste Behandlungsart findet man in Georg Pistorius (Beckers) Anleitung zum Ausstopfen und Aufbewahren der Vögel und Säugethiere. Darmstadt 1799. S. 89 u. f.

groß ist, noch besondere Einschnitte über dem untern Theil der Hinterfüße nöthig sind. Hierauf wird die Fleischseite des Felles mit einem Päleisen (halben Monde) so gut, als möglich, bestoßen, oder Fleisch und Fett mit einem schicklichen Messer so gut als möglich abgelöst, und das ganze Fell zuerst mit ungelöschtem Kalch, alsdann mit Allaun abgerieben und solchergestalt gegerbet. Und nun erst kann das Thier folgendermaßen ausgestopft werden:

Ein Stück Holz von der Länge des Rückgrats, woran vier Zainstäbe, (aus welchen die Nagelschmiede die Nägel machen,) mit Tuchlappen und Spitzen versehen, befestigt werden, muß dem Thiere die feste Stellung und Anlage zur Figur geben. Statt dieser Eisenstäbchen kann man sich auch bey manchen Thieren des bloßen Holzes bedienen. Ein ähnliches Stück Eisen, welches auf beyden Seiten mit Lappen versehen seyn muß, um es einmal an das Holz unter dem Rücken, und das anderemal an den Schädel, welcher bis unter das oberste Wirbelbein im Felle bleibt, befestigen zu können, muß dem Halse die gehörige und feste Stellung verschaffen. Der Stand und die Festigkeit der Füße, deren zweyte halbe Röhre auch im Felle bleibt, wird ebenfalls durch eiserne Stäbe erhalten. Hierauf wird das ganze Fell mit gebundenem reinen Heu ausgefüllt und zuletzt die Oeffnung zugenäht.

Andere ziehen die Haut sorgfältig ab, füllen die Hirnschaale mit reinem Werg aus, umwickeln die Fußknochen und den Schwanzdrath mit Werch, das zur Festigkeit und Gestalthaltung durchnäht wird,

und

und formen eben so mit Werch einen durchglühten Drath, in der Gestalt des Körpers aus, und nähen dann alle aufgeschlitzte Stellen mit Sorgfalt zu. Alle innern Theile werden vorher mit einem Conservirpulver, das aus 6 Theilen Allaun, 4 Theilen starkem Pfeffer und 2 Theilen Kampfer besteht, bestreut.

Kleinere Thiere, als Iltisse, Mäuse u. d. gl. haben weniger Schwierigkeit. Man bedient sich bey diesen schwächern statt der eisernen Stäbe nur stärkern oder mit Werch unwickelten Drathes nach Verhältniß der Größe oder Kleinheit des Thieres, bestreicht das Fell auf der Fleischseite zu mehrerer Sicherheit gegen den Angriff verderbender Insekten statt des Alauns mit Arsenik, den man mit Baumöhl aufgelößt hat, und bestreut diesen Anstrich mit klarem ungelöschten Kalch. Die Flügel der Fledermäuse überzieht man, um sie vor den Motten zu bewahren, mit einem klaren Lack.

Es ist neuerdings eine sehr einfache und zuverläßige Methode erfunden worden, um die kleinsten Thiere aufzubewahren. Zuerst wird alles, was in den Eingeweiden der Thiere enthalten seyn kann, völlig ausgeleeret, und zwar entweder durch einen allmähligen Druck gegen den After, oder durch eine starke Einspritzung, welcher alles weicht, was im Wege ist. Nach dieser vollendeten Reinigung bindet man den After mit einem Faden fest zu, und spritzet mit einer Spritze Aether durch den Mund in den Körper, und wenn alles damit inwendig angefüllt ist, so hängt man das Thier am Kopfe auf. Hierauf sticht man ein Auge aus, holt das Gehirn aus dem Kopfe, füllt den leeren Raum

gleich-

gleichfalls mit Aether an, und bewahrt ihn vor dem Auslaufen durch einen Pfropf, den man in die Augenhöhle stecket. Am andern oder dritten Tage wiederholt man diese Ausspritzungen in den Körper, und fährt damit so lange fort, bis das Thier ganz ausgedorret ist. So wie nun diese Austrocknung nach und nach, indem der Aether bey seiner Verdünstung die im thierischen Körper befindliche Feuchtigkeit verflüchtiget, vor sich geht, sucht man dem Thiere seine schickliche Stellung zu geben, und sobald es vollkommen ausgetrocknet ist, kann man es ohne Besorgniß hinstellen, wohin man will. Diese Methode ist deswegen sehr vortheilhaft, weil der Aether wohlfeil ist, und man z. B. zu einer Maus nicht mehr als eine Unze braucht. Schade, daß sie an verwundeten Thieren nicht recht anwendbar ist, indem man den Aether nicht wohl zusammenhalten kann.

Diejenigen kleinen Thiere, welche man auf obige Art nicht gut erhalten kann, und die ungebohrnen, verwahrt man in gleichweiten Gläsern, die mit Weingeist oder reinem Kornbranntewein angefüllt und mit Kork und Thierdärmen fest verschlossen sind.

Skelette von kleinern ganzen Thieren, oder von größern Thierköpfen und Füßen, die man besonders deswegen aufstellt um an den Zähnen und Zehen die Kennzeichen der Classen, Gattungen und Arten deutlich wahrzunehmen, werden gemacht, indem man das Cadaver, welches vom gröbsten Fleisch entblößt ist, in Wasser, worin ungelöschter Kalch aufgelößt ist, legt, und in demselben so lange verwesen läßt,

bis

bis das noch übrige Fleiſch mit einem Meſſer leicht abgelöſt werden kann. Die Knochen werden alsdann, wenn ſie recht ſchön werden ſollen, vorher mit einer ſcharfen Potaſchenlauge durchgepeitzet, ehe ſie an der Sonne mit Waſſer gebleicht werden.

Auf die Stellung und Figur der Thiere, die man ausſtopfet, kömmt alles an, und man wählt dazu entweder die natürlichſte oder die auffallendſte. Bey den Raubthieren z. B. iſt es nicht unſchicklich, wenn man ihnen den Rachen aufſperrt, um die Miene der Raubſucht und das ſcharfe Gebiß deutlich bemerken zu können.

Herr Camper, ein berühmter Anatom in Holland hat auch eine ſehr ingenióſe Methode ausgedacht, die Thiere im Tode nach dem Leben darzuſtellen, ohne ihr Fell durchs Ausſtopfen zu verlängern. Er formt den Rumpf ab, gießt ihn von Gips aus und zieht dann das Fell drüber her.

Das ſieben und zwanzigſte Kapitel.

Von der Eintheilung dieſer Claſſe in ihre Ordnungen und Gattungen, und von einigen vorzüglichen Schriften über die Säugethiere.

Ehe wir zur Eintheilung der Claſſe der Säugethiere ſelbſt ſchreiten, müſſen wir uns erſt noch mit einigen Wörtern bekannt machen, die in der ganzen Naturgeſchichte ſehr oft vorkommen.

Man

Man nennt in der Naturgeschichte ein jedes Ding, das wir bemerken können, oder einen jeden natürlichen Körper ein einzelnes Ding (Individuum).

Wenn mehrere solche einzelne Dinge in ihren wesentlichen Eigenschaften und Theilen eine große Aehnlichkeit unter einander haben, so rechnet man sie zu einer Art (Species). Dabey giebt es nun zuweilen einzelne Körper, die eine große Veränderung in ihren zufälligen Eigenschaften erlitten haben, wodurch sie von den andern Körpern merklich abweichen; diese nennt man Spielarten, Abänderungen oder Varietäten. So ist z. B. unter der Art Hirsch, der weiße Hirsch, den man zuweilen antrifft, eine Spielart.

Ferner, wenn mehrere Arten natürlicher Körper in gewissen Haupteigenschaften mit einander übereinkommen, so machen sie eine Gattung, oder wie andere wollen ein Geschlecht (Genus) aus. Hierbey stößt freylich der Naturforscher zuweilen auf eine einzelne Art, die von allen übrigen sehr abweicht, er weißt ihr daher allein, als einer einer einzelnen Gattung ihre bequemste Stelle an. So macht z. B. der Tapir allein eine eigne Gattung aus.

Mehrere ähnliche Gattungen geben nun weiter eine Ordnung (Ordo), und zuletzt mehrere ähnliche Ordnungen eine Classe (Classis).

Wenn es sich zuweilen trifft, daß die Ordnungen zu weitläuftig werden, so zertheilt man sie, der Bequemlichkeit halber, wiederum in Abschnitte (Sectiones), und wenn eine Gattung zu zahlreich wird, so sondert man ihre Arten in gewisse Familien (Familiae) ab,

ab, ſo z. B. bey der großen Mäuſegattung; und wenn man bey manchen Arten noch abſonderungswürdige und bleibende Verſchiedenheiten findet, ſo bemerkt man dieſe durch die Abtheilung in gewiſſe Raſſen, z. B. bey den Pferden *).

Dieſe gewöhnliche Eintheilung, welche man ſich mit dem bekannten Beyſpiele der Ordnung im Soldatenſtande, wo die Armee die Klaſſe, die Brigade die Ordnung, das Regiment die Gattung, die Compagnie die Art und jeder Soldat ein Individuum iſt, deutlich machen kann, heißt ein Syſtem, oder eine Methode. Die Einrichtung, der Bau eines ſolchen Syſtems hängt von den Kennzeichen (Charakteren) ab, die man bey der Beſtimmung der Claſſen, Ordnungen, Gattungen, und Arten zum Grunde gelegt hat. Durch dieſe wird man in den Stand geſetzt, jeden natürlichen Körper von allen andern mit Leichtigkeit und Gewißheit zu unterſcheiden.

Es giebt aber verſchiedene künſtliche Syſteme, nach welchen die Säugethiere geordnet worden ſind.

In den älteſten Zeiten ſahe man auf die Verſchiedenheit der Füße. Ariſtoteles theilte ſie darnach ſchon 1) in Thiere mit ungeſpaltenem Hufe, z. B. das Pferd; 2) mit geſpaltenen Füßen oder zwey Hufen

*) Etwas andere Begriffe werden von Raſſe und Varietäten gegeben von Hrn. Kant in der Berliner Monatsſchrift 1785. VI. p. 391. und im Teutſchen Merkur 1788. I. p. 48. und in Hr. Girtanners ausführl. Schrift über das Kantiſche Princip für die Naturgeſchichte. Göttingen 1796.

Hufen, z. B. die Ziege, und 3) mit gefingerten Füßen ein, worunter alle übrigen auf dem Erdboden lebenden Thiere gerechnet wurden. Und diese Eintheilung behielten einige neuere, z. B. Klein *), bey, bestimmten und verbesserten sie nur mehr.

Klein, der zu den vierfüßigen Thieren auch die vierfüßigen Amphibien rechnet, macht drey Ordnungen: 1) Thiere mit Hufen, 2) haarige Thiere mit Zehen, 3) unbehaarte Thiere mit Zehen, und diese zertheilt er wieder in Familien.

Vollkommener machte diese Eintheilung Hallen **). Er theilte die vierfüßigen Thiere in zwey Abschnitte, die er Classen nennt, und jede derselben wieder in verschiedene Gattungen. In der ersten Classe begreift die erste Ordnung, die behuften, mit ungespaltenen Klauen; die zweyte, die zweyklauigen; die dritte, die dreyklauigen; die vierte, die vierklauigen, z. B. das Nilpferd; die fünfte, die fünfklauigen, den Elephanten, in sich. Die zweyte Classe beschreibt in der ersten Ordnung die einzehigen, in der zweyten die zweyzehigen u. s. w.; in der sechsten aber die mit Floßfederfüßen versehene, welche sich im Wasser nähren und an trocknen Orten werfen.

Der

*) Er war Sekretair der Stadt Danzig, und ein berühmter Naturforscher. Sein System findet man in dem Buche: J. Theod. Kleins natürliche Ordnung und vermehrte Historie der vierfüßigen Thiere herausgegeben von Gottfr. Reyger. Danzig, 1760.

**) S. Prof. Hallens Naturgeschichte der Thiere. Erster Theil. Berlin, 1751.

Der Ritter von Linné nahm ſein Syſtem vorzüglich aus der verſchiedenen Anzahl, Geſtalt und Lage der Zähne her.

Ich will hier den allgemeinen Entwurf deſſelben Syſtems nach ſeinen Eintheilungsgründen, der Beſchaffenheit der Füße, und vorzüglich der Verſchiedenheit der Vorderzähne darlegen.

Die Säugethiere haben alſo:

I. entweder wahre Füße, und a.dann

1) gar keine Vorderzähne: Dieß giebt ie

Zweyte Ordnung der Säugethiere: Thiere ohne Vorderzähne. Bruta.

2) Oben keine Vorderzähne:

Fünfte Ordnung: Wiederkäuende Thiere. Pecora.

3) Zwey Vorderzähne oben und unten:

Vierte Ordnung: Nagethiere. Glires.

4) Vier Vorderzähne oben:

Erſte Ordnung: Menſchenähnliche Thiere. Primates.

5) Sechs ſtumpfe Vorderzähne oben:

Sechſte Ordnung: Thiere mit dem Pferdegebiß. Belluae.

6) Meist sechs spitzige Vorderzähne oben:

Dritte Ordnung: Raubthiere. Ferae.

II. oder verwachsene Füße zum Schwimmen, welche den Flossen der Fische ähnlich sind:

Siebente Ordnung: Säugende Seethiere. Cetacea.

Herr Hofrath und Professor Blumenbach in Göttingen *) sieht auf alle äußere Merkmale, auf den ganzen Habitus (Ansehen) der Thiere zugleich und bestimmt darnach zwölf Ordnungen: 1) Bimanus. Der Mensch mit zwey Händen. 2) Quadrumana. Säugethiere mit vier Händen, z. B. Affen. 3) Bradypoda. Säugethiere, deren ganzer Körperbau auf den ersten Blick Trägheit und Langsamkeit verräth, z. B. der Ameisenbär. 4) Chiroptera. Säugethiere, deren Vorderfüße Flatterhäute bilden, z. B. Fledermäuse. 5) Glires. Nagende Säugethiere. Sie nähren sich, bis auf sehr wenige Ausnahmen (und im wilden Zustande vermuthlich alle), von Vegetabilien und zwar von härtern die sie benagen. 6) Ferae. Reißende oder sonst fleischfressende Säugethiere, als wovon nur wenige Gattungen ausgenommen sind, Hunde Katzen, Bären. 7) Solidungula. Einhufige Thiere; das Pferd. 8) Pecora. Wiederkäuende Thiere mit

*) S. Handbuch der Naturgeschichte von D. J. F. Blumenbach. Göttingen 1797. S. 56.

mit geſpaltenen Klauen, z. B. der Hirſch. 9) Belluae. Meiſt ſehr große oder unförmliche, borſtige oder dünnbehaarte Säugethiere. Schwein, Elephant ꝛc. 10) Cetacea. Wallfiſche, warmblütige Thiere, die mit den kaltblütigen Fiſchen faſt nichts als den unſchicklichen Namen gemein haben.

An allen dieſen Eintheilungen, von welchen es noch mehrere giebt, finden ſich aber Mängel und Unvollkommenheiten, die vorzüglich darinn beſtehen, daß ähnliche Gattungen zertrennt in verſchiedene Ordnungen kommen, und unähnliche wiederum in einer Ordnung mit einander verbunden werden.

Da aber dieſe Unvollkommenheiten allen künſtlichen Syſtemen beynahe nothwendig zu ſeyn ſcheinen, und wir das Syſtem der Natur vielleicht noch lange oder gar nicht finden werden, ſo will ich das etwas veränderte und wie ich glaube verbeſſerte Pennantſche Syſtem *), das auf die Bewegungswerkzeuge und Zähne zugleich Rückſicht nimmt, und eine ſehr leichte Ueberſicht

 verſchafft,

*) Pennant war ein ſehr geſchätzter Naturforſcher in England. ſ. Thomas Pennant's history of Quadrupeds. Ed. 3. London 1793. Preface and p. XI. und Meine Ueberſetzung von dieſem Werke unter dem Titel: Thomas Pennats allgemeine Ueberſicht der vierfüßigen Thiere. Aus dem Engl. überſetzt und mit Anmerkungen und Zuſätzen verſehen. Weimar 1799. Erſter Band. p. XXI. Ferner: D. M. B. Borkhauſens deutſche Fauna oder kurzgefaßte Naturgeſchichte der Thiere Deutſchlands. Frankfurt 1797. Erſter Band p. XVIII.

verschafft, zum Grunde legen, und nicht nur in der Folge alle deutsche Thiere darnach aufzählen und beschreiben, sondern auch hier, zur vollständigen Hinsicht in die gesammte Mammalogie, die Kennzeichen aller Gattungen und die Anzahl der bis jetzt bekannten Arten angeben.

Die Ordnungen, Abschnitte und Gattungen der Säugethiere mit ihren Kennzeichen sind nun folgende.

Die erste Ordnung.

Säugethiere mit Hufen. Ungulata.

I. Abschnitt.

Einhufige Thiere. Solidungula.

Die Füße haben nur einen Huf, d. h. man sieht äußerlich keine Abtheilung der Zehen, sondern diese stecken alle in einer einzigen hornartigen Scheide, wie in einem Schuh.

In beyden Kinnladen stehen sechs abgestumpfte Vorderzähne.

Das Euter des Weibchens mit zwey Säugwarzen liegen zwischen den Hinterbeinen.

Die

Die ganze Geſtalt iſt ſchön, alle Theile wohl proportionirt an ſich, und eben ſo proportionirt zuſammengeſtellt. *)

Die meiſten ſind als nützliche Thiere faſt über die ganze Erde verbreitet. Eine Gattung.

1. Das Pferd. Equus.

Man kennt ſechs Arten, und zwey nützliche Baſtardarten von dieſer Gattung.

II. Abſchnitt.

Zweyhufige Thiere. Bisulca.

Mit zwey Hufen oder Klauen, wo alſo die Zehen in zwey hornartigen Scheiden ſtecken.

Die Geſtalt iſt mannigfaltig, ſo wie die Lebensart. Neun Gattungen.

A. Ohne Vorderzähne in der obern Kinnlade: Wiederkäuende Thiere. **)

Oben ſtehen keine, unten aber ſechs oder acht, von den breiten abgeſtumpften Backenzähnen weit entfernte breite Vorder- oder Schneidezähne. Die Eckzähne fehlen mehrentheils.

*) Der ſchlappöhrige Deutſche Müller-Eſel wird hoffentlich hier keine Ausnahme machen dürfen.

**) Pecora. *Lin.*

Das Euter liegt zwischen den Hinterfüßen mit zwey oder mehrern Säugwarzen.

Sie haben vier Mägen *), leben von Gewächsen, die sie mit ihren Zähnen und durch Hülfe der Zunge abrupfen, durch die Backenzähne grob zermalmen und vermöge des Baues ihres vierfachen Magens wiederkauen können.

Der Mensch nutzt fast alles von ihnen.

a. Mit Hörnern und zwar

α. mit bleibenden Hörnern.

2. Giraffe. Camelopardalis.

In der untern Kinnlade stehen acht Vorderzähne, wovon die äußersten zweytheilig sind; die Hörner sind kurz, aufrecht, an der Spitze abgestumpft; Hals und Schultern sind von außerordentlicher Länge. Eine Art.

Der Kameelparder (Camelopardalis Giraffa, *Gmelin Lin.*) ist wegen seines dünnen, sehr langen Halses, der sehr großen und hohen Schultern an den Vorderfüßen ein sehr sonderbar gestaltetes Thier. Die Länge beträgt 22, die Höhe bey aufgerichtetem Kopfe 16, und die Länge des Halses allein 7 Fuß. Die übrige Gestalt ähnelt dem Pferde. Er wohnt im Innern von Afrika, nährt sich von Blättern, und es wird Haut und Fleisch von demselben benützt. **)

3. Ochs.

*) s. oben S. 113.

**) Um meinen Lesern, denen die Deutsche Thiergeschichte vorzüglich und vielleicht ganz allein interessirt, doch einen allge-

3. Der Ochs. Bos. *)

Sechs Arten.

4. Das Schaf. Ovis.

Zwey Arten.

5. Die Ziege. Capra.

Drey Arten.

6. Die Antilope. Antilope.

Vier und dreyßig Arten, welche nach der verſchiedenen Geſtalt der Hörner in Familien eingetheilt werden.

B. Mit abfallenden Hörnern oder Geweihen.

7. Der Hirſch. Cervus.

Vierzehn Arten. Sie haben entweder ſchaufelförmige oder runde Geweihe.

---

allgemeinen Ueberblick über die Thiere zu verſchaffen, habe ich allzeit bey jeder fremden Gattung eine Art als Beyſpiel aufgeſtellt.

*) Die Kennzeichen der Deutſchen Gattungen hat man allzeit an ihrem gehörigen Orte zu ſuchen.

b. Ohne Hörner.

8. Das Bisamthier. Moschus.

In der untern Kinnlade stehen acht Vorderzähne. Die Männchen haben einzelne hervorstehende Eckzähne in der obern. Man beschreibt fünf Arten.

Das Tibetische Bisamthier (Moschus moschiferus, L.) ist dem Reh ähnlich, und hat in der Nabelgegend einen Bisamsack. Der gute Bisam wird nur bey dem Männchen gefunden. Es lebt einsam in den erhabenen Theilen von Asien, in Sibirien und China, und nährt sich vom Laub der Bäume und von den Moosflechten.

9. Das Kameel. Camelus.

Die sechs untere Vorderzähne sind schaufelförmig. Oben befinden sich zwey und unten drey von einander abstehende Eckzähne. In der obern Kinnlade stehen fünf und in der untern vier Backenzähne auf jeder Seite. Die Oberlippe ist gespalten. Die Klauen sind vorne nur ein wenig gespalten und die Afterklauen fehlen. Sieben Arten.

Das einbucklige Kameel. (Camelus Dromedarius, L.) Dieß sanftmüthige Thier, das im ganzen Orient das nützlichste Hausthier ist, hat 6 1/2 Schuh Länge, trägt 1200 und mehr Pfund, kann in einem Tage mehr als 18 Meilen gehen, und das Fleisch der Jungen, und Milch und Haare werden benutzt. Es nährt sich von stachlichten Gewächsen und kann 15 Tage

durſten, weil in den Zellen des zweyten Magens das Waſſer lange vorräthig bleibt.

B. Mit Vorderzähnen in der obern Kinnlade. *)

Die Eckzähne ſtehen einzeln.

Der Kopf geht in einem Rüſſel aus. Statt der Haare iſt der Leib mit Borſten bedeckt.

Der ſcharfe erhabene Rücken, die breiten Seiten, die eingezogenen Keulen, der ſtarke, breitſpitzige, faſt gar nicht abgeſetzte Hals, der gedrucktkegelförmig auslaufende Kopf, die kurzen Beine, — alles dieß giebt dieſen Thieren eine ganz beſondere Geſtalt.

Die vielen Euter liegen von Bruſtbein an bis zwiſchen die Hinterfüße, und die Fortpflanzung iſt ſtark.

Der Magen iſt einfach und die Nahrung vielfach.

Man benutzt alles von ihnen. Man macht nur eine Gattung; könnte aber das Aethiopiſche Schwein zu einer zweyten machen.

10. Das Schwein. Sus.

Fünf Arten.

---

*) Am Aethiopiſchen Schwein ſcheinen die Vorderzähne zu fehlen.

III. Abschnitt.

Vielhufige Thiere. Multungula.

Sie haben drey bis fünf Hufe oder Klauen, wo also die Zehen in so viel Scheiden stecken.

Der Körper macht eine unförmliche, große Masse aus, die mit einer dünnbehaarten Haut überzogen ist.

11. Das Nashorn. Rhinoceros.

Hat oben und unten zwey voneinander stehende Vorderzähne. Auf der Nase steht ein einfaches oder doppeltes, dichtes, kegelförmiges Horn. Man giebt zwey Arten an. Es giebt aber vielleicht noch eine dritte Art. *)

Das einhörnige Nashorn (Rhinoceros Unicornis, L.) kömmt an Größe dem Elephanten bey, nur ist es niedriger. Seine Länge ist bis 12, und seine Höhe bis 7 Fuß. Der Kopf ähnelt einem Schweinskopf, der Hals und Leib ist dick, und der Wanst hängt herab. Die Vorderbeine sind gekrümmt und jeder Fuß hat drey Klauen. Die dicke Haut ist, wie beym Elephanten, schwarzgrau und hat einzelne steife Haare. Es ist träge und friedlich, lebt einsam und gesellschaftlich in den untern Ländern von Asien z. B. Ostindien, nährt sich von harten strauchartigen Gewächsen und Kräutern, und wälzt sich gern, wie die Schweine, im Morast.

Es

*) Meine Uebers. von Pennants allgem. Uebers. I. 145.

Es entflieht einem Pferde, so schnell ist sein Lauf. Das Fleisch wird gegessen und das Horn braucht man zu allerhand Kunstsachen. Es ist wahrscheinlich das Ree'm oder Einhorn der Bibel.

12. Das Flußpferd. Hippopotamus.

Diese Gattung, welche nur aus einer Art, dem sogenannten Nil- oder Flußpferde besteht, hat vier Vorderzähne in beyden Kinnladen, wovon die obern paarweise von einander entfernt stehen, und von den untern die mittlern länger sind und hervorragen. Die Eckzähne sind einzeln und die untern sind größer, rückwärts gekrümmt und schief abgestumpft. Die Füße haben einen Huf, der gleichsam in vier Klauen gerändelt ist.

Dieß große Thier (Hippopotamus amphibius, L.) dessen Kopf einem Ochsenkopfe ähnlich ist, wird 17 Fuß lang und 7 Fuß hoch, lebt um die afrikanischen Flüsse und schwimmt und geht unter dem Wasser. Es geht des Nachts aus dem Wasser nach Zuckerrohr und Reiß, frißt aber auch Fische. Es lebt in Polygamie und das Weibchen wirft ein Junges. Der Speck ist eßbar. Es ist Hiobs Behemoth. Hiob 40. V. 15—19.

13. Der Tapir. Tapir.

In beyden Kinnladen stehen zehn stumpfe Vorderzähne. Die Eckzähne fehlen. An den Vorderfüßen sind vier oder eigentlich nur drey Klauen und hinten eine

Art

Art von Afterklauen; an den Hinterfüßen aber sind drey stumpfe Klauen. Nur eine Art.

Der langnäsige Tapir (Hippopotamus terrestris, L.) ist von der Größe einer Kuh und von Gestalt, wie ein Schwein, das sich in Südamerika in Wäldern und um die Flüsse herum aufhält. Es frißt Gras, Zuckerrohr und andere Früchte. Es schwimmt gut, und geht auf dem Boden unter dem Wasser hin. Sein Fleisch wird gegessen.

14. Der Elephant. Elephas.

Die Eckzähne in der obern Kinnlade stehen hervor, und sind in die Höhe gebogen, in der untern mangeln sie. Die Nase verlängert sich in einen biegsamen Rüssel. Die runden Füße sind in fünf Hufe oder Klauen getheilt. Bey dieser Gattung beschreibt man nur eine Art, doch scheinen drey Arten hierher zu gehören: der Asiatische, Afrikanische, und Amerikanische Elephant. Letztern kennt man bloß im fossilen Zustande.

Der große Elephant (Elephas maximus, L.). Er ist nächst dem Menschen das merkwürdigste Geschöpf. Größe, Stärke, Klugheit, Gelehrigkeit und hohes Alter erheben ihn über alle Thiere. Er wird bis 24 Fuß lang und 15 Fuß hoch; wohnt gesellschaftlich in dem heißen Striche von Afrika und Asien in großen einsamen Waldungen, die an Sümpfen und Wasser liegen. Er nährt sich von jungen Bäumen, Aesten und Blättern, Reiß, Getraide und Sumpfgras. Dies plumpe Thier geht in einer Stunde 3000 Schritte und braucht seinen Rüssel so geschickt, wie ein

Mensch

Mensch die Hand. Seine Zähne, die das Elfenbein geben, nützen auch uns. Die weißen Elephanten werden fast göttlich verehrt.

Die zweyte Ordnung.

Säugethiere mit Fingern oder Zehen.

Digitata.

I. Abschnitt.

Der Mensch mit zwey Händen*).

Bimanus.

Die Vorderfüße sind bloß Hände, d. h. es stehen an derselben vier getrennte Finger mit einem abgesonderten

*) Man wird es einen unschicklichen Platz nennen, daß ich den Menschen nach dem angenommenen Systeme hier mitten unter die vierfüßigen Thiere stelle, nach dem Linneischen stünde er wenigstens oben an. Ich könnte zwar sagen, daß er hier in der Mitte der Säugethiere eben so schicklich als am Anfange stünde, indem er auf beyden Seiten nun die ihm untergeordneten Thiere desto besser übersehen könne. Allein ich glaube überhaupt, daß man am besten thue, ihm als vernünftigen Herrscher und Beobachter der Thiere ganz aus der classificirten Naturgeschichte wegzulassen. Er mag jetzt nur hier stehen, weil man doch gewöhnlich in solchen gemeinnützigen Büchern über die Naturgeschichte etwas vom Menschen sucht.

gesonderten Daumen, und die Nägel sind an Vorder- und Hinterfüßen breit.

51. Der Mensch. Homo.

Er hat vier dicht an einander stehende Schneidezähne in beyden Kinnladen. Die untern haben eine aufrechte Stellung. Das Kinn steht vor. Die Eckzähne sind unmerklich länger und hinter jedem stehen fünf Backenzähne, welche oben breit, in der Mitte vertieft, und an den Seiten zugerundet sind. Alle Zähne schließen an einander an.

Es giebt nur eine Art, den vernünftigen Menschen (Homo sapiens), welcher durch seine Vernunft, übrigen Seelenkräfte, die alle Kunsttriebe ausschließen, durch die meisten körperlichen Eigenschaften, und die eigne Bildung seines Körpers nicht nur gar sehr von allen andern Thieren unterschieden, sondern auch weit über sie erhaben ist. Er allein genießt des Vorzugs der Sprache (Loquela), geht aufrecht, übertrifft durch die Geschicklichkeit seiner zweyen Hände alle Thiere, und erreicht wahrscheinlich auch das höchste Alter. — Ursprünglich sind die Menschen von weißer Farbe; die mehr oder wenigere vollkommene Weiße aber hängt vom Clima und von der Lebensart ab. Je näher die Menschen dem Aequator kommen, desto mehr fallen sie ins braune; doch sind auch hier die innern Häute und Fußsohlen noch weiß. Selbst die Schwarzen oder Mohren sind an der innern Fläche der Hände und Fußsohlen röthlich. Die schwarze Farbe hat ihren Sitz in dem

neh-

netzförmigen Schleime unter der Oberhaut, und die Sonnenhitze verursacht sie hauptsächlich. — Die gewöhnliche Größe der Menschen ist 5 Fuß, 4 bis 5 Zoll Pariser Maaß; die kleinste Nation der Eskimos ist 3 Fuß, oder 3 Fuß bis 9 Zoll, und die größte, die Patagonen 5 Fuß 9 Zoll, bis 6 Fuß hoch. Im kalten, rauhen Clima wird der Mensch am größten und stärksten, aber der höchste Grad der Kälte unterdrückt wieder sein Wachsthum. Man vertheilt, nach den bemerkten Verschiedenheiten, die Menschen in verschiedene Rassen, die vorzüglich das Clima bildet, und deren Unterscheidungsmerkmale man besonders in der Farbe und den Haaren findet.

So hat der Europäer eine weiße Haut und fast immer ins gelbliche fallende Haare; der Asiate eine braune Haut und ein schwarzes Haar; der Afrikaner eine schwarze Haut und ein schwarzes krauses Haar, und der Amerikaner eine kupferfarbene Haut und ein grobes, dichtes, schwarzes Haar.

Näher bestimmt diese Menschenrassen Erxleben*) auf folgende Art **):

1) Die Bewohner der nordischen Länder vom Polarcirkel gegen den Pol, in beyden Welten, oder

*) Er war Professor in Göttingen.

**) S. auch Grosse physic. Abhandlungen über die Menschenracen. Theorie der Erzeugung. Ueber die Methode in der Naturforschung nebst einem neuen Versuche die Säugethiere zu classificiren. gr. 8. Zittau und Leipzig.

oder die Lappen: sie sind klein, untersetzt, haben einen großen Kopf, ein flaches breites Gesicht, eine spitzige Unterkinnlade, kleine tiefe Augen, eine stumpfe Nase, aufgeblasene Lippen, große Ohren, einen großen Mund, gerade, schwarze, starke Haare, lange Arme, kleine Hände und Füße.

2) Die Tataren, die in Asien leben, und von dem Imaus bis an die Gränzen der Lappen sich verbreiten, sind von mittlerer Größe, olivenbraun, haben eine runzliche Stirn, große Augenbraunen, eine kurze dicke Nase, ein spitziges Kinn und dünnen Bart, große, weit von einander stehende Zähne, schwarze, dickere Haare, dicke Hüftbeine und kürzere Schenkel.

3) Die übrigen Asiaten, oder Ostindianer, jenseits des Ganges und unter dem Fluß Amur: auch von mittler Größe, doch schmutzigbraun und steif, mit schwärzlichem Haar, platter Nase und vorwärtsstehenden Zähnen. Hierher gehören die Mongolen, die Javaner, welche doch fast kupferroth werden; die Amboiner, die aber schon heller sind; die Bewohner von Madagaskar, und Siam; ferner die meisten Einwohner der Südländer. Doch haben die Neusee- und Neuholländer lange unterwärts gebogene Nasen. Ihr Schädel ist meistens spitzig gewölbt, ihr Hinterhaupt kurz, und die Kinnladen sind außerordentlich stark.

4) Die Europäer sind fleischig, weiß, haben ein mäßig erhabenes Gesicht, lange, meist blonde Haare und blaue, auch braune wohlgeöffnete Augen von mittler Größe, eine hervorstehende Nase, nebst dünnern Lippen. Doch darf man hierbey nicht die politischen, son-

sondern vielmehr die physischen Gränzen von Europa denken.

5) Die Afrikaner, besonders die Einwohner des südlichen Afrika: sie sind groß, schwarz, mit feiner Haut, schwarzem krausen wolligen Haar, schwarzen und grünen Augen, überwärts gebogener Nase, aufgewulstenen Lippen, aufgedunstetem Bauch und großen Brüsten.

6) Die Amerikaner (mit Ausschließung der Polarmenschen) sind von kupferrother Farbe, mittler Größe, haben schwarze, gerade, starke Haare, ein plattes Gesicht, kleine Stirn, schwarze Augen, niedergebogene Nase, und große Nasenlöcher.

Herr Hofrath Blumenbach bringt das ganze Menschengeschlecht unter folgende fünf Hauptrassen.

1. Die Caucasische Rasse:

Dessen Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. Heft I. Taf. 3.

Von weißer Farbe mit rothen Wangen, langen, weichen, nußbraunen Haar (das aber einerseits ins Blonde, anderseits ins Dunkelbraune übergeht); und der nach den Europäischen Begriffen von Schönheit musterhaften Schedel- und Gesichtsform. Es gehören dahin die Europäer mit Ausnahme der Lappen und übrigen Finnen; dann die westlichern Asiaten, disseits des Obi, des Caspischen Meers, und des Ganges; nebst den Nordafrikanern; — also ungefähr die Bewohner der den alten Griechen und Römern bekannten Welt.

2. Die Mongolische Rasse:

Abbild. natur. hist. Gegenst. Taf. 1.

meist waizengelb (theils wie gekochte Quitten, oder wie getrocknete Citronschaalen); mit wenigem, straffem schwarzem Haar; enggeschlitzten Augenliedern; plattem Gesicht; und seitwärts eminirenden Backenknochen. Diese Rasse begreift die übrigen Asiaten, mit Ausnahme der Malayen; dann die Finnischen Völker in Europa (Lappen ꝛc.), und die Eskimos im nördlichsten Amerika von der Beringsstraße bis Labrador.

3. Die Aethiopische Rasse:

Abbild. naturhist. Gegenst. Taf. 5.

mehr oder weniger schwarz; mit schwarzem krausem Haar; vorwärts prominirenden Kiefern, wulstigen Lippen, und stumpfer Nase. Dahin die übrigen Afrikaner, namentlich die Neger, die sich dann in die Habessinier, Mauren ꝛc. verlieren, so wie jede andere Menschenvarietät mit ihren benachbarten Völkerschaften gleichsam zusammen fließt.

4. Die Amerikanische Rasse:

Abbild. naturhist. Gegenst. Taf. 2.

Lohfarb oder zimmtbraun (theils wie Eisenrost oder angelaufenes Kupfer); mit schlichtem, straffem schwarzem Haar, und breitem aber nicht plattem Gesicht, sondern stark ausgewirkten Zügen. Begreift die übrigen Amerikaner außer den Eskimos.

5. Die Malaysche Rasse:

Abbild. naturhist. Gegenst. Taf. 4.

von brauner Farbe (einerseits bis ins helle Mahagony, anders

anderſeits bis ins dunkelſte Nelken- und Kaſtanienbraun); mit dichtem ſchwarzlockigem Haarwuchs; breiter Naſe; großen Mund. Dahin gehören die Südſee-Inſulaner oder die Bewohner des fünften Welttheils und der Marianen, Philippinen, Molucken, Sundaiſchen Inſeln ꝛc. nebſt den eigentlichen Malayen.

Von dieſen fünf Hauptraſſen muß nach allen phyſiologiſchen Gründen die Caucaſiſche als die mittlere oder die Stammraſſe angenommen werden. Die beyden Extreme, worin ſie ausgeartet, iſt einerſeits die Mongoliſche, anderſeits die Aethiopiſche. Die übrigen beyden machen die Uebergänge. Die Amerikaniſche den, zwiſchen der Caucaſiſchen und Mongoliſchen. Die Malayiſche den, zwiſchen jener Mittelraſſe und der Aethiopiſchen.

Von dieſen Abänderungen muß man gewiſſe durch Krankheiten entſtandene Veränderungen des Menſchen unterſcheiden, wohin die Dondos, Albinos, oder Kackerlacken, und die gefleckten Menſchen gehören. Auch machen die Rieſen von 8 Fuß und drüber, und die Zwerge von 36 Zoll eher Misgeburten als beſondere Abänderungen aus.

Alle dieſe Abänderungen, oder ſogenannte Raſſen nähern ſich doch immer ſo ſehr, daß man keine gewiſſe, beſtimmte Gränzen zwiſchen denſelben feſtſetzen, und daher mit der größten Wahrſcheinlichkeit behaupten kann, daß alle Menſchen von einer gemeinſchaftlichen

Stammrasse und von einem Stammvater entstanden sind *).

II. Abschnitt.

Thiere mit vier Händen. Quadrumana.

Vorder- und Hinterfüße sind Hände, die Finger mit abgesonderten Daumen haben, wie es ihre Lebensart und ihr Aufenthalt auf den Bäumen verlangt. Sie haben vier Vorderzahne in der obern Kinnlade, die parallel neben einander stehen, niedere spitzige Eckzähne und stumpfe Backenzähne. Die Arme werden durch Schlüsselbeine von einander gehalten.

Sie scheinen in Monogamie zu leben, und das Weibchen hat zwey oder vier Euter.

Sie nähren sich von Erd- oder Baumfrüchten; wenige von Fleisch. Zwey Gattungen.

16. Der Affe **).

Hier findet man vier dicht an einander schließende gleich lange Vorderzähne, längere von den übrigen abstehende Eckzähne und stumpfe Backenzähne in beyden

*) Blumenbach de generis humani varietate natura. Gottingae 1795.

**) Es machen einige drey Gttungen daraus: Affen (Simia), Paviane (Pavio), und Meerkatzen (Cercopithecus).

beyden Kinnladen. Alle vier Füße ſind Hände, gewöhnlich mit flachen Nägeln und einen oder zwey ausgenommen mit vier Fingern und einem Daumen.

An der Bruſt ſtehen zwey Säugwarzen.

In drey Familien, die ſich auf die Verſchiedenheit des Schwanzes gründen, beſchreibt man 70 Arten mit einigen unbeſtimmten *).

Die gemeine Meerkatze (Simia Cynomolgus) hat die Größe einer Hauskatze und einen Schwanz, der eben ſo lang als der Körper iſt. Die Naſenlöcher ſind erhaben und geſpalten. Sie bewohnt die weſtlichen Küſten von Afrika ſehr häufig, läßt ſich leicht zähmen, iſt gelehrig und kurzweilig, frißt Nüſſe, Feld- und Gartenfrüchte, und pflanzt ſich auch in der Gefangenſchaft fort. Die ſchwarzen Feldſpinnen frißt ſie mit dem größten Appetite.

17. Der Maki. Lemur.

Die Thiere dieſer Gattung haben oben vier, und unten ſechs Vorderzähne; auf jeder Seite einen einzelnen dicht anſchließenden Eckzahn und viele Backenzähne, vier Hände mit fünf freyen Fingern, und vier Säugwarzen an der Bruſt. In dem Gange und

*) Unbeſtimmt: weil ihre Geſchichte noch nicht ſo genau bekannt iſt, daß man ſie zuverläßig als Arten trennen könnte. Ein ſchönes Werk über die Affen iſt Audebert hist. nat. des Singes. Paris. in folio.

der übrigen Lebensart sind die hierher gehörigen Thiere den Affen, und am Kopfe den Füchsen ähnlich. Man giebt dreyzehn Arten an; als:

Der Mongus (Lemur Mongoz, L.). Ein Thier, wie eine Katze groß, doch hochbeiniger, das sich leicht zähmen läßt, einen langen Schwanz hat, mehrere Ellen hoch springt, sich von Früchten und süßen Sachen nährt und um Madagaskar herum wohnt.

III. Abschnitt.

Raubthiere. Ferae.

Sie haben sechs scharfe Vorderzähne in beyden Kinnladen, auf jeder Seite derselben einen langen kegelförmigen, spitzigen, etwas gekrümmten Eckzahn, und Backenzähne, welche fast alle schmal sind, und eine oder mehrere Spitzen haben.

Die Füße haben Zehen mit spitzigen Krallen. Meistens laufen sie damit geschwind; einige klettern auch.

Die meisten halten sich auf der Erde im Trocknen auf, doch graben sich auch einige in die Erde, und andere leben abwechselnd im Wasser und auf dem Lande.

Sie nähren sich fast alle vom Raube anderer Thiere, welche sie entweder mit ihrem scharfen Gebiß oder Krallen fangen; doch genießen auch einige Speisen aus dem Gewächsreiche.

Die neun Gattungen sind:

18. Der Hund. Canis.

Zwey und zwanzig Arten, auch einige unbestimmte.

19. Die Hyäne. Hyaena.

Sechs Vorderzähne und zwey Eckzähne in jeder Kinnlade. An jedem Fuß vier Zehen; ein kurzer Schwanz, zwischen welchem und dem After eine Queeröffnung mit einer schmierigen Feuchtigkeit sich befindet. 3 Arten und 1 unbestimmte.

Die gestreifte Hyäne (Hyaena striata). Sie ist wie ein großer Hund, hat lange scharf zugespitzte weite Ohren, eine aufrechte Mähne, ist aschfarben mit schwarzen Seitenstreifen. Ein grausames Raubthier im mittlern Asien und im nördlichen und westlichen Afrika. Sie lebt einsam, fällt die Menschen an, und gräbt die faulen Leichname aus den Begräbnißplätzen aus.

20. Die Katze. Felis.

Mit langen und kurzen Schwänzen. 29 Arten.

21. Der Bär. Ursus.

Sieben Arten und zwey unbestimmte.

22. Der Dachs. Meles.

Zwey Arten.

23. Das Beutelthier. Didelphys.

Oben sind 10 und unten 8 Vorderzähne, die alle klein und an der Spitze abgerundet sind; einzelne Eckzähne, wovon die obern stärker und größer sind, als die untern. Auf jeder Seite sind meist 7 Backenzähne, wovon die vordern dreyeckig und spitzig, und die hintern breit und zackig sind. Die Füße haben fünf Zehen und die hintern sind Hände, woran der abgesonderte Daumen ohne Nagel ist. Die Weibchen haben die Euter am Bauche gewöhnlich in einem Beutel, der geöffnet und geschlossen werden kann. Man zählt 19 Arten.

Der Opossum oder das Moluckische Beutelthier (Didelphys Opossum.) Ein rothbräunliches Thier, das über jedem Auge einen weißen runden Fleck hat, unter dem Laube der Bäume versteckt lebt, und Vögel hascht. Es hängt sich mit dem Schwanze an, und schleudert sich von einem Baum zum andern. Die 4 bis 5 Jungen steckt es mit den Hinterfüßen in den Beutel. Im heißen Amerika, und auf den Moluckischen Inseln.

24. Das Stinkthier. Viverra.

In beyden Kinnladen sind sechs Vorderzähne, doch liegt der, zwischen dem mittelsten und äußersten auf jeder Seite der untern Kinnlade sich befindende weiter einwärts; längere einzelne Eckzähne, und sechs scharfe und zackige Backenzähne. Die Zunge ist stachlich, und die Füße haben hervorragende Krallen. Einige

neuere

neuere Zählen 25 Arten zu dieſer Gattung, andere mit den weniger beſtimmten Arten 31.

Der Coati. (Viverra Nasua, L.) iſt zwey Fuß lang, hat eine bewegliche in einen Rüßel verlängerte Naſe, gräbt nach Regenwürmern, und läßt ſich leicht zähmen. In Südamerika.

25. Das Wieſel. Mustela.

28 beſtimmte und einige unbeſtimmte Arten.

26. Die Otter. Lutra *)

Sieben Arten.

IV. Ab-

*) Beym Abdruck dieſes Bogens erhielt ich Herrn Hofr. Blumenbachs Abbild. naturhiſtoriſcher Gegenſtände 5. Heft, und fand eine neue Thiergattung aus Neuholland (tab. 41) in derſelben, das aber im Syſtem noch nicht gehörig eingeſchaltet iſt. Das Thier heißt Schnabelthier (Ornithorhyngus paradoxus), und weicht in Rückſicht des Gebiſſes von allen bis jetzt bekannten Säugethierformen ab. Im Ganzen ſieht es einem kleinen Flußotter gleich; aber ſtatt alles Gebiſſes iſt es mit einem zum Täuſchen ähnlichen Entenſchnabel verſehen, welcher wie bey den Enten mit einer ſehr nervenreichen zum Taſten beſtimmten Haut bekleidet, und am Unterſchenkel eben ſo ſägeförmig eingekerbt iſt.

Dieß paradoxe Thier iſt gegen anderthalb Fuß lang, oben ſchwarzbraun, am Bauche gelblichgrau; die Füße haben eine ſehr breite Schwimmhaut und lange Krallen. Es findet ſich in Menge in einem Landſee jener fernen Gegend.

IV. Abschnitt.

Schrotthiere. Rosores.

Sie haben zwey bis sechs Vorderzähne in beyden Kinnladen. Mehrere Eckzähne, die sich in die Backenzähne verlaufen.

Die Füße haben Zehen mit scharfen meist zum Graben geschickten Klauen.

Sie halten sich mehrentheils in der Erde auf.

Sie sind Insecten- Wurm- und Wurzelfresser.

27. Der Maulwurf. Talpa.

Sechs Arten.

28. Die Spitzmaus. Sorex.

Siebenzehn Arten.

29. Der Igel. Erinaceus.

Vier Arten.

V. Abschnitt.

Nagethiere. Glires.

Die Thiere dieses Abschnitts haben unten und oben zwey meist beysammenstehende scharfe Vorderzähne; die untern sind allezeit etwas länger, als die obern.

Die

Die Eckzähne fehlen ganz und lassen einen zahnlosen zwischenraum. Die Backenzähne sind mehrentheils stumpf und von verschiedener Anzahl.

Die Füße sind gespalten, mit Krallen besetzt, mit den Hinterfüßen stehen sie bis an die Ferse auf und ihr Gang ist fast immer springend.

Die Oberlippe ist bey ihnen gespalten, und manche haben zwischen den Schultern Schlüsselbeine.

Ihr Aufenthalt ist sehr verschieden, auf, über, unter der Erde und im Wasser.

Ihre Nahrung besteht mehrentheils aus Produkten des Gewächsreiches, die sie zernagen, woher ihr Name kömmt.

Sie lieben die Reinlichkeit.

Die neun Gattungen sind:

30. Das Halbkaninchen. Cavia.

Eilf Arten.

31. Der Biber. Castor.

Drey Arten.

32. Das Stachelthier. Hystrix.

In jeder Kinnlade stehen zwey schief abgeschnittene Vorderzähne und auf jeder Seite vier Backenzähne. Der Leib ist theils mit harten Haaren, theils mit Stacheln besetzt. 7 Arten, wobey eine unbestimmte.

Das Stachelschwein (Hystrix cristata, L.) hat auf dem Nacken und Halse eine grau und weiße

weiße Borstenmähne, und den Rücken bedecken lange, Federkielen ähnliche Stacheln, die es aber nicht nach Belieben wegschießen kann. Es lebt in gegrabenen Höhlen in der Erde, und geht des Nachts nach Wurzeln und Obst. In den wärmern Gegenden von Asien, Afrika und Europa. Fleisch und Stacheln werden benutzt.

33. Der Springer. Dypus.

In jeder Kinnlade stehen zwey Vorderzähne; die Vorderfüße sind sehr kurz, die Hinterfüße aber sehr lang und gleichen den Füßen der Sumpfvögel; der Schwanz sehr lang und mit einem Busch versehen. 5 Arten.

Der Aegyptische Springer (Dypus Iaculus *Gmelin Linn.*). Er ist unter 7 Zoll lang und der Schwanz 10 Zoll; die Vorderbeine 1 Zoll und die Hinterbeine 2 1/4 Zoll; aschgrauröthlich, am Bauch weißlich. Das sonderbar gestaltete Thier geht fast immer auf den Hinterfüßen und die vordern braucht es wie Hände. Es thut weite Sprünge wie ein Caninchen. Seine Nahrung sind Vegetabilien. Die Heymath ist das nördliche Afrika und mittlere Asien. Es ist der Daman Israel der heiligen Schrift.

34. Die Maus. Mus.

In 6 Familien werden 53 Arten beschrieben.

35. Das Murmelthier. Arctomys.

8 Arten.

36. Der

36. Der Schläfer. Myoxus.

Sieben bestimmte und 8 unbestimmte Arten.

37. Das Eichhorn. Sciurus.

Die 30 Arten werden in zwey Familien in laufende und fliegende eingetheilt. Man hat auch noch 2 unbestimmte Arten.

38. Der Hase. Lepus.

Zwölf Arten werden in 2 Familien mit und ohne Schwanz beschrieben.

VI. Abschnitt.

Harmlose Thiere. Bradypoda.

Sie haben keine Vorderzähne und sind Frucht- und Kräuterfressend.

Ihr ganzer Körperbau verräth Trägheit und Langsamkeit.

Zwey Gattungen.

39. Das Faulthier. Bradypus.

Einzelne stumpfe Eckzähne. Hinter jedem Eckzahn fünf stumpfe Backenzähne. Der Körper ist mit langen Haaren bedeckt. Drey Arten.

Der

Der Ai (Bradypus tridactylus, L.). Ein zottiges Thier mit 3 Zehen an einem Fuß, so groß wie ein Fuchs, das so langsam geht, daß es in einem Tage kaum eine Viertelmeile zurücklegt; den Baum, auf den es seine Nahrung sucht, verläßt es nicht eher, als bis die Blätter alle abgezehrt sind. Es kann einen Monat hungern, säuft nie, schläft hängend und ruft des Nachts immer seinen Namen. Es wohnt in Südamerika.

40. Das Panzerthier. Dasypus.

Die Vorderzähne und Eckzähne mangeln. In beyden Kinnladen sind viele kurze, cylindrische Backenzähne. Der Kopf und Körper ist mit einem hornartigen Schilde, das in der Mitte bewegliche Gürtel hat, von oben bedeckt. Man kennt 8 Arten: z. B.

Das dreygürtelige Panzerthier. (Dasypus tricinctus, L.) Ein fußlanges Thier, das gut graben kann, sich von Erdfrüchten ernährt, und stark nach Bisam riecht. In Brasilien im Wasser und auf dem Lande.

VI. Abschnitt.

Zahnlose Thiere. Anodontia.

Die Zähne fehlen ihnen ganz und gar.

Die Gestalt ist ganz eigen, langgeschäftet und mit niedrigen Beinen.

Sie

Sie nähren ſich von Inſecten.
Zwey Gattungen.

41. Das Schuppenthier. Manis.

Die Zähne fehlen. Die Zunge iſt lang und ſchmal. Der Oberleib iſt mit knochenartigen, beweglichen Schuppen bedeckt. 3 Arten.

Das langgeſchwänzte Schuppenthier. (Manis macroura, L.) Ein Thier mit ſchwarzbraunen Schuppen, die in der Geſtalt und Lage viel ähnliches mit den Fichtenzapfenſchuppen haben. Es nährt ſich von Ameiſen. In Oſtindien.

42. Der Ameiſenfreſſer. Myrmecophaga.

Die Zähne fehlen in beyden Kinnladen, die ſich in einen langen Rüſſel endigen. Die Zunge iſt ſchmal. Der Leib hat eine lang- und weichhaarige Decke. Dieſe Gattung hat 7 Arten.

Der große Ameiſenfreſſer. (Myrmecophaga jubata, L.) Ein Thier von 4 Fuß Größe mit einem Schwanze, der einem Pferdeſchweif ähnlich iſt, mit welchem es ſich gegen den Regen ſchützet. Die lange Zunge ſteckt es in einen Ameiſenhaufen, läßt ſie voll laufen, und zieht ſie alsdann ein. In Südamerika.

Die dritte Ordnung.

Säugethiere mit Flughäuten. Chiroptera.

Mit langen ausgebreiteten Zehen an den Vorderfüßen, die durch eine dünne breite Haut, welche bis an die Hinterfüße reicht, ausgespannt sind. Diese Thiere werden dadurch die einzigen Säugethiere, welche einen wahren Flug haben; denn die fliegenden Eichhörner u. s. w. thun mit ihrer weiten Haut, die die Füße umgiebt, weiter nichts als große Sprünge.

Die Zähne sind fast alle aufgerichtet, spitzig, getrennt, an der Zahl 26 bis 38. Die Vorderzähne variiren, doch sind gewöhnlich unten mehr als oben, oben selten keine, und noch seltner oben und unten keine. Eckzähne sind gewöhnlich mehr als einer auf jeder Seite der beyden Kinnladen, doch meist die vordern größer, und sie ähneln im Gebiß sowohl als in der Lebensart gar sehr den Spitzmäusen *).

Obgleich die Zehen der Vorderfüße länger als der Leib sind, so ist doch der Daumen sehr kurz.

Sie

*) Es sind wahre Säugethiere; denn sie haben mit den Vögeln nichts als den Flug und die starken Brustmuskeln gemein, die ihnen, als fliegenden Thieren, so nöthig sind.

Sie zeugen meiſt zwey Junge, die meiſt an zwey Eutern an der Bruſt ſäugen *), und gehen vorzüglich in der Abenddämmerung und nur zuweilen in der Morgendämmerung ihrer Nahrung, die vorzüglich aus Inſecten, aus Thier- und Pflanzenfrüchten beſteht, nach.

Sie verſchlafen bey uns durch Winterſchlaf und natürlichen Schlaf zwey Drittheile ihres Lebens **).

*) Die vier Vorderzähne einiger Arten, die zwey Euter an der Bruſt, die Zeugungstheile und der abgeſonderte Daumen an den Vorderfüßen beſtimmten Linné dieſe Thiere mit dem Menſchen in eine Claſſe, unter die Primaten zu ſtellen.

**) Spalanzani (in Lettere sopra il Scopetto di un nuovo Senso nei Pipistrelli etc. Turin 1794. 64. 8. in 8vo) glaubt einen neuen Sinn der Fledermaus entdeckt zu haben, der ſie auch dann noch leitet, wenn ihnen die Augen ausgeſtochen ſind. Er ſchnitt den Fledermäuſen die Augen etwas mit der Schere aus, oder brannte ſie mit einem glühenden Eiſen aus, und dennoch flogen ſie nach wie vor in den Zimmern herum, die er dicht mit Stöcken hatte durchkreuzen laſſen, und wichen allezeit den Stöcken aus, ſo daß ſie dieſelben nur etlichemal mit den Flügeln berührten. Sie flogen mit vieler Behendigkeit durch. Sie wichen auch ſo wie ſehend der Hand und den Katzen aus. Damit ſie nicht durch den Geruch und das Gehör geleitet würden, verſtopfte er ihnen Ohren und Naſe. Spalanzani glaubt, daß ihnen ein Organ, welcher es auch immer ſey, nicht nur gegeben ſey, um das Auge zu erſetzen, ſondern auch zur Aushülfe, wenn ſie der Lichtſtrahlen beraubt wären. Das Organ könne nicht dann erſt wirken, wenn ihnen die Augen ausgeſtochen wären,

Ich theile mit Hr. Borkhaußen (s. Deutsche Faune I. 79. und Compendiöse Bibliothek: Zoologe Heft II. 27. Ord. IV.) diese Ordnung in fünf Gattungen, weil die Verschiedenheit in den Vorderzähnen wirklich wesentliche Kennzeichen an die Hand giebt und dadurch das Auffallende vermieden wird, daß diese Ordnung nur eine Gattung hätte. In Deutschland haben wir nur zwey Gattungen.

43. Das Gespenst. Pteropus.

In jeder Kinnlade sind vier Vorderzähne. Man kann zwey Familien, mit und ohne Schwanz, daraus machen. Eine ist nur geschwänzt. 7 Arten.

Das Blutgespenst (Pteropus Spectrum. Vespertilio Spectrum, L.) ist 5 1/2 Zoll lang, mit hundeartigem Kopfe, einem aufgerichteten Blatt

wären, weil sie unmöglich gleich nach der Zernichtung der Augen so behende einem jeden Gegenstande ausweichen könnten.

Ich habe den Versuch nachgemacht, habe aber gefunden, daß die Fledermäuse anfangs ziemlich oft anstießen, immer sehr behutsam und langsam flogen, und wohl durch ein gewisses feines Gefühl, das die Hemmung des Luftzugs bey der Bewegung der Flügel, in der Nähe der Stöcke, bemerklich machte, geleitet wurden. Doch will ich hier noch nicht entscheiden, allein so hat es mir geschienen. Blinde Menschen zeigen ja auch in vielen Fällen ein ungemein feines Gefühl, wodurch sie z. B. Farben unterscheiden u. s. w., das man deshalb nicht gleich für einen neuen Sinn ausgeben darf.

Blatt auf der Naſe, ohne Schwanz und von Farbe aſchgrau. In Südamerika. Es ſaugt Menſchen und Thieren das Blut aus, indem es erſt einen Biß thut, und dann flatternd ſo lange ſaugt, bis es voll iſt. In Surinam kann man keine Schweine halten, weil ihnen dieſe Thiere die Säugwarzen abbeißen. Sie nähren ſich aber nicht bloß vom Blute.

44. Die Fledermaus. Vespertilio.

In vier Familien zwölf Arten.

45. Die Schwungmaus. Nyctimene.

In der obern Kinnlade ſtehen zwey, in der untern keine Vorderzähne. Der Schwanz iſt da. 1 Art.

46. Die Flugmaus. Noctitio.

Drey Arten.

47. Das Flatterthier. Nycteris.

Die Vorderzähne fehlen in beyden Kinnladen. Eine beſtimmte und eine unbeſtimmte Art.

Die vierte Ordnung.

Säugethiere mit Flossenfüßen. Palmata.

I. Abschnitt.

Mit Zehenabtheilungen. Lobata.

Ihre Füße sind flossenähnlich, doch sind alle Abtheilungen der Zehen da; die vordern liegen tief in der Haut vergraben und die hintern stehen gerade heraus.

Die Vorderzähne variiren, oft sind gar keine vorhanden; die Backenzähne sind groß, und oft stark gezackt.

Sie sind Fisch- und Kräuterfressend.

Drey Gattungen.

5. Das Wallroß. Trichechus.

Es stehen einzelne Eckzähne in der obern Kinnlade und vier Backenzähne auf jeder Seite in beyden Kinnladen. Die Hinterfüße sind in einen Fischschwanz verwachsen. Es sind zwey Arten bekannt.

Das gemeine Wallroß (Trichechus Rosmarus, L.) ist bis 18 Fuß lang. Aus den obern Kinnladen gehen 2 Seitenzähne 20 Zoll lang und 8 Zoll dick. Der Kopf ist dick, länglichrund, der Hals kurz, der Körper in der Mitte dick. Es

wohnt

wohnt um den Nordpol in Heerden, frißt Meergras, Fische und Muscheln, geht auf dem Eis lahm, brüllt wie ein Ochs, und heckt 1 bis 2 Junge. Haut, Thran und Zähne werden benutzt.

49. Die Robbe. Phoca.

Neunzehn Arten und vier unbestimmte.

50. Der Manati. Manati.

Die Vorderfüße sind flossenähnlich. Die Hintertheile endigen sich in einen horizontalen Schwanz. Die Säugwarzen liegen zwischen den Beinen.

Der Uebergang zum folgenden Abschnitt.

Diese Thiere, deren es sechs Arten giebt, rechnete Linne' sonst unter die Wallrosse; allein dorthin gehören sie nicht. Sie können gar nicht ans Land steigen.

Der wallfischschwänzige Manati (Manati Balaenurus, Trichechus borealis, *Gmelin Linn.* I. 61. B.) wird bis 28 Fuß lang und 8000 Pfund schwer. Der zugerundete halbmondförmige Schwanz macht sie den Fischen sehr ähnlich. Sie leben in dem kalten Meere zwischen Europa, Asien und Amerika. Der Mund ist voller Borsten und die Haut schwarz und so hart wie Eichenborke. Sie nähren sich bloß von Meerkräutern. Fleisch, Speck und Haut wird benutzt.

II. Abschnitt.

Ohne Zehenabtheilung. Cetacea.

Sie werden ihrer Gestalt halber von vielen unter die Fische gezählt; sie haben aber alle Haupteigenschaften der Säugethiere. Auf dem Scheitel haben sie röhrenförmige Luftlöcher, statt der zweyen Vorderfüße Floßfedern an der Brust und einen waagerechten Schwanz, welcher zusammengewachsen ist, und die Stelle der Hinterfüße vertritt.

Daß sie nicht zu den Fischen, sondern zu dieser Classe der Thiere gehören, beweisen die vier Abtheilungen ihres Herzens, ihr rothes, warmes Blut, ihre Lungen, die Art ihrer Begattung, das Gebähren lebendiger Jungen, welche sie an ihren Brüsten säugen, ihre Gehörwerkzeuge und ihre beweglichen Augenlieder, ihre wahren Knochen, die sich auch in den vordern Flossen und dem Schwanze befinden.

Es fehlt ihnen der besondere Hals, und einige haben auf dem Rücken ein Stück Fleisch, das man die Rückenflosse oder Rückenfinne nennt.

Sie bewegen sich sehr geschwind im Wasser.

Ihre Nahrung besteht aus Würmern und kleinen Fischen, von welchen sie sehr fett werden. In diesem Fett besteht auch ihr großer Nutzen, den sie den Menschen leisten.

Die vier Gattungen sind:

52. Narwall. Monodon.

Eine Art.

53. Der

53. Der Wallfiſch. Balaena.
Sechs beſtimmte und zwey unbeſtimmte Arten.

54. Der Kachelot. Physiter.
Vier Arten mit etlichen unbeſtimmten.

55. Der Delphin. Delphinus.
Vier Arten.

Die vorzüglichſten hierher gehörigen Schriften ſind:

Caroli a Linné System naturae a per regna tria naturae, cura *J. Frid. Gmelin.* Lipsiae. 1788. T. I. 8.

Histoire naturelle generale et particuliere avec la description du Cabinet du Roi par M. de Buffon et D'Aubenton. a Paris 1749 etc. T. I — XV. Supplement. 1774. T. I — III 4. Au Deuxponts 1785. T. I — XIII. 12. Mit Kupf.

Herrn von Büffons Naturgeſchichte der vierfüßigen Thiere, aus dem Franzöſiſchen überſetzt. Berlin 1772. 8. 1—5 B. von Martini; 6. B. von Forſter; 7—22 von Otto. Mit Kupf.

Pennant history of Quadrupeds. ed. 3. London 1793. T. I. II. 4. Mit Kupfern.

Pennants allgemeine Ueberſicht der vierfüßigen Thiere, aus dem Engliſchen überſetzt und mit Anmerkungen und Zuſätzen verſehen von J. M. Bechſtein. Weimar 1799. 1800. 4. 2 Bände. Mit Kupfern.

J. C. D. von Schrebers Säugethiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Erlangen 1775. 4. Mit schwarzen und illuminirten Kupfern.

E. A. W. v. Zimmermanns geograph. Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere. Leipzig 1778. 8. 1—3 B.

J. A. E. Goeze's Europäische Fauna oder Naturgeschichte der Europäischen Thiere. Leipzig 1791. 8. 1—3 B.

J. A. Donndorfs Zoologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linneischen Natursystems. Leipzig 1792. 8. 1 B.

Meine kurze aber gründliche Musterung aller von dem Jäger als schädlich geachteten und getödteten Thiere. Gotha, 1792. 8 Mit Kupfern.

J. E. Riedingers Entwurf einiger Thiere. Augsburg 1738. 1—7 Thl. Fol. mit 126 Kupfertafeln.

Dessen Abbildungen der vierfüßigen Thiere in ihren natürlichen Farben. Ebendaselbst. 1767.

Dessen gründliche Beschreibung und Vorstellung der wilden Thiere. 10 Blätter.

Meine getreuen Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. Nürnberg. 1793—1800. 2 Bände. Kupfer.

Säugethiere Deutschlands.

Die Säugethiere Deutschlands

in besonderer Hinsicht auf

Thüringen.

Da ich unter den Deutschen Säugethieren nur diejenigen, welche sich in den Thüringischen Gegenden *) befinden, vorzüglich aus eigner Kenntniß und Erfahrung beschreibe, und die Beschreibung der übrigen, als einiger Fledermäuse- und Mäusearten, des Bibers, des Murmelthiers, des Bären ꝛc. weil ich ihre Geschichte nicht ganz aus der Natur selbst nehmen konnte, aus fremden Quellen z. B. dem vorhin angegebenen vortrefflichen Werke des Hrn. von Schrebers u. s. w. geschöpft habe, so glaube ich, daß es nicht unschicklich ist, hier anzugeben, welche Säugethiere ich Thüringische nenne, welchen Begriff man alsdann auch auf die Bestimmung der Säugethiere Deutschlands wird anwenden können.

Ich nenne nämlich, erstens von denen, die in der Freyheit leben, nicht nur alle diejenigen, welche sich in Thüringen wirklich fortpflanzen, sondern auch diejenigen, welche

*) Mit den Gränzen Deutschlands und der thüringischen Gegend muß man sich in der Geographie bekannt machen.

welche sich zu gewissen Zeiten aus eignem innern oder äußern Antrieb dahin begeben, eine Zeitlang daselbst aufhalten und ihre Nahrung finden; zweytens von den Hausthieren alle diejenigen, welche hiesige Produkte als Nahrungsmittel zu sich nehmen, und dabey schon in ihrer Nachkommenschaft fortleben, Thüringische Säugethiere.

Von den wilden Thieren gehören also nach dieser Voraussetzung der Luchs und Wolf hierher, weil sie nicht selten unsere Gegenden besuchen, und dieselben nur wegen der großen Verfolgungen, denen sie sogleich, wenn sie unsere Gränzen beschreiten, ausgesetzt sind, nicht zum stäten Wohnplatz wählen können; unter den zahmen aber z. B. die Seidenhunde, Spanische Schafe, das Angorische Kaninchen, und das Meerschweinchen, weil sie sich nicht nur bey Thüringischer Nahrung wohl befinden, sondern auch durch ihre Fortpflanzung das Bürgerrecht im Thüringischen Thierstaate erworben haben.

In den Zeiten, da beynahe ganz Thüringen noch ein aneinanderhängender Wald war, und nur einzelne Gegenden durch Menschenhände bebaut wurden, bewohnten es die flüchtigen Elenthiere, wilden Auerochsen *), grausamen Bären, blutdürstigen Luchse

*) Noch im eilften Jahrhundert gab es in den Rheingegenden Elenthiere und Auerochsen. Da nun Thüringen nicht so früh das Glück der Cultur genoß, so mögen sie wohl noch später dasselbe bewohnt haben. Siehe ein mehreres in Schlötzers Briefwechsel B. I. Heft II. pag. 78 folg. 1776.

Luchse und reissenden Wölfe *) in Menge, die aber alle, bey der zunehmenden Cultur dieses fruchtbaren Erdstrichs, dem Pfluge und der gewaffneten Hand des Jägers weichen, und andere weniger kultivirte Gegenden zu ihrem Aufenthalte wählen mußten.

Von diesen kehren jetzt nur zuweilen einige wieder zurück, gleichsam, um zu versuchen, ob es nicht möglich sey, von ihrem alten Staate wieder Besitz zu nehmen.

Schon seit einiger Zeit fängt man auch in Thüringen an, auf die Verbesserung der ökonomischen Säugethiere zu denken, und nicht nur den großen Vortheil, den der Kleebau, und die Stallfütterung an einigen Orten verschaffen, einzusehen, sondern auch die Rindviehzucht mit Friesischen Ochsen, und Schweizerkühen, und die Schafzucht mit Spanischen Widdern zu veredeln.

Die

*) Die Bären pflanzten sich noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts im Thüringerwalde fort, und der letzte von den im Herzogthum Gotha auf dem Wintersteiner Forste erzeugten jungen Bären wurde 1686 auf dem daran gränzenden Ruhler Forste am Berge, der Reiffsteig genannt, von einem Büchsenmacher, Hans Löfler erschossen. Noch zu Anfange dieses Jahrhunderts zogen die Wölfe in den Wintermonaten heerdenweise durch den Thüringerwald, pflanzten sich auch einzeln in den düstern stillen Gegenden desselben fort, und die Luchse waren gar nicht selten.

Die Säugethiere Deutschlands, von welchen diejenigen, die in Thüringen einheimisch sind, mit eingeklammerten Ziffern ausgezeichnet worden, sind nun nach der Ordnung unsers genommenen Systems folgende:

Erste

Erste Ordnung.

Thiere mit Hufen. Ungulata.

Erster Abschnitt.

Einhufige Thiere. Solidungula. *)

Diese Thiere nützen uns vorzüglich durch ihre Stärke, daher man sie zum Ziehen, Reiten und Tragen braucht.

Die erste Gattung.

Pferd. Equus.

Kennzeichen.

In der obern und untern Kinnlade sind 6 Vorderzähne; die obern stehen senkrecht und parallel, und die untern mehr vorwärts gerichtet.

Die einzelnen Eckzähne sind von den Vorder- und Backenzähnen abgesondert.

Zwi-

*) Um den Raum zu schonen sehe man die Kennzeichen der Ordnungen und Abschnitte vorn in der Uebersicht der ganzen Classe der Säugethiere. S. 182 u. f. f.

Zwischen den Hinterbeinen sitzt das Euter mit zwey Säugewarzen.

Obgleich der Magen einfach ist, so leben sie doch bloß von vegetabilischer Nahrung.

Sie bringen jährlich ein Junges zur Welt, welches zwey bis drey Jahre alt wird, ehe es zur Fortpflanzung tüchtig ist.

Diese Gattung enthält auch zwey Bastartarten.

(1) 1. Das gemeine Pferd.

(Taf. II., Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Männchen: Hengst; Weibchen: Stute; castrirtes Männchen: Wallach.

Equus Caballus. *Caroli à Linné* Syst. naturae cura *J. F. Gmelin* Ed. XIII. T. I. 1. p. 209. n. 6.

Le Cheval. *Buffon* Histoire naturelle IV. 174. tab. 1. Ed. de Deuxponts I. T. 1. F. 1. Uebersetzung von Martini. I. S. 13. mit 6 Fig.

The generous Horse. *Pennant* History of Quadrupeds I. 1. Meine Uebersetzung unter dem Titel: Allgemeine Uebersicht der vierfüßigen Thiere. I. 1.

v. Zim-

v. Zimmermanns geographische Geschichte des Menschen und der vierfüßigen Thiere. I. 178.

v. Schrebers Säugethiere. V. Taf. 309. 310.

Goeze's Europäische Fauna. III. 313.

Donndorfs zool. Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linne'ischen Natursystems. I. 707. Nr. 1. Im letzten Buche findet man alle Schriften über die Säugethiere und ihre Synonymen gesammelt, welche nicht in den oben angegebenen Gmelin-Linneischen Natursystem angegeben sind.

Ridingers Entwurf einiger Pferde nach Alter und Gebrauch nach dem Leben gezeichnet. Augsburg 1755. Fol. Dessen Vorstellungen der Pferde in ihren Hauptfarben. 1770. 50 Blätter.

Vergleiche ferner:

a) Von der Kenntniß der Pferde.

W. C. von Reizensteins vollkommener Pferdekenner. Uffenheim 1764. 2 Th. 4.

Köllners Versuch über die Farben und Eigenschaften deutscher und ausländischer Pferde. Graiz 1791. 8.

b. Von der Pferdezucht.

G. Hartmanns Anleitung zur Verbesserung der Pferdezucht. 2te Aufl. Tübingen 1786. 8.

C. S. Richters Anweisung zur guten Pferdezucht und Wartung, und wie man ein guter Pferdekenner werden kann, vom Betrug der Roßhändler ꝛc. 2te Auflage. Halle 1795. 8.

J. B. von Sind Unterricht von der Pferdezucht und Anlegung der Gestüte. Frankf. u. Leipzig. 1782. 8.

c. Vom Abrichten der Pferde.

J. B. von Sind Unterricht in der Wissenschaft eines Stallmeisters. Göttingen 1770. Fol.

L. Hühnerdorfs Anleitung zur natürlichsten und leichtesten Art Pferde abzurichten. Marburg 1790. 8.

Ribingers neue Reitschule, einen vollkommenen Reiter in allen Lectionen vorstellend. Augsburg 1734. Dessen neue Reitkunst in Kupferstichen. Ebend. 1744. Dessen Vorstellung und Beschreibung der Schul- und Campagnepferde nach ihren Lectionen. Ebd. 1760. Dessen Vorstellung unterschiedener Nationalpferde. 9 Theile.

Der

Der vollkommene Kutscher. Aus dem Franz. Frankf. u. Leipz. 1778. 8.

d. Von dem Beschlag und der Zäumung.

J. A. Kerstings Unterricht Pferde zu beschlagen. Göttingen 1777. 8.

Zaumkunst oder ausführliche Anweisung, wie nach gewissen Regeln allerley Reit- und Kutschpferde wohl zu zäumen. Durch Hippophilum. Herborn 1728. Fol.

Frae: Rex gründliche Anweisung zum Satteln und Packen, daß kein Pferd gedruckt werde. Berlin 1791. 8.

Kennzeichen der Art.

Mit kurzen spitzigen Ohren, einer Mähne am Halse und einem ganz mit langen Haaren besetzten Schweife.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Daß das Pferd wegen seiner vortrefflichen Eigenschafften vor allen zahmen Thieren einen großen Vorzug habe, ist außer allem Zweifel. Ja es zeichnet sich durch seine Kühnheit, Geschwindigkeit, Stärke, Dauer, Gelehrigkeit, Gedächtniß, Sinnschärfe, Wachsamkeit, Sanftmuth, Dienstfertigkeit, Folgsamkeit, Treue und Zuneigung zum Menschen, um ihm zu dienen und ihn

zu vergnügen, durch seine Geselligkeit und Schmeichelhaftigkeit unter sich, durch seinen schönen Körperbau und durch sein stolzes Ansehen, vor jeder andern Thierart aus. Es bekam daher auch vom Schöpfer eine Natur, die unter allen Himmelsstrichen, wie die menschliche, ausdauern kann, und ein Auge, das wie der Vögel ihres mit einer Nickhaut versehen ist, mit welcher es dieses sein kostbares Sinneswerkzeug gegen mancherley Verletzungen einigermaßen bedecken kann, ohne des Lichts gänzlich beraubt zu seyn.

Seinen Ursprung hat es, wie die andern zahmen Thiere, von einer wilden Rasse *), die klein, dickköpfig und häßlich seyn, und noch jetzt in Siberien, und in der großen Tartarey gefunden werden soll. Unter der Hand des Menschen hat es sich aber so schön gebildet, daß seine Gestalt jedermann vergnügt, und es ist gewiß unter allen Thieren, bey seinem langgestreckten Körperbau, an allen Theilen seines Leibes am regelmäßigsten und zierlichsten gebaut. Eine kleine Vergleichung mit allen übrigen vierfüßigen Thieren kann jeden davon überzeugen. Obgleich sein Kopf mit sehr langen Kinnbacken versehen ist, so nimmt es doch weder die blödsinnige Miene des Esels, noch das dumme Ansehen des Ochsen an, die regelmäßigen Verhältnisse der Theile seines Kopfs geben ihm vielmehr einen freyen, lebhaften Anblick, der durch die Schönheit seines erhabenen Halses

*) E. Caballus ferus. Gmelin Linn. l. c. a). v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 309.

ses noch mehr erhöhet wird. Seine lebhaften Augen öffnen sich in verhältnißmäßiger Weite. Die Ohren haben ihren regelmäßigen Bau, sind weder zu kurz, wie beym Ochsen, noch zu lang, wie beym Esel. Die Beine sind wohlproportionirt. Die Haarbüschel über der Stirne, die Mähne am Halse zieren es vortrefflich, und scheinen Muth, Stärke und Stolz anzukündigen; und nichts konnte den schöngewölbten Hintertheil des Pferdes vortrefflicher decken und endigen, als der lange, dickhaarige Schweif, welcher alle Thierschwänze an Schönheit übertrifft.

Die große Mannichfaltigkeit von Farben (Haaren) hat eine Menge Benennungen unter den Pferdekennern hervorgebracht. Man theilt nämlich die Farben des Haares in einfache, zusammengesetzte und außerordentliche ein, und begreift unter den einfachen: das weiße, isabellfarbige, braune und schwarze Haar; unter den zusammengesetzten: das graue und wolfsgraue; und unter den außerordentlichen: die Tigerfarbe, Schäckenfarbe, Porcellanfarbe, und Pfirsichblütfarbe. Alle diese Hauptfarben haben nun wieder ihre abweichenden Schattirungen und Mischungen, die aber nur den eigentlichen Kunstverständigen interessiren können. Der weiße Flecken, den man an der Stirn, oft von verschiedener Größe erblickt, und den man auch durch künstliche Mittel hervor zu bringen sucht, heißt eine Bläße, wenn er bis auf die Nase reicht und ein Stern, wenn er bloß auf der Stirn steht und rund ist. Eine Schnippe ist ein spitzig zulaufender Fleck

auf der Nase. Die Aehre oder eine andere Art von Stern, den man an der Stirn, Brust, auf dem Bauche, und bey den Dickschenkeln sieht, besteht aus einer solchen Stellung der Haare, wo sie gleichsam aus einem gewissen Mittelpunkte ausgehen, und sich so ausbreiten, daß sie eine kugelförmige Höhlung, wie einen Trichter bilden. Und unter dem römischen Degen versteht man eine Haarnath, die von Haaren, die gegen den Strich laufen, gebildet wird, und längs dem Halse oder an der Mähne hinläuft.

Nach den verschiedenen Himmelstrichen, und nach den verschiedenen Nahrungsmitteln in denselben, die das Pferd genießt, hat es auch eine verschiedene Bildung bekommen, die zwar im Ganzen die nämliche bleibt, aber durch die Proportion seiner Theile, da man auf dieses Thier so vorzüglich sein Augenmerk richtet, die Menschen veranlaßt hat, es in verschiedene Rassen nach den Ländern, in welchen diese Abweichung der Theile merklich ist, einzutheilen. Man hat daher folgende vorzügliche Nationalpferde:

1) Die Arabischen. Sie sind die schönsten Pferde und werden allenthalben und sonderlich in der Türkey sehr hochgeschätzt. Man macht dreyerley Abtheilungen unter ihnen:

a) die edlen, *b*) die mittlern, *c*) die schlechten. Ueber die edle Art hält man Stammbäume *). Alle sind von mittlerm Wuchs, mehr mager

*) Sie heißen Köchlani. s. Niebuhrs Beschreibung von Arabien. Koppenhagen 1722. S. 161. u. Hallens Naturge-

ger als fett, leicht, geschmeidig, feurig, stolz und dauerhaft. Von ihnen stammen die schönsten Pferde in den meisten Ländern her.

2) Die Barbarischen, auch Lybischen genannt. Der Kopf ist schön und klein und der Hals lang und fein; die Mähne dünne; der Körper schmächtig und die Farbe gewöhnlich grau. Die Höhe ist 5 Schuh. Von Natur sind sie nachläßig und kaltsinnig in ihrem Gange. Es macht aber nicht leicht ein Pferd seine Schule besser als das Barbarische; sie schwimmen auch gut. Man giebt ihnen den Rang nach den Arabischen. Man nimmt sie gern zu Beschälern und von ihrer Zucht giebt es gute Jagdpferde.

3) Die Spanischen. Der Kopf ist groß, die Ohren sind lang, der Hals ist stark, lang und aufrecht, die Mähne dick, die Brust breit, das Kreuz rund, der Körper schwer, der Schaft lang, die Füße schön geformt, die Farbe gewöhnlich schwarz, auf der Stirn weiß gezeichnet, das Betragen gelehrig, stolz und kühn, und ihr Gang hurtig, schön und reizend natürlich. Die schönsten Parade-Pferde, überhaupt Pferde vom ersten

turgeschichte der Thiere. S. 230. Man hat ihre Abkunft bereits 2008 Jahre aufgeschrieben, und man sagt, daß sie ursprünglich von der Stuterey des Königs Salomo abstammten. Die vorzüglichsten Pferde in der Welt, wenn Schönheit, Symmetrie der Theile, Größe, Stärke, Biegsamkeit, Gelehrigkeit, Dauerhaftigkeit und Zuneigung gegen die Menschen Vorzüge eines Pferdes sind, hat Bruce auf seiner Reise nach den Quellen des Nils in Nubien gesehen.

Range unter den Europäischen. Die vorzüglichsten kommen aus Andalusien.

4) Die Englischen. Es sind sehr schöne hohe, langgestreckte Pferde mit einem langen geschmeidigen Kopf, einer krummen Nase, steifen kleinen Ohren, dünnen und langen Hals und Beinen, brauner, gelber und gefleckter Farbe. Sie stammen von Arabischen und Barbarischen Pferden ab, und sind wegen ihres festen Tritts, großen Schritts, und wegen ihrer Geschwindigkeit berühmt genug, ob sie gleich die Füße nicht hoch heben. Sie sind gemeiniglich wild und scheu. Zur Parforcejagd kann man sie gut gebrauchen. Die besten Englischen Pferde kommen aus der Landschaft Yorkshire.

5) Die Friesländischen. Es sind die größten und stärksten Pferde. Der Körper ist stark, Rücken und Kreuz breit, die Stellung hoch, der Hals kurz, der Kopf groß, die Füße sehr haarig und die Farbe sammtschwarz. Sie sind stark, muthig, fest im Gange, von fester Natur und großer Ausdauer. Es sind vorzüglich gute Kutschen- und Wagenpferde.

6) Die Dänischen. Man könnte sie zu den Deutschen zählen. Der Körper ist vollgebaut, der Kopf groß, der Hals dick, die Schultern sind stark, Brust und Kreuz breit, der Wuchs mittelmäßig. Es sind dauerhafte Kriegspferde, aber halsstarrig und der Regel nach von geringer Gelehrigkeit. Sie haben einen anmuthigen Gang im Wagen, und unter ihnen sind die Schäcken und Tigerpferde sehr gemein. Sie kommen eigentlich aus Jütland und die besten liefert die Landschaft Tye.

Die

7) Die Neapolitanischen. Eine Mittelgattung. Sie haben einen starken Hals, großen schweren Kopf (einen Schafkopf) und krumme Nase, sonst starke Knochen und einen vollkommnen Wuchs, und einen stolzen Anstand in ihren Bewegungen. Sie sind ungelehrig, boshaft und eigensinnig, laufen und ziehen aber gut. Da sie die Füße hoch heben, so geben sie stolze Kutschenpferde. Die den Brand auf der linken Seite haben, kommen aus Calabrien, und die ihn auf der rechten haben, aus Apulien. Die letztern sind vorzüglich groß und flüchtig.

8) Die Polnischen. Sie sind klein, unansehnlich, doch geschwind, dauerhaft und unermüdet.

9) Die Ungarischen. Sie sind beynahe den Polnischen ganz gleich, nur nicht von so starkem und festem Bau. Der Hals ist stark, gerade ausgestreckt und der Kopf scharf. Aus den Bergstädten und Siebenbürgen kommen die besten *).

10) Die Russischen. Sie sind klein, dickbäuchig, mit unförmlichen langen Mähnen, doch dauerhaft und stark.

11) Die Türkischen. Sie sind wohlgestaltet, ob sie gleich lange nicht das vollkommene Verhältniß der Leibestheile, wie die Barbarischen haben. Ihr Hals ist dünn,

*) N. 8 und 9. machen auch wilde Gestüte und müssen gejagt und eingefangen werden. Man bemerkt auch an ihnen, daß sie nicht leicht ihre Zähne abnutzen, und also von Natur Begurs, wie die Franzosen sagen, oder Pferde von unkenntbarem Alter sind.

dünn, scharf und schlank, die Brust schmal, der Leib eng, der Rücken zu hoch und die Schenkel zu dünne. Den Kopf vergleicht man mit einem Kameelkopf und das Kreuz mit einem Mauleselkreuz. Sie sind jachzornig, können aber das Laufen wohl aushalten, sie strecken dabey den Hals steif aus und den Schwanz in die Höhe.

12) Die Isländischen oder die Normänner. Die kleinste Rasse mit kurzen steifen Haaren, starkem Kopfe und Gliedmaßen, doch gut proportionirt. Sie sind dauerhaft, aber boshaft.

13) Die Deutschen. (Taf. II. Fig. 1.) Die Größe ist über mittelmäßig, der Kopf groß und plump, der Hals kurz und stark, so wie letzteres auch Körper und Beine sind, die Fesseln meist lang und die Beine rauh. Dieß sind die, welche in Landgestüten erzogen werden. Sie sind gute Zugpferde. Man muß aber von diesem Deutschen ökonomischen Pferde a) das Holsteinische und b) das Mecklenburgische sehr wohl unterscheiden, unter welchen sowohl schöne Reit- als Kutschenpferde sich befinden, und unter welchen sich jene vorzüglich durch den schön gekrümmten Kopf und diese durch den schön gestreckten Leib unterscheidet *).

Von

*) Daß es so wenig eigene gute und schöne Pferde in Deutschland giebt, kömmt von der Einführung ausländischer Beschäler und Zurücksetzung selbstgezogener guter Hengste her. Schlechte ausländische Beschäler, die man herbey zog, weil es Mode war, fremde Pferde im Gestüte zu haben, verdarben unsere dauerhaften guten Rassen. Man

Von den Frießländischen und Dänischen stammen unsere thüringischen Pferde ab *). Diejenigen, die in der Gegend des Thüringerwaldes auf dem Lande gezogen werden, sind von mehr als mittlerer Größe, haben einen starken Kopf, eine gerade eckige Nase, einen kurzen dicken Hals, starke Mähnen, breite Brust, dicke Beine, kurzen dicken Leib, starkes Kreuz und Schwanz. Sie sind eben nicht ansehnlich, aber dafür desto dauerhafter.

Bey der Kenntniß der Pferde kömmt alles auf ihre Schönheit, Gesundheit und Brauchbarkeit an, und der Wuchs derselben, ihre gröbern und feinern Gliedmaßen bestimmen allemal die Art ihrer Brauchbarkeit.

Der Roßverständige theilt das Pferd in drey Haupttheile ein, beschreibt darnach seine Gliedmaßen, und bedient sich dieser Kunstausdrücke:

1) Die Vorderhand, zu welcher Kopf, Hals, Brust und Vorderbeine gehören.

2) Der Leib, welcher den Rücken, die Lenden, Seiten und Bauch bis an die Hüften in sich faßt.

3) Die

Man findet daher in Deutschland bloß in solchen herrschaftlichen Gestüten, die gute ausländische Rassen haben, schöne Pferde. Auf dem Lande aber sind sie selten.

*) Da in Thüringen noch wenig Pferde gezogen werden, so kommen dieselben meistentheils als Fohlen vom Bremer Viehmarkte.

3) Die Hinterhand, welche das Kreuz, die Hinterbeine und den Schwanz in sich begreift *).

Ein gutes und gesundes Pferd muß muthig und munter seyn, und ein schönes folgende Eigenschaften haben: einen langen, magern und dünnen Kopf, kleine, schmale und zarte Ohren, die enge und gerade in die Höhe stehen; große helle Augen, voll Feuer, mit dünnen Augenliedern und ausgefüllten Augengruben; schmale und magere Kinnbacken; weite Nasenlöcher, die inwendig roth sind, und überhaupt eine etwas übergebogene Nase (Ramskopf); ein wenig gespaltenes, und inwendig rothes Maul, eine schmale und dabey erhabene Stirn. Der Hals muß lang, hoch und dabey der Oberhals dünn, mit langen Mähnen geziert, an den Schultern gerade in die Höhe laufend, am Kopf schmal, und krumm, wie ein Schwanenhals, seyn, und der Unterhals gerade in die Höhe steigen. Diese beyden Theile, der Kopf, Hals, und ihre Stellung tragen das meiste zur Schönheit des Pferdes bey. Außerdem muß es eine breite Brust, flache, magere Schultern, einen runden Leib, einen ebenen Rücken, ein rundes, starkes Kreuz, dicke Hüften und Oberschenkel, dünne Füße, schwarzglänzende, hohe Hufe, und einen dicken Schweif haben. Wo alle diese Eigenschaften beysammen sind, da ist Muth und

*) Fast alle Theile des Pferdes, größere und kleinere, haben in der Kunstsprache ihre eigene Benennung, so heißen z. B. die Schläfe, Augenadern u. s. f. Sie aber hier alle anzuführen, würde unnöthig seyn.

und Munterkeit, Leichtigkeit aller Bewegungen, Dauer in der Arbeit und wenigstens äußere Gesundheit zu erwarten und man sagt: das Pferd ist von gutem Leist.

Offenbare Fehler an Pferden sind, wenn sie kleine tiefliegende Augen haben, denn sie sehen dann nicht gut, wenn sie wechselsweise bald das eine, bald das andere Ohr heben und sinken lassen, denn alsdann sind sie gewöhnlich tückisch; wenn sie beyde Ohren oft hängen lassen, denn dieß ist ein Zeichen ihrer Faulheit; wenn sie sattelrief sind, d. h. wenn sie einen vertieften Rücken haben, denn sie werden dann bald müde; wenn sie eine enge Brust haben, denn alsdann streifen sie sich gerne, und endlich, wenn sie an den Füßen oder Huf fehlerhaft sind, Zwanghufe, Platthufe oder Hornspälte haben, denn sie werden leicht hinkend.

Ein Pferd, das zur Jagd gebraucht werden soll (Jagdpferd, auch Parforcepferd), muß vorzüglich eine gute Brust haben, um im Laufen auszuhalten, und leicht und geschwind zu laufen. Die Schultern müssen flach, und sehr biegsam, der Leib mehr lang als kurz, und das Maul gut und nicht gar zu empfindlich seyn; und endlich muß es lieber zu langsam als zu hitzig seyn, um sich in Bewegung bringen zu lassen.

Die sogenannten Schußpferde, welche beym Pürschen gebraucht werden, müssen so abgerichtet seyn, daß sie ganz ruhig und ohne eigenen Willen sind, und den Schuß, ohne zu erschrecken, hören können. Um leicht aufsitzen zu können, wählt man sie von mittlerer Statur.

Zu Kriegspferden für Officiere verlangt man empfindliche, biegsame, geschickte, leichte und muntere Pferde, und sieht hierbey nicht so sehr auf Zärtlichkeit und Schönheit.

Ein ordentliches Reitpferd braucht nur stämmig und stark zu seyn, und ein festes Maul und gute Knie zu haben.

Ein Reitpferd zum Vergnügen darf eher klein als groß seyn, um durch seine Bewegung nicht so sehr zu ermüden. Bey sichern Schenkeln und einem guten Maule kann ihm die allzu große Hitze und Lebhaftigkeit fehlen. Die feinsten unter diesen sind die Frauenzimmerpferde.

Prachtpferde müssen ihrem Zwecke gemäß ein prächtiges Ansehen haben. Schönheit der Farbe, der Gestalt, der Mähne und des Schweifes, und Muth und Stolz sucht man bey ihnen.

Bey Kutschenpferden sieht man auf niedere Hinterschenkel, gerade Lenden, einen hohen Kopf, und ein gutes Maul.

Ein Pferd für einen Oekonomen muß eine breite Brust, und ein starkes Kreuz haben, sonst ist es gleich, ob die Ohren ein- oder auswärts stehen; und zu Last- und Packpferden fordert man besonders untersetzte, starke, knochige und gelassene Thiere.

Da man bey der Brauchbarkeit des Pferdes besonders auf sein Alter Rücksicht nehmen muß, so ist man bemüht gewesen, sichere Kennzeichen davon aufzusuchen, und diese hat man in den Zähnen gefunden. Nur

Schade

Schade ist es, daß diese Kennzeichen das Alter des Pferdes nur bis ins zehnte Jahr mit Gewißheit bestimmen.

Das männliche Geschlecht hat allezeit 40 Zähne, 12 Vorderzähne (Rabzähne), 4 Hundezähne (Haaken) und 24 Backenzähne (Stockzähne); dem weiblichen Geschlechte fehlen entweder diese Hundezähne, oder sie sind nur sehr kurz. Etliche Tage nach der Geburt keimen schon vier Vorderzähne bey einem Füllen hervor *), zwey oben und zwey unten, bald darauf noch vier andere, welche sich oben und unten an den Seiten der vier erstern ansetzen, und nach drey oder vier Monaten, die vier letzten, welche oben und unten auf jeder Seite der acht ersten anschließen. Das Füllen hat alsdann zwölf Vorderzähne, die man Füllenzähne oder Milchzähne nennt. Sie stehen unerschütterlich, bis das Füllen 2 1/2 oder drey volle Jahre alt ist; alsdann aber fallen sie in der nämlichen Ordnung wieder aus, wie sie hervorgebrochen sind; erstlich nämlich die vier mittlern, zwey oben und zwey unten, welche in vierzehn Tagen durch vier andere ersetzt werden, die höher sind, aber statt der weißen Farbe eine gelbliche bekommen haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sagt, daß das Pferd zu zeichnen anfange, und daß der erste Bruch geschehen sey. Nach Verlauf eines Jahres geschieht der zweyte Bruch, und es fallen die vier folgenden aus, und in vierzehn Tagen treten ebenfalls wiederum vier neue an ihre Stelle. Nach dem vierten oder 4 1/2 Jahren verliehrt es endlich die beyden letzten Vorderzähne,

*) Sehr selten bringen sie vier Zähne mit auf die Welt.

derzähne, die ebenfalls durch vier andere wieder ersetzt werden, aber nicht so geschwind. Die obern kommen eher hervor, als die untern. Sie heißen Eckzähne. Alle gewechselten Vorderzähne heißen Roßzähne und zeigen das Alter des Pferdes bis ins achte Jahr an. Sie sind ausgehöhlt und haben in dieser Höhlung einen schwarzen Flecken, den man die Bohne oder den Kern zu nennen pflegt. Nach der Abnahme dieser Höhlung in den Vorderzähnen der untern Kinnlade berechnet man das Alter bis ins achte und neunte Jahr, wo gewöhnlich die Grube ausgefüllt, und das schwarze Maal verschwunden ist, wenn nämlich die Pferde ihre gewöhnliche Nahrung und nicht bloßes Gras bekommen haben *). Nach dieser Zeit nimmt man die Hundezähne als Merkmale an, welche im vierten Jahre hervorbrechen und sehr spitzig sind. Sie bleiben bis zum sechsten Jahre sehr spitzig, werden alsdann nach und nach stumpfer, und im zehnten Jahre sind sie bey dem gewöhnlichen Futter ganz stumpf, und dabey sehr lang, weil sich in diesem Alter das Zahnfleisch von denselben abzulösen anfängt. Von dieser Zeit an wird also das Alter der Pferde gänzlich ungewiß, und ein hohes Alter kann man alsdann bloß daran erkennen, wenn diese Zähne sehr lang und lose, die Furchen des Gaumens verschwunden sind, und bey dunkelfarbigen um die Augen und Nase, in der Mähne

*) Wenn das Pferd sieben Jahr alt ist, so ist nämlich der braune Kern auf den zwey mittelsten untern Vorderzähnen weggeführt, in dem achten auf den beyden darnebenstehenden und im neunten auf den Eckzähnen.

Mähne und dem Schweife weiße oder sogenannte graue Haare zum Vorschein kommen. Solche graue Haare kommen gewöhnlich erst im achtzehnten Jahre.

Ein bestimmtes Lebensziel kann man bey den Pferden nicht angeben. Es ist nämlich bekannt, daß, je später sich die Pferde völlig ausbilden, und ihren vollkommenen Wuchs und Größe erlangen, desto besser und älter werden sie. Ein Pferd, welches im sechsten Jahre erst sein völliges Wachsthum vollendet hat, ist zwanzig Jahre gut zu gebrauchen, und lebt vierzig Jahre und drüber *); hingegen ein Pferd, das durch eine äußerliche oder innerliche Ursache schon im vierten Jahre ausgewachsen ist, ist nur zehn Jahre gut, und wird nicht leicht über 24 Jahre alt.

Zergliederung **).

So vollkommen die Zergliederung bey den Pferden ist, indem man dazu eigene Schulen angelegt hat, z. B. die Ecole veterinaire in Hannover und Berlin, so mangelhaft ist sie noch bey den andern Säugethieren.

*) Daß Pferde nicht bloß vierzig, sondern sogar fünf und sechzig Jahre erreicht haben, davon zeugt schon Aristoteles Hist. Animal. V. 128.

**) s. Stabb's Anatomy of Horse. London 1767. mit Kupf. fol. Cours d'Hippiatrique on Traité complet de la Medice de Chevaux. 65 planch. par la Fosse, à Paris. 1772. gr. Fol. Uebers. dieses Werks von Knobloch unter dem Titel: Lehrbegriff der Pferdearzney. Leipzig und Prag, 1787. Erster und zweyter Band.

Es kann aber hier nur vom Pferde einiges Merkwürdiges angegeben werden.

1) Der Magen der Pferde ist gegen den Magen anderer von Vegetabilien lebenden Thiere gar sehr verschieden. Er ist einfach, der Größe des Thiers nach klein, und hat gar keine Aehnlichkeit mit denen der wiederkäuenden Thiere, daher Büffon die Eigenheit des Pferdes erklärt, daß es sich nicht erbrechen, viel weniger wiederkäuen kann.

2) Die Gallenblase fehlt.

3) In dem Magen und andern Eingeweiden findet man den Pferdebezoar. s. unten.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Das Wiehern der unbeschnittenen Pferde, dessen Töne nach der Verschiedenheit ihrer Leidenschafften, als der Freude, des Verlangens, Zorns, der Furcht und des Schmerzes abwechseln, und welches von Wallachen und Stuten viel seltner gehört wird, die Art ihrer Vertheidigung, das Ausschlagen mit den Hinterfüßen und das Beißen, ihr sehr kurzer Schlaf, der oft nur zwey bis drey Stunden dauert, das Sehen im Finstern, die eigne Art des Saufens, daß sie sich nicht brechen können, und andere Eigenheiten sind jedermann bekannt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß die Pferde unter allen Himmelsstrichen aushalten. Sie gehen bis zum Arktischen Kreis hinauf. Wild findet man sie in

großen

großen Heerden in Bessarabien, in den Wüsten am Tanaim, und in der ganzen Tatarey. Sie verwildern auch gern, wie man jetzt ganze Heerden in Amerika und einzelne in Polen und in den schottischen Hochländern antrifft, und es ist zweifelhaft, welche Pferde eigentlich wilde, und welches verwilderte sind. Die Pferde der wandernden Tataren werden sogar nicht selten von der wilden Rasse weggeführt, vermischen sich mit derselben und pflanzen sich fort. Diese Zucht unterscheidet man hernach an der Farbe, die aus mancherley Schattirungen von Nußbraun zusammengesetzt ist *).

Die Pferde, die man zum Reiten, Fahren und Tragen gebraucht, werden in Thüringen durchgängig bloß in Ställen gehalten, und kommen gewöhnlich gar nicht ins freye Feld auf die Weide. Man baut ihnen daher bequeme Ställe, welche die frische Luft durchstreichen, und die Sonne erleuchten kann, und diese entfernt man gern von den Schweineställen, weil ihnen der Geruch des Schweinemistes zuwider ist, und reinigt sie gehörig. Auf einer Stuterey ist es aber bis jetzo noch ganz anders, weil hier die Pferde nicht nur ihre eigne Ställe, sondern auch ihre großen Weidenplätze auf freyem Felde, wohin sie des Sommers über von besondern Pferdehirten getrieben werden, brauchen. Und zur Fohlenzucht scheinen die Triften wirklich noch den größten Nutzen zu leisten, ob man gleich auch hier bey gehörig getroffenen Maaß-

*) s. Meine Uebersetzung von Pennants allgem. Uebers. I. S. 3.

regeln die Stallfütterung ohne Schaden einführen, und dadurch die großen Pferdeweiden besser benutzen könnte.

Ein Stall, worin die Mutterpferde, die zur Fortpflanzung gehalten werden, sich befinden, muß 15 Schuh hoch seyn, und viele Fenster zur Erleuchtung, zum Durchstrich der frischen Luft, und zur Sonne haben. Die Stände derselben müssen 10 Schuh 8 Zoll tief, und 7 Schuh, 6 Zoll um der Fohlen willen breit seyn. Das Steinpflaster oder die Schaalhölzer erheben sich nur vorwärts um 4 Zoll, damit die Feuchtigkeiten ablaufen können. Die steinerne Krippe steht 4 Fuß hoch, die Raufe 1 1/2 Schuh über derselben, und die Seitenwände sind 4 Schuh und etliche Zoll hoch. Jeder Stand hat am Ende einige Riegel, die den Füllen das Durchkommen verwehren.

Für die Füllen braucht man dreyerley Ställe bis ins vierte Jahr. Einen eigenen Stall für die Halb- und Einjährigen, einen eigenen zweyten für die Zweyjährigen, und einen dritten für die Drey- und Vierjährigen. Bis zum zweyten Jahre brauchen sie keine Stände. — Die Ställe müssen stets reinlich gehalten werden, ob sich gleich die Pferde wenig niederlegen, und viele sogar auch stehend schlafen.

Nahrung.

Die Fütterung der Pferde wird nach der Bestimmung derselben eingerichtet. Ein müßiges Pferd kann bey der Hälfte des Futters bestehen, das ein arbeitendes zur Erhaltung seiner Kräfte braucht. Wenn ein Pferd, das

das am Pflug und Wagen geht, täglich 12 Pfund Hafer und eben so viel Hexel (Heckerling), den man gern aus Waizenstroh schneidet, und Abends bey der Abfütterung 5 Pfund gutes Heu verlangt, so kann ein Kutschen- oder Reitpferd bey seinen mäßigen Arbeiten mit halb so viel Hafer und Heckerling und dem Bund Heu von 5 Pfund vorlieb nehmen. Die trächtigen Stuten, welche mäßig arbeiten, bekommen nebst dieser Portion Heu täglich 10 Pfund Hafer, wenn sie die letzten drey Monate müßig stehen 6 Pfund, und wenn sie der Fohlenzeit nahe sind, und es geschehen kann, ein grünes Wickenfutter.

In Stutereyen aber, wo die Pferde auf die Weide getrieben werden, müssen sie im Frühjahr nach und nach an grünes Futter gewöhnt werden, weil die zu schnelle Abwechselung leicht Durchfall und Verstopfung verursachen kann. Ehe sie vom Hirten des Morgens ausgetrieben werden, bekommen sie allezeit ein trocknes Futter. Des Morgens treibt er nicht früher aus, als der Nebel und Reif verschwunden ist, des Abends aber früher ein, ehe er fällt, und in den heißen Mittagsstunden sucht er mit ihnen den Schatten. Sie müssen allezeit auf trockene Wiesen, die kurzes und kleereiches Gras geben, geführt werden, weil nasse Weiden faule und schwere Pferde machen. Die bergigen Gegenden geben daher den Pferden die beste Weide. Es ist auch nöthig, daß alle vierzehn Tage mit den Weideplätzen abgewechselt wird, damit das abgeweidete Gras wieder nachwachsen kann. Man sieht daher leicht, daß bey einer etwas großen Stuterey auch eine sehr große Strecke Triftweide zur Erhaltung derselben erfordert wird. Es wäre also rathsamer, diese

Plätze mit Klee, Wickenfutter, oder an Bergen mit Esparsette und Luzernenklee zu bebauen, oder sie in künstliche Wiesen zu verwandeln, welche für die Pferde aus Steinklee (Melilotus), spanischem Klee, englischem Raygras (Lolium perenne), Wiesenhafer (Avena elatior), Timotheusgras (Pheum pratense), Wiesenschwengel (Festuca elatior), wolligem Roßgras (Holcus lanatus), und Pimpenelle (Pimpinella sanguisorba) bestehen. Nur muß dabey die Vorsicht gebraucht werden, daß man im Frühjahr und im Herbst das grüne Futter mit Heu und Stroh ab- und zunehmend vermischt, ehe man ihnen beydes allein vorlegt, und daß man ihnen bey nassem Wetter bloßes Heu vorsteckt. Die Fohlen bekommen nach Verschiedenheit ihres Alters eben das Futter ihrer Eltern, aber nur erst im dritten Jahre zwey oder drey Pfund Hafer mit eben so viel geschnittenem Stroh.

Zur Zeit des Härens im Frühjahr und Herbst müssen die, zu dieser Zeit kraftlosen Pferde geschont, und besonders gut und ordentlich gefüttert werden *).

Sie bekommen des Tages drey Mahlzeiten und zwar, wenn es die Umstände erlauben, des Morgens 5 Uhr, Mittags 11 Uhr und Abends 7 Uhr.

Zu ihrem Tranke erhalten sie kühles, weiches und helles Brunnen- oder Bachwasser des Tages dreymal. Sie saufen auf eine eigene Weise, indem sie Maul und Nase hurtig und tief ins Wasser tauchen, und durch eine bloße

*) In feuchten morastigen Gegenden werfen sie auch zuweilen das Horn an den Füßen ab.

bloße Bewegung des Schluckens so viel zu sich nehmen, als zur Befriedigung ihres Durstes nöthig ist.

Alle vierzehn Tage streut man ihnen eine Handvoll Salz unter ihr Futter, welches sie vor den bösen Krankheiten der Druse, des Rotzes und anderer mehr bewahrt und ihnen Freßbegierde macht.

Schädlich ist den Pferden alles junge Laub, die Holzäpfel, besonders der Taxus und folgende Kräuter, Frauenbettstroh (Gallium verum), Ottermennich (Agrimonia eupatoria), verschiedene Arten Spierpflanzen (Spiraea), Sonnenwirbel (Myosotis scorpioides), Baldrian (Valeriana officinalis), Hahnenfuß (Ranunculus pratensis), Pferdeschwanz (Equisetum palustre), und Wolfsmilchskraut (Euphorbia).

Die Pferde sollen nach Linne's Versuchen 262 Kräuter fressen, und 212 unberührt lassen.

Fortpflanzung.

Bey der Anpreisung der eigenen Erziehung der Pferde in seinem Vaterlande hört man gewöhnlich Oekonomen die Einwendung machen, daß man die Pferde wohlfeiler kaufen, als selbst erziehen könne, ohne daß sie vorhero die Wahrheit ihrer Behauptung wirklich untersucht haben. Man hat sehr wichtige Gründe für das Gegentheil, worzu vorzüglich die auf Stutereyen geführten Rechnungen gehören.

Der Staat sollte es sich zur besondern Pflicht machen, darauf zu sehen, daß die Pferde, die man im Lande braucht, auch darin gezogen würden; denn 1) gewöh-

nen sich fremde nicht so leicht an Luft, Wasser und Futter; 2) ist die Betrügerey mit fremden Pferden zu groß, da man leicht Lungenfaule, und mit andern Fehlern behaftete kaufen kann, wenn man ihren Gesundheitszustand von Jugend auf nicht kennt; 3) muß der Staat immer dafür sorgen, daß das Geld im Lande bleibe, so wie 4) jeder gute Wirth alle entbehrliche Ausgaben vermeiden, und lieber noch Vortheil zu ziehen streben muß. Gegend und Lage eines Landes können hier auch keinen Einwand machen, da in jedem Lande, wo gutes Wasser und Futter ist, auch gute Pferde gezogen werden können.

Man macht gewöhnlich dreyerley Abtheilungen unter dem Gestüte.

1) Wildes Gestüte, wo die Pferde Sommer und Winter, Tag und Nacht ohne alle Wartung im Freyen bleiben. Hier muß man sie, wie in Polen, Ungarn, oder der Wallachey ꝛc. einfangen. Dieß Gestüte kann nur in solchen Gegenden statt haben, die sehr unbevölkert sind, und wo die unangebauten Weideplätze nicht besser benutzt werden können. Obgleich die hier gezogenen Pferde klein bleiben, so sind sie doch abgehärtet, nervig, leicht und flüchtig.

2) Halbwilde Gestüte, wo die Pferde im Sommer in den Wäldern und auf den Triften sich aufhalten müssen, und im Winter bloß die Stallfütterung genießen. Es giebt schöne und dauerhafte Pferde. Einige Gestüte in Böhmen und Mähren, und das berühmte Sennergestüte in der Grafschaft

schaft Lippe gehören hierher. s. Prizelius Beschreibung desselben. Lemgo 1770.

3) Zahmes Gestüte, wo die Pferde nur im Sommer des Tags über auf die Weide getrieben werden, des Nachts aber in ihre geschlossene Ställe kommen. Und dazu könnte man noch setzen:

4) Stall- oder Landgestüte, welches die Fohlen- oder Füllenzucht der Unterthanen ist, wobey die Pferde gar nicht auf die Weide getrieben werden, sondern die Feldarbeiten des Landmannes verrichten müssen. Ihre Beförderung und Verbesserung sollte immer ein Gegenstand der landesherrschaftlichen Fürsorge seyn.

Die dritte Art, welche in Deutschland die gewöhnlichste, aber auch die kostbarste ist, hat man auch einzeln in Thüringen, ob sie sich gleich gewöhnlich bloß nur auf die Anzucht der Pferde für den Hof einschränkt *), und die vierte ist nur noch bey einzelnen Landleuten und in sehr beschränkten Gegenden üblich. Da jene in der That für sehr bevölkerte Länder zu kostbar ist, weil man wenigstens auf eine Stute 350 Ruthen gute Weide, und auf ein Säugfohlen die Hälfte davon rechnen muß,

so

*) Z. E. Im Herzogthum Gotha auf der herrschaftlichen Stuterey zu Georgenthal, wo schöne, dauerhafte, Pferde gezogen werden. Stuten und Füllen gehen den ganzen Sommer auf hohen Waldwiesen und in Gebirgen grasen, wodurch ihr Wuchs ausgebildet, ihr Huf hart und dauerhaft und ihre Muskeln durch das Bergsteigen abgehärtet und fest werden.

so sollte man das Stallgestüte auf großen Stutereyen in ebenen Gegenden einführen, die Triften in künstliche Wiesen verwandeln und die Hirten darzu brauchen, den Zuchtpferden das Futter herbey zu schaffen, sie zur Bewegung auszutreiben, und zu warten.

Um nun eine gute Nachzucht zu erhalten, kömmt alles auf die Güte der Zuchthengste und Zuchtstuten an. Je entfernter der Himmelsstrich ist, aus welchem der Hengst und die Stute abstammen, desto besser und schöner sollen die Pferde, die daher entspringen, werden. Nur dürfen die Beschäler nicht, wie es gewöhnlich der Fall, bey ausländischen theuren Pferden ist, von schlechtem Muskelbau, und überhaupt weniger starker Leibesbeschaffenheit und geringern Kräften seyn, als die einheimischen. Man weiß aus Erfahrung, daß die Stute mehrentheils dem Pferde die Größe und der Hengst demselben die Gestalt der Gliedmaßen giebt; man würde daher wohl thun, wenn man seine Pferdezucht durch fremde Mutterpferde verbesserte, allein da diese schwer zu bekommen sind, so thut man es durch fremde Hengste. Nur sorgt man dafür, daß man wenigstens vier Jahre hintereinander immer neue fremde Hengste den Stuten zugesellt, und keine Begattung unter der Blutsfreundschaft zuläßt, wenn keine Ausartungen zu fürchten seyn sollen. Die Rasse muß daher wenigstens immer verwechselt und erneuert werden, wenn man schöne und gute Pferde haben will.

Ein guter Zuchthengst (Springhengst, Beschäler) muß von schönem Wuchse seyn, einen langen und schlanken Leib, lebhafte Augen, und kleine Ohren haben,

darf

darf nicht unregelmäßig gefleckt seyn; außerdem aber kann er in Ansehung der Farbe, schwarz, schwarzbraun, braun, ein Mohrenschimmel, ein Hermelin, ein Fuchs, ein Schimmel oder getiegert seyn. Doch liebt man die getiegerten und Rothschimmel deßwegen nicht, weil jene mehrentheils Rattenschwänze haben, und diese übel riechen.

Einige lassen den Hengst schon im vierten, andere besser im sechsten Jahre, wenn er völlig ausgewachsen ist, zur Begattung. Er ist bis ins zehnte Jahr tüchtig.

Eine gute Stute, (Mutterpferd) muß groß seyn, einen langen weiten Leib, gute Schultern, eine breite Brust und einen langen Hals haben. Sie muß völlig 5 Jahr alt seyn, ehe man ein gutes Fohlen von ihr erwarten kann. Man sagt diejenigen Stuten, die Hundezähne hätten, seyen gewöhnlich zur Unfruchtbarkeit geneigt.

Man irret, wenn man glaubt, daß die Beschäler und Stuten ohne Arbeit seyn müßten, wenn sie gute Füllen zeugen sollten. Denn die Erfahrung bestätigt es, daß die Zuchtpferde bey stäter Arbeit, wodurch ihre Säfte immer gehörig entwickelt werden, bessere Füllen bekommen, als diejenigen, die blos dem Geschäffte der Zeugung ohne Arbeit obliegen. *)

Die

*) Meine Stute muß bis auf den letzten Tag arbeiten, freylich hat sie in den letzten Tagen nicht die anstrengende Arbeiten wie sonst. Sie befindet sich dabey so wohl, daß sie allzeit das Fohlen in weniger als einer halben Stunde hat; frißt vor dem Fohlen und gleich darauf wieder, wie gewöhnlich.

Die Stuten, welche an eine ordentliche Lebensart gewöhnt sind, und gut gehalten werden, fühlen alle Jahre im Frühjahr den Trieb zur Fortpflanzung (rossen, rosseln). Die Zeit ist gewöhnlich das Ende des Märzes, der April und May, und 14 Tage läßt jede den Reiz zur Begattung am stärksten merken, wo man ihr auch den Hengst verstattet. Es ist überhaupt nicht rathsam der Stute oder den Hengst zur Begattungszeit den Reiz zu vermehren, doch ist bey kalten Temperamenten ein Gemisch von Roggen, Gersten und etwas Hanfsaamen in Wasser eingeweicht, an einen kühlen Ort gestellt, daß es nicht sauer werde, und Morgens und Abends eine Handvoll auf das Futter gegeben, eins der unschädlichsten Kunstmittel.

Das Beschälen, Bedecken, oder Besprinzgen aus der Hand, wie man es nennt, ist die sicherste Art der Begattung. Es geschieht in einer Hütte, die etwas abhängig gebaut ist, damit die kleine Stute bergan und die größere bergab gestellt werden kann. Nach dem ersten Sprung führt man in 9 Tagen den Hengst abermals zur Stute, und schlägt sie ihn ab, d. h. verlangt sie ihn nicht, so ist sie trächtig; sie verlangt ihn auch mehrentheils, wenn sie nicht empfangen hat, von selbst schon eher wieder. Man begießt sie nicht mit Wasser nach der Begattung, sondern macht ihr eine leichte Bewegung. Ist sie gleich nach derselben lustig und munter, so soll dieß ein Zeichen ihrer Befruchtung seyn.

Ein guter Hengst ist vermögend in einem Jahre 30 Stuten zu belegen, eine des Morgens, die andere des

Abends

Abends, wenn er dabey nur mäßige Arbeit verrichten und jede Woche zwey Tage von diesem Geschäffte ruhen darf. Man thut aber nicht wohl, wenn man ihm mehr als 20 Stuten zugesellet und ihn des Tages mehr als einmal braucht, weil der zu öftere Gebrauch, wodurch die Säfte schlecht und unvollkommen werden, die Ursach der Blindheit so vieler Pferde seyn soll, die von einem solchem Hengste abstammen.

Im fünften Monat nach der Empfängniß der Stute fühlt man das Füllen, besonders beym Trinken, sich in Mutterleibe bewegen. Sie trägt 10 1/2, 11, 11 1/2, ja auch 12 Monate, je nachdem sie gut oder schlecht gefüttert und gewartet wird *), und man will bemerkt haben, daß diejenigen, die des Morgens empfiengen, allzeit nach 11 Monaten und 10 Tagen das Fohlen brächten, die andern aber später und unordentlicher. Ihre Niederkunft ist nahe, wenn die Milch fließt und erfolgt in 24 Stunden, wenn um die Eiterwarzen sich zähe weiße Tropfen sammeln, die, wenn man sie abwischt, immer wieder nachfließen.

Sie fohlet mehr liegend als stehend, und da oft verkehrte Lagen sich finden, so muß ein geschickter Hirte in

*) Diese Bemerkung ist durch viele Erfahrungen bestätigt, daß diejenigen Stuten allzeit 8 und mehrere Tage früher niederkamen, welche gut gehalten wurden, als diejenigen, welche schlecht gehalten wurden, ob sie gleich in einem Tage den Sprung bekamen. Ich habe eine Stute, die dieses Jahr mit einem Stutenfüllen nur 10 Monate und 10 Tage gieng, und voriges Jahr mit einem Hengstfüllen 11 Monate und 1 Tag.

in Bereitschaft seyn, der diese Lage kennt, und ihr beystehen kann.

Sobald das Füllen den Kopf zeigt, muß man ihm die Fohlennahrung oder das Pferdegift (Hippomanes), ein dunkelrothes, schwammiges Gewächs von der Zunge wegnehmen *), weil es ihm, wenn es verschluckt wird, schädlich ist, und sobald es gebohren ist, muß man ihm die schwammigen Ballen von den Fußsohlen abbrechen.

Gesunde Füllen springen gleich in der ersten Viertel- oder halben Stunde nach ihrer Geburt, nachdem ihnen die Mutter durch Lecken ihre erste Zärtlichkeit bewiesen hat, auf, und suchen das Euter, und man verwehrt ihnen die erste Muttermilch nicht, weil sie allzeit ein Abführungsmittel des Erbkothes ist. Sie müssen allzeit an das Euter gehalten werden, weil sie leicht jedes Ding ergreifen, was rund ist, auch ihren eignen Nabel, und dann sehr schwer ans Euter zu gewöhnen sind, und dieje-

*) Neuere Beobachter behaupten, daß die Fohlennahrung ihren Sitz nicht eigentlich auf der Zunge habe, sondern eine Concretion von unreinen Säften sey, die man in der Gebärmutter schwimmend antreffe, und die nur beym ersten Athemhohlen des Füllens in das Maul komme. So viel ist sicher, daß man sie bey Embrionen nie im Munde, sondern im Schafwasser herumschwimmend antrifft, und daß sie auch zuweilen dem Pferde statt im Maul, auf der Nase sitzt, auch oft gar nicht gefunden wird, wenn man gleich dem Füllen bey der Geburt den Rachen öffnet, und alsdann also im Wasser oder bey der Nachgeburt seyn muß.

diejenigen, welche bey oder nach der Geburt mutterlos werden, müssen an Stiefmütter oder Ziegen gewöhnt werden, welchen man beym Saugen der Füllen die Augen blendet. Geht dieß nicht an, so zieht man sie mit Ziegenmilch oder Kuhmilch auf. Man macht anfänglich ein Zäpfchen von Leinwand, taugt es in Milch und giebt es dem Füllen in den Mund, dieß hält man dann in ein flaches Milchgefäße, und läßt es, wenn es von selbst säuft, weg. Die Ziegenmilch ist allzeit der Kuhmilch vorzuziehen.

Etliche Tage bekömmt die Mutter laues Wasser mit Roggenmehl oder Waizenkleyen und Salz vermischt, dann aber gewöhnlich wieder ihr kaltes Getränke.

Den neunten oder zehnten Tag, nachdem sie gefohlt hat, wird sie gewöhnlich wieder roßig, und man läßt ihr auch den Hengst zu, weil dieser Tag gewöhnlich zur Empfängniß am günstigsten ist.

Die Füllen entwöhnen sich von selbst, oder werden im vierten oder fünften Monate entwöhnt. Man kann sie unterdessen in den Ställen herumlaufen, und allenthalben Futter finden lassen. Wenn sie die ersten 12 Zähne vollkommen haben, so bekommen sie schon neben ihrer Muttermilch auch Heckerling, Hafer, Heu und Gras zu ihrer Nahrung. Sie müssen von Jugend auf reinlich gehalten und täglich gewaschen werden. Wo Pferdetriften sind, kommen sie nach den ersten 14 Tagen auf die Weide, wo sie aber mit den Kühen ausgetrieben werden, erstlich nach einem halben Jahre. Ihr Futter im Stalle nimmt nach dem Alter zu.

Nach dem dritten Jahre, und nicht früher, fängt man an, sie zu ihrer Bestimmung vorzubereiten. Man legt ihnen zuweilen ein Gebiß ins Maul, einen Sattel auf den Rücken, spannt sie an einen leeren Wagen, und läßt sie damit ein wenig traben. Die Reitpferde dürfen erst nach vier völlig zurückgelegten Jahren ordentlich beritten werden, aber die Zugpferde kann man früher an den Wagen und Pflug spannen. Jetzt ist auch die Zeit, wo sie beschlagen werden, und zwar im Winter erstlich an den Vorderfüßen, und dann das kommende Frühjahr auch an den Hinterfüßen. Man gewöhnt sie darzu, indem man ihnen in ihrer Jugend zuweilen die Füße aufhebt, auf den Huf mit einem Hammer pocht, und dann für ihr ruhiges Verhalten Zucker oder Salz aus der Hand zu lecken giebt. Die Eisen dürfen nicht aufgebrannt, und der Huf nicht abgeraspelt werden, weil er sonst leicht schadhaft werden kann, sonderlich durch den Verlust seines natürlichen äußerlichen Glanzes.

Im zweyten und dritten Jahre werden die Pferde, besonders die herrschaftlichen, durch einen glühenden eisernen oder kupfernen Stempel an den Kinnladen, unter den Mähnen, an den Schultern, Hinterschenkeln oder Hinterbacken vor der Schmiede gezeichnet. Die Wunde wird mit Baumöhl bestrichen und geheilet.

Da man einmal grausam genug ist, zu glauben, daß die Pferde ohne beschnitten (gewallacht, gerissen, gelegt) zu seyn, nicht leicht regiert oder gebändigt werden könnten, und dadurch erst lenksamer und gelehriger gemacht werden müßten, so hat man verschiedene Methoden erfunden, ihnen ihre Kraft zur Fortpflanzung zu nehmen.

nehmen. Die zwey gewöhnlichen sind: 1) das Verschneiden durch Corrosivmittel, und 2) durch Feuer.

Bey der ersten Art, welches die beste ist, weil die zweyte oft Entzündungen nach sich zieht, wird das Pferd geblendet, gegürtet, mit Seilen, die kreuzweiß durch Ringen an den Füßen gezogen sind, langsam und behutsam durch zwey Männer auf den Mist geworfen; der Verschneider öffnet mit einem scharfen Messer den Hodensack, drückt die Geilen heraus, und bindet zwischen vier Hölzchen von 6 Zoll Länge, die inwendig hohl und mit Sauerteig und Mercurio sublimato corrusivo angefüllt sind, und Kluppen heißen, die Saamengefäße fest, wäscht die Wunde mit Eßig und Salz aus, läßt dem Pferde nach dem Losbinden zur Ader, öffnet die Bindfaden nach 24 Stunden, in welcher Zeit die Saamengefäße zerstöhrt sind, wäscht die Wunde abermals aus, und nach 14 Tagen ist sie geheilt. Man zerdrückt oder schlägt auch zuweilen den Thieren die Gefäße, welche den Saamen bereiten und führen, breit. Ein solch verstümmeltes Pferd heißt alsdenn ein Wallach oder Mönch. Es geschieht diese Operation allemal im Herbst oder Frühjahr, wenn das Thier drey oder vier Jahr alt ist; doch kastrit man auch alte Hengste glücklich.

Das Englisiren, wo man den Pferden einen vorzüglichen Theil ihrer Schönheit, und ein Vertheidigungsmittel gegen den Anfall der Insekten raubt, kömmt jetzt allmählich ab. In England konnte man es einführen, weil in diesem Lande die Insekten, welche

bey uns eine so große Plage der Pferde sind, nicht so häufig angetroffen werden, und man die Pferde alle der Reihe nach und nahe an einander spannt, wodurch sie sich mit dem langen Schwanze in die Augen schlagen könnten. Es geschieht diese Operation in einem Nothstalle, und es werden ihnen im zweyten oder dritten Jahre 2 Zoll vom After die Sehnen des Schwanzes rund herum zerschnitten, der Schwanz wird in die Höhe gebunden, und die Wunde mit Wundbalsam geheilt. Nach der Heilung schlägt man den Schwanz eine Viertel Elle vor der Wurzel völlig ab, und der übrige Theil steht gerade aus *).

Krankheiten und Mittel dagegen.

Man vergleiche: Erxlebens Einleitung in die Vieharzneykunst. Göttingen u. Gotha 1769. Dessen praktischer Unterricht in der Vieharzneykunst. Ebendaselbst. 1771.

Abilgaards Unterricht von Pferden, Kühen, Schafen und Schweinen. Koppenhagen 1771. 8.

Bartlet's Pharmacopee oder Apotheker eines Roßarztes mit Anmerkungen von D. Buschholz. Weimar 1778.

Veterinarius oder theoretisch-praktischer Unterricht

*) Ben dem Landgestüte, wo die Landleute ihre Pferde selbst ziehen, sollte die Obrigkeit für gute Hengste sorgen, und überhaupt mehr auf diese wichtige Sache ihr Augenmerk richten. So wird in den Hannöverischen Landen ein Beschäler gehalten, den jeder Bauer fordern kann. Im Gothaischen ist diese Einrichtung jetzt ebenfalls gemacht.

richt von der Behandlung, Cur und Wartung der Pferde und des Hornviehes ꝛc. Gotha 1779. 8.

Lehrbegriff der Pferdarzney, aus dem Franzöſ. des Hrn. La Foſſe überſ. von D. Knobloch, mit einer Vorrede von D. Wolſtein. Prag u. Leipz. 1788. 3r u. 4r Band.

J. Clarks Abh. von Verhütung der Pferdekrankheiten. Aus dem Engl. Wien 1790. 8.

J. A. Kerſtings nachgelaſſene Manuſcripte über die Pferdarzneywiſſenſchaft. Herausgegeben v. G. Sothen. 2te Aufl. Berlin 1792. 8.

J. G. Wolſtein Unterricht für Fahnenſchmiede. 2te Aufl. 1796. 8.

D. Robertſons vollſtändiges Werk über die Pferdewiſſenſchaften durch Anmerk. aus den berühmten Thierärzten berichtet v. G. P. Mogalla. Neue Aufl. Breslau 1796. 8.

Die Kennzeichen, woran man den geſunden Zuſtand eines Pferdes erkennen kann, ſind folgende: Es muß willig und munter, nicht ekel im Futter und gefräßig ſeyn; nach der Arbeit und dem Freſſen ſich ganz ruhig verhalten, oder niederlegen. Der Körper muß immer einerley Grad der Vollkommenheit behalten, nicht bald mager, bald ſtark ſeyn. Es muß hell aus den Augen ſehen, die Ohren immer aufwärts kehren, ein glänzendes Haar haben, unter dem Zügel ſchäumen, nicht zu viel trinken, nicht wäſſerig oder weich miſten, ohne Beſchwerde harnen, nicht ſo ſtark über der Arbeit ſchwitzen, und leiſe athmen. Wo dieſe Kennzeichen alle angetroffen werden, da iſt das Pferd gewiß geſund, hingegen wo nur

eins fehlt, da ist Aufmerksamkeit nöthig, weil eine Krankheit entweder schon wirklich eingetreten ist, oder wenigstens ihr Daseyn anmeldet.

Ein Merkmal der Ungesundheit eines Füllens ist, wenn es beym Schlafen den Kopf gerade vor sich hinstreckt, und nicht nach der Brust zieht, wollige Haare hat, und vor dem zweyten Jahre das Geschröte sinken läßt.

In Dännemark erhält man die Pferde gesund, fleischig und glänzend, wenn man den Saamen von den Brennesseln allmählig trocknet, pulverisirt und des Morgens und Abends eine Handvoll für jedes Pferd unter den Hafer menget.

1) Die Druse (der Kropf), welche von Erkältung, unterbrochener Ausdünstung im Frühling und Herbste, oder von unordentlicher Verdauung entsteht. Unreine Säfte sind die gewöhnliche Ursache derselben und diese rühren oft von dumpfiger und verdorbner Nahrung her. Ein plötzlicher Uebergang vom grünen zum trocknen und vom trocknen zum grünen Futter im Herbst und Frühjahr soll diese Krankheit ebenfalls verursachen. Man muß daher von dem einen zum andern allmählig überschreiten. Der Knoten (dieß muß man zum Unterschiede vom Rotze bemerken), worinn sich eine ungesunde Feuchtigkeit sammelt, befindet sich unter dem Kinn mitten zwischen beyden Kieferknochen, und wenn er aufbricht, fließt diese Feuchtigkeit aus beyden Nasenlöchern zugleich. Das Pferd hat dabey das Ansehen, als wenn es innerlich krank wäre, oder wie wenn es den Schnupfen hätte, hat matte Augen, ist träge, traurig, hustet heiße und

frißt

frißt nicht gehörig. Besonders drey- und vierjährige Füllen werden damit befallen. Spießglasleber (hepar Antimonii) ist eine Blutreinigung dafür, sonst hilft das ächte Naumannische Drusenpulver, wovon man dem kranken Pferde alle Morgen und Abend einen Eßlöffel voll eingiebt, und ihm zugleich verschlagenes Wasser zum Tranke darreicht. Einen Waidballen, ein Pfund schwer, in ein leinenes Säckchen geneht, und dem Pferde davon zu saufen gegeben, befördert den Abgang der Kropf- und Drusenmaterie. Es scheint, wie wenn die vorzüglichste Cur darinn bestehen müßte, die Ausdünstung zu befördern. Man hält daher den Stall warm, behängt die Thür mit einer guten wollenen Decke, und giebt ihnen kein kaltes Getränk, sondern laulichtes Wasser mit Gerstenmehl und Honigwasser. Auch empfiehlt man noch folgendes Mittel: ein halb Pfund zerstoßene Wachholderbeeren, eben so viel Gentianwurzel und 8 Loth Galgant mit Honig zu einer Latwerge gemacht; hiervon streicht man Morgens und Abends jedesmal einer Wallnuß groß dem Pferd auf die Zunge.

2) Der Rotz wird für eine ansteckende Krankheit gehalten. Einige schreiben den Rotz von dem Saufen von sehr kaltem Wasser bey warmer Witterung her, weil das Pferd dabey die Nase ins Wasser steckt, wodurch die Kälte die Schleimhaut trifft, welche die Höhlung der Nase bekleidet, und allezeit der Sitz der Krankheit ist. Oft ist er auch eine Folge der schlechten Behandlung der Druse. Doch, wenn es wahr ist, was der berühmte Arzt Camper, der viele Untersuchungen über diese Krankheit angestellt hat, behauptet, (und was der

Mann sagt, kann man sonst sicher glauben) so ist diese Krankheit nicht schlechterdings ansteckend, wie man allgemein behauptet. Es ist ein Fluß aus der Nase, der aus einer verdorbenen, zähen und scharfen Lymphe (Fließwasser) besteht, weiß, gelb, grün und blutig ist, wobey die Nase an der Scheidewand Röthe, Hitze und Geschwüre hat, und eine oder beyde Drüsen seitwärts an den Kieferknochen (nicht wie bey der Druse in der Mitte) geschwollen sind. Diese Drüsenknoten lassen sich, als zwey eyrunde Körper, angreifen und verschieben. Es fließt anfangs allezeit nur ein Nasenloch, und das Pferd ist munter, frißt und säuft, wie gewöhnlich. Wenn schon Geschwüre in der Nase sind, und die ausfließende Materie vermischt und vielfarbig, gelbgrünlich oder röthlich aussieht, so ist das Pferd verlohren, und muß todgestochen werden; ist aber die Krankheit noch in ihrem Anfange, so kann sie zuweilen noch gehoben werden. Der Ausfluß hört auch wohl eine Zeitlang auf und dann kann ein unvorsichtiger Käufer sehr betrogen werden. Die Knoten unter der Kinnlade verrathen aber auf jeden Fall die Krankheit. Im Allgemeinen wird sie eben so behandelt wie die Druse und zu der Latwerge mit Wachholder, Gentianwurzel und Galgant setzt man nur noch 4 Loth Schwefel des Spiesglases. Ein anderes Mittel ist dieses: man schlägt dem Pferde die Halsader, und läßt ihm ohngefähr 3 Pfund Blut wegfließen. Alsdann kocht man zwey Händevoll Fliederblumen (Hollunder), und eben so viel Käsepappeln mit 1 Pfund Wasser und 1 Pfund Pottasche. Dieß spritzt man durchgeseigt und lau dem Pferde täglich drey-

bis

bis viermal in die Nase. Nebenher kann man ihm auch einen Beutel mit gekochter Gerste anhängen, deren erweichenden Brudel es in die Nase ziehen muß. Wenn man die vorige Einspritzung vierzehn Tage wiederholt hat, so nimmt man ferner zwey Hände voll rothe Rosen, kocht sie mit einem Pfund Wasser, seigert dieß durch, mischt ein Pfund Kalchwasser und zwey Löffel voll gelben Honig drein, und spritzt es dem Pferde lau ein. Dabey bekömmt endlich das Pferd folgendes Pulver: Mineralmohr (Aethiops mineralis), Pockenholz, Schwefelblumen und Jalappenwurzel, von jedem ein halb Loth, zusammengestoßen, und alle Morgen eingegeben. Ein sehr gutes Mittel wider den Rotz soll noch folgendes seyn, das aus der Vieharzneyschule zu Paris herstammt. Man thut eine hinlängliche Portion Kalch in ein Gefäß und gießt allmählig so viel Wasser darauf, als zum Ablöschen erfordert wird. So wie dieser Kalch allmählich löscht, gießt man immer mehr Wasser zu, um ihn zu verdünnen, seigt das Wasser durch und tränkt die Pferde damit. Dabey spritzt man ihnen des Tags zwey- bis dreymal folgende Auflösung ein. Man nimmt 40 Gran Mercurium sublinatum corrosium, löst sie in 20 Loth Weingeist auf und giebt davon 2 Loth in einem Pfunde abgekochten Leintrank ein. Andere rathen das kranke Pferd alle 10 bis 14 Tage mit einer Pille aus 1 1/2 Leberaloe, 1 Loth gereinigtem Weinstein, 1/2 Quentchen versüßtem Queckssilber und weißer Seife zu reinigen. Diese und ähnliche Arzeneyen helfen freylich nichts, wenn, wie gesagt, das Geblüt schon zu sehr verdorben ist. Allein es hat

zu unsern Zeiten ein berühmter Stallmeister ein geheimes Mittel erfunden, welches noch nie fehlgeschlagen haben soll. Man bekommt es in Frankfurth am Main bey Hrn Wierz. Ein Topf von 1 1/2 Pfund kostet nebst dem Gebrauchszettel 8 Gulden.

Man unterscheidet gewöhnlich dreyerley Arten von Rotz, den Lungenrotz, wo man bey der Oeffnung die Lunge voller kleiner und großer Geschwüre von der Größe eines Hirsenkorns bis zur Größe einer Erbse findet, den Hirnrotz, wo die Materie bis zum Gehirn hinauf steigt und alle Kanäle des Kopfes eitern, und den Nierenrotz, wo die Nieren angegangen sind. Alle diese Erscheinungen finden dann erst statt, wenn das Thier schon incurabel ist, und die Scheidewände der Nase sind dann ganz zerfressen.

3) Der Wurm *), (Springwurm, Pferdepocken). Eine ansteckende und schwer zu heilende Krankheit. Es entstehen an dem Halse, dem Körper oder den Beinen des Pferdes Knoten von der Größe einer Haselnuß, welche zuweilen auch länglich und von der Dicke eines Fingers sind. Diese Knoten brechen auf, sehn alsdann aus, wie Speck, und geben eine fette und zähe Feuchtigkeit von sich. Wenn sich viele Knoten an einer Stelle des Körpers öffnen, so entsteht ein ausgebreitetes Geschwür, das immer weiter um sich greift, wie der Krebs. Fließt dem Pferde zugleich die Nase, so ist es heftig angesteckt, und dieß nennt man den innern Wurm.

Diese

*) Ohngeachtet dieses Namens ist doch bey dieser Krankheit an nichts weniger, als an einen Wurm zu denken.

Diese Krankheit, welche die Hengste mehr als die Stuten befällt, kann erzeugt werden, wenn das Pferd von schwerer Arbeit sogleich in Ruhe kömmt, oder wenn es nach einer Krankheit auf einmal zu viel frißt, oder fehlerhaftes Futter erhält.

Man heilt sie gewöhnlich auf folgende Art: man läßt dem Pferde vier Pfund Blut aus der Halsader weglaufen, und giebt ihm alle Morgen zwey Loth von einem Pulver, welches aus fein gestoßenem Pockenholz, Spießglas und Schwefelblumen, von jedem gleich viel, besteht. Statt dieses Pulvers kann man ihm auch täglich ein halb Loth von dem sogenannten Mineralpulver mit Mehl und Honig zu einer Latwerge gemacht, eingeben.

Die Geschwüre heilen geschwind, wenn man sie mit einer Bähung wäscht, die aus einem halben Quentchen Mercurio sublimato, in drey Pfund reinem Wasser aufgelöst, besteht.

Ein Mittel gegen den Wurm, das einige thüringische Curschmiede allezeit, wenn kein anderes anschlagen wollte, mit dem glücklichsten Erfolg gebraucht haben, ist folgendes: man nimmt die innere Rinde der Espenschale, Kreide, Knoblauch, Eicheln, Gartensalbey, Weißwurz, Bilsensamen, Sadebaum und weiße Enzianwurzel, von jedem gleichviel, verwandelt diese Stücke alle in ein Pulver, und giebt dem Pferde, wie die Schmiede wollen, nur bey abnehmendem Monde einmal davon 19 bis 21 Eßlöffel voll auf dem Futter zu fressen; dabey darf das Pferd zwey Stunden nichts zu saufen und zu fressen bekommen, und es muß ihm drey Wochen hintereinander, jede Woche einmal, zur Ader gelassen werden. Verschwindet

schwindet die Krankheit nicht, so muß die Cur den folgenden Monat wiederholt werden.

Die Hufschmiede theilen diese Krankheit in verschiedene Arten ein, als den Mehlwurm, fliegenden Wurm, (Reutwurm) Strickwurm, verkehrten Wurm, krebsartigen Wurm und innern Wurm. Es sind dieß aber nur bloße Benennungen von eben derselben Krankheit, welche den verschiedenen Grad des Uebels bezeichnen. Die Heilung ist immer dieselbe.

4) Die Darmgicht (Verstopfung, Kolik, fälschlich Feivel). Das Pferd windet sich, will nicht fressen, stampft mit den Füßen oder wälzet sich, es schwillt ihm der Bauch und es kann nicht misten. Sie entsteht theils von unreinem, theils von verdorbenem Heu und Hafer, theils von versetzten Winden, die von schlechter Fütterung herrühren. Wenn man gestoßene Krebsaugen mit Wein dem Pferde eingießt, es reitet, und nicht zum Liegen läßt, so soll es genesen. Nachdem es genesen, purgirt man es mit folgendem Mittel, welche Purganz auch in andern nöthigen Fällen gut ist.

Leberaloe	5 Quentchen.
Schwarze Nießwurz	2 Quentchen.
Verfüßt Queckfilber	1 Loth.
Cremor Tartari	1 Loth.

Honig so viel genug ist zu einer Pille.

5) Der Strengel (Bräune) entsteht von einem Geschwüre oder von einer Entzündung im Halse, wo das Pferd den Hals steif hält, sein Futter käuet und fressen will, aber nicht niederschlucken kann. Die Ursachen dieser Krankheit sind plötzliche Erkältung oder staubiges

und

und beregnetes Futter. Aderlaß und Klystire, innerlich aber Buttermilch, Salpeter und Vitriolspiritus unter das Getränke sind die besten Gegenmittel. Man will auch diese Krankheit durch eine Aderlasse, und durch Einspritzungen von Honig und lauigem Wasser heben.

6) Die Rehe (Verfangenheit, Verschlagen). Diese Krankheit macht das Pferd, wie die Gicht bey dem Menschen, an einem oder mehrern Gliedern oder am ganzen Körper lahm und steif, so daß es sich nur mit Mühe und großen Schmerzen bewegen kann, und rührt von Erkältung, von übertriebener Arbeit, von Mangel an Bewegung bey starker und überflüßiger Fütterung, von jähling abwechselndem Futter, oder einem kalten Trunke nach einer Erhitzung, her. Die Rehe wird gehoben, wenn man die stockende Ausdünstung, oder den zurückgebliebenen Schweiß des verfangenen Theils wieder zu bewirken sucht, und den Theilen, die steif sind, Bewegung verschafft. In Schweiß kann man das Pferd bringen, wenn man es langsam und egal mit einem Strohwisch reibt, mit einer warmen Decke überlegt und ihm einen Trank von 2 Loth Hirschhornspiritus, mit etwas Honig und 1/4 Pfund Brandewein versetzt, eingiebt.

7) Der Durchlauf (Durchfall). Man kennt dreyerley Arten:

a) Wenn das Pferd dünn mistet. Dieser giebt sich von selbst wieder.

b) Wenn ein zäher Schleim vom Pferde geht, oder wie die Schmiede sagen, das Fett dem Pferde geschmolzen ist. Hier bekömmt das Pferd ein Clystier

stier von 1/2 Pfund Leinöhl, mit zwey Eyerdottern, und 2 Pfund lauem Wasser, und innerhalb täglich zweymal 1/2 Pfund Leinöhl mit 1/2 Loth Salpeter und 1 Loth gepülverter Enzianwurzel.

b) Wenn das Pferd Blut mistet. Dieser Durchfall ist gewöhnlich mit einem Fieber verbunden. Das Pferd bekömmt zweymal des Tages ein Clystier von Wasser mit Leinsaamen gekocht, und innerlich wird ihm alle Morgen 1/2 Pfund Leinöhl mit eben so viel Honig und einem Quentchen gestoßenen Alaun eingegeben.

8) Der Koller oder Schwindel. Es giebt zweyerley Arten, *a*) den stillen, und *b*) den rasenden, wüthenden.

Bey der ersten Art verhält sich das Pferd ruhig, sieht vor sich hin, stößt blindlings an alles an, läßt das Futter aus dem Maul fallen, sich den Finger tief ins Ohr stecken, ohne zu schütteln, und die Beine übers Kreuz setzen, ohne sie weg zu bewegen. Bey der zweyten aber, die zuweilen eine Folge der ersten Art ist, tobt es und raset, und läßt nicht ohne Gefahr an sich kommen. Beyde Arten sind fast unheilbar. Mit Aderlassen bis zur Ohnmacht, mit Hunger, stätem Kopfwaschen mit kaltem Wasser, einem Fontenell an der Brust, lassen sie sich zuweilen heben. Man giebt auch innerlich folgende Lattwerge mit gutem Erfolg: 4 Loth Salpeter, und Honig so viel als zu einer Latwerge nöthig ist. Von derselben giebt man dem Pferde ein Hühnerey groß mit einem Quentchen Amoniak Gummi vermischt, auf einem hölzernen Spaten ein. Einige geben auch folgenden

genden Trank: Vier Loth gereinigten Salpeter, 2 Loth eröffnenden Eisensafran und 12 Loth Brunnenwasser untereinander gemischt. Man giebt Morgens und Abends die Hälfte. Es muß dabey gute Diät gehalten und sparsam gefüttert werden.

9) Das Blutstallen. Rautensaft mit lauem Wein stillet es.

10) Die Entzündung. Der Eiter wird mit Bleyeßig (acetum saturninum) allzeit vertrieben.

11) Der Tripper und die Entzündung, welche bey den Hengsten entweder von selbst aus Geilheit, oder wenn sie zu stark gereizt werden, entstehen, werden ebenfalls durch Einspritzungen des Bleyeßigs gänzlich curirt.

12) Der Feivel, wenn das Pferd oben am Kopf etwas aufbricht, welches den Mähnen herabeitert, rührt von unreinem Geblüte. Rother Gundermann dem Pferde zerstoßen in die Nase geblasen, soll ihn vertreiben.

13) Das Vernageln wird durch gestoßene und aufgelegte Schafgarbe unfehlbar geheilet.

14) Das Satteldrücken entsteht theils vom schlechten Reiten, theils wenn der Sattel nicht paßt, theils zuviel oder nicht gut aufgepackt wird. Durch folgendes Mittel lassen sich dergleichen Verwundungen bald heilen: Alaun, Salmiak, Grünspan, blauen und weißen Calixtenstein, Weinstein und englisch Kupferwasser, von jedem für einen Groschen, alles in einem neuen Tiegel zerfließen lassen, in ein starkes Papier gegossen, davon taglich eine Haselnuß groß genommen, in Wasser aufgelöst, und den Geschwulst oder die Wunde so lange damit gewaschen, bis der Schaden geheilt ist.

15)

15) Die Räude, welche bey den Pferden Schabe heißt, vertreibt man mit einer scharfen warmen Lauge von Holzasche, Kalch und Hühnermist, womit man sie wäscht und alsdann eine Decke darüber breitet.

16) Das Feuer, wo die Haut aufliegt. 1/2 Nösel Senf, 1/2 Nösel Siebenseiden, 1/2 Pfund grauen Schwefel, 1/4 Pfund Lorbeer, 1/4 Pfund Enzian, 3 Finger voll Kümmel. Früh beym ersten Futter 1 Löffel, und Abends beym letzten Futter 1 Löffel darunter gegeben.

Außerdem giebt es noch viele Krankheiten der Pferde, welche aber alle zu beschreiben zu weitläuftig seyn würde, als das hitzige und kalte Fieber, die Lungensucht, Engbrüstigkeit, Haarschlechtigkeit, Verstopfung des Harns, der Lauterstall, die Krätze, Mauke, Mähnenraude, die Klemmen, verschiedene Beulenkrankheiten, Ueberbeine, Feigwarzen, Hornklüfte, den Bugwurm, Stollenschwamm, Leist oder Schale, die Flußgalle, Steingalle, den Blutspat, Wasserspat, Ochsenspat, Hahnenspat, trocknen Spat, die Steingallen, Geschwüre an den Füßen, Entzündungen der Augen u. a. m.

Der Pferdebezoar (Hippopolithos) ist ein eyrunder Körper, in dem Magen, den Gedärmen oder der Blase der Pferde, welcher oft etliche Pfund wiegt, und zuweilen tödlich ist.

Feinde.

1) Der Bär und der Wolf fällt das Füllen und auch zuweilen das Pferd an.

2) Plage verursachen den Pferden folgende Insekten und Würmer:

Die

Die Pferdelausfliegen und die ungeflügelten Pferdeläuse (Hippobosca equina et Pediculus equi), welche die Säfte der Falben, Rothschimmel und Schäcken besonders lieben. Sie werden durch Waschen mit Tabakslauge vertilgt.

Die rothafterige Pferdebremse (Oestrus hemorrhoidalis), welche dem Pferde, wenn es mistet, ihre Eyer an das Ende des Mastdarms legt, wo sie auskriechen, und als Larven in den Falten der Därme sich aufhalten. Die Nasenbremse (Oestrus nasalis), welche ihm die Eyer in die Nase legt, von wo die Larven durch den Schlund bis in den Magen schlüpfen oder sich auch in der Schlundhöhle aufhalten. Diese Insecten werden oft tödtlich, indem sie bey magern Pferden in Menge den Magen durchfressen. Zur Befreyung von dieser Beschwerde dienen fette Oehle, brennbare Geister und eine gesättigte Auflösung des Kochsalzes. Auch hilft den Pferden Schwefeldampf in die Nase gehen zu lassen oder eine starke Prise Rappetabak in die Nase gerieben.

Die Stechfliege (Conops calcitrans), welche im August die Pferde sonderlich durch Aussaugung des Bluts, so wie die Ochsenbreme, Riesenbreme, Dorfbreme, Grasbreme und Blinzelbreme (Tabanus bovinus, Gigas, rusticus, bromius et coecutiens), plagt.

In den Eingeweiden wüthen ferner oft folgende Würmer. Der Pferderundwurm (Ascaris gigas s. equi), der oft wie ein kleiner Finger dick und über einen Fuß lang ist. Man vertreibt diese Würmer da-

durch, daß man den Pferden eine Handvoll Salz in den Hals steckt. Der Haarwurm (Trichuris). Er weicht durch die gewöhnlichen Weidenblätter zu ganzen Nestern fort. Die Bandwürmer (Taenia, Palisadenwürmer (Strongylus) und Egelwürmer (Fasciola) sind ihnen auch oft sehr beschwerlich *).

Nutzen.

Daß die Pferde sehr nützliche Thiere sind, die sowohl durch ihre Dienste und Kräfte, als auch durch verschiedene wichtige Produkte und Theile ihres Körpers nützen, zieht wohl niemand in Zweifel. Ihre Sanftmuth, welche nur gegen Feinde und gegen große Beleidigungen in Zorn übergeht, und ihre Gelehrigkeit und Stärke macht sie zu solchen nützlichen Hausthieren, welche beynahe dem ganzen Menschengeschlecht unentbehrlich geworden sind. Sie dienen in der Landwirthschaft, bey den Posten, im Kriege und beym Handel durch Reiten, Ziehen und Lasttragen. In der Oekonomie zieht man zwar die Ochsen vor, weil diese auch noch, nachdem sie getödtet sind, durch ihr Fleisch nützen; allein wenn man bedenkt, daß ein Pferd dreymal mehr, als ein Ochse, verrichtet, so behalten die Ochsen nur einen Vorzug in so fern, daß sie in bergigen Gegenden besonders zum Pflügen

*) Ueber diese und fast alle bekannten Eingeweidewürmer der Säugethiere siehe: Goeze Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Blankenburg 1782. 4.

Pflügen wegen ihres langsamen, gewissen und anhaltenden Ganges besser benutzt werden können, als die Pferde.

1) Im Reiten nützt und vergnügt das Pferd, wenn wir seinen natürlichen Gang betrachten, in Gegensatz des künstlichen, der auf der Reitbahn ausgebildet wird:

a) Durch seinen Schritt, wo zuerst der rechte Vorderfuß, hierauf der linke Hinterfuß, alsdann der linke Vorderfuß, und zuletzt der rechte Hinterfuß aufgehoben wird;

b) durch seinen Trab, wo der rechte Vorderfuß und linke Hinterfuß zu gleicher Zeit, darnach der linke Vorderfuß und der rechte Hinterfuß ebenfalls in einem Augenblicke aufgehoben werden; und endlich

c) durch den Gallopp, welches eine Art von Springen ist. Der linke Hinterfuß kömmt hierbey zuerst auf die Erde zu stehen, um dieser wallenden Bewegung zu einem Ruhepunkte zu dienen, hierauf hebt sich der rechte Hinterfuß mit dem linken Vorderfuß zugleich in die Höhe, und diese beyden kommen auch wieder zu gleicher Zeit auf die Erde, zuletzt wird der rechte Vorderfuß, welcher gleich nach dem linken Vorderfuß und rechten Hinterfuß aufgehoben wird, wieder niedergesetzt.

Es giebt aber auch Pferde, welche von Natur einen sonderbaren Gang haben, der einen Mittelgang zwischen dem Trabe und Schritt ausmacht, und

d) der Paß genennt wird. Das befremdendste hierbey ist, daß bey einem Schritte die beyden Schen-

kel der einen Seite, z. B. der rechte Vorder- und Hinterschenkel zugleich sich fortbewegt, und daß hierauf die beyden linken Schenkel im Fortschreiten den zweyten Schritt ausmachen. Dieser geschwinde Gang ist für den Reiter sehr bequem, weil er nicht stößet; mattet aber das Pferd ab, und soll auch nur schwachen Pferden besonders eigen seyn.

Die englischen Pferde sind wegen ihrer außerordentlichen Schnelligkeit im Laufen sehr berühmt. Man hat Beyspiele, daß ein Wettrenner in 22 Minuten einen Weg von einer deutschen Meile zurückgelegt hat.

Die Reitkunst beschäfftigt sich mit dem Abrichten der Pferde, ihrer gehörigen Zäumung und übrigen Behandlung. Es erfordern aber die gemeinen Reitpferde, die Jagd- und Parforcepferde, Schußpferde, Kriegspferde, Schulpferde, Paradepferde, Springer u. s. w. jedes seine besondere Abrichtung.

2) In Ansehung des Fuhrwesens ist das Pferd ganz unentbehrlich. Seine Stärke darzu hat es vorzüglich in den Schultern.

Ein starkes thüringisches Pferd fährt 10 bis 12 Centner Fracht.

Paradepferde für Chaisen erfordern auch wie die Reitpferde eine besondere Abrichtung.

3) In ebenen Gegenden werden mit ihnen die vorzüglichsten Stücken des Ackerbaues, das Pflügen und Eggen besorgt.

4) Sie werden auch in manchen Gegenden zum Tragen gebraucht. Man legt ihnen dann die Lasten in Säcken oder Körben auf.

5) Zum

5) Zum Betrieb der Maschinen wählt man die Pferde nur dann, wenn man keinen Gebrauch von Wasser, Wind und andern bewegenden Kräften machen kann. Hier wirken sie am besten im horizontalen Zuge an Deichseln von stehenden Wellen.

6) Man läßt auch von alten Pferden Maschinen durch Treten vermittelst sogenannter Tritträder in Bewegung setzen. Die Morgenländer lassen sie das Getraide austreten, in Schonen treten sie den Thon in den Ziegelhütten u. s. w.

7) Das Fleisch der Pferde wird von den Europäischen cultivirten Völkern gewöhnlich nicht gegessen, aber die südlichen Polacken, welche wilde Gestüte haben, jagen die Pferde und essen sie, und die Kalmucken, Tataren, und die Negern an der Küste von Guinea finden ihr Fleisch ebenfalls sehr schmackhaft, und den Kopf besonders delikat. Die Kalmucken, die doch Schafe und Rinder im Ueberfluß haben, ziehen das Fleisch der Füllen allem andern vor *).

8) Die frische Pferdemilch ist erfrischender als andere. Die Tataren, Kalmucken, Mongolen

*) Im Jahr 1784 that der Schwedische Hof, um dem Fleischmangel abzuhelfen, den Vorschlag, Pferdefleisch zu essen, setzte Prämien und Pensionen auf die Befolgung desselben und begünstigte ihn durch sein eigen Beyspiel. Man sah es damals als ein Schibolet der Königlichgesinnten an, daß sie entweder selbst Pferdefleischesser waren oder doch den Genuß desselben empfahlen. Allein alle Bemühungen, dieser Neuerung Dauer zu geben, waren vergeblich.

und andere wandernde Völker trinken die saure täglich, als ihren gewöhnlichen Trank. Sie machen auch aus derselben, weil sie mehr geistige, als fette Theile hat, ein berauschendes Getränke, Kosmos genannt, und gute Käse *).

9) Mit den Vorderzähnen, welche in Holz eingefaßt werden, glättet der Buchbinder das Papier und die Bücherdecken, und die Backenzähne können, wie die Backenzähne der Elephanten, verarbeitet und polirt, und zu ausgelegter Arbeit verbraucht werden, da sie alsdann wie Agath aussehen. — In Irrland macht man schöne Knöpfe daraus.

10) Das Kammfett, das die Abdecker vom Hals des Pferdes ausschmelzen, wird von den Gerbern, Schustern und in der Oekonomie gebraucht, um das Leder geschmeidig zu machen und zu erhalten.

11) Die Harnblase macht man zu Tabaksbeuteln und zu großen Bällen, und verbindet auch Gläser und Flaschen damit.

12) Die Pferdehaut wird zu Sohlen- und Riemenleder, zu Juften, und ächten orientalischen Chagrain gegerbt. Die Kalmucken verfertigen noch Pallas Gefäße daraus, welche von kochendem Wasser nicht erweichen, und dem Getränke auch keinen Geschmack mittheilen. Die Häute mit den Haaren werden von den Chinesern zu Kleidungen getragen.

13) Die Sehnen hinten am Fuße kaufen unter dem Namen der Roßadern die Sattler und Orgelbauer,

*) Pallas Reise I. 315. J. G. Gmelins Reise I. 273.

bauer, welche letztere sie zum festen Verbinden der Falten an den Orgelbälgen brauchen.

14) Die Pferdehaare werden auf verschiedene Art genutzt. Aus den Haaren der Mähne und des Schweifes macht man Schlingen, um Vögel zu fangen, Bezüge auf Geigenbogen und sonst verschiedene Arten von Gewürken, als Halsbänder, Armbänder, Knöpfe, Haarsiebe, Stricke, Angeln u. s. f. Die gesottenen Pferdehaare geben die gesundesten Betten und Kanapees, besonders wenn man Stahlfedern dabey anbringt. Sie werden auch zu Ausstopfung der Buchdruckerballen, Spielbällen u. s. f. verbraucht.

Die kurzen Haare der Haut werden zu Pinseln, Hüten, Bürsten, Seilen, zu Matratzen, welche keine Feuchtigkeiten an sich ziehen, zu Ausstopfung der Sättel, Polster, Kissen, Stühle und anderer Meublen angewendet.

Der Roßschweif ist in der Türkey ein Ehrenzeichen des Kaisers und der Großen. Er wird auch von verschiedenen berittenen Soldaten zur Verzierung ihrer Kaskette gebraucht.

15) Aus dem Hufe werden Kämme und verschiedene Dinge vom Horndrechsler verfertiget. Sonst wird er calcenirt zum Berlinerblau verwendet, geraspelt als Dung auf die Aecker gestreut, zum Cement- oder Brennstahl, so wie zur Bereitung des flüchtigen Laugensalzes für die Salmiakfabriken gebraucht.

16) Der hitzige Pferdemist taugt nur auf zähe, kalte Thon- und Lehmfelder mit vielem Stroh, thut aber

in Mistbeeten gute Dienste, und wo man Gewächse schnell treiben will.

Gedörrter Pferdemist mit Kleyen vermischt, soll in der Hornseuche und Lungenfäule der Schafe eine Arzeney seyn.

Bey Futtermangel lassen sich die Schafe, Schweine, und das Hornvieh mit frischem Pferdemist, wenn etwas Mehl, Kleyen, Spreu und anderes Futter darunter gemengt wird, füttern.

Der Pferdemist wird gebraucht, um das Bley zu Bleyweiß zu machen, indem man die Töpfe, in welchen Essig und Bley ist, in denselben verscharret; der durch seine Hitze dünstende Essig zerfrißt das Bley und verwandelt es in Bleyweiß.

Die Egyptier um Kahiro gebrauchen den Ruß von gebranntem Pferdemiste zu Salmiak. Man kann auch mit diesem Miste die Maulwurfsgrillen (Gryllotalpa) vertreiben. Man macht nämlich zu Anfang des Herbstes in Gegenden, wo diese schädlichen Insekten sich aufhalten, Gruben in die Erde, welche man mit Pferdemist ausfüllt, und wieder mit Erde bedeckt. Im folgenden Frühjahr öffnet man diese Gruben und findet eine Menge alter Maulwurfsgrillen, die sich hier versammelt haben, und tödtet sie mit sammt ihrer Brut. Wenn man frischen Pferdemist kocht, oder in warmes Wasser einweicht, und erfrorne Füße zwey Stunden in diese Masse setzt, so wird nicht nur der Frost aus denselben gezogen, sondern sie werden auch gänzlich geheilt. Eben derselbe giebt mit Lehm, Salzwasser, ungelöschten Kalch, Ziegel- und Glasmehl, Hammerschlag,

Feil-

Feilspänen, Kühhaaren, frischem Rinderblut und Wasser, einen sehr dauerhaften Ofenkitt (lutum sapientiae).

Schaden.

Wenn man sie auf nassen Wiesen weidet, so zertreten sie den Boden, und zupfen die Graswurzeln aus.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Es ist eine ungegründete Sage, daß der lähmende Rüsselkäfer (Curculio paraplecticus, L.) auf dem Wasserschierlinge eine Art Lähmung, die Paraplexiekrankheit, verursache, die man mit Schweinekoth curirt. Der Verdacht möchte eher auf die Pflanze selbst fallen.

2) Daß eine gewisse Raupe in der breitblättrigen Rohrkolbe (Tipha latifolia, L.) den Pferden eine Wurmkrankheit verursachen soll, ist noch nicht erwiesen. Man müßte die Raupen oder Puppen in einem solchen Pferde finden. Naturforscher XI. 30. Taf. 3. Fig. 1—4.

3) Die Pferde sollen Gespenster sehen. Die Knechte und Postillions sagen, daß die Pferde gleich wüßten, wo es nicht richtig sey. Daß sich aber die Pferde des Nachts beym Aufstoßen von etwas Ungewöhnlichen, einer Fledermaus, Eule, dem Aasgeruch vom Galgen u. s. w. wild gebeerden, rührt von ihrer natürlichen Scheuheit und Furchtsamkeit her.

4) Die Würmer sollen den Pferden in den Magen gehext werden.

5) Gegen behexte Pferde ist ein in einem neuen Topfe zu Pulver gebranntes Wiesel das beste Mittel.

6) Wolfsleber zu Pulver gestoßen und in die Luft gestreut, so gehen die wildesten und flüchtigsten Pferde nicht weiter, als bis es verflogen ist.

7) Sonst brauchte man in der Medicin (und einfältige Leute brauchen es noch) Milch, Blut, Mark, Urin, Schweiß, Fett, Fleisch, Warzen, Huf, Fohlennahrung, Hoden, Schwämme, die ersten Zähne, den Roßbezoar und die Haare der Pferde.

8. Der Landmann hebt das Fruchthäutchen (Amnios), wenn ein Hengstfohlen gebohren wird, sorgfältig auf, trocknet es, schneidet es dann klein, und giebt es den Pferden auf dem Futter. Dieß soll starke, gesunde und muthige Pferde machen.

(2) 2. Der Esel.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Hausesel, Steinesel. Männchen: Eselhengst; Weibchen: Eselstute.

Equus Asinus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 211. n. 2.

Ane. *Buffon* hist. nat. IV. 337. Ed. de Deuxp. I. T. 1. f. 2. Uebers. von Martini I. 187.

Ass. *Pennant* hist. of Quadr. I. 8. Meine Uebers. I. 8.

v. Zim-

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 178.
v. Schrebers Säugethiere. V. Taf. 312. 313.
Goeze's Fauna. III. 346.
Donndorfs Zool. Beytr. I. 717. Nr. 2.

Kennzeichen der Art.

Mit langen Ohren, bloß am Ende behaartem Schweife und einem dunkeln Kreuz über die Schultern beym männlichen Geschlecht.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Wir reden hier eigentlich vom zahmen Esel (Equus Asinus domesticus, *Lin.*), dessen Stammvater der sogenannte wilde Esel oder Kulan (Eq. Asinus ferus s. Onager, *Lin.*) *) ist, der sich noch jetzt heerdenweise in der großen Tatarey in den dürren und bergigen Wüsten bis zum 48ten Grad der Breite aufhält, im Herbst in unzähligen Schaaren südlich gegen Persien und Indien zieht und daselbst überwintert. Dieser ist nicht nur größer, sondern auch schöner gebaut, als unser gewöhnlicher deutscher zahmer Esel. Der Kopf ist mehr gebogen, die Ohren stehen aufrecht, der Leib ist schlanker, und die Beine sind dünner und höher. Die Hauptfarbe ist silberweiß; der

*) Pallas neue nordische Beyträge II. 22. Taf. 1. 2.

der Obertheil des Gesichts, die Seiten des Halses und Leibes sind blond; der Hintertheil der Schenkel eben so, der Vordertheil von den Weichen an durch eine weiße Linie getheilt, welche sich rund um den Rumpf herum bis zum Schwanze ausdehnt; Bauch und Beine sind weiß; längs der Schärfe des Rückens hin, von der schwärzlichen wollhaarigen Mähne an, bis zum Schwanze, läuft ein kaffeebrauner Streifen von buschigen, gewellten Haaren, der auf dem Hintertheile am breitesten und gegen den Schwanz zu wieder schmäler wird, ein anderer von der nämlichen Farbe, bildet mit demselben (beym Hengste) ein Kreuz über die Schultern, wie wir es auch beym zahmen Eselhengst sehen; der Rückenstreif und die Mähne sind auf jeder Seite mit einer schönen weißen Linie eingefaßt. Der Winterbalg besteht aus feinen, sanften seidenartigen, wellenförmigen, und der Sommerbalg aus glatten, weichen seidenartigen, mehr einfarbigen Haaren.

So schön nun, wie dieser wilde Esel, ist freylich unser zahmer, wenigstens in Deutschland, nicht. Und da wir ihn noch überdieß mit der schönen Gestalt, Farbe und dem Feuer des Pferdes zu vergleichen pflegen, so ist er in Deutschland und fast in allen nördlichen Gegenden, wo er immermehr an Häßlichkeit und Trägheit zunimmt, ein Gegenstand der Verachtung und des Spottes, welches er doch wegen seiner Güte, Geduld, Genügsamkeit und vorzüglichen Nutzbarkeit wirklich nicht verdienet. Der große und schwere Kopf, die langen und schwankenden Ohren, der breite und dicke Hals, die schmale Brust, der fast schneidende Rücken, die Hüften,

welche

welche höher sind als das Vorderroß, das platte Kreuz, der kahle Schwanz, die engen Hinterschenkel machen ohnstreitig, daß er neben dem stolzen und schönen Pferde eine demüthige und plumpe Rolle spielen muß. Doch findet man in Arabien Esel, die wegen ihrer Schnelligkeit, wegen ihres Muths, ihrer Stärke und Schönheit sehr hochgeschätzt werden. Sie haben ein glattes Haar, einen hohen Kopf, leichte Schenkel und werden zum Reiten gebraucht. Auch Italien und Spanien bringt schon so schöne Esel hervor, die man mit 100 Rthlr. und drüber bezahlt. Vielleicht kommt die üble Gestalt, Faulheit und Trägheit unserer Art daher, daß sie unser rauhes Futter und die rauhe Luft nicht wohl gewohnt werden können; denn die Erfahrung lehrt, daß ihre Größe von dem Himmelsstriche abhängt, unter welchem sie wohnen; je kälter und rauher dieser ist, desto kleiner und schwächer fallen die Esel aus.

Mit dem Pferde hat der Esel nur der allgemeinen Form in der Gestalt der Theile nach Aehnlichkeit. Die Größe unsers thüringischen Hauesels vom Kopf bis zum Schwanz ist gewöhnlich 5 Fuß 4 Zoll, und die Höhe 3 bis 6 Zoll *). Die Höhe der Beine ist 1 Fuß 9 Zoll; der Kopf hält 1 Fuß 4 Zoll, die Ohren 9 Zoll 6 Linien und der Schwanz 2 Fuß. Diejenigen, welche in

*) Dieß ist das fast allgemein bekannte Werkmaaß oder Leipziger Maaß. (Taf. I. Fig. 2.) Nach dem Pariser Maaß (Taf. I. Fig. 3.), wornach in der Naturgeschichte die Thiere ausgemessen sind und werden, ist die Länge fast 5 Fuß, und die Höhe fast 3 Fuß.

in Gestüten großer Herren, nicht bloß für sich, sondern auch und vorzüglich wegen der Maulthierzucht gehalten werden, sind größer und in Rücksicht der Verhältnisse und Gestalt der Theile und Glieder noch schöner. s. Fortpflanzung. An unsern gewöhnlichen hat der dicke Kopf lange, breite, schlaffe Ohren, die sich nach dem Schall nach Gefallen, langsam bewegen. Die graubraune Augen stehen an der breiten Stirn weit voneinander, und ihr Blick ist traurig. Die Lefzen sind dick und herabhängend. Die Anzahl seiner Zähne ist 36, und er wechselt sie, wie das Pferd. Der Hals ist lang, steht stets gerade ausgestreckt, und ist mit einer kurzen Mähne behangen. Der Rücken ist gebogen, und der Bauch unförmlich breit. Die schlanken Beine, die schönsten Gliedmaßen am ganzen Esel, haben einen grauen Huf.

Sein dickes Fell ist mit langen, unansehnlichen, steifen, etwas gekräuselten Haaren überzogen. Die Farbe ist sehr verschieden. Eigentlich ist sie ein besonderes grau, das man das Eselgrau nennt. In den Weichen ist er weiß oder weißlich, an dem Hals und den Füßen mit einigen schwarzen Linien, und auf dem Rücken mit einen schwarzen Kreuz versehen. Sonst giebt es mausefahle, aschgraue, bläuliche, fuchsrothe, bräunliche, schwarze, schmutzig weiße, und mit allen diesen Farben gefleckte und gesprenkelte Esel.

Merkwürdige Eigenschaften.

Die unangenehme Gestalt hat ihnen die Natur durch ein gutes Gesicht, vortreffliches Gehör und einen außerordentlich feinen Geruch zu ersetzen gesucht.

Sie

Sie erlangen ein Alter von 36 Jahren.

Ihre Affekten drücken sie durch ein ängstlich ausgestoßenes, fürchterlich klingendes Hinhan-Geschrey aus, das wechselsweise aus hohen Tönen in tiefe, und aus tiefen wieder in hohe übergeht. Die Eselin schreyt höher und schärfer; der verschnittene Esel aber tief und schwach. Ihr Knochengebäude ist dem Pferde völlig gleich.

Die schlechte Erziehung und Sorgfalt, die man auf diese verrufenen Thiere wendet, veringern allerdings ihre Fähigkeiten. In ihrer Jugend sind sie aufgeräumt, wälzen und überschlagen sich muthwillig auf der Erde, und machen vielerley poßierliche Wendungen und Sprünge, trottiren und galloppiren; im Alter aber verwandelt sich diese Lustigkeit durch die schweren Arbeiten und elende Kost in Schläfrigkeit und Furchtsamkeit, und wenn sie sich dann wälzen, so geben sie damit zu erkennen, daß ihnen die Haut von verschiedenen Unreinigkeiten jücke, und daß sie reinlich gehalten seyn wollen. Ueberhaupt sind sie vor allen Thieren demüthig, geduldig und gelassen. Alle Züchtigungen ertragen sie ohne Widerwillen, aber die Wirkung derselben ist auch von kurzer Dauer. Sie verabscheuen allen Koth und Nässe, und können nur mit derben Schlägen durchs Wasser getrieben werden; allein man bemerkt mit Vergnügen, wie die natürliche Liebe der Mutter zu ihren Jungen auch dieser natürlichen Scheue widersteht, denn sie wadet durch den tiefsten Fluß, ja fürchtet auch das Feuer nicht, wenn sie dieselben in Gefahr glaubt. Seinen Treiber kennt der Esel unter tausend Personen, und gewöhnt sich so an ihn, daß er ihn von weitem spüret, und aufsuchet. Sein Ge-

dächt-

dächtniß lehrt ihn den Weg, den er einmal gewandert ist, ohne Irrthum wieder finden. Er ersteigt mit der größten Sicherheit und den größten Lasten die steilsten Berge, und geht, ohne zu straucheln, unbeschlagen über spiegelglatte Eisflächen. Seinen Herrn giebt er die Beladung mit einer unerträglichen Last durch Senkung des Kopfs und der Ohren, Aufsperrung des Mauls, und Einziehung der Lefzen zu erkennen. Blendet man ihn durch eine Binde die Augen, so bleibt er stracks steif auf seinem Platze stehen, und legt man ihn mit einem Auge auf die Erde und verdeckt ihm das andere, so bleibt er auch in dieser Lage wie todt hingestreckt. Er schläft noch weniger, als das Pferd, und nur vier Stunden des Tages, besonders legt sich der brünstige Esel und die trächtige Eselin nicht eher, als bey der größten Mattigkeit zur Ruhe. Knochengebäude, Eingeweide und alle innern Theile sind gerade wie beym Pferde.

Verbreitung und Aufenthalt.

Man sagt, daß unser Hause-Esel aus Arabien nach Griechenland, von da nach Italien, von hieraus nach Frankreich, und aus diesem Lande endlich nach Deutschland zu uns gekommen sey. Kältere Gegenden als unser Deutschland kann er nicht wohl vertragen. In Thüringen wird er nur in bergigen Gegenden von den Mühlern und Landleuten zum Lasttragen gebraucht.

Er verlangt zu seinem Aufenthalte einen trockenen und reinlichen Stall.

Nahrung.

So unekel er in seiner Kost ist, welche in schlechtem Gras und Heu, in dornigen Kräutern und Gesträuch, und in Disteln mit Kleyen vermischt, besteht, so eckel ist er in seinem Getränke, welches helles Wasser seyn muß, indem er sich auch nicht durch die härtesten Schläge zum Trinken trüben Wassers zwingen läßt.

Fortpflanzung.

Der Esel geräth im Frühjahr in seine natürliche Brunst, und zwar bey seiner größten Hitze in eine Art von Wuth, die sich aber nur in einem gräßlichen fortdauernden Geschrey äußert, und nicht eher besänftigt wird, bis man ihm die Eselin zuläßt, welches denn auch gewöhnlich im May, Junius und Julius geschieht, wo auch die Eselin am hitzigsten ist.

Der Hengstesel muß groß und stark, nicht unter drey, und nicht über zehn Jahr alt seyn, hohe Schenkel, einen völligen Leib, einen erhabenen und leichten Kopf, lebhafte Augen, weite Nasenlöcher, einen langen Hals, eine breite Brust, ein plattes Kreuz, einen kurzen Schwanz, und ein glänzend weiches, dunkelgraues Haar haben. Die besten Beschälesel sind in Spanien und Mailand zu bekommen; doch findet man auch gute im Romanischen und Genuesischen. Sie sind aber sehr theuer, besonders wenn bemerkt wird, daß man sie für große Herren zur Maulthierzucht kaufen will.

Man hat die Gewohnheit, daß man die Stute nach der Begattung (Beschälung) prügelt, oder von hinten mit kaltem Wasser begießt, weil sie aus Geilheit

nicht leicht zum erstenmal empfängt. Sie trägt 11 Monate und etliche Tage oder gewöhnlich 290 Tage, bekommt im zehnten Monat ihre Milch, und sucht in der Geburtsstunde ängstlich einen dunkeln verborgenen Ort, wo sie eins, selten zwey Füllen zur Welt bringt. Diese saugen 5 Monate, sind in ihren Jugendjahren lustige und artige Thiere, und vermehren sich schon im zweyten Jahre wieder. Sie bedürfen keiner sonderlichen Wartung und Pflege, da sie mit geringer Kost vorlieb nehmen, und nicht leicht erkranken. Sieben Tage nach der Geburt geräth die Mutter schon wieder in Hitze. Sie zeigt außerordentliche Liebe und Zuneigung gegen ihre Jungen, und ist untröstlich, wenn man sie von ihr trennt.

Krankheiten.

Nur selten unterliegt der Esel einer Krankheit des Pferdes, besonders wenn man ihn einen trocknen und im Winter einen warmen Stall zu seinem Aufenthalte anweiset.

Feinde.

Vom Ungeziefer wird er auch wegen seines übelriechenden Schweißes unter allen mit Haaren bewachsenen Thieren am wenigsten angefochten. Zuweilen findet man die Eselslaus (Pediculus Asini) auf ihm, und in seinen Gallengängen die Egelwürmer (Fasciola.)

Nutzen.

Der Nutzen dieses so gering geachteten Hausthiers ist von der größten Wichtigkeit. Auf dem schöner gewachsenen und flüchtigern Esel, welcher wie ein Pferd

schreitet,

schreitet, trabet und gallopiert, nur daß alle diese Bewegungen klein sind, und weit langsamer geschehen, wird in Italien, Spanien, der Türkey und überhaupt im Orient geritten, und in gebirgigen Gegenden ist der schwere träge Landesel dem Müller und Landmann, der Lasten durch steile und gefährliche Wege fortschaffen soll, fast unentbehrlich. Auch zum Wegschaffen des Erzes in gebirgigen Bergwerken ist er brauchbar. Er trägt eine Ladung von 3 Cent. und mehr, von einem Knaben regiert, sicher an ihren Bestimmungsort, und kann daher unter allen Thieren nach Verhältniß seiner Größe, die schwerste Last tragen. In trocknen, leichten und sandigen Boden zieht er auch den Pflug z. B. in Aleppo.

Die Milch der Eselin, welche der Menschenmilch am nächsten kömmt, ist leicht zu verdauen, nahrhafter als andere, hat schon manchem Schwindsüchtigen das Leben gerettet, und wird in mehrern Krankheiten, weil sie dünn, nicht fett, nicht käßig, und schwachen Mägen dienlich ist, als sehr heilsam gebraucht. Auch werden aus derselben die wohlschmeckenden Parmesankäse gemacht.

Das Fleisch der Keulen vermischt man mit andern Fleisch zu den schmackhaftesten Cervelatwürsten, ja das junge Eselsfleisch hält man in einigen Städten Italiens und Spaniens für eine Delikatesse.

Seine Haut wird zu vielerley Gebrauch vom Weiß- und Rothgerber gahr gemacht, und giebt vorzüglich Chagrin, Pergament, Siebe, Trommelfelle und sehr dauerhafte Schuhe. Nach Pallas bereiten die Chinesen

aus derselben einen Leim, den sie Okiao nennen, und den sie auch zum Tusch setzen. *)

Die Haare können gesponnen und, wie vom Pferde, zu allerhand Fütterungen, als der Stühle benutzt werden.

Der Mist ist eine gute Düngung in feuchten, schweren, kalten, kiesigen Boden, und er ist der einzige Dung, den man frisch brauchen kann, da alle andere Dunggattungen erst einige Monate liegen und sich verzehren müssen, ehe sie in ihre erste Nahrungstheile zerfallen. Nach Niebuhr wird er in Kahira zur Feuerung angewandt. **)

In der Medicin leistet der Esel keinen Nutzen mehr, als durch seine Milch.

Hierher gehören noch zwey Bastartarten, welche vom Pferde und Esel entspringen.

1) Das Maulthier. Equus Asinus Mulus.
Gmelin Lin. l. c. γ
Le Mulet. *Buff.*
The Mule. *Penn.*

2. Der Maulesel. Equus Asinus. Hinnus.
Gmelin Lin. l. c. δ.
Le petit Mulet, le Bardeau, *Buff.*

Erstes

*) Pallas Reisen I. 391.
**) Niebuhrs Reise I. 154.

Ersterer stammt von einem Eselhengst und einer Pferdestute ab *), und man wählt zur Begattung ein gutes Mutterpferd und den besten Esel.

Der Beschälerese l muß vorzüglich groß und stark seyn, große Augen, weite Nasenlöcher, einen langen Hals, eine breite Brust, hohe Schultern, einen kurzen Schwanz, eine dunkle Farbe und glatte Haare haben. Die Stute muß jung und groß seyn. Wenn sie besprungen (bedeckt) werden soll, so wird sie geblendet und mit den vordern Füßen niedriger, als mit den hintern gestellt. Der Esel ist vom fünften bis zum vier und zwanzigsten Jahre gut zu diesem Geschäffte der Fortpflanzung, und er kann 10 bis 15 Stuten jährlich befruchten. Die Stute geht mit dem Maulthierfüllen länger als mit dem Pferdefüllen trächtig. Die Jungen, wenn sie zur Welt kommen, sind munter und gleich frisch auf den Beinen, saugen 6 bis 7 Monate, und entwöhnen sich von selbst. Sie werden gewöhnlich älter, als ihre Eltern, wachsen schneller, als das Pferd, und werden oft 17 bis 18 Fäuste hoch. Die Hengste wallacht man auch, weil sie viel geiler, als die Pferde sind.

*) Nach der gewöhnlichen Bibelübersetzung Gen. XXXVI 24. soll Ana, Esaus Schwiegervater die Maulthiere erfunden haben, allein im Hebräischen hat Maulthiere und warme Bäder einerley Benennung, und es hat daher Ana wohl warme Bäder entdeckt. Man hatte in den ältesten Zeiten keine Pferde in Palästina, sondern bekam sie erst viel später aus Aegypten. J. D. Michaelis älteste Geschichte der Pferde u. s. w.

Diese Bastartthiere vereinigen in sich einige vorzügliche Eigenschaften ihrer Eltern, die Schönheit, Größe, Farbe und Munterkeit der Mutter, und die Ausdaurungskraft, den sichern Gang und die Geduld des Vaters; Schade, daß auch Kopf, Ohren, Kreuz, Schwanz und Stimme nach dem Vater einschlagen!

Die andere Art entsteht, wenn der Vater ein Pferd und die Mutter ein Esel ist. Bey der Begattung muß die Eselin hinten tiefer stehen als vorne. Diese Thiere sind plump, faul, träge und klein; die Ohren sind etwas länger, als Pferdeohren, aber das übrige ist mehr mütterlich, als väterlich. Man nennt sie auch Pferdeesel, Stuteneſel. *)

Bey

*) Da von dieser Art zuweilen sehr unförmliche Thiere ausfallen, so sind daraus die fabelhaften Jumare entstanden, welches Bastarten von der Pferde- und Ochsengattung von einem Stier und einer Eselin, (Bif), oder von einem Stier und einer Stute (Baf), oder von einem Esel und einer Kuh, oder von einem Hengst und einer Kuh seyn sollen. In Ansehung des Körpers und der Füße sollen sie gewöhnlich dem Pferde, am Kopf und Schwanze aber dem Rindvieh gleich kommen und am Kopf auch zwey Erhöhungen haben. Sie sollen sehr boshaft und stärker als die Maulthiere seyn und in Dauphine', Savoyen, Piemont ꝛc. zum Tragen gebraucht werden. Einen soll man 7—8 Centner auflegen können. Zeichnung und Beschreibung findet man im Histoire generale des Egliges evangeliques de Vallées de Piemont ou Voudoises par Jean Leger, à Leyde fol. 1669. Blumenbach de generis humani varietate nativa. p. 13.

Beyde Arten brauchen, wie der Esel, vier Jahre zu ihrem völligen Wachsthum, haben, wie dieser, 36 Zähne, die den Pferdezähnen gleichen, und eben so, wie jene das Alter der Thiere anzeigen, sind dauerhaft, stark, gesund, und nicht den Schwachheiten der Pferde unterworfen. Sie tragen schwere Bürden von 4 Centnern und drüber, gehen in bergigen und klippigen Gegenden sicherer, und kommen besser fort, als die Pferde. Bey Armeen sind sie dahero vorzüglich gut zu gebrauchen. Sie können 20 bis 30 Jahre gute Dienste thun. Sie erfordern aber warme Ställe, und wollen reinlich gehalten seyn.

Man erhält sie in der Fütterung sehr wohlfeil. Bey einer Mischung von Pferde- und Eselskost und klarem kalten Wasser zum Tranke befinden sie sich sehr wohl.

Wenn man die so nützliche Maulthiere erhalten will, so sucht man sich einen schönen Spanischen oder Italienischen Beschälereesel zu verschaffen. Im Nothfall thut ein großer, starker, dunkler deutscher Müllereesel auch den Dienst. Die Pferdestute läßt ihn lieber zu als einen Beschälerhengst und sie kömmt auch wegen der längern Ruthe und der anhaltendern Begattung eher und leichter zu. Zum erstenmal aber muß man ihr die Augen blenden, daß sie den kleinen Esel nicht sieht. Sie geht mit einem Maulthierfüllen etwas länger trächtig als mit einem Pferdefüllen. Das Maulthierfüllen ist gleich nach der Geburt auf den Beinen und entwöhnt sich gewöhnlich von selbst im 6ten oder 7ten Monate. In 2 1/2 oder in 3 Jahren läßt man die, welche zum Reuten oder Ziehen gebraucht werden sollen, beschlagen.

Denen, welche man reiten will, schneidet man die langen Ohren mit einer scharfen Scheere, wie Pferdeohren klein und spitzig. Man muß aber die Haut sehr zurückdrücken, daß diese dann über dem Schnitte zusammenheilt. Die Maulthierhengste verschneidet man wegen ihrer Geilheit vom dritten bis zum vierten Jahre. Die dunkelbraunen hat man am liebsten.

Mit den Pferden und Eseln sollen sich diese geilen Mittelthiere auch wirklich fortpflanzen können, nur nicht mit ihres Gleichen *).

In Thüringen findet man beyde Arten eben nicht häufig.

Um ihnen ihre natürliche Widerspenstigkeit zu benehmen und pünktliche Folgsamkeit gegen ihren Herrn beyzubringen, müssen sie ihn durch ein hartes Betragen fürchten lernen.

*) s. Pennants Uebers. a. a. O. und Varro de re rust. Lib. II. c. 1. 26. Columella Lib. VI. c. 37. 3.

Zwey-

Zweyter Abschnitt.

Zweyhufige Thiere. Bisulca.

In diesem Abschnitte kommen diejenigen Säugethiere vor, welche uns vorzüglich durch Fleisch, Milch, Fett, Haare, Wolle, Haut, Horn u. s. w. nützen. Durch die gespaltenen Klauen, und die daraus entstehenden Fährten machen sich die hierher gehörigen jagdbaren Thiere vorzüglich dem Jäger bemerklich.

I. Ohne obere Vorderzähne: Wiederkäuende Thiere.

A. Mit Hörnern.

a. Mit bleibenden Hörnern.

Die zweyte Gattung.

Ochs. Bos.

Kennzeichen.

Unten hat diese Gattung 8 Schneidezähne, die Eckzähne aber mangeln.

Die Hörner sind hohl, vorwärts halbmondförmig gebogen und glatt.

Die gespaltenen Hufe sind stark und breit.

Die Weibchen sind, wie die Männchen, gehörnt, und der Körper hat kurze Haare.

Das Euter mit 4 Säugewarzen, sitzt zwischen den Hinterbeinen.

Der Magen ist vierfach. Es sind daher wiederkäuende Thiere, die sich bloß aus dem Gewächsreiche nähren.

Sie pflanzen sich jährlich nur einmal fort, bringen der Regel nach nur ein Junges, das erst im zweyten oder dritten Jahre trächtig wird.

3. Der Büffelochse *).

Namen, Literatur und Abbildungen.

Büffel, gemeiner Büffel, Ungarischer Büffelochs und Elephantenochs.

Bos.

*) Die Savoyarden, die ihn zuweilen als ein fremdes Thier, wie einen Bären, herumführen und ihm einige Kunststücke, z. B. Verbeugungen und dergl. machen lassen; nennen ihn Meerochsen und erzählen dabey die Geschichte des Nilpferdes (Hippopotamus).

Bos Bubalus. *Gmelin Linn.* I. 1. pag. 206. n. 5.

Buffle. *Buffon* hist. nat. XI. 284. I. 25. Ed. de Deuxp. V. I. 2. f. 1. Ueberf. von Otto IX. 112. 203. XXII. 87.

Buffalo. *Pennant* hist. of Quadr. I. 28. Meine Ueberf. I. 26.
Donndorfs zool. Beytr. I. 699. n. 5.
v. Schrebers Säugeth. V. Tf. 300. A. B.
v. Zimmermans geogr. Zool. II. 40. 90.

Kennzeichen der Art.

Mit schwarzen, dicken, zusammengedrückten, an einer Seite zugeschärften, aufwärts gebogenen Hörnern und fast glatter Haut.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses Thier, dessen eigentliches Vaterland in Asien, Malabar, Borneo und Ceylon ist, wird nicht nur in Afrika und Indien, sondern auch, seit dem siebenten Jahrhunderte, in Italien, Griechenland, der Türkey, Ungarn, in den salzburgischen und andern mehr nördlichen Gegenden von Deutschland *) als Hausthier erzogen, und zum Zuge gebraucht. Ursprünglich stammt er wohl aus Ti-

*) Z. B. in der Casselschen Menagerie pflanzten sie sich fort.

bet her *). Es ist größer, stärker, schwerer, als der gemeine Ochs. Seine Länge beträgt über 9 Fuß **), und er wiegt gewöhnlich über 1000 Pfund, wovon die Haut allein 100 Pfund ausmacht.

Die Bildung des Büffelochsen hat im Ganzen genommen viel Aehnlichkeit mit dem gemeinen Ochsen. Doch ist seine Stirn und das Stirnblatt erhabener; das Maul breiter und nicht aufgeworfen; die Ohren länger und spitziger. Der Kopf ist im Verhältniß gegen den Leib klein, und neigt sich immer gegen die Erde. Die Hörner sind schwarz, vorne und hinten platt, und am Ende zugespitzt. Gleich beym Ausbruch aus der Stirne wenden sie sich in schräger Richtung nach außen, nach unten und hinten, darauf krümmen sie sich hinterwärts und nach oben zu über. Auf dem Untertheile sind einige Erhöhungen. Sie wachsen oft zu einer erstaunenden Größe, werden über sechs Fuß lang, zwanzig Pfund und drüber schwer und fassen sechs Quart Wasser. Die Augen liegen nahe bey den Hörnern und weiter vom Ende des Mauls und sind weiß. Der Hals ist dick und lang. Die Kehlhaut fehlt. Der Hintertheil des Rükkens gegen den Schwanz zu abhängig. Der Leib ist dick, hat sehr hartes, starkes Leder, aber etwas schlankere Gliedmaßen, als der Stier. Die Schenkel sind kurz, dick

*) Aus Indien wurde er zuerst in der Lombardey durch den König Agilulf, der vom Jahr 561—616 regierte, eingeführt. Warnefridi de Gestis Longobardor. IV. c. 11.

**) Par. Maas: Länge über 8 Fuß.

dick und stark. Der Schwanz ist kurz, dünn und beynahe kahl.

Die Haut hat am ganzen Leibe eine schwärzliche Farbe, außer zwischen den Beinen, und das Haar ist entweder schwarz oder roth, dünne gesäet, steif, so wie bey den Schweinen, an den Seiten des Leibes. Die Stirne ist von verwirrten langen Haaren ganz kraus. Die Brust, das Kreuz, der Bauch, und der größte Theil der Beine sind völlig kahl. Die längsten Haare sind 3 1/2 Zoll, und die Schwanzhaare 6 bis 7 Zoll lang.

Ueberhaupt hat dieses Thier ein plumpes, und wegen seiner magern Gliedmaßen, kahlen Schwanzes, scheudummen Blickes, und finsterer Miene ein niedriges und häßliches Ansehen, und sein Naturel ist dabey wild, hart, unbiegsam, zornig, und man pflegt ihm deswegen einen Ring, wie dem Bären, in die Nase zu legen, um ihn zu regieren. Die rothe Farbe ist ihm so gehässig, daß er bey Erblickung derselben ganz unbändig wird; das Feuer aber setzt ihn in Furcht. Er ist nächst dem Schweine das schmutzigste Hausthier, und läßt sich nicht gern reinigen und striegeln. — Er geht gern ins Wasser und schwimmt geschickt.

Er brüllt entsetzlich, und mit stärkern und tiefern Tönen, als der gemeine Ochse.

Sein Weibchen hat sehr kleine Eiter, und giebt wenig Milch.

Aufenthalt, Nahrung und Fortpflanzung hat er in Deutschland fast gänzlich mit dem zahmen Rindvieh gemein; geht mit ihm auf die Weide, kann aber weniger Hunger und Durst aushalten; denn er

läuft

läuft oft von seiner Arbeit, ohne sich durch etwas aufhalten zu lassen, weg, nach seiner Krippe, und von da nach der Tränke. Sein Stall muß sehr dauerhaft, und Krippe und Raufe stark und wohl verwahrt seyn.

Die Büffelkuh ist ohngefähr 12 Monate trächtig, läßt sich bis zum Kalben bespringen, und bringt ein Junges zur Welt. Wegen der Wohlfeilheit ihres Unterhaltes sollten diese Thiere in Deutschland mehr angezogen werden. Sie nehmen bey ihrer großen Gefräßigkeit gerade mit dem schlechtesten Futter vorlieb, als Erbsen- Bohnen- Hirsen- und türkischen Waizenstroh und sind im Stalle immer mit Grummet, etwas Salz und Wasser zufrieden. Auf der Weide halten sie sich im Sommer des Ungeziefers halber gern in Sümpfen und Moräften auf, wo sie sich so tief im Wasser verstecken, daß zuweilen kaum der Kopf hervorragt.

Feinde.

Ihre Feinde sind vorzüglich die Engerlinge (Oestrus) und die Bremen (Tabanus), welche sie zuweilen ganz wüthend machen.

Nutzen.

Das Fleisch der alten Büffel, ob es gleich grobfaserig und hart ist, wird von Leuten, die schwere Arbeit verrichten, gegessen, und das Fleisch der Jungen ist sehr schmackhaft.

Die fette Milch der Büffelin hat einen sehr starken Geschmack; die Butter und die Käse, welche unter dem Namen Caseo di Cavallo, oder Marzolino bekannt sind, sollen wohlschmeckender, als vom gemeinen Rindvieh seyn.

Aus

Aus der sehr starken Haut macht man sehr gutes Sohlenleder und anderes, welches zu Stiefeln, Schuhen, Handschuhen, Schilden, Reitkollets, Degengurten, Jagdtaschen, Patrontaschen und besonders zu Schläuchen tauglich ist. Die alten Römer verfertigten ihre Harnische und die Siamer Bogen daraus.

Die Sehnen, Flechsen und dergleichen werden zu Leim gesotten.

Das Blut dient zu blauer Farbe und Gärtnertreibereyen, auch zur Nahrung der Thiere.

Die harten Hörner und die Klauen werden vom Kammmacher und Horndrechsler, wie alle Hörner und Klauen, und besonders zu Rosenkränzen und Tabaksdosen verarbeitet *)

Das Fett und Mark soll zum Zertheilen, und zur Stärkung der Nerven, so wie das Horn mit Myrrhen und Oehl vermischt in die Ohren gethan gegen den Schmerz derselben, der von Erkältung herrührt, dienen.

Die Knochen werden zu feiner Drechslerarbeit gebraucht.

Die Haare und der Mist werden, wie beym Rindvieh, benutzt; und letzterer, der einen starken Bisamgeruch hat, ist vorzüglich kühlend auf warmen Boden an Bergen.

Da diese Ochsen außerordentlich stark sind, so braucht man sie, wie die andern, zum Pflügen, Ziehen und Schleifen,

*) Aus Aberglauben verfertigte man sonst Ringe aus diesen Theilen, welche gegen den Krampf und andere Krankheiten dienen sollten.

Schleifen, und zwey Büffel vor einen Wagen gespannt, ziehen eben so viel, als vier starke Pferde.

Schaden und Mittel dagegen.

Die wilden Büffel fallen, wenn sie verwundet werden, Menschen an, und treten sie mit Füßen; und richten oft auf bebauten Feldern großen Schaden an. Man hält sie von letztern Orten mit Feuer ab. Auf den Philippinischen Inseln tödtet man sie mit Lanzen, in andern Gegenden steigt man da, wo sie sich des Nachts niederlassen, auf die Bäume und erlegt sie mit Gewehr. Die zahmen gehen zuweilen bey großem Durste mit Karn und Pflug in den nächsten Teich oder Fluß, und haben schon manchem Führer im Zorn das Leben geraubt. Auf feuchten Wiesen treten sie wegen ihrer Schwere zu tief ein.

(3) 4. Der gemeine Ochs.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Stier und Kuh. Außerdem heißt das männliche Geschlecht noch: Bulle, Bullochs, Brummochs, Brummer, Farre, Farrochs, Stammochs, Reitochs, Wucherstier, Haagen.

Bos Taurus. *Gmelin Linn.* I. 1. p. 202. n. 1.

Boeuf. *Buffon* hist. natur. IV. 437. t. 14. Ed. de Deuxp. V. 39. Ueberf. von Otto. IX. 112. 149. 223.

Bull.

Bull. *Pennant* hist. of. Quadr. I. 16. Meine Ueberſetz. I. 15.
v. Zimmermanns geograph. Zool. I. 151. II. 84.
Goeze's Fauna. III. 272.
Donndorfs zool. Beytr. I. 683.
v. Schrebers Säugeth. V. 295—297.

(Taf. II. Fig. 2.)

Kennzeichen der Art.

Mit runden auswärtsgekrümmten, an der Wurzel weit auseinanderſtehenden Hörnern und einer ſchlaffen Kehlhaut.

Geſtalt und Sitten des männlichen und weiblichen Geſchlechts.

Das zahme Rindvieh ſtammt wahrſcheinlich von dem Auerochſen (Urochſen *) ab **), welcher ſonſt auch

*) Ur heißt im Altdeutſchen Wald, Urochs oder Auerochs alſo Waldochs, wie Auerhahn Waldhahn.

**) Bos Taurus ferus Urus. Gmelin Linn. l. c. α, a, Ridingers wilde Thiere. Taf. 37. Von dieſen ſind dann vielleicht wilde Raſſen: a) der Bonaſus (B. T. f. Bonasus. Gmelin Linn. l. c. b,). Mit ſehr langer Nackenmähne und krauſen aufgerichteten Haaren am ganzen Körper, und Hörnern, deren Spitzen einwärts und gegen einander gebogen ſind. In Afrika. b) Der Biſon (B. T. f. Bison. Gmelin Linn. l. c. c,). Mit langer Nackenmähne, buckligem Rücken und ausgebreiteten Hörnern. In Litthauen und der Moldau.

auch im Thüringer- und Harzwalde gefunden wurde, und noch jetzt in Pohlen, Litthauen und Sibirien wild angetroffen wird. Der Auerochse ist zwar größer, hat ein grimmigeres und wilderes Ansehen, haarigere Schultern, Genick und Brust, als der zahme Ochs, und seine Farbe ist auch beständig, nämlich allezeit schwarzfahl mit einem mausefahlen Streif auf dem Rücken; allein demohngeachtet darf man ihn als Stammvater anerkennen, wenn man bedenkt, wie viel die Zähmung und die Verschiedenheit des Futters auf die Thiere wirkt, so, daß auch das zahme Rindvieh selbst, das doch gewiß von Einem Stamme entsprungen seyn muß, nach der Verschiedenheit des Klimas und besonders der Nahrung von verschiedener Größe, Farbe, und von verschiedenem Wuchse ist, und daß es sogar in einigen Provinzen Englands und in Island Ochsen giebt, welche ihr vorzügliches Kennzeichen, die Hörner nicht haben *). Man trifft diese Abart auch in Thüringen und in andern Gegenden Deutschlands an. Im erstern heißen diese Kühe Kolbenkühe, weil man gleichsam nur einen Kolben oder Ansatz von Hörnern sieht.

Man giebt folgende äußerliche Eigenschaften an, welche zu einem guten und schönen Stück Rindvieh erforderlich wären. Der Kopf soll kurz und breit, die Ohren lang und haarig, die Hörner glänzend, stark, und von mittelmäßiger Länge, das Maul breit und flach, die Nasen-

*) Im Erfurthischen; bey Prag auf dem Oberstburggräflichen Gathe. Carl Eugen, Fürst zu Fürstenberg, brachte sie nach Böhmen.

Nasenlöcher weit offen, die Lippen schwarz, der Hals groß und dick, die Schultern breit, dick und fleischig, die Brust groß und breit, der Schlauch (Triel) bis zu den Knieen niederhangend, die Lenden und das Kreuz breit, die Rippen rund und krumm, der Bauch groß und hangend, der Rücken gerade, der Schwanz bis zur Erde niederhangend und sehr haarig, die Hüften lang, die Beine und Schenkel stark, die Klauen breit, kurz und stark, und die Haut dick und weich seyn. Nach diesen allgemeinen Eigenschaften, werden nun unter den Rassen, die nach Verschiedenheit ihres Vaterlandes auch verschiedene und noch besondere äußerliche Eigenschaften haben, die Hausthiere gewählt.

Wir wollen die vornehmsten Rassen, welche auch in Thüringen nicht unbekannt sind, hier mit ihren unterscheidenden Merkmalen angeben:

1) Die Dänischen und Jütländischen Ochsen sind dickleibig, und haben kurze Füße und wenig ausgebogene Hörner. Ihre Farbe ist schwarz und weiß, oder roth und weiß. Man mästet sie auf zehn Centner.

2) Die Polnischen haben hohe Beine, weit auseinanderstehende Hörner und eine blauliche oder fahle Farbe. Sie werden zu neun Centnern gemästet.

3) Die Ungarischen haben niedrige Beine, einen dicken und starken Leib, und eine weißliche Farbe. Sie wiegen gemästet oft neun Centner.

4) Die Schweizerischen. Sie sind groß, lang und hoch und meist schwarz von Farbe *).

5) Die Friesländischen haben niedrige Füße, und sind sehr lang, dick, breit und meist roth von Farbe. Sie werden oft zwölf Centner schwer gemästet. Die Kuh giebt zu manchen Zeiten wegen der guten Weide in den an der Elbe und Nordsee gelegenen sogenannten Marschländern täglich 20 bis 24 Kannen Milch.

6) Die Fränkischen. Sie sind hochbeinig, langgestreckt und meist roth von Farbe. Sie können neun Centner schwer gemästet werden **), und werden sehr stark nach Frankreich verhandelt. Zu diesen gehören auch die Voigtländischen, welche schwach und schief herausgebogene Hörner haben und von verschiedener Farbe, die schönsten aber erbsgelb sind.

7) Die

*) Steyermark, auch ein großer Theil Cärnthens, Tyrols und das ganze Gebirgland von Salzburg sind die Deutschen Gegenden, welche in Absicht der Rindviehzucht dieß mit der Schweiz gemein hat, daß die Kühe den ganzen Sommer hindurch auf den Alpen weiden. Hier werden auch Butter und Käse gemacht, welches man Brenteln nennt. Letzteres besorgt allezeit eine Weibsperson, die Brentlerin, Sandin oder Schwaigerin heißt. Das Rindvieh ist daher in dieser Gegend sehr groß und gut.

**) Im Jahr 1775 wurde zu Nürnberg ein Ochse von 25 Centn. und 40 Pfund geschlachtet. Er hatte 340 Pf. Talg und die Haut wog 70 Pfund. Im Jahr 1692 wurde aber in Lincolnshire ein Ochse geschlachtet, der obigen am Gewicht noch weit übertraf; er wog 35 Centner und 77 Pfund.

7) Die Böhmischen. Das starke untersetzte Nationalvieh ist schwarzbraun von Farbe, und man hat fette Ochsen zu sechzehn Centnern.

Da die übrigen Deutschen, die noch nicht durch eine größere Art verbessert worden, kleiner sind, als alle diese angegebenen Rassen, so sind auch die Thüringischen verhältnißmäßig kleiner, ob man gleich in manchen Gegenden des Thüringer Waldes, wo gute Weiden sind, Ochsen mästet, welche acht Centner wiegen. (Taf. II. Fig. 2.)

Der Thüringische Ochs ist von mittler Statur, kurz gebaut, hat einen dicken schweren Kopf und kaum gekrümmte Hörner. Die Kuh ist hochbeinig, langhälsig, langleibig, hat ein erhabenes Kreuz und einen spitzig zulaufenden mit einer aufgeworfenen Nase versehenen Kopf. Doch werden Beobachter, so wie allenthalben, also auch in jedem Thüringischen Dorfe, eine abweichende Bildung des Rindviehs erkennen, wovon die Ursache in der verschiedenen Weide und in dem verschiedenen Wasser zu suchen ist. Die Kühe z. B., welche in den tiefen Wäldern Thüringens weiden, haben lange spitzige, rückwärts gebogene Hörner, einen langen dünnen Hals, den sie, wie die Hirsche, hoch tragen, dünne Beine und einen hohen Nacken, eine breite Brust und Kreuz, sind gestreckt, und meist roth von Farbe. Hingegen die Kühe der Landdörfer haben einen großen Kopf, der, wenn sie gehen, mit dem Hals, und Rücken in einer Linie fortläuft.

Die gewöhnliche Länge der Thüringischen Kühe ist vom Kopf bis zum Schwanz 8 Fuß, und die Höhe 4 1/2

Fuß *), doch sind sie, je nachdem sie in der Jugend gut oder schlecht gefüttert und gewartet wurden, auch größer oder kleiner.

Die gemeinste Farbe des Thüringischen Rindviehes ist die rothbraune, doch giebt es auch gelbbraune, gelbe, rothe, schwarze, weiße, fahle, schimmelfarbene, und gefleckte. Die Farbe hat übrigens keinen merklichen Einfluß auf die Güte des Thiers; nur müssen die Haare selbst dicht, weich, glatt, und glänzend seyn, weil dieß Kennzeichen der Gesundheit sind. Doch liebt man das graue, weiße, blaßgefärbte und gefleckte Rindvieh deswegen nicht, weil es von Fliegen, Bremsen und anderm Ungeziefer weit mehr, als das braune, rothe und schwarze gequält wird. Wie bekannt, so hat der Ochs eben so, wie das Pferd, auf der Stirne einen Stern oder Wirbel von Haaren.

Die Schönheit, Geschmeidigkeit, Lebhaftigkeit und Hurtigkeit des Pferdes mangelt dem Rindvieh gänzlich. Sein Körperbau ist unförmlich, der Kopf länglich viereckig, die Lippen überhängend und die obern dick und stumpf, die Augen breit, schwarz, flachrund und trübe; die Ohren breit, spitzig und schlaff; der Hals dick und zur Seiten breit gedruckt; die Brust hängend, der Nacken hoch, die Rippen stark gebogen, das Kreuz breit und hager, der Bauch rund und dick, die Beine kurz und stark, der Gang schläfrig und schwer, seine Wendungen ungeschickt, und überhaupt sein ganzes Wesen plump und

*) Par. Maas: Länge 7 Fuß; Höhe 3 und 1/4 Fuß.

und langsam. Auch hat ihm die Natur sehr wenige geistige Talente verliehen. Allein der Mangel aller dieser Eigenschaften schmälert seine anderweitige große Nutzbarkeit für die Menschen nicht. Das weibliche Geschlecht zeichnet sich bey seiner Trägheit noch durch Sanftmuth aus, welche bey dem männlichen nur allzu oft in Tücke und Bosheit ausartet. — Die Waffen dieser Thiere, ihre Hörner, werden durch ihre große Stärke fürchterlich, und im Nothfall brauchen sie auch die Hinterfüße, um sich gegen ihre Feinde zu wehren. — Sie begnügen sich mit einem kurzen und leichten Schlaf, den das geringste Geräusch unterbrechen kann, und liegen dabey gewöhnlich auf der linken Seite.

Das Alter des Rindviehs kann man an ihren Zähnen erkennen.

Es hat dasselbe, wie bekannt, acht Schneidezähne in der untern Kinnlade, welche schmäler und leichter beweglich ist, als die obere. Statt der Vorderzähne in der obern, ist das Zahnfleisch mit einer zarten Haut überzogen, auf welche die Zähne der untern Kinnlade so genau passen, daß nicht das kleinste Gräschen, wenn es frißt, durchschlüpfen kann. Auf jeder Seite der beyden Kinnladen befinden sich sechs Backenzähne, daß also das Maul, da ihm die Eckzähne mangeln, zusammen mit 32 Zähnen besetzt ist.

Ein Kalb kommt mit vier Milchzähnen auf die Welt, erhält in vierzehn Tagen noch zwey andere, und hat im ersten Vierteljahr seine acht Vorderzähne. Nach dem zehnten Monate, oder zu Ende des ersten Jahres fallen ihm die zwey mittlern aus, und diese werden in

vierzehn Tagen durch zwey andere ersetzt. Das kommende Jahr oder gewöhnlich nach sechzehn Monaten verliert es die zwey folgenden, welche an der Seite der zwey mittlern stehen, und statt derer bekömmt es in kurzer Zeit wieder zwey neue, und im dritten Jahre endlich die vier letztern, so daß nach Verlauf völliger drey Jahre das Rindvieh seine acht Vorderzähne (Schaufeln) eingesetzt (eingeschoben) hat, welche alsdann breiter, länger, nicht mehr so weiß sind und näher zusammen und fester stehen, als die Milchzähne. Nach dem vierten Jahre, wenn die Kalbin zum erstenmal gebohren hat, tritt an der Wurzel der Hörner dicht am Kopfe ein Ring hervor, der ihr fünftes Jahr andeutet, das folgende Jahr wächst der Kuh wiederum ein neuer hervor, der ihr sechstes Jahr bezeichnet, und so treten unabläßig in jedem Jahre neue Ringe hervor, so lange diese Thiere leben. Doch kann man sich auf das Kennzeichen der Hornringe nicht sicher verlassen, weil der Ausnahmen zu viel sind, wo Kühe, die viel Kälber hatten, wenige Ringe, und andere, welche wenig Kälber hatten, schon viele Ringe angesetzt hatten. Nach dem sechsten Kalbe, welches allemal die Zeit seyn sollte, wo die Kühe gemästet und geschlachtet würden, erkennt man ihr Alter an der Ungleichheit und Stumpfheit der Zähne, und an dem Zahnfleisch, daß sich, je älter sie werden, je mehr ablöst, so daß man in ihrem hohen Alter einen großen Theil der braunen Zahnwurzel sieht.

Sie leben 25 bis 30 Jahre; 20 Jahre sind schon drückend für sie, und ihre ergiebige Nutzung hört mit dem zwölften auf.

Zerglie-

Zergliederung.

Das merkwürdigste an den innern Theilen ist der vierfache Magen, dem aber das Rindvieh mit allen andern Thieren gemein hat, und welcher oben S. 113. beschrieben worden ist. Das Wiederkäuen ist als ein leichtes Erbrechen anzusehen, und geschieht Stoßweiße. Wenn die Kuh die wiederkäuten Nahrungsmittel verschluckt hat, so vergehen einige Augenblicke, ehe die übrigen Mägen und vielleicht das Zwerchfell auf den ersten Magen wirken, wodurch ein Klümpchen Futter abgerissen und in den Mund hinauf geschoben wird.

Luftröhre und Lungen sind von außerordentlicher Größe.

Auf der Zunge findet man dreyerley Arten von Erhöhungen, hakenförmige, warzenförmige und schwammartige. Die hakenförmigen sitzen am Ende der Zunge, und an denselben bleibt das Gras leicht hängen; die warzenförmigen befinden sich an der Wurzel und die schwammartige an deren Seiten.

Merkwürdige Eigenschaften.

Ihr Brummen und Blöken, wodurch sie ihre Begierden und Leidenschaften ausdrücken, hört man täglich. Den Stier scheint selten eine andere Leidenschaft, als der Trieb zur Fortpflanzung zum Brüllen zu reizen. Die Kuh aber schreyet weit öfterer aus andern Ursachen, und das Kalb blökt bald aus Schmerz, bald aus Mangel der Nahrung, bald aus Sehnsucht nach der Mutter.

Verbreitung und Aufenthalt.

Das zahme Rindvieh ist als eine der nützlichsten Thierarten fast auf der ganzen Erde jetzt verbreitet, und nimmt in verschiedenen Ländern oft eine gar merklich abweichende Gestalt von unserer gewöhnlichen Europäischen Rasse an. So hat z. B. der große Indische Ochs, der auch auf Madagaskar angetroffen wird, einen 40 bis 50 Pfund schweren Fetthöcker auf den Schultern u. s. w.

Die Ställe, welche dem Rindvieh zum Aufenthalte angewiesen werden, müssen geräumig genug seyn, so, daß jedes Stück einen Raum von zwey Ellen in der Breite einnehmen kann. Die Höhe derjenigen, in welchen der Mist nur etliche Tage liegen bleibt, ist acht Fuß, und wo man ihn bis zur Düngung liegen läßt, zehn bis zwölf Fuß. Die Raufen und Krippen werden nach der Größe des Rindviehes eingerichtet, und in Ställen, in welchen der Mist bis zur Düngung sich sammelt, müssen sie in Säulen so eingelegt seyn, daß man sie in dem Verhältniß, nach welchem die Streue unter ihnen wächst, durch Hülfe eiserner Nägel höher stellen kann. Der Boden muß mit Steinen ausgepflastert, und so eingerichtet seyn, daß von der nützlichen Gauche nichts verlohren geht; unter den Deckbalken müssen genugsame Fenster und Oeffnungen, durch welche im Sommer die frische Luft die Ställe durchstreichen kann, und wo möglich an der Decke ein oder etliche Dunstschornsteine (Dampfröhren, Zugschornsteine), je nachdem der Stall groß oder klein ist, angebracht werden, welche unten mit einem

Schieber

Schieber versehen sind, wodurch sie mehr oder weniger geöffnet werden können. Die Streu muß der Maaße eingestreut werden, daß das Vieh immer trocken liegt, und reinlich und sauber aussieht. Dem Federvieh darf man nicht erlauben in diese Wohnungen des Rindviehs zu gehen, weil die verlohrnen Federn, wenn sie sich mit dem Futter vermischen, demselben einen heftigen und langwierigen Husten, ja oft den Tod verursachen; und wenn sich diese Thiere wohl befinden sollen, so müssen sie eben sowohl, wie die Pferde, obgleich nicht so oft, gestriegelt und gebürstet, im Sommer zuweilen gebadet und abgeschwemmet werdet, und immer einen ausgewaschenen Schwanz und gereinigte Klauen haben. Diejenigen, die Sommer und Winter im Stall bleiben, müssen zuweilen auf den Hof gelassen werden, weil ihnen sonst das Horn an den Klauen zu groß wächst, und dadurch das Gehen erschwert wird.

Nahrung. *)

Das erste und vorzüglichste, worauf man bey der Nahrung des Rindviehes zu sehen hat, ist, daß es satt und gut gefüttert werde. Wir kennen in Thüringen zweyerley Arten der Kuhwirthschaft in Ansehung der Fütterung. Erstlich, wo die Kühe, nebst der Hutweide in Feldern und Wäldern, wohin sie im Sommer alle Tage getrieben werden, auch noch besondere Nahrungsmittel im Stalle verlangen. Zweytens, wo die Kühe beständ-

*) S. Riems gekrönte Preißschrift über die dienlichste Fütterungsart der Kühe und deren Behandlung überhaupt. Leipzig 1788.

beständig, Sommer und Winter, im Stalle bleiben, und keine Hutweide genießen *).

Denjes

*) Es ist bekannt, wie viel Streit zwischen den Oekonomen deshalb ist geführt worden, ob es besser sey, die Kühe auf die Gemeindeweiden auszutreiben, oder die Weideplätze zu vertheilen, und sie in künstliche Wiesen und in Aecker zu verwandeln und die Kleefütterung einzuführen. In Thüringen sollte billig nur für die Bewohner des Thüringerwaldes die erstere Art allein bleiben, weil hier der Mangel an Wiesen und Aeckern, und also an hinlänglichem Futter zur Haltung des Rindviehs, das oft der vorzüglichste Nahrungszweig der Waldbewohner ist, nothwendig macht, und weil bey gehörig getroffenen Maasregeln die Hütung im Walde auch jetzt noch ohne beträchtlichen Nachtheil erlaubt werden kann. Allein die großen gemeinen Weideplätze in den ebenen Gegenden Thüringens sollten alle abgeschafft, vertheilt, und dadurch die auf unzählige und untrügliche Erfahrungen ihres Nutzens sich gründende Stallfütterung eingeführt werden. Denn (damit ich nur einiges hierbey bemerke,) der große Nutzen, den das Rindvieh durch seinen Dünger verschafft, geht durch die Treibung auf die Weide zur Hälfte verlohren; die meisten Wiesen können nur dürre Wiesen seyn, d. h, die Besitzer derselben bekommen nur Heu von denselben, und müssen das Grummt entbehren, um das Vieh darauf weiden zu lassen; die feuchten Wiesen werden durch das schwere Vieh zertreten; die Gemeindeplätze sind, wenn sie einmal abgehütet worden, meist leer von allem guten Futter, und das Vieh frißt sich an den jungen unkräftigen Grassprossen nur krank und hungrig; die Kuh verläuft die Milch; und endlich die mehresten Krankheiten, ja die verheerenden Rindviehseuchen, entste-

Denjenigen Kühen, die auf die Weide gehen, wird vorher beym Melken ein Futter Gras vorgelegt und alsdann

entstehen daher, wenn das Vieh schädliche, beregnete, bethauete, und bereifte Kräuter frißt, und bald große Hizze, bald große Kälte und bald das heftigste Regenwetter aushalten muß. In den Waldgegenden, wo die meisten dieser nachtheiligen Folgen nicht zu befürchten sind, muß daher darauf gesehen werden, daß der Hirte vorzüglich dem leztern Uebel auszuweichen sucht, und daß das Rindvieh, wo möglich, jede Woche einmal einen Tag im Stalle bleibt und mit Heu oder besser, um das Heu im Sommer zu schonen, mit Gras, das mit viel Salz vermischt ist, gefüttert wird.

Ueberhaupt ist der Nutzen der Stallfütterung beym Rindvieh außer allem Zweifel; beym Schafvieh aber bleibt er problematisch und hier muß sich jeder Oekonom nach seiner Gegend und Lage richten.

Ein Landmann, der 30 Morgen Land zum Klee- und Futterbau verwendet, kann davon 25 Kühe im Stalle ernähren. Diese 30 Morgen bringen ihm nach sichern Erfahrungen, mehr Nutzen als 90 Morgen Fruchtland, und durch den erlangten Dung verdoppelt er die Fruchtbarkeit seiner Aecker. Den Kleebau treibt man auf folgende Art am vortheilhaftesten. Man säet nämlich in gewöhnlich zubereitetes Sommerfeld entweder zugleich mit der Gerste und Hafer, oder nach denselben den sogenannten spanischen, holländischen, brabanter Klee (Trifolium purpureum, majus, sativum, pratensi simile), schneidet die reife Sommerfrucht hoch ab, und erndet dann im Herbst zum erstenmal den Klee ein, welcher getrocknet mit den Stoppeln ein gutes Winterfutter giebt. In Winter deckt man ihn, wo möglich, (es ist aber nicht allerdings nöthig) mit Mist zu,

öff-

alsdann beym Austreiben im Hofe frisches Wasser zu trinken gegeben. Wo sie zu Mittag wiederum eingetrieben

zu, öffnet ihn im Frühjahr, (bey uns in der Mitte des Aprils) bestreut ihn, wenn man kann, mit Gips, und mäht ihn zum erstenmal, wenn er 8 Tage geblüht hat (bey uns in der Mitte des Junius). Man richtet es dabey so ein, daß man bey der täglichen Fütterung alle 5 Wochen wieder von vorne anfangen kann, denn in dieser Zeit wird der abgemähte wieder zum abhauen tüchtig seyn. Diese Erndte hat man gewöhnlich im Brachfelde dreymal (ohne die im vorigen Herbste) zu genießen. Mit der dritten Erndte macht man um Bartholomäi (zu Ende des Augusts) den Beschluß.

Man ackert alsdann diese Brachäcker um, so, daß die Kleewurzeln in die Höhe kommen, egt sie, pflügt sie im Herbst zum zweytenmal, wirft den Wintersaamen ein, und man hat eine gute Getraideerndte ohne vorhergegangene Düngung zu hoffen, weil die Wurzeln bey ihrer Fäulung dem Acker eine bessere Düngung verschaffen, als jeder andere frische Mist.

Da man bey dieser Art des Kleebaues alle Jahre Kleesaamen nöthig hat, so ist es am besten ihn selbst zu ziehen; man läßt daher so viel Klee des zweyten Wuchses (oder nahe vor dem Thüringerwalde: des ersten Wuchses, weil der Saamen des zweyten nicht gehörig reif wird) auf der Mitte des Ackers stehen, da man aus Erfahrung weiß, daß dieser mehr Körner erhält, als der des ersten Wuchses, welcher seine Kräfte mehr in den Stengeln und Blättern verschwendet. Das Einsammeln des Klees kann durch Kinder geschehen, die jeden Tag durch den Acker gehen und die schwarzen Köpfe abpflücken.

Den

den werden, müssen sie abermals erst getränket werden und dann beym Melken ein Futter Gras bekommen. Hierauf erhalten sie, wenn man es für nöthig hält, ein laues oder kaltes Getränke mit Kleyen, Getraideschrot oder Trebern und Spülich, dann gehen sie wiederum auf die Weide, und des Abends bekommen sie nach der Tränkung ebenfalls wieder eine Portion Gras.

Bey der Stallfütterung des Rindviehs auf der andern Seite sind eben die Vorsichtigkeitsregeln nöthig, die bey

Den Luzernerklee, der eben ein so vortreffliches Futter ist, obgleich die Milch und die Butter etwas bitter schmecken, säet man in Gärten, auf Aecker mit Wiesenhafer vermischt, und er dauert bey guter Düngung 15 bis 20 Jahre.

Außer diesen kann man auch noch, wenn man viele Aecker besitzt, beständige Kleeäcker halten, die 3 Jahre ihr gutes Futter reichlich geben, oder sich das Wickenfutter, das aus der Aussaat der Wicken, mit Hafer und Erbsen vermischt, entsteht, und des Jahrs dreymal abgemähet werden kann, verschaffen. Letzteres läßt man auch reifen, braucht die Körner zur Mast, und das Stroh als ein gutes Winterfutter für die Schafe.

Man verzeihe mir diese scheinbare Ausschweifung ihrer Gemeinnützigkeit halber.

Wichmann über die natürlichsten Mittel den Landmann die Stallfütterung zu erleichtern. Leipzig 1784. Meyers Gedanken über die Stallfütterung. Ulm 1791.

bey dem Schafvieh angewendet werden *), sowohl in Absicht der Zeit des Abmähens des Klees, Espersetts, Grases und Wickenfutters, als auch des Vorlegens selbst. Es muß im Frühjahr und Herbst nach und nach an die grüne und trockene Nahrung gewöhnt werden, und vor allen Dingen ist Abwechselung im Futter nöthig, weil man bemerkt, daß die stäte Kleefütterung zuweilen Ekel erweckt. Man giebt ihm von dieser grünen Nahrung täglich fünf kleine Fütterungen, weil es, wenn ihm zuviel auf einmal vorgelegt wird, dasjenige, was von seinem Athem erwärmt ist, liegen läßt, oder unter die Füße tritt. Zum Tranke bekömmt es dabey nichts als frisches, reines Quell- oder Bachwasser.

Bey der Winterfütterung ist, wenn man von den Kühen den gehörigen Nutzen an der Milch haben will, noch mehr Abwechselung nöthig. Sie bekommen daher immer abwechselnd täglich viermal gedörrten Klee, Heu, Grummt, Erbsen- Korn- Waizen- Gersten- und Haferstroh; darzwischen aber erhalten sie des Tages zweymal eine Siede von Heckerling vermischt mit etwas Salz, Kleyen, Gerstenschroot, Trebern, oder Oehlkuchen, gestampften, ungekochten weißen, rothen Rüben, Runkelrüben, Erdkohlrüben, Krautdorschen, Kartoffeln, Obstabfällen, und andern Abgängen in der Küche, die in einem besondern Fasse (Spülichfasse) aufgehoben werden. Dabey muß man aber zwischen jedem Futter das nöthige Wiederkäuen abwarten. Ihr Getränke muß ebenfalls kalt seyn, und darf nur höchstens mit etwas

war-

*) S. Nahrung des Schafes.

warmen Wasser abgeschreckt werden, weil warmes Getränke seine Kraft verliert, das Vieh ermattet, und ihm unnöthigen Schweiß austreibt. Eine Milchkuh muß vor allen Dingen viel Wasser bekommen, wenn sie viel Milch geben soll, und man sagt, daß der große schwarze Rettig und die Pastinake die Milch sehr stark vermehrten.

Linne' hat den Versuch gemacht, und gefunden, daß das Rindvieh 276 Kräuter fraß, und 218 unberührt ließ. Schierlingskraut, gelber und blauer Sturmhut (Aconitum Lycoctonum et Napellus), Bilsenkraut, Tabackskraut und das Wasserrispengras, (Minsch oder Segger Poa aquatica), wenn seine Blätter von einer Krankheit gestreift sind, sind ihm Gift *).

Zu allen Jahrszeiten ist diese Viehart zur Erhaltung ihrer Gesundheit wöchentlich einmal an einem bestimmten Tage eine Hand voll Salz mit Kleye vermengt vorzulegen nöthig. Kühe, welche auf solche Art, und besonders mit Kleeheu und Wurzeln gefüttert werden, können auch im Winter des Tages dreymal gemolken werden, damit die Milch nicht abnimmt und in Fleisch übergehet.

Nach den bekannten Ausrechnungen soll man zur Erhaltung einer Kuh ein zweyspänniges Fuder Heu, von ohn-

*) An einigen Orten, z. B. im Amte Altenburg, wo man keine Brache hat, füttert man das Rindvieh so lange im Hofe und Stalle bis die Felder leer sind, alsdann treibt man es in die Stoppeln und auf die abgemäheten Wiesen.

ohngefähr 10 Centnern und 1 Schock Stroh brauchen, von bloßem Heu aber zwey solcher Fuder. Sonst rechnet man gewöhnlich täglich auf eine Kuh im Winter 20 Pfund Heu, und im Sommer 80 bis 90 Pfund Klee. Eine ganz genaue Berechnung läßt sich nicht angeben, und das vorzüglichste bey der Fütterung kömmt auf die Ordnung an, die man bey derselben beobachtet, sonst kann man noch zweymal so viel Futter verwüsten.

Ein Ochs, der nicht arbeitet, muß mit Heu und Stroh in gleichem Maaße zu seiner Sättigung vorlieb nehmen, wenn er aber arbeitet, so kann er mehr Heu als Stroh und zur Stärkung seiner Kräfte vor Anlegung des Jochs jeden Tag etwas Hafer verlangen. Er scheint das Roggenstroh lieber, als das weniger nahrhafte Gerstenstroh zu fressen.

Was die Mast des Rindviehs anlangt, so werden die Kälber, die man gut schlachten will, mit süßer abgekochter Milch und Semmeln gefüttert, wobey man ihnen täglich ein rohes, von Schalen freyes Hühnerey, oder einige, von Eyern und Gerstenmehl verfertigte Kugeln, in den Hals steckt, wovon sie in 4 bis 6 Wochen sehr fett werden. Die Mästung des größern Viehes aber, der Kühe und Ochsen, ist sehr verschieden und jeder Oekonom richtet dieselbe nach seinem Vortheil ein. Jedoch sind gewisse Vortheile bekannt, deren man sich ohne große Unkosten bedienen kann, und die sowohl die Mästung beschleunigen als auch verbessern. Wicken, Kleeheu, gelbe Rüben, Salz und kaltes Wassergetränke, in welches etliche Händevoll Gerstenschrot gemengt werden, thun dieß. Man legt nämlich einem Stück Mastvieh

täglich

täglich viermal in gleichen Theilen vermischt Heu und Grummt vor, giebt ihm nach jeder Mahlzeit kühles Wasser mit Gerstenschrot oder Trebern, und nach dem Wiederkäuen vier Händevoll geschrotene Wicken mit einer Handvoll halb Salz und halb Salpeter vermischt. Bey dieser Fütterungsart erspart man die Zeit, das Vieh wird in 6 bis 8 Wochen fett, nicht krank, und der Aufwand des Salzes und Salpeters ersetzt das dadurch erhaltene Unschlitt reichlich. Im Sommer bedient man sich statt des Heues und Grummts des Klees.

Fortpflanzung.

Um den Nutzen von dem Rindvieh zu erlangen, den man von ihm erwarten kann, kommt alles darauf an, daß man sich bemüht eine gute Nachzucht zu erhalten. Dieß kann in Thüringen jetzt ebenfalls sehr leicht geschehen, da man daselbst verschiedene Rindviehzuchten, sogenannte Schweizereyen, die aus Schweizerischen, Voigtländischen oder Ostfriesländischem Vieh bestehen, antrifft, wenn nur mehr Ernst und Eifer da wäre, solche Verbesserungen zu machen. Außerdem kann man auch schon durch gutgezogene Kälber, Kühe und Ochsen, aus der Nachbarschaft, oder aus seiner Heerde diese Viehart verbessern, wenn man nur allzeit die größten und besten aussucht.

Ein Kuhkalb muß daher allzeit schön gewachsene Hörner, mittelmäßig lange Beine, einen schlanken Leib, und einen guten Ansatz zum Euter haben, und von einer Mutter abstammen, welche viele und gute Milch giebt, und ein junger Bulle muß einen kurzen, dicken Kopf und

breite Stirn, schwarze Augen, dicke schwärzliche Hörner, eine breite starke Brust und Hals, einen langen Leib, und langen haarigen Schwanz haben, und wo möglich dunkelbraun oder schwarz von Farbe seyn.

Wenn keine Ausartungen entstehen sollen, so dürfen die Kälber nach 18 Monaten nicht mehr mit dem ältern Rindvieh unter einerley Heerde seyn, um die zu frühzeitige Vermischung zu verhüten, wodurch schwache Mütter und schwache Kälber entstehen; die Kuhkälber dürfen vor dem dritten Jahre nicht zum Ochsen kommen *), und die Ochsenkälber müssen bey gutem Futter drey, oder besser, damit sie ganz ausgewachsen sind, vier Jahre alt seyn, ehe sie zur Begattung (Reiten, Bespringen) zugelassen werden, und die Ochsen dürfen nicht länger als drey Jahre bey einer Heerde bleiben, um dadurch die Begattung mit den jungen Kühen, die von ihnen abstammen, zu verhüten, müssen alsdann entweder mit Ochsen von andern Heerden vertauscht, oder gemästet und geschlachtet, und überhaupt nicht länger als bis in ihr neuntes Jahr zum Bespringen gebraucht werden. Ein einziger Ochse ist übrigens vermögend, 60 Stück Kühe

*) Es ist der Versuch, besonders von armen Leuten gemacht worden, daß sie die jungen Kühe, (Kalben, Versen, Stärken), die zur Fortpflanzung tüchtig sind, durch Drukken und Streichen dahin gebracht haben, daß sie Milch gaben; ja man ist sogar so weit gegangen, und hat eine solche melkend gemachte Kuh beschnitten, und dadurch erhalten, daß sie immerfort einerley Milch, und einerley Maaß von Milch gegeben hat.

Kühe zu befruchten, allein man gesellet ihm mit größerm Vortheil nur die Hälfte zu.

Den Reiz zur Begattung (Rindern, Oechslichwerden) fühlen alle Kühe, sowohl diejenigen, welche auf die Weide getrieben werden, als diejenigen, welche man in Ställen hält, mehrentheils in den drey Frühlingsmonaten, April, May und Junius, und geben ihm durch ein heftiges und unaufhörliches Brüllen, durch das Bespringen anderer Kühe, Mangel der Freßlust, und durch das Aufschwellen der Geburtsglieder zu erkennen. Im Freyen auf der Weide empfangen sie mehrentheils alle beym ersten, zweyten und dritten Sprung glücklich, und die Kräfte des Ochsen zu diesem Geschäffte erhält man in diesen Monaten durch Gersten, Wicken, und besonders durch Hafer.

Die Kühe tragen 283 bis 285 Tage oder 9 Monate, und bringen im zehnten eins, und sehr selten zwey Kälber zur Welt (kalben, kälbern). Dieß geschieht fast jedesmal in den letzten Wintermonaten, im Februar und März. Da aber manchem Oekonomen sehr viel daran gelegen ist, zu einer bestimmten Jahrszeit eine frischmelkende Kuh zu haben, so hat man auch auf Mittel gesonnen, den Trieb zur Begattung, sowohl bey Ochsen als Kühen zu jeder Jahrszeit rege zu machen. Dem Ochsen, welchem es nur selten an Lust und Munterkeit zum Bespringen fehlt, reizt man, wenn man ihm das Maul mit einem Strohwisch bestreichet, mit welchem man die Geburtsglieder der Kuh gerieben hat. Den Kühen aber giebt man einige Gründlinge (Cobitis barbatula, *L.*), eine kleine bekannte Fischart, zu fres-

sen, oder sicherer, 14 Tage hintereinander in kleinen Portionen gestoßene Hanfkörner, oder nur die Oehlkuchen von denselben unter dem Futter, oder geröſteten Hafer mit Salz vermischt, oder Kümmel unter dem Futter, und man kann nach einem von diesen gebrauchten Mitteln, den Ochsen zulassen.

Denjenigen Kühen, welche mit der Heerde auf die Weide gehen, und die man zur Mästung gern gelte haben will, kann man die Luſt zum Rindern durch fein gepülvertes Glas, das man ihnen zwischen zwey Brodschnitten zu fressen giebt, benehmen.

Die Kühe, welche das zweyte und dritte Kalb bekommen, müssen vier Wochen vor ihrer Niederkunft, und vier Wochen nach derselben, mit einem guten lauen Getränke von schwarzem Mehl, Kleyen und schlechtem Getraide, und mit gutem Grase, Heu und Wurzeln gefüttert werden, damit sich die Milchgefäße erweitern, und die Euter groß und gefüllter werden.

Wenn die Kühe nicht von selbst 4 oder 6 Wochen, ehe sie kalben, die Milch verliehren, so muß man aufhören, sie zu melken, weil die Milch, die sie dann noch haben, dem zarten Kalbe nöthig seyn kann.

Da sie sehr oft schweren Geburten unterworfen sind, so muß ein geschickter Hirte die Lage des Kalbes in Mutterleibe, und die Handgriffe, die bey der Geburtshülfe nöthig sind, kennen, um ihnen in der Noth helfen zu können. Sie bekommen, wenn sie das Kalb gebohren haben, kein geistiges Getränke, sondern bloß ein Getränke von lauem Wasser, in welches eine Handvoll Roggenmehl und etwas Salz gemischt ist. Die Verzeh-

rung

rung der Nachgeburt muß verhindert werden, weil sie ihnen eine langsame Auszehrung verursachen soll.

Ein gesundes Kalb wird nach den ersten empfangenen Liebkosungen der Mutter durch Lecken, wobey man es mäßig mit Salz und Brodkrumen bestreut, das Euter sogleich von selbst suchen, und man läßt es auch die erste reinigende Muttermilch genießen.

Diejenigen Kälber, welche zur Nachzucht aufgestellt (angebunden) werden sollen, werden nicht von Kühen genommen, welche zum erstenmal kalben, sondern von solchen, die das zweyte, dritte, vierte oder fünfte Kalb bekommen, die viele Milch geben, und deren Milch mehr Butter als Käse giebt, und sie müssen, wenn sie recht gut werden sollen, vor oder kurz nach Weihnachten gebohren worden seyn. Sie saugen vier Wochen an der Mutter, und werden alsdann in einem andern Stall gebracht, um das Sohnen der Mutter und Tochter nacheinander zu verhindern. Es werden ihnen anfangs Milchgetränke mit Kleyen, Geschrot, oder grobem Mehl vorgesetzt, nach diesen werden sie, wenn man sie lauteres Wasser zu trinken dadurch gelehrt hat, daß man ihren Durst durch Bestreichung der Zunge und des Mauls mit Salz, erregte, mit geschnittenem Heu und Strohfutter, das mit Kleyen oder grobem Mehl vermischt ist (Siede), und mit aufgestecktem guten Heu, Hafer und Gerstenstroh weiter gefüttert, und zuletzt im May und Junius auch an Gras gewöhnt, welches man ihnen so lange unter die Siede schneiden läßt, bis man glaubt, daß sie ohne

Nachtheil ihrer Gesundheit auf die Weide gelassen, oder bloßes Gras und Kleefutter im Stalle genießen dürfen.

Andere halten folgende Schweizerart, die Kälber zu erziehen, für besser. Das Kalb darf nach derselben niemals an der Mutter saugen, sondern wenn es von derselben abgeleckt ist, so melkt man sie, und setzt die Milch dem Kalbe in einem irrdenen Geschirr vor, das immer äußerst rein seyn muß, damit die Milch nicht sauer wird, und in welches man die Hand verkehrt legt, so daß der Daumen nur aus der Milch hervorragt. Wenn es dann an dem Daumen zu saugen anfängt, so zieht man ihn in das Geschirr zurück, nimmt hierauf die Hand ganz heraus, und es wird forttrinken. Diese Täuschung wird so lange wiederholt, bis das Kalb diese Nahrung ohne Daumen zu sich nimmt, und zwar täglich dreymal. Drey Wochen lang bekommt es die reine Muttermilch, in der vierten gießt man ein wenig milchwarmes Wasser unter dieselbe, in der fünften den dritten Theil, in der sechsten die Hälfte Wasser, in der siebenten zwey Drittel Wasser, und endlich nach der siebenten bekommt es milchwarme Molke. Braucht man in der vierten Woche die Milch selbst, so kocht man grobes schwarzes Brod in Wasser mit etwas Milch vermischt zu einem Brey, und giebt ihm davon dreymal des Tages. Statt süßer Milch kann auch saure oder Buttermilch gebraucht werden, wenn man viele Kleyen und schwarzes Brod einmengt. Unter dieser Kost verfließt ein Vierteljahr. Nach dieser Zeit erhält es entweder saure Milch oder Molke mit gekochtem Leinsaamen, Oehlkuchen oder Nachkorn, und nach vier ganz verflossenen Monaten füttert man es mit gutem

Heu

Heu und Hafergarben, und tränkt es mit Milchmolken. Das ganze erste Jahr bekommt es dann gewöhnlich kein Gras oder grünes Futter, und erst im zweyten wird mit Gras, und besonders mit Klee im Stalle die Fütterung fortgesetzt; doch kann man auch mit der gehörigen Vorsicht Luzerner- und Spanischen-Klee im ersten Jahre füttern. Die guten Wirkungen dieser letzten Methode sind, daß die Kälber keine Haare einsaugen, die Kühe und Kälber beym Entwöhnen nicht nach einander schreyen *), die Milch gehörig aus dem Euter gezogen wird, und die Kälber allezeit größer und stärker werden müssen, als nach der vorigen Erziehungsart.

Im ersten Winter erfordern die Kälber besondere Aufsicht und Wartung; denn dieser macht eigentlich den gefährlichsten Zeitraum ihres Lebens aus. Im folgenden Sommer werden sie alsdann schon stark genug, um vom nächsten Winter nichts mehr fürchten zu dürfen. Da sie unter zwey Jahren noch keine Zeichen des Alters haben, so werden sie im ersten Jahre Abfetzkälber oder Zuchtkälber, im zweyten aber die weiblichen Verfen und die männlichen Stiere genennt.

Von Kühen, welche gut ans Fleisch setzen, und nicht viel Milch geben, bindet man die Ochsenkälber an.

Das Verschneiden geschieht entweder in den ersten Wochen, oder wird, wie einige lieber wollen, bis

*) Um die Mutterkühe in Holland nach dem Abbinden ihrer Kälber vom Blöcken zu verhindern, oder vielmehr einen Schmerz durch den andern zu lindern, macht man ihnen einen Schnitt in die Ohren.

ins zweyte Jahr verschoben, weil alsdann erst der Ansatz zu einem starken Hals und Brust, und zur Größe und Stärke da ist, und jetzt erst die schönsten als Bullen zur Nachzucht ausgesucht werden können. Allein länger darf auch diese Operation nicht verspart werden, sonst wildern sie schon, und wachsen nicht mehr so gut *). Man bedient sich hierbey gewöhnlich einer kürzern Methode, als bey den Pferden. Man bindet den jungen (oder alten) Ochsen fest, und läßt ihn von einigen starken Personen auf der Seite an eine Mauer oder Wand andrücken. Der Schäfer oder Hirte nimmt alsdann zwey gleiche acht Zoll lange und zwey Zoll dicke Klippelhölzer, welche an dem einen Ende zusammengebunden sind. Zwischen dieselbe klemmt er den Hodensack auf der offnen Seite ein, und bindet sie, indem er sie fest zusammenhält, und nach den Hoden zu abwärts straff anzieht, auf der andern Seite gut zusammen. Man sieht zuweilen zu, ob die Hölzer noch fest gebunden sind, und läßt sie von selbst mit dem verfaulten Hodensack abfallen. Mit bloßen Bindfaden läßt sich diese Castration auch verrichten. Das männliche Rindvieh bekommt nach diesem Verlust seiner Mannbarkeit einen längern Hals, Kopf, Leib

*) Auch ihr Trieb zur Fortpflanzung verliert sich alsdann nicht, und sie pflegen sich noch immer hitzigen Kühen mit großem Nachtheil zu nähern. Denn fast das bloße Berühren eines solchen Ochsen erzeugt an den Geschlechtstheilen der Kuh gewisse Fleischgewächse oder Warzen, welche wohl von einer unreifen eiternden Saamenmaterie entstehen, und durch ein glühendes Eisen wieder vertrieben werden müssen.

Leib und Hörner. Es wird, da es seine Wildheit, seiner Stärke unbeschadet, verliehrt, mehr zur Arbeit geschickt, gelehriger und verträglicher. — Im dritten Jahre ist es die höchste Zeit, einen Zugochsen zahm zu machen, und unter das Joch zu beugen, weil mit seinem Alter auch seine Ungelehrigkeit, Unbändigkeit und Halsstarrigkeit zunimmt. Zwey, die zusammen an einem Joche ziehen sollen, führt man zusammen an die Weide, und bindet sie an eine Krippe.

Man beschneidet auch die Kuhkälber, die den Namen Nonnen bekommen. Dieß geschieht aber in den ersten Wochen. Man rühmt ihre Brauchbarkeit beym Fuhrwerke, ihre Behendigkeit, Stärke und Anlage zum Fettwerden gar sehr.

Krankheiten und Mittel dagegen.

Das Rindvieh, das auf die Weide getrieben wird, ist mehrern Krankheiten, die von schädlichen und verdorbenen Gewächsen, von der schnellen Abwechselung und von der schlechten Witterung entstehen, ausgesetzt, als das Vieh, welches im Stalle bleibt. Es gehören dahin vorzüglich

1) Die Hornviehseuche, Viehseuche *), welche zuweilen, wie die Pest, um sich greift, und die Länder sperrt.

*) v. Willburg Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die Erkenntniß und Heilungsart der Krankheit des Rindviehs. Nürnberg. 1781. 8.

Blumenscheins vollst. Unterricht für den Landmann, wie sich selbiger bey herrschenden Viehseuchen zu verhalten habe. München. 1787. 8. Dessen vollst. Sammlung praktischer Heilungsarten aller Viehseuchen. Ebendas.

Wollen-

sperrt. Sie ist von mancherley Art, die vorzügliche aber ist die Lößerdürre (Magenseuche, Ruhr, Viehpest, Blatternpest, Pestis variolosa boum *)!).

Diese Krankheit erscheint mit Fieber, Verlust der Freßbegierde und des Wiederkäuens; das Rückgrad ist sehr empfindlich, die Nase trocken, die Augen voller Hitze; nach und nach fallen die Augen ein und Nase und Rachen stinken, auch die Bauchmuskeln ziehen sich krampfhaft zusammen und der Durchfall, der wie Aas stinkt, stellt sich ein; die Haut bekommt auch zuweilen einen Ausschlag oder Blattern. Diese Krankheit tödtet oft in funfzehn bis zwanzig Stunden, oft auch erst den dritten, fünften und siebenten Tag. Thiere, welche den zwölften Tag erleben, kommen zuweilen durch. Bey der Oeffnung ist der Lößer oder Faltenmagen wie eine große Kugel und hart, und das zwischen den Blättern liegende Futter ist zum Bröckeln dürre; der vierte Magen ist entzündet, und riecht aashaft. Hr. D. Meyer in Alt-Stettin hält diese Seuche für einen starken Schnupfen. Das Rindvieh schnaube nämlich bloß durch die Nase (wenn es nicht in der Jugend durch Aufsperren des Mundes und Zuhalten der Nase gezwungen worden wäre, durch den Mund zu schnauben) und so erstickt es

Wollenstein das Buch von den Seuchen des Hornviehes, der Schafe und Schweine, für die Einwohner auf dem Lande. Wien, 1791. 8.

*) D. Reich Belehrung für den Landmann über die Rindviehseuche und die Inoculation derselben. Nürnb. 1797.

es eigentlich. Dieß käme von den Geilhörsten auf den Wiesen her, die von Rindviehmist und Urin entstehen und die das Vieh aus Ekel übergienge, im Herbst aber, wenn es nicht viel mehr fände, alles schon halb in Fäulniß übergangen fräße, und dadurch den Schnupfen erhielte. Das für Aberglauben ausgeschriene Nothfeuer sey die beste Cur. s. Anhang zur Berliner Preißschrift: Von Verbindung der Mathem. und Phys. mit der Landwirthschaft. 1769.

So viel man bemerkt hat, sollen lange anhaltende dürre Witterung, staubige Weide, unreines Getränke, Pfützensaufen und Mehlthaue diese Fehler der Eingeweide bewirken. Das Maul des Viehes des Tages etlichemal mit Salz ausgerieben, und mit Essig ausgewaschen, und ihm eine Kugel von Sauerteig zwey Zoll im Durchmesser und ein Paar Messerspitzen voll Salz eingegeben, hilft im Anfang. Dasjenige Vieh, das beständig und stark mit Leinkuchenmehl gefüttert worden ist, soll mitten in der Viehseuche unter dem angesteckten Vieh gesund geblieben seyn. Auch saure Aepfel oder Extract davon, sollen es retten und bewahren.

Bey der im Jahr 1794—97 im mittlern und südlichen Deutschland so heftig wüthenden Lößerdürre hat man folgendes Verfahren am zweckmäßigsten gefunden.

Das kranke Vieh wird allein an einen reinlichen luftigen Ort gethan, und man giebt ihm aller drey Stunden ein Pulver aus 1 Loth Weinstein, und 2 Quentchen gepülvertem Tausendgüldenkraut oder Enzian mit einer Schoppen Wasser und zwey Löffel voll Honig, Hollunder- oder auch Wachholdermuß vermischt. Das Saufen be-

steht

steht aus Mehl und Sauerteig mit etwas Weinessig vermischt.

Zum Präservativ, wo die Krankheit noch nicht ist, zieht man dem Vieh an der Brust ein Haarseil mit Spanischfliegenpflaster bestrichen und erwärmt.

Zu obigem Pulver kann man noch etwas gestoßene und durchgeschlagene büchene Holzkohlen setzen, die das beste der Fäulniß widerstehende Mittel sind.

Ein anderes Mittel ist das im Bambergischen für bewährt gefundene:

a. Verwahrungsmittel für das annoch gesunde Vieh.

Man läßt dem nüchternen Vieh gemäßigt zur Ader; alsdann nimmt man Kohlen von Büchen- und Birkenholz zu gleicher Vielheit, stößt dieselbe zu feinem Pulver, giebt dem Vieh auf jedes Viehfutter einen starken Eßlöffel voll, wohl eingemengt, und fährt mit dieser Cur vierzehn Tage bis drey Wochen fort.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß das gesunde Vieh gegen diese ansteckende Seuche stets bewahrt, auch das kranke Vieh davon geheilt worden ist.

b. Heilungsmittel für das bereits erkrankte Vieh.

Man mischt Salz, Ruß und Essig unter einander, und reinigt täglich dem kranken Vieh drey- bis viermal die Zunge und das Maul damit. Gleich darauf wird jedem Stücke Vieh ein auch zwey Löffel voll, nach Stärke der Krankheit, Acidi Vitrioli tenuis, so wie

solches

solches in den Apotheken bereitet wird, mit 1/2 Maaß lauwarmen Wasser erweicht eingeschüttet. Mit dieser Cur wird bis zur Genesung fortgefahren. Das Vieh muß aber beständig bedeckt und warm gehalten, und nur in den warmen Mittagsstunden aus dem Stalle gelassen werden. Der Stall muß immer rein seyn, und das Vieh bloß mit lauer dünner Mehlbrühe getränkt, oder ihm dieselbe, wenn es nicht saufen will, eingeschüttet werden. Zeigt das Vieh Lust zum Fressen, so giebt man ihm eine Mehlsuppe, die aus Mehl, Wasser, etwas Butter und Salz bereitet wird. Das Acidum vitrioli tenue kann auch als Verwahrungsmittel dem Vieh täglich ein- bis zweymal gegeben werden.

Eine im Lüneburgischen gemachte Erfahrung zeigt, daß das Rindvieh, das bey Pferden stand, oder dahin gestellt wurde, von der Lößerdürre befreyt blieb.

Eine andere Art der Hornviehseuche ist die Lungen-Seuche, d. i. eine faulige Lungenentzündung, welches Uebel nicht von einer Ergießung, eigentlich Einsaugung der Galle aus der Leber ins Blut, wie bey der Ueberzällung geschieht, sondern von Erzeugung eines schleimigen, faulen, reizenden Stoffs in den ersten und zweyten Wegen herzuleiten ist; wodurch faulartige Entzündungsfieber mit Entzündungen der Eingeweide hervorgebracht werden können. Man würde hier am besten nebst einem zweckmäßigen diätischen Verhalten, sogleich den erkrankten Thieren ein Fontanell oder Eiterband vor die Brust legen, ihm keine feste Nahrung, sondern dünnes Gesöffe von Malzschrot mit Essig säuerlich gemacht reichen und denselben langsame Bewegung in der freyen

Luft

Luft machen, auch jedem Stücke täglich dreymal nachfolgenden Trank geben. Nimm Alltheekraut 2 Loth; dieß wird mit 1 1/2 Pfund Wasser bis auf 1 Pfund zugedeckt eingekocht, alsdann durchgeseigt und 1/2 Quentchen Campher, den man mit einigen Tropfen Brandwein aufgelöst haben muß, 1 Loth Salpeter, 6 Loth Glaubersalz, 2 Eßlöffel voll gemeinen Honig, und 2 Kaffeetassen voll Weinessig zugemischt. Den alten Thieren giebt man diese Portion täglich dreymal, jungen aber bis zum Kalbe nur die Hälfte oder ein Drittel. Anstatt des Alltheekrautes kann man auch Leinsaamenkörner nehmen. Um die Thiere zum Wiederkäuen zu reizen und der Fäulniß zu widerstehen, ist es gut, wenn man dem kranken Vieh des Tags einigemal die Zunge mit Salz reibt und große Bissen Brodkrume, in Essig eingetaucht, in den Rachen steckt.

2) Die Knotenkrankheit, das fliegende Feuer, der fliegende Brand verursacht zuweilen ein großes Viehsterben. Es entstehen an verschiedenen Theilen des Leibes große Knoten, die eine gelbe Feuchtigkeit enthalten, und von welchen das Vieh, wenn sie nahe am Kopfe sind, in acht bis zwölf Stunden, und wenn sie weiter davon sind, in 24 bis 36 Stunden stirbt. Sie bricht allezeit im August aus, das Rindvieh wird damit überfallen, wenn es des Abends im Walde weidet, man glaubt durch den Stich einer Wespe, und giebt die große Holzwespe als Ursache an *). Diese Krankheit steckt nicht an.

*) Sirex Gigas, L. (s. Hirsch). Mir kömmt diese Ursache außer vielen andern Gründen, auch daher sehr unwahrscheinlich

an. Man schneidet dem Vieh die Knoten an den Orten, wo es geschehen kann, ganz aus, oder wo es nicht geschehen kann, schneidet man sie nur auf, drückt die giftige Feuchtigkeit heraus, und legt dürre Christwurz auf, damit sie vollends herausgezogen wird, und reinigt die Wunde mit Weinessig oder Urin.

3) Der Zungenkrebs *), die Mundfäule, die Finnen, der Krebs, die Schwämme — eine ansteckende Krankheit. Aus kleinen weißen Körnchen an der Zunge und dem Zahnfleisch des Rindviehs wird eine oder mehrere schwarze Blasen; die Stimme wird rauh; es steht schwer auf den Hinterfüßen, und bekommt einen starken Husten, mit einem üblen Geruch begleitet, welchen Zustand man auch die faule Bräune nennt. Diese Krankheit entsteht wahrscheinlich vom Genuß giftiger und besonders vom Mehlthau verdorbener Kräuter oder faulen stillstehenden Wassers. Ein Verwahrungsmittel gegen dieselbe ist Wachholderbeeren, oder Lorbeeren und Küchensalz gepülvert fünf Finger voll die Woche etlichemal unter dem Futter gegeben. Den Thieren, die eine Blase haben, muß dieselbe vor allen Dingen aufgeschnitten und mit scharfen Mitteln, als mit Weinessig

scheinlich vor, weil es alle Jahre diese große Holzwespe giebt, 1787 und 1797 sehr häufig gab, und man doch von diesem Uebel nichts gehört hat, und weil sich dieses Insekt nach meinen Beobachtungen nie ans Vieh, noch dahin setzt, wo sich das Vieh etwa drauf legen könnte.

*) Von dem sogenannten Epidemischen Zungenkrebs unter dem Rindvieh. Göttingen, 1787. 8.

essig ausgewaschen, mit blauen Vitriol ausgerieben und mit Salz, Alaun und Salpeter bestreut werden, sonst fällt die Zunge in kurzer Zeit vom Brand verheert, stückweise heraus. Innerlich giebt man im Frühjahr alle Morgen und Abend dem Vieh frische Weidenblätter, ein Paar Löffel voll Salz, und einen Löffel voll gestoßene Enzianblätter; im Winter aber ein halb Pfund Enzianwurzel, acht Loth Schwefel, vier Loth Salpeter, und drey Loth Ofenruß, gepülvert in einem Tag drey Eßlöffel voll in frischem Wasser. Auch folgende Mittel helfen. Wenn man nämlich bemerkt, daß die Zunge des Thiers nicht rein ist, so schlägt man ihm die Drosselader und giebt ihm einen Trank aus Salpeter, Weinsteinrahm und Campfer und in der Folge Chinarinden und stärkere Säuren. Dabey bekommt es nur halbe, aber unverdorbene Fütterung, und es wird ihm ein Fontenell an die Brust gesetzt (eingezogen) aus der in spanischer Fliegentinktur geweichten schwarzen Nießwurz.

4) Die Maul- und Fußkrankheit, oder Pestblatter. Es entstehen zwischen den Klauen und im Maul am Gaumen, Zahnfleisch, am Ende des Mastdarms, und auf der Zunge helle Wasserblasen, wie die Haselnüsse groß. Die Ursach dieser Viehseuche ist wohl schlechte Witterung, und die dadurch verunreinigte Luft, welche schädliche Dünste in sich enthält, die auf das Rindvieh wirken, große Hitze und Dürre. Man verwahrt dasselbe zu solchen Zeiten, wenn diese Seuche herrscht, gegen diese Krankheit, wenn man ihm Morgens und Abends in seinem Tranke Leinkuchen mit einem halben Loth Salpeter giebt. Die Blasen selbst reibt man mit

einem

einem Tüchelchen, das in Salzwasser getaucht ist, an den Füßen und im Maule auf, und bestreicht auch wohl die Stellen, wo die Blasen standen, mit Theer.

5) Das Blut. Es ist dreyerley.

a) Das Herzblut auch das Blähen, Auflaufen. Dieß ist eine Krankheit der Kühe, wenn sie bey ungewohnter Kleefütterung, hungrig auf einmal eine zu große Menge saftiger Kräuter, besonders aber Klee fressen, welcher ihnen im ersten Magen stecken bleibt und ihn aufblähet. Ein einfaches Mittel ist folgendes: Man vermischt 1/4 Pfund Leinöl mit einem Nösel lauer Milch, und gießt es ein. Nach Verhältniß des Viehes wird dieses Mittel verstärkt oder vermindert. Wenn aber die Haut schon wie eine Trommel aufgeschwollen ist, so muß man mit dem Stich helfen. Man nimmt darzu ein Stechmesser (Trokar), so wie es bey Menschen in der Wassersucht zum Abzapfen gebraucht wird, stößt es dem Vieh auf der linken Seite zwischen der letzten Rippe, dem Hüft- und Kreuzknochen in der Mitte der Weiche, senkrecht ein, und läßt den Wind durch die mit dem Messer eingestochene Röhre herausdringen. Im Nothfall kann man auch ein Brodmesser dazu brauchen. Auch hilft man dem Vieh gewöhnlich, wenn man ihm eine Hand voll Schnupftabak in Milch, oder einen lebendigen Frosch eingiebt.

b) Das Lendenblut, wo sie Blut mistten. Es entsteht von zu fettem Gras auf der Weide, von jungem Laube, von einem hitzigen Trunk in heißen Sommertagen, und besonders vom kleinen Sauerampfer, den

sie im Walde zu häufig genießen. Ein Stück eingestecktes Speck hilft.

c) Das Blutharnen (das Rothe), welche Krankheit sie besonders alsdann befällt, wenn sie in waldigen Gegenden im Frühjahr Kräuter fressen, auf welche der Blumenstaub der Fichten und Kiefern gefallen ist. Ein halb Loth Alaun in sechs Nöseln Milch aufgelöst, und auf einmal eingegeben, so wie Schweinefett, Heu und öfteres kaltes Getränke, sind zwey gute Mittel; und wenn die Krankheit heftig ist, so schlägt man dabey eine Ader.

6) Das Feuer. Die Kühe nehmen bey der besten Fütterung ab, und sehen trübe aus den Augen. Die Haut liegt ihnen fest auf dem Leibe auf. Unterbrochene Ausdünstung ist gewöhnlich die Ursache. Man zieht ihnen mit Christwurz an den Hinterbeinen ein.

7) Die Kröte. Sie ist zweyerley:

a) Die Herzkröte, innerliche Kröte, das böse Ding. Sie blöken plötzlich schrecklich, fallen nieder, und sind, wie vom Schlag gerührt, todt.

b) Die ordentliche und äußerliche Kröte. Bey dieser Krankheit schwillt diesen Thieren der ganze Kopf und der Mastdarm. Man schlägt ihnen eine Ader am Halse, sticht ihnen den Geschwulst mit einer spitzigen Nadel auf, daß die gelbe Feuchtigkeit durchfließt, und giebt ihnen einen Löffel voll Mithridat und Bergöl ein. Sonderbar ist es, daß hitzige Kühe diese Krankheit meistens aus Rache und Zorn bekommen, wenn sie in einem Kampfe nicht gewonnen haben, oder stark gestoßen worden sind.

8) Die

8) Die Darmgicht, Kolik, das Darmschneiden. Sie wälzen sich hierbey schrecklich. Ein Löffel voll Eßig mit Kreide curirt sie.

9) Der Durchfall. Diesen stopft ein Hühnerey oder Malz; und ist er heftig, blauer Thon eines Eyes groß in warmen Wasser aufgelößt. Bey jungem Vieh leistet die Rhapontikwurzel die vortrefflichsten Dienste, bey Kälbern aber, die noch an der Milch sind, und vielfältig damit behaftet werden, eine Haselnußgroß ungesalzene Butter, etlichemal eingegeben. Letzteres hilft auch den säugenden Lämmern.

10) Die Entzündung des Euters, und das Aufspringen der Striche, welchen Uebeln die Kühe durch vielerley Zufälle so sehr ausgesetzt sind, vertreibt man durch Bestreichung mit ungesalzener Butter, oder durch Auflegung einiger Lilienblätter, die etliche Tage in Baumöhl eingetaucht gewesen sind.

11) Geschwulste und Knoten des Euters. Diese bringt man, wenn sie sich nicht durch gelindes Reiben mit Kampher zertheilen lassen, durch Umschläge von warmer Hafergrütze zur Eiterung, und heilt sie alsdann, wie andere Geschwüre. Auch dient ein Umschlag, mit einem Brey aus Leinsaamen in Milch gekocht, wider alle Geschwüre und Geschwulste.

12) Alle äußerliche Fleischwunden von Stößen oder Schlägen werden mit einer Salbe von Eyerdotter, eben so viel dickem Terpentin und ohngefähr einer Wallnuß groß ungesalzener Butter täglich dreymal verbunden und geheilt. Andere Quetschungen und Beulen curirt man folgendergestalt: Man löset in

einem Glas voll Brunnenwasser so viel Salz auf, als sich darin auflösen läßt und vermischt hernach eben so viel Essig damit. Man reinigt die Wunde, taucht ein leinenes Tüchlein in jenes lau gemachte, mit Essig vermischte Wasser, legt es auf die Quetschung oder Beule und auf dieses Tüchlein ein vierfaches leinenes Tuch und befestigt hernach alles mit einer Binde. Dieß thut man täglich drey- bis viermal und der Schade heilet dadurch ohne Eiterung vollkommen. Das auf ein leinenes Läppchen gestrichene, und auf einen solchen Schaden öfters gelegte reine Honig ist ein eben so heilsames und bewährtes Mittel. Auch bey Quetschungen, Beulen und Verwundungen der Pferde, ja sogar der Menschen, sind diese Mittel gut zu brauchen.

13) Eine Haarkugel findet sich zuweilen in dem Magen dieser Thiere, welche aus den Haaren zusammengeballt ist, die sie sich ablecken und verschlucken.

14) Die große Warzen unterbindet man mit einem Pferdehaar oder einem seidenen Faden, und die kleinen beizet man mit einer scharfen Lauge weg.

15) Die Franzosen oder die Franzosenkrankheit. Man bemerkt beym Ausschlachten des Rindviehes zuweilen in der Brusthöhle, auf den Lungen der innern Brusthaut, der Fläche des Zwergfells, in der Bauchhöhle und auf den Gedärmen bald mehr bald weniger, größere oder kleinere, ungleichgestaltete bläuliche, fleischfarbene oder marmorirte Fettklumpen, die aber weder übel riechen, noch schlecht schmecken und daher unschädlich sind. Diese nennt man die Franzosen. Es sind aber keine venerische Geschwulste (und das Fleisch

solcher

solcher Thiere ist daher sehr gut zu brauchen) sind vielmehr von Oel und Gallerte zusammengehäufte Fettklumpen, welche eine verfleischte Limphe enthalten, und keine Blasenwürmer, wie man sonst vermuthet und geglaubt hat. *)

16) Wenn das Vieh zuweilen nicht fressen will, so darf man nur das Futter in Weinessig einweichen und mit Salz bestreuen; hierdurch wird der Appetit sich gewiß wieder zeigen. Es wird auch nicht unschicklich seyn, hier

17) des Selbstaussaugens zu erwähnen, welchen Fehler oft die besten Kühe an sich haben. Das beste Mittel ist: Man nimmt recht stinkenden faulenden Käse, zerdrückt ihn in einen Schoppen Weinessig zu Brey, und bestreicht das Euter damit.

Feinde.

Die Wölfe stehlen Kälber von der Weide weg. — Das Rindvieh wird von der Kuhmilbe, Hundemilbe oder Zangenlaus (Acarus reduvius), Kälberlaus (Pediculus vituli et Bovis Tauri), von den Stechfliegen (Conops), Mücken und Ochsenbremen sehr gepeiniget. Man besprengt es zur Abschreckung dieser Feinde mit Wasser, worin grüne Nußschalen und Nußblätter abgekocht sind oder mit Heringslake.

*) Graumanns Abh. über die Franzosenkrankheit des Rindviehes und die Unschädlichkeit des Fleisches solcher Thiere. Rostock und Leipzig 1784.

Die Ochsenbremsen *) verursachen die sogenannten Engerlinge, welche die Haut löcherlich machen, und dem kränklichen Vieh sehr nachtheilig sind.

Die große Holzwespe (s. Knotenkrankheit) soll die tödtliche Knotenkrankheit verursachen.

In den Eingeweiden machen ihnen oft Bandwürmer (Taenia bovina), in dem Netze große Blasenwürmer, in den Lungen Fadenrundwürmer und besonders in der Leber Egelwürmer große Beschwerden, ja tödtliche Krankheiten. Auch von einer Art Lungenwürmer, die in Klumpen von Tausenden oft in den Röhren der Kälber stecken, ersticken zuweilen die Kälber. S. Schriften der Berl. Gesellsch. naturforschender Freunde. I. 115.

Nutzen.

1) Es ist oft unter den Oekonomen Streit gewesen, ob die Pferde oder Ochsen in der Oekonomie nützlicher wären, und man ist immer geneigt gewesen, zum Vortheil der Ochsen zu sprechen **); und so viel ist auch allerdings gegründet, der Ochse ist wohlfeiler, nimmt mit

*) Oestrus bovis, L. Kuhbremse, Pisselmücke, Baier, Biesfliege, Waldfliege, Viehfliege. Die Geschwulste, die davon entstehen, heißen Dasselbeulen, Viekebeulen.

**) Ein erfahrner Oekonom berechnete in seiner Wirthschaft den Gewinn von 8 Ochsen gegen 6 Pferde in 5 Jahren zu 1000 Rthlr. S. Funk's Naturgeschichte für Schulen. I. 39.

mit geringerer Kost vorlieb, giebt bessern Dünger, ist wenigern Krankheiten ausgesetzt, als das Pferd, und kann, wenn er ausgedient hat, gemästet werden, allein das Pferd verdrängt ihn wegen seiner Langsamkeit in ebenen Gegenden und großen Landwirthschaften, und er darf nur in bergigen Gegenden wegen seines anhaltenden und sichern Schrittes am Pflug und Wagen den Vorzug vor dem Pferde erhalten.

Man spannt gewöhnlich an Pflug und Wagen zwey Ochsen an ein Joch, um die Gleichheit des Schrittes zu erhalten; allein wenn dieselben nicht genau einerley Höhe, Gang, Schritt, Munterkeit und Stärke haben, so ist dieß eine große Plage für dieselben, und man thut besser, man jochet jeden Ochsen allein, entweder vor die Stirn, oder im Nacken an. Er läßt sich auch mit einem leichten Kummt an der Brust anspannen, doch scheint er hier seine gehörige Stärke und Folgsamkeit nicht zu beweisen.

In einigen Gegenden Asiens und Afrika's wird er, wie in den ältesten Zeiten, zum Ausdreschen des Getraides *), zum Reiten und Tragen gebraucht, und in einigen Gegenden Schwedens muß er in den Ziegelhütten den Thon treten.

Die Kühe unter das Joch zu beugen, wie es auch in einigen Thüringischen Orten üblich ist, und besonders im Gespann mit einem Ochsen oder Pferde, ist grausam, da sie durch solche schwere Arbeiten, bey welchen sie auch noch durch ihre Milch nützen müssen, zu sehr

*) 5. B. Mos. 25, 4. 1. Cor. 9, 19.

abgemattet und elend werden. Verschnittene Kühe oder sogenannte Nonnen sollen aber gut und noch besser als die Ochsen gebraucht werden können.

2) Den größten Nutzen leisten die Kühe durch ihre Milch, und die vier Zitzen am Euter, wodurch sie sich von allen mit ihnen verwandten Thieren unterscheiden, und ihre Fähigkeit auch ohne ein säugendes Kalb lange Milch zu geben, beweist, daß sie dadurch ganz vorzüglich zum Nutzen der Menschen bestimmt sind. Gute Kühe geben in einem Tage, wenn sie Kleefutter bekommen und im Stalle stehen, 10 bis 12 Maaß Milch. Man melkt sie in den Thüringischen Walddörfern, wo sie den ganzen Tag über in den Bergen auf der Weide bleiben, zweymal, und in den Landdörfern gewöhnlich dreymal des Tages. Kühe, die immer im Stalle sind, sollten billig alle Tage dreymal gemolken werden, denn durch das öftere Melken werden die Milchgefäße erweitert, und es wird immer mehr Milch im Euter abgesondert. Gute Milch darf weder zu dick noch zu dünne, sondern sie muß vielmehr in Ansehung ihres Zusammenhangs so beschaffen seyn, daß ein Tröpfchen, das man abfließen läßt, seine Rundung behält, und eine schöne weiße Farbe hat. Diejenige, welche zuletzt aus den Euter kommt, ist allzeit besser als die erstere. Nach dem Melken muß die Milch sogleich nicht durch ein Haarsieb, oder durch ein wollenes Tuch, sondern durch einen wohlgereinigten leinenen Beutel, welcher in einen Ring eingefaßt ist, geschüttet werden, und zwar, wenn sie Rahm (Sahne) ansetzen soll, in ein breites irrdenes Gefäß, worin sich die in die Höhe steigenden öhligen Theile, die die Sahne bil-

bilden, besser sammeln können, als in einem engen hohen Topf. Der Ort, wo die Milch aufgehoben wird, muß nicht dumpfig, und weder zu warm, noch zu kalt seyn. Der Rahm, welcher gebuttert werden soll, darf nicht zu lange auf der geronnenen (sauern) Milch stehen, sonst wird er scharf und übelschmeckend, und theilt diesen scharfen und übeln Geschmack auch der Butter, die im May und Junius, und in Hollstein und Thüringen am besten ist, mit. Die Butter wird, außer zur Speise, zum Einschmelzen der Wolle vom Tuchmacher, in Salzsiedereyen, um das Salz zum Schäumen zu bringen, in Zuckersiedereyen, um das Aufwallen des Zuckers beym zweyten Sud zu mäßigen gebraucht. Die Buttermilch kann man trinken und zu Speisen verbrauchen, eben so wie die saure. Letztere giebt, wie bekannt, die gewöhnlichen Käse, welche nach der verschiedenen Behandlungsart gut oder schlecht werden. Die Edammer, Limburger, Pflastersteinkäse, Aberdammer, die Schweizer- und Parmesankäse behaupten vor allen übrigen den Vorzug. Auch die Molke, die dabey zurück bleibt, kann man in der Oekonomie und Arzney verschiedentlich nützlich anwenden, und in Salzsiedereyen schäumt man das Salz damit. Das Waschen mit saurer Milch ist auch ein gutes Mittel wider die Sommerflecken, wenn man sich dabey der Sonne entzieht. — Man bedienet sich auch jetzt der Milch mit mehrern Vortheil zur Stärke, weil sie die Leinewand nicht zerfrißt. Man setzt sie nämlich 48 Stunden an einen kühlen Ort, verhindert das Gerinnen, nimmt die Sahne sehr rein ab, und taucht darein die gewaschene Leinwand.

Die

Die Milch, welche sich in den Eutern der Kühe, ehe sie kalben, sammelt, brauchen die Isländer, als einen Leim, um Bücher, Holz und andere Dinge damit zu leimen, und auch unter die Dinte.

3) Das Rind- und Kalbfleisch ist ein vorzügliches Nahrungsmittel der Menschen, welches ihnen, auch bey den öftersten Genuß, keinen Eckel verursacht, wie die andern Fleischarten, und schmackhaft, nahrhaft und leicht verdaulich ist. Es wird frisch, geräuchert und mit Salpeter eingemacht, oder als Pökelfleisch gegessen, und auf vielerley Art zugerichtet. Die Kalbaunen und übrigen Eingeweide werden ebenfalls gegessen; das Fett giebt gute Suppen, und das Mark nährt und stärkt entkräftete Personen.

4) Mit den Haaren stopft der Sattler Sättel, Polster und Stühle aus; der Filzmacher macht davon Matrazen und Filzstiefeln, der Tüncher mischt sie unter seinen Kalch, um ihn mehr Festigkeit zu verschaffen, und der Ackerbesitzer kann diejenigen, welche beym Weißgerber, wo sie mit Kalch vermischt sind, abgehen, als einen vortrefflichen Dünger auf nassem Boden brauchen. In Rußland weiß jede Hausmutter aus den bloßen Kuhhaaren ein fingerdickes Tuch, Woilok genannt, zu bereiten. Der gemeine Mann schläft darauf, und bedeckt damit den Boden. Lepechins Reise I. 140. Gmelins Reise V. 12.

5) Aus den Häuten der Kälber, Kühe und Ochsen machen die Roth- und Weißgerber allerhand Lederarten, und der Pergamentmacher aus den Kalbfellen Pergament. Mit dem aus diesem Leder bereiteten

Juf-

Juften, deſſen Bereitung ein Geheimniß war, führt Rußland einen anſehnlichen Handel. Die Koſtromiſchen und Jeroslauiſchen ſind die beſten. Ein gutes Juftenleder muß nicht allzuſchwer und groß, geſchmeidig und wohlriechend ſeyn, die Fleiſchſeite muß eine weiße, und die andere eine friſche Farbe haben. Der weiße engliſche Juften und der ſchwarze Thranjuften gehört auch zu den beſten Arten. Unter den rothgegerbten Kalbleder iſt das engliſche das beſte. Das Briſtoliſche, Erlangiſche und Schweizeriſche iſt bekannt genug. Das Bauzener iſt auf der Narbenſeite karmoiſinroth. Der vielfältige Gebrauch dieſer Produkte iſt zu bekannt, als daß ich nöthig hätte, ihn zu beſchreiben.

Von den Abfällen bey der Zubereitung der verſchiedenen Lederarten, ſo wie von den Knorpeln und Sehnen, wird der Hornleim oder Schreinerleim verfertiget, guter Dünger geſammelt, und die Schweine werden von dem Abſchabſel des Leders ſo fett, daß ſie nicht aufſtehen können. Beckmanns Technologie 240. 2. In Frankreich machen die Cretoniers, welche die Abfälle in den Schlachthäuſern verarbeiten, eine eigene Handthierung aus. Sie ſchmelzen das Fett aus dergleichen Abgängen und preſſen ſie aus; das braune Fett verkaufen ſie an die Gerber und mit dem Ueberbleibſel mäſten ſie Schweine. Encyclop. method. Arts et Metiers. I.

Man macht auch Felle mit den Haaren gahr, und braucht ſie zu Stühl- und Kofferbeſchlägen, und zu Ranzen. Die auf ſolche Art gegerbten Felle von ungebohrnen Kälbern geben gute Handſchuhe und Gebräme;

und

und andere Kalbfelle verhüten, unter das Betttuch gelegt, das schmerzhafte Durchliegen der Kranken.

Aus dem mit Kalch gereinigten Felle eines Kalbskopfs kann man einen sehr guten Leim zum Zusammenkitten des zerbrochenen Porzellans und zum Lackiren kochen.

6) Die Hörner der beschnittenen Ochsen verarbeitet der Drechsler zu Pfeifenröhrchen und andern Dingen, der Hirte zu blasenden Instrumenten, und die des andern Rindviehes der Hornarbeiter und Kammmacher zu Dintefäßern, Knöpfen, Dosen, Pulverhörnern, Messerheften, Kämmen u. s. f., und die Abgänge von diesen Arbeiten geben den besten Dünger.

7) Die Weißgerber brauchen einen an einen Stock befestigten Ochsenschwanz, statt des Pinsels, um die Felle mit Kalch einzuschmieren. In Ostindien braucht man ihn zu Fliegenwedeln.

8) Das Blut des Rindviehs braucht man in Zuckersiedereyen, um den Zucker zum Schäumen zu bringen und zu reinigen; in den Berlinerblaufabriken, als einen Zusatz zu dieser Farbe unter dem Namen Blutlauge; in Salzsiedereyen, um das Salz zum Schäumen zu nöthigen; zum Anstreichen allerley Holzwerks; zum Zeugfärben; zur Destillation um Dippels thierisches Oel, welches officinell ist, daraus zu gewinnen; zu Dünger, und zu einem dauerhaften Ofen- und Wasserkitt.

9) Die Ochsenklauen werden vom Drechsler, Messerschmide zu Heften, und vom Kammmacher verbraucht. Ueberhaupt muß man sie, wie alle Viehklauen, auffammeln, um entweder das Fett zum Brennen

in

in Lampen oder zum Einschmieren der Schlösser aus demselben zu ziehen, oder sie zum Eisenhärten, oder zum Dung auf Wiesen und Aecker ganz oder geraspelt zu verwenden.

Das Ochsenklauenfett ist, wenn es in einem kleinen Mörser so lange gerieben wird, bis es sich in eine grünliche Salbe verwandelt, ein gutes Mittel das Eisen und den Stahl, wenn sie damit bestrichen werden, eine Zeitlang vor dem Rost zu bewahren.

10) Das Rinderfett und Talg, das, wenn das Vieh mit gelben Möhren, Kürbißen, Klee und Oehlkuchen gemästet wird, gelb, und mit Heu und Stroh, weiß aussieht, braucht man theils an Speisen, theils um das Salz zum Schäumen zu bringen, und auch um die Frostwunden gegen den Winter damit zu bestreichen, daß sie nicht wieder aufbrechen.

11) Das Laab aus dem Kälbermagen befördert das Gerinnen der Milch zu süßem Käse.

12) Mit der Galle, die seifenartige Eigenschaften hat, wäscht man bunte Sitze, damit die grüne Farbe nicht ausgehe. Eben so benutzt sie auch der Mahler und Tüncher. Man braucht sie auch zum Ausmachen der Flekken in Kleidern und weißem Zeuche. Sie wird auch getrocknet in der fallenden Sucht, die von einer fehlerhaften Galle herrührt, weiter zur Beförderung des Stuhlgangs und zur Vertreibung der Spulwürmer gebraucht.

13) Aus den Harnblasen verfertigt man pneumatische Betten, Ballons, Beutel und verbraucht sie zu Verbindung der Gläser und des Destillirgeräthes.

Die

Die Gedärme benutzt der Fleischer zur Füllung der Würste, und der Luftschiffer zu Luftballons. In England zieht man das äußerste Häutchen vom Mastdarm ab, und bereitet daraus eine dünne, doch feste Haut, welche die Formen abgiebt, zwischen welchen man das Dukatengold zu Goldschaum oder Flittergold auf dem Ambos schlägt, womit England ganz Europa versieht, und Rahmen, Leisten, Bücher u. a. m. vergoldet werden. Eben dieß Häutchen mit Gummiwasser gesteift, ist die sogenannte englische Haut, womit die Wundärzte die Aderlaßöffnungen und andere Wunden durch das bloße Anhauchen verbinden.

14) Das männliche Glied des Stieres wird auf eben die Art, wie die Roßadern, auch zu Gerten und Peitschenstielen gebraucht; und es bedienen sich auch einige Eltern, Schullehrer und Zuchtmeister desselben noch statt des Stocks zur Bestrafung der Kinder und Züchtlinge.

15) Die Haut, welche das Kalb um sich mit auf die Welt bringt, gebrauchen die Isländer statt des Glases zu Fenstern.

16) Alle Knochen dieser Thiere werden gebraucht. Aus den starken Knochen der Vorder- und Hinterbeine werden, nachdem das Fett ausgelaugt ist, von den Drechslern allerhand Dinge, als Stockknöpfe, Büchschen u. d. gl. gedreht, aus den übrigen weniger starken werden Hefte, Schalen und Stiele an die Messer gemacht, und aus den kleinern brennt man die Beinasche, die zu den Kapellen und Gefäßen gebraucht wird, in welchen Metalle geschmolzen werden, und auch

die

die schwarze Mahlerfarbe giebt, welche man Beinschwarz nennt.

17) Wie nutzbar das Rindvieh durch seinen Dünger wird, weiß jeder Landmann, und wie nachahmungswürdig und vortheilhaft in dieser Rücksicht die Stallfütterung sey, sollte ebenfalls jeder wissen. Verbrannt geben die Exkremente Salmiak. Einige Aerzte empfehlen für einen entzündeten Brustgeschwulst die Umschläge von frischem Kuhmist; und die Lauge desselben bleicht Leinewand, leinen und baumwollen Garn schön weiß.

18) In den neuern Zeiten hat man auch den Aufenthalt in Kuhställen schwindsüchtigen Personen empfohlen, welchen die Einathmung der Dünste an diesen Orten sehr heilsam seyn soll.

19) Das Rindvieh hat Vorempfindungen von einem Gewitter, und zeigt sie durch sein Bestreben den Stall zu erreichen, oder sonst wo unter Dach zu kommen.

Schaden.

In jungen Schlägen von Laub- und Schwarzholz thut das Rindvieh großen Schaden, und den Rasen der feuchten Wiesen ruinirt es durch seinen schweren Tritt.

Irrthümer und Aberglauben.

1) Die gemeine Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus) soll Kühen und Ziegen die Milch aussaugen.

2) Die Haarkugeln in den Magen sollen durch Hexerey dahin kommen.

3) Die Viehfliege (Musca nemorum) deren Saugen den Kühen so empfindlich seyn soll, findet sich bloß auf Blumen, und hat keinen Saug- noch Stechstachel. Es ist die Ochsenbremse (s. oben), vor welcher das Rindvieh so wüthend wird. s. Müllers Linneisches System V. 2. Taf. 28. Fig. 9. 10.

4) Blaue oder rothe Milch, oder das Vergehen der Milch wird den Hexen zugeschrieben.

5) Die sogenannten Fettklumpen, welche man Franzosen nennt, sind keine venerische Krankheit, daß man deswegen die fettesten Ochsen, die sie oft haben, wie es sonst geschehen, als Aas wegwerfen müßte.

6) Der Saft von einem ausgepreßten frischen Kuhflaten vertreibt die heftigsten Fieber. Eine Curart, die ich noch neulich erlebt habe.

Die dritte Gattung.

Schaf. Ovis.

Kennzeichen.

Unten befinden sich acht Vorderzähne und die Eckzähne mangeln.

Die Hörner sind hohl, zusammengedrückt, runzlich, schraubenförmig gedreht, die Spitze auswärts gekehrt, und an Anzahl und Gestalt verschieden.

Das Fell ist wollig.

Das

Das Euter mit zwey Säugwarzen sitzt zwischen den Hinterfüßen.

Der Magen ist vierfach.

Sie pflanzen sich des Jahrs einmal fort, und bringen gewöhnlich ein Junges, das erst der Regel nach im zweyten Jahre trächtig wird.

(4) 5. Das gemeine Schaf.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Schaf; altes männliches Geschlecht: Widder, Bock, Schafbock, Stähr, Stöhr, Stier; altes weibliches Geschlecht: Schafmutter, Zibbe, Schibbe; verschnittene: Hammel, Schöps; Junges: Lamm; männlichen Geschlechts im ersten Jahre: Stöhrlamm, Bocklamm; weiblichen Geschlechts im ersten Jahre: Schaf: Kälber: Kilber: Schibben: Zibbenlamm; Hammel im ersten Jahre: Hammellamm, geschnittenes Lamm; im zweyten: zweyzähniger Jährling; im dritten: vierzähniger Hammel; im vierten: sechszähniger Hammel; im fünften: vollmäuliger Hammel; weiblichen Geschlechts im ersten Jahre: Mutterlamm; im zweyten: Jährling; im dritten: Schilke oder vierzähniges Schaf; im vierten: sechszähniges und im fünften: vollmäuliges Schaf.

Ovis Aries. *Gmelin Linn.* I. 1. p. 197. n. 1.

Brebis et Belier. *Buffon* hist. nat. V. t. 1. 2. Ed. de Deuxp. I. T. 2. F. 2, 3. Ueberf. von Martini I. 286. Taf. 12. IX. 262.

Common Sheep. *Pennant* hist. of Quadrup. I. 37. Meine Ueberf. I. 42.
v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 159.
Goeze's Fauna III. 93.
Donndorfs zool. Beytr. I. 660.
v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 290. A. B.

Von der Schafzucht.

Wichmanns Katechismus der Schafzucht. Leipzig 1784. 8.
Germershausen, das Ganze der Schafzucht. 2 Th. Leipzig 1789. 8.
Lossius letzte und natürlichste Behandlung der Schafe. Leipzig 1791. 8.
Finke Schreiben über ungekünstelte und sichere Verfeinerung aller groben Wolle. Celle 1790. 8.

Kennzeichen der Art.

Mit zusammengedrückten, unebenen, unterwärts mondförmiggebogenen Hörnern, die aber im zahmen Zustande (der Anzahl und Gestalt nach in jedem Lande verschieden ausfallen, und) sehr oft fehlen, und mit mehr oder weniger gerollten Haaren.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts und andere merkwürdige Eigenschaften.

Die zahmen Schafe, die jetzt beynahe in der ganzen Welt verbreitet sind, und nach Verschiedenheit ihres Vaterlandes auch eine verschiedene Bildung und Nutzbarkeit

barkeit erhalten haben, stammen vielleicht alle von dem wilden Sibirischen Schafe *), und von dem Muffelos oder Muflons **) in Sardinien und Corsika ab.

Man theilt sie nach ihrem Vaterlande in verschiedene Rassen ab, die nach ihrer Größe und Gestalt, nach

*) Argali genannt.

**) Ovis Ammon. Gmelin Lin. I. p. 200. n. 2. Hier wird es als eine besondere Art aufgeführt; es ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach die Stammrasse von unserm zahmen Schafvieh. Vergleiche: Buffon XI. 532. t. 29. Ed. de Deuxp V. T. 3. f. 1. Uebers. v. Martini und Otto II. 12. IX. 249. 282. mit 2 Fig.

Wild Sheep. Pennant l. c. K. Meine Uebers. a. a. O. S. 41.

v. Schrebers Säugeth. V. 288.

Pallas Reise III. S. 231. Dessen N. G. merkwürdiger Thiere. XI. n. 3.

Cetti N. G. von Sardinien (Uebers.) I. S. 143.

Die Größe ist wie eine kleine Hirschkuh. Die Hörner stehen mitten auf dem Scheitel, an der Wurzel dicht beysammen, steigen anfangs aufrecht, krümmen sich dann herab und drehen sich auswärts, wie beym gemeinen Schafbock, sind eckig und kreuzweis gefaltet. An den Schafmüttern sind sie kleiner. Der Kopf ist wie bey einem zahmen Widder; die Ohren sind kleiner; der Hals dünn; der Leib groß; die Glieder schlank; der Schwanz kurz; die Klauen klein und wie beym gemeinen Schaf. Die Farbe ist im Winter braun, grau, unten weißlich, und langhaariger als im Sommer, wo ihre Farbe mehr ins Graue fällt. — Man jagt diese Thiere, wie bey uns das Wild, und braucht Fleisch, Haut und Hörner.

der Form und Anzahl der Hörner, nach der guten und schlechten Wolle unterschieden sind. In Deutschland kennen wir außer unsern gewöhnlichen Deutschen Schafen noch die kleinen Schafe, die sogenannten Schnucken oder Heideschnucken mit kurzen Schwänzen, die vorzüglich in der Mark Brandenburg auf dürren sandigen Boden gut fortkommen, und jetzt zu unserm großen Vortheil auch die Spanischen und kleinen Englischen Schafe.

Was die äußerliche Gestalt der Schafe betrifft, so nimmt man nicht sowohl auf ihre Schönheit, als vielmehr auf ihre Größe auf, die Feinheit und Güte der Wolle Rücksicht. Das ganze Schaf ist gleichsam nur ein wolliger Klumpen, der von vier magern und steifen Füßen unterstützt wird. Die Schnauze ist gebogen, lang, dürr und spitzig, die obere Lippe hängt über die untere her, und die Stirn ist breit.

Gleich im ersten Jahre haben die Lämmer acht kleine spitzige Vorderzähne in der untern Kinnlade, welche die Schäfer fälschlich Hundezähne nennen. Diese Zähne verwechseln sie mit größern breitern vom zweyten Jahre an bis zum sechsten. Es fallen ihnen nämlich im zweyten Jahre die zwey mittlern spitzigen Zähne aus, und es schieben sich statt derselben zwey größere und breitere ein, die dem Thier, den Namen Zweyschaufler verschaffen, und im dritten Jahre fallen zwey andere, und zwar zu beyden Seiten der beyden mittlern einer, aus; und wenn diese wieder durch größere und breitere ersetzt sind, und das Thier ein Vierschaufler geheißen hat, so verliert es im folgenden Jahre wiederum zwey andere, und heißt Sechsschaufler, und im fünften

ten Jahre endlich stehen, nach dem Ausdrucke der Schäfer, alle acht Schaufeln da *).

Aus diesem Wechsel der Vorderzähne ist man im Stande, das Alter der gesunden Schafe bis ins sechste Jahr zuverläßig zu bestimmen. Nach diesen aber wird es ungewiß, und man vermuthet es nur durch die ungleich längere Entblösung der Zähne vom Zahnfleisch, die abgestumpften Backenzähne und das allmählige Ausfallen der gelben Vorderzähne, welches letztere meist im achten Jahre anfängt.

Daß die großen und weit von einander stehenden Augen der Schafe gewöhnlich einen schmutzig gelben **) Stern, eine längliche horizontalliegende Pupille haben, ohne Feuer sind, die Ohren weit auseinander zur Seite auswärts gekehrt, horizontal, unterwärts geöffnet stehen, die Widder einen großen herabhängenden und schwankenden Hodenbeutel, und die Mutterschafe zwey Euter mit zwey Zitzen haben, ist jedermann bekannt.

Die gelblichen Hörner steigen nicht wie beym Ochsen und der Ziege in die Höhe, sondern biegen sich seitwärts nach hinten, wenden sich dann nach unten vorwärts, und krümmen sich wieder nach den Augen zu. Den Schafmüttern mangeln sie entweder ganz, oder sind kleiner und dünner.

*) Man hat auch noch andere Benennungen für diese Thiere, die von dem Zahnwechsel ihren Ursprung haben, s. oben Namen.

**) Dieß ist gewöhnlich die Farbe des Augensterns. Man hält die mit schwärzlichem Stern für die besten; allein dieß Kennzeichen trügt.

Auch bekannt genug ist die Farbe der Schafe: die meisten nämlich sind schmutzig oder blaßgelblich weiß; doch giebt es auch braune, schwarze und gefleckte. Die letztern aber liebt ein guter Oekonome deswegen nicht, und wenn sie noch so schön gezeichnet wären, weil allemal die Wolle ungleicher, gröber und also schlechter, als an den einfarbigen, besonders den weißen ist. Ihre Wolle, die aus dünnen, festen, biegsamen, weichen und fettigen Haaren besteht, ist auf dem Rücken, und an den Seiten des Halses krauser und kürzer als auf den übrigen Theilen des Halses, an den Seiten des Leibes und an den Schultern. Diejenige an den auswendigen Schenkeln, und an dem Schwanze ist gröber, steifer, und fast glatt, und die an den noch übrigen Theilen des Leibes befindlichen Haare kann man nicht eigentlich Wolle nennen. Der Schwanz hängt bis über die Kniekehle herab, und ist nur wenig beweglich.

Ihr Naturel ist milde und folgsam, daher sie ihrem Leithammel, dem bellenden Hunde und dem pfeifenden Schäfer treulich folgen, und sogar die Sprünge und Bewegungen, die ihnen der Leithammel vormacht, alle maschinenmäßig nachmachen; dagegen aber zeigen sie in allen ihren Handlungen die größte Dummheit, und bey dem geringsten unerwarteten Auftritte außerordentliche Blödigkeit und Furchtsamkeit. Ein Knall, eine Feuerflamme, ja das geringste Geräusch macht sie gleich stutzig, sie stampfen mit den Füßen, drängen sich zusammen, oder ergreifen die Flucht. Ja der Blitz und Donner bringt sie oft ganz außer aller Fassung, daß sie durch ihr ängstliches Anstemmen die stärkste Horde über den Haufen werfen.

werfen. So dumm sie sind, so schwächlich sind sie auch. Ein kurzer Weg fällt ihnen beschwerlich und eine größere Reise macht sie ganz kraftlos. Ihr Herz pocht ihnen, ehe sie zu laufen anfangen und gleich sind sie außer Athem. Sonst sind ihre Affekten beynahe in einer steten Ruhe. Ihre harte Stirn, oder ihre Waffen, die Hörner, brauchen sie eben so selten zum Stoßen, als ihre schwachen Füße, um nach ihren Beleidigern auszuschlagen. Zur Zeit der Begattung sind sie etwas muthwillig, aber keiner sonderlichen Hitze unterworfen, und nur selten kämpfen ein Paar muthige Böcke um eine Braut. Auch wenn sie Junge haben, werden ihre Affecten nicht höher gespannt. Eine Schafmutter läßt sich ihr Junges wegnehmen, ohne erzürnt zu werden, ohne sich zu wehren, oder durch einen ungewöhnlichen Laut ihre Betrübniß zu erkennen zu geben. Nur als Lämmer belustigen sich diese Thiere mit possierlichen Seitensprüngen und gegenseitigen Necken. — Sie scheinen das Licht und Musik zu lieben, und die Schäfer sagen, daß sie am besten und ruhigsten weideten, wenn ihnen auf der Schalmey eine Tafelmusik gemacht würde, und daß sie ihr Abend- und Morgenlied in der Horde mit der größten Aufmerksamkeit anhörten.

Ihr Blöken, daß sie zu allen Zeiten hören lassen, ist außer dem allgemeinen Abschiedsgeschrey bey der Trennung der Böcke, Hammel, Schafe und Lämmer jeden Morgen, aus der Horde, wo sie, nur durch eine Flechtenwand geschieden, zusammen geschlafen haben, und bey dem freudigen Wiedersehen des Abends in der Horde, fast ohne alle Bedeutung.

Sie leben über vierzehn Jahre; sind aber nur höchstens sieben Jahre nutzbar.

Dieß sind die Kennzeichen und Eigenschaften, die überhaupt der ganzen Schafart zukommen.

Das Thüringische Schafvieh nun insbesondere hätte wirklich, im Ganzen genommen, vor den andern gewöhnlichen Deutschen einen Vorzug, sowohl in Ansehung seiner Größe, als Güte der Wolle, wenn man es wagte, das Schmiervieh, das man noch in so vielen Gegenden aus unrichtigen Gründen hält, gänzlich abzuschaffen. Die gewöhnliche Höhe desselben ist 2 Fuß, und die Länge von der Kopfspitze an beynahe 3 1/2 Fuß *). Der Kopf ist kurz, die Nase kaum etwas gebogen, die Hörner fehlen mehrentheils ganz, und wenn auch zuweilen ein Lamm gebohren wird, dem Hörner wachsen, so haben sie doch keine Festigkeit und gehen fast immer wieder verlohren **).

Es

*) Par. Ms.: Länge über 3 Fuß, und Höhe 1 Fuß 9 Zoll.

**) In Thüringen bekommen wir, so wie in den mehresten Gegenden des nördlichen und mittlern Deutschlandes unser Schafvieh zur Trift vom Eichsfelde. Die Eichsfelder Schafe zeichnen sich durch Größe, Güte der Wolle und des Fleisches vor allen andern in den mittlern und nördlichen Gegenden Deutschlands zu ihren Vortheil aus. Das ganze Land scheint auch zur Schafzucht ganz geeignet zu seyn.

Unsere Thüringer Schäfer lieben die Böcke und Schafe mit Hörnern gar nicht. Sie sagen, sie würden nie so fett als die andern, und geben vor, daß die Kraft der

Es giebt unter den Schafen viele Nationalrassen, worunter sich die mit dem langen Schwanze und mit dem breiten Schwanze (O. A. lati- et longicaudata), die man in der Tatarey und in Afrika ꝛc. antrifft, vorzüglich auszeichnen (s. Meine Uebers. von Pennants allg. Uebers. a. a. O.) Für uns sind aber außer Zweifel folgende zwey Varietäten besonders merkwürdig.

a) Das Spanische Schaf.

Ovis Aries hispanica, Lin.

(Taf. III. Fig. 1.

Seine schneckenförmig gebogenen Hörner haben einen auswärts gebogenen Haaken. Es ist klein, mit kurzem Schwanz, meist verschieden gefärbt, und hat die krausgerolletste, vortrefflichste und feinste Wolle.

Es hält unser Clima sehr gut aus, hat eine starke Natur und pflanzt sich unter allem am meisten fort. In Spanien weidet die Heerde das ganze Jahr hindurch unter freyem Himmel, in einer mehr kalten als warmen Luft, im Sommer in Gebirgen, im Winter in Ebenen.

Es ist wenigen Krankheiten ausgesetzt; doch bekommt es in unsern Gegenden oft einen Ausschlag auf der Haut, der aber durch das Waschen mit einem Decokte von

der Nahrungsmittel sich in die Hörner zöge. So viel habe ich auch bemerkt, daß sich die gehörnten Hammel nie so gut, als die ungehörnten füttern.

von Nießwurz oder von Holzlauge und Tabak leicht und geschwinde vertrieben werden kann.

Es wird in Spanien vor der Wollschur nicht gewaschen, sondern muß nur stark schwitzen, wovon die Wolle eine große Geschmeidigkeit erhalten soll.

Die Spanische Wolle beziehen wir in Deutschland durch die Holländer. Die beste kömmt aus Castilien und Arragonien und wird nach der Güte in Prime, Seconde und Tierce unterschieden. In Spanien soll eine Heerde von 6000 Schafen nach Abzug alles Aufwandes 36000 Reichsthaler reinen Gewinn abwerfen.

b) Das Englische Schaf.

Ovis Aries Anglica, Lin.

Es hat keine Hörner; der Schwanz geht nur bis an die Knie; die Füße sind kurz; die Stirne ist schwarz.

Die Wolle ist feiner, länger und sanfter als der Deutschen Schafe ihre. Ein zweyjähriges Mutterschaf liefert an 6 Pfund Wolle, ein Widder bis 8, und ein Hammel bis 9 Pfund alle Jahre.

In England werden sie meist in kleinen Heerden gehalten, damit sie desto besser besorgt werden können, und bleiben im Sommer und Winter außer dem Stalle. In Lincolnshire sind die besten.

Zuletzt ist auch noch bemerkenswerth:

c) Das Schafreh, (Ovis hybrida),

eine Bastartart von einem Widder und einer Rehkuh. Es hat gemeinschaftliche Kennzeichen von Vater und Mutter. Das, was man in Schweden sah, war ein Weibchen, glich völlig der Mutter, nur daß dessen Haar nicht so weich und fein, sondern kraus und zottig, wie das des Vaters war. s. Goeze Fauna III. 72. mit einer Abbild. Neue Schwedische Abhandl. II. 269.

Zergliederung.

1) Das merkwürdigste ist der Uterus, wenn das Junge in seinem Wasserhäutchen liegt. Er besteht fast aus lauter großen Säugwarzen, die sich an der drüsigen Substanz angesogen haben und abgezogen werden können, und hat eine außerordentliche Schlüpfrigkeit. Für das so öftere Stoßen der Schafe ist dieß eine sehr weise Einrichtung der Natur.

2) In dem Magen findet man oft aus Haaren, Moos, Wurzeln ꝛc. bestehende Kugeln, welche mit einer kalkartigen Kruste überzogen sind.

3) Lunge und Leber sind gewöhnlich in schlechtem Zustande, und oft so wie die Eingeweide mit Würmern angefüllt. s. unten Feinde.

Aufenthalt und Nahrung.

Man ist auch noch beynahe in ganz Thüringen gewohnt, sowohl in den ebenen als gebirgigen Gegenden die Schafe im Sommer auszutreiben, und im Winter in dunkle dumpfige Ställe zu bannen.

In

In den gebirgigen Gegenden, wo weder hinlängliche Aecker noch Wiesen sind, wo es viele steile unbebaute Berge giebt, und wo die nützliche Holzaussaat noch nicht eingeführt oder in der That nicht möglich oder nöthig ist, wo die Wälder viele Blösen und vieles Gras haben, in solchen Gegenden werden wohl die Schafe beständig ausgetrieben werden, und wenn die Bevölkerung so beschaffen ist, daß sie mit der Getraide- und Holzconsumtion im gehörigen Verhältnisse steht, so wären auch solche steinige, bergige Gegenden gerade der Platz, wo die Schafe hinzuweisen wären. Allein in den ebenen, fruchtbaren Gegenden Deutschlands sollte man wirklich einmal die alten Vorurtheile fahren lassen, und die Schafe, als der Oekonomie im Ganzen auf diese Art schädlichen Thiere abschaffen, oder die Hausfütterung in Ställen und auf dem Hofe oder die Fütterung auf dem Felde, die sogenannte Pferchfütterung (Futterschäferey), einführen *).

Alles

*) Wer es weiß, wie viel Plätze von gutem Erdreich noch in Thüringen bloß deswegen, damit die Schafe daselbst einige elende Gräser finden können, öde und unbebaut liegen; wie vortheilhaft daraus künstliche Wiesen und Kleefelder gemacht werden könnten; wer es weiß, wie auch auf den weiten, bergigen und leeren Triften, die hier so häufig sind, in thonigen und schlechten Boden noch Esparsette ꝛc. sehr gut fortkommen; wer den Zwang und Schaden kennt, den diejenigen Aeckerbesitzer leiden müssen, welche die Brache zur Hut der Schafe unbebaut liegen lassen müssen, und welche oft selbst keine Schafe besitzen; und wer zugleich den Nutzen des Kleebaues auf

der

Alles kömmt daher auf die Behandlungsart der Schafe an, in Absicht ihrer Weide und Fütterung, welches

der Brache kennt; der wird mit mir die Abschaffung der Schaftrift wünschen.

Es giebt in Deutschland noch Gegenden genug, wo der Boden von der schlechten bergigen und steinigen Beschaffenheit ist, daß die Schafzucht getrieben und den Sommer über dieselben auf dem Felde bleiben und sich nähren können. Denn zur Schafzucht scheint die Stallfütterung mit Klee, wie man sie beym Rindvieh mit Vortheil anwendet, noch nicht anwendbar, und die Natur der Schafe mußte erst nach und nach durch mehrere Generationen hindurch darangewöhnt werden, daß sie nicht nur nicht mehr die trockensten, ausgesuchtesten Kräuter- und Grasarten wählten und eine bewegende Lebensart nöthig hätten; sondern daß auch ihr lebhaftes Naturel sich abstumpfte und ihre Eingeweide ohne Nachtheil die einfachsten und fettesten Nahrungsmittel vertragen lernten. Aus jenen Gegenden der Schafzucht würden alsdann die Schafe nach der Erndte in die übrigen cultivirtern Gegenden geschafft, auf die abgeweideten Felder getrieben und zur Mästung des Winters über in Ställen mit den künstlichen Futterkräutern und den auf den unbenutzten Brachäckern erzielten Rüben u. s. w. unterhalten.

Diese künstliche Schafzucht aber einzuführen, scheint nicht schwer zu seyn, wenn nur diejenigen, die diese Aenderung und Verbesserung machen können, ernstlich Hand ans Werk legen wollten. Wie leicht ließen sich nicht die großen Riede unter die Einwohner eines Orts vertheilen, und ihnen die Anweisung geben, ebene Gegenden in künstliche Wiesch und fruchtbare Aecker zu verwandeln, und nicht ganz unfruchtbare bergige Gegenden mit Esparsette und andern dürr wachsenden Futterkräutern

ches beydes seine gehörige Ordnung und Vorsicht erfordert.

In Gegenden, wo die Schafe ausgetrieben werden, muß der Schäfer sich wohl vorsehen, daß sie nicht zu früh aus den Ställen und Horden gehen, wenn der Reif, Thau und die Regentropfen noch auf den Kräutern hängen, weil dadurch die so gemeinen Krankheiten der Schafe, die Lungenfäule und Darmsucht entstehen; so

kräutern zu besäen? Und könnte die Obrigkeit Schaden haben, wenn sie auch zum erstenmale die Sämereyen zum Kleebau, und den künstlichen Wiesen unter die Armen umsonst austheilte, oder nur einstweilen vorschöß, auch deswegen, um dem Landmann, der oft so schwer von seinen alten Vorurtheilen abzubringen ist, der oft bey offnen Augen nicht sehen will, den Vortheil dieser Behandlungsart der Hausthiere erst recht begreiflich zu machen.

Den Schafen das künstliche Wiesenfutter zu verschaffen, säet man auf die umgerissenen ebnen Riede: alle Kleearten (Trifolium), Esparsette (Hedysarum Onobrychis, Luzerne (Medicago sativa), Pimpenel (Pimpinella), Täschelkraut (Thlaspi bursa pastoris), Schafschwingel (Festuca ovina), Graslauch (Lolium perenne), Zaunwicken (Vicia sepium), Honiggras (Holcus Europaeus), Bocksbart (Tragopogon pratense), Mariengras, Wiesenhafer, Raigras (Avena elatior), deutschen Spargel (Spergula arvensis), Knotenkraut (Spergula pentandria), u. s. w. Alle diese Kräuter bekommen den Schafen sehr wohl, wachsen gut, und solche Wiesen dauern sehr lange, wenn der Heusaamen alle Jahre gehörig gesammelt und im März an den Orten, wo es nöthig ist, eingestreut wird. An Berge säet man die Esparsette, die zwanzig Jahre lang abgemähet werden kann, wenn man die blosen Flecken immer auszubessern sucht.

so wie er überhaupt die Weide an feuchten, sumpfigen Orten, besonders in regenhaften Jahrszeiten aufs sorgfältigste zu meiden hat; dahingegen kann er des Abends bey hellem Wetter wohl etliche Stunden in die Nacht hinein die Schafe weiden lassen, weil dann die schädlichen Ausdünstungen aus der Erde und die Thautropfen noch nicht eingetreten sind. Und da sie mehr Kälte als Hitze vertragen können, und durch die offnen Weiden in den heißen Mittagsstunden sehr leicht von verschiednen Krankheiten befallen werden, so muß er diese Stunden mit seiner Heerde an schattigen Orten zubringen. Vor allen Dingen muß jeder, der die Schafe mit Nutzen halten will, darauf sehen, daß sie im Frühjahr und im späten Herbst, wo sie hungrig nach Hause zurückkehren, und im Winter, wenn es die heitere und gelinde Witterung verstattet, sie auszuführen, noch nachgefüttert werden.

Es scheint auch, wie wenn die Schafe nach ihrem verschiedenem Alter von Natur eine besondere Weide erforderten. Die Lämmer verlangen eine nahrhafte nahe Weide, weil sie noch zu schwach sind, an den steilen und magern Bergen herum zu klettern. Die Hammel, die zur Schlachtbank bestimmt sind, wollen fette Weiden auf Brachen und in Stoppeln, und für die Mutterschafe sind die gesunden Bergweiden am aller vortheilhaftesten.

Man zählt 387 Kräuter, die das Schaf nach einem von Linne' gemachten Versuch frißt und 141, die es unberührt läßt.

Die Hordenfütterung hielt man sonst für vortheilhafter, sie scheint aber nach der Natur der

Schafe nicht so anwendbar als die Stallfütterung für das Rindvieh zu seyn. Will man sich derselben bedienen, so sind ebenfalls verschiedene Vorsichtigkeitsregel nöthig.

Sollen die Schafe im Felde gefüttert werden, so baut man eine geräumige Horde mit niedrigen Raufen an den Seiten, entweder in die Nähe des Kleefeldes, das man für die Schafe bestimmt hat, auf, und verrückt sie des Tages dreymal, (welches man wegen der Fettigkeit und Menge des Düngers thun kann) oder man stellt sie auf einen andern entferntern zur Düngung bestimmten Acker, und führt den Klee auf Karren bey, oder endlich man befestigt sie an einen schattigen Ort, streut Stroh ein, und schafft von da den Mist weiter auf seine Aecker.

Außerdem bringen die Hofhorden eben den Nutzen, den die Feldhorden gewähren, wenn man genöthigt ist, die Schafe darin zu füttern, welches geschieht, wenn man den Pferch auf dem Felde nicht nutzbar genug anbringen kann, oder, welches freylich der Fall noch lange zu seyn scheint, wenn sich die verschiedenen Besitzer einer Heerde in Absicht der Gesammtfütterung nicht vereinigen können. Eine solche Horde muß dick mit Stroh bestreut seyn und hoch liegen, damit der Harn abfließen kann, welchen man in eine mit Stroh gefüllte Grube leitet. — Man hat die Gewohnheit, daß man den Schafen dreymal des Tages grünes Futter vorlegt; allein man thut besser, wenn man ihnen fünf kleinere Portionen giebt, weil sie sich so leicht bey der wohlschmeckenden Kost überfressen können. Ein gesun-

des

des Schaf zehrt täglich 12 Pfund gutes grünes Futter auf.

Im Frühjahr, wenn man die trockene Fütterung endigt, ist nöthig, daß man den Schafen anfangs vieles Heu oder Stroh und wenig Gras, und nach und nach immer mehr Gras und weniger dürres Futter, auch den besten Klee vorlegt, und eben so verfährt man im Herbste, indem man anfangs vieles grünes Futter und wenig Heu oder Stroh, und nach und nach immer mehr trockenes Futter mit weniger Gras füttert, bis man sich nach einiger Zeit, (und dieser Uebergang braucht gewöhnlich im Frühjahr und Herbst nur drey Wochen zu dauern) lauter dürre Nahrung ohne Abnahme ihrer Kräfte zu geben getraut.

Das grüne Futter darf niemals eher abgemäht werden, bis die Sonne oder die Luft den Thau abgetrocknet hat. Es werden daher die Mittags- und Abendfütterungen des Morgens nach dem Thau und die kommende Morgenfütterung des Abends geholt.

Man darf auch den Klee und die Esperfette nicht früher verfüttern, als bis sie acht Tage geblühet haben, nach der sichern Erfahrung, daß sie vor der Blüte den Schafen schädliche Blähungen und Koliken verursacht haben. Dasjenige Futter also, das im Herbste vor den Frösten die Blüten nicht mehr treiben kann, wird zu Heu gemacht, so wie überhaupt alles dasjenige, welches man unter 5 Wochen nicht grün verfüttern kann, und man trocknet es am besten auf den Aeckern selbst auf aufgestellten Stangen, die mit etlichen Sprossen durchkreuzet sind, oder auf kleinen Häufchen, die man Morgens

oder Abends, ehe der Thau verdünstet ist, umwendet und auflockert, damit die Blättchen nicht abfallen.

Da der Winter in unserm Thüringen oft zu rauh, hart und beständig ist, so ist es wohl nicht zu rathen, die Schafe in dieser Jahrszeit, ob ihnen gleich Kälte und Schnee nichts schaden, beständig unter freyem Himmel zu lassen, wie man es wohl in wärmern Ländern thun kann, man treibt sie dahero bey zu großer Kälte in die Ställe. Diese müssen groß, hoch, und so gebaut seyn, daß man die schädlichen Dünste immer durch frische Luft wegtreiben kann, welches durch breterne Dunstschornsteine (Dampfröhren) zu bewerkstelligen ist. In der Mitte und an den Seitenwänden müssen Raufen mit untergelegten Krippen befestiget seyn, in welchen alles, was von der Raufe abfällt, die Körner, die ihnen etwa vorgeschüttet werden, und die aus dem Geströhde fallen, aufbewahrt werden können; der Boden muß in der Mitte erhaben ausgelegt werden, damit die so nützliche Gauche an ihrem bestimmten Ort ablaufen kann, und der Mist muß immer weggeschafft, und reines, weichgedroschenes Stroh gestreut werden. Auch darf es nicht darin stäuben. Die Hitze, besonders wenn sie dumpfig und feucht ist, schadet diesen zärtlichen Thieren ungemein, daher muß man ihnen immer Kühlung verschaffen.

Gewöhnlich glaubt man freylich die Schafe bedürften im Winter kaum etwas Stroh oder Holzlaub, und darin bestünde eben der Nutzen der Schafzucht vor der andern Viehzucht; allein man schadet sich allzeit bey einer solchen Behandlung. Das Schaf bedarf eben so,

wie

wie das übrige Stallvieh, auch im Winter sein gutes Futter, wenn es den Nutzen verschaffen soll, den man mit Recht von ihm verlangen kann, d. h. wenn es gute Lämmer erziehen, einen guten Wollenbelz auflegen und so bey Fleische bleiben soll, daß es dann im Sommer als Schlachtstück bald fett wird. Es verlangt also auch im Winter gutes Heu- und Kleefutter, und den ohne Blüte abgemäheten Klee, der mit Stroh in Hexel ist verwandelt worden. Von dieser Kost verzehrt es täglich in drey Fütterungen 2 bis 3 Pfund. Zur Abwechselung füttern dann die Wirrgebünde von Erbsen, Bohnen, Wickenfutter, Linsen, und die Strohgebünde von Gersten und Hafer, die deshalb auch nicht ganz rein ausgedroschen werden, sehr gut. Ein Schaf verdauet davon täglich 4 bis 6 Pfund. Eben so können die Besitzer von Laubhölzern das gedörrte Laub von Pappeln, Weiden, Ahorn, Faulbaum (Rhamnus Frangula), Ulmen, Erlen und Eschen, als ein gutes Futter nutzen. Hierzu müssen die Zweige im zweyten Safte im August abgehauen, in Bündel gebunden und an der Luft getrocknet werden. In dieser Gestalt steckt man das Laub im Winter den Schafen auf die Raufe, und sammelt alsdenn die Reißer wieder als Brennholz zusammen. Bey dieser Fütterung muß aber das Laubholz in Menge da seyn, weil diese unzeitige Fällung dem Holzwuchs allezeit nachtheilig ist.

Sie können auch, wenn es gefroren ist, auf die grüne Wintersaat getrieben werden,

Die Waldbewohner thun wohl, wenn sie die so häufig wachsenden Ginsterstäucher (Genista tinctoria

et germanica), welche den Schafen nicht nur ein sehr angenehmes, sondern auch wegen ihres bittern Saamens ein sehr gesundes Futter sind, eintragen und trocknen. Außerdem verzehren die Schafe mit besondern Appetit alle Arten von Kohlblättern und Rüben, sie bekommen aber diese Leckerbissen nur erst dann, wenn man genöthiget ist, anderes schlechtes Futter zu füttern, so wie man ihnen auch nur im Nothfall etwas Hafer, Gersten, oder Waizenkleyen in ihre Krippen schüttet. Ja man hat auch angefangen sie nicht ohne Vortheil mit Siede, wie das Rindvieh zu füttern. An zerstampfte Roßkastanien kann man sie auch leicht gewöhnen; sie sind eine gesunde Speise, sonderlich ein Gegenmittel der Faulsucht. Die Hammel, die man im dritten und vierten Jahre mästet, erhalten im Winter zu ihrer Nahrung gutes Heu, Wurzel- und Kohlgewächse, Hafer und etwas geschrotene Gerste, und zwar in öftern Mahlzeiten, so viel sie fressen wollen. Im Herbste verlangen sie weiter nichts als gutes Gras und Ruhe.

Diese gute Winterfütterungsart der Schafe muß nun allerdings befolgt werden, wenn man von ihnen den gehörigen Nutzen ziehen will. Man kann sich bey jeder gemischten Heerde, die mehrere Besitzer hat, von der Wahrheit dieser Behauptung augenscheinlich überzeugen, denn nur die schlechtgefütterten verliehren im Frühjahr ihre Wolle und sterben, wenn sie dann auf einmal wieder die jungen zarten Gräser gierig verschlucken und geben bey der Wollenschur nur halb so viel und schlechtere Wolle als die gut gefütterten.

Noch

Noch ist es nöthig, die Kräuter zu bemerken, welche den Schafen schädlich und giftig sind, als Wolfsmilchskraut (Euphorbia), Sonnenthau (Drosera), Schachthalm (Equisetum), Butterkraut (Pinguicula), Sumpfhahnenfuß (Ranunculus), Binsengras u. dgl.

Da man die Erfahrung gemacht hat, daß die Schafe lange Zeit ohne zu trinken, leben können, so haben die meisten Schäfer in Thüringen auch noch die schädliche Gewohnheit, daß sie dieselben nur in heißen Sommertagen an einen flachen Teich, oder einen Fließgraben führen, und es die übrige Zeit dem bloßen Zufall überlassen, wann und wo sie Wasser finden, ihren Durst zu stillen *). Allein dieß ist wirklich die Ursache von sehr vielen Krankheiten der Schafe, besonders der Faul- und Leberfucht, wenn sie genöthiget sind, aus unreinen Quellen zu trinken. Es ist daher der Schäfer Pflicht, sie alle Tage ein- oder zweymal zu einem reinen, hellen Wasser zu führen, und zwar mit der Regel, daß, wenn sie fettes Gras, Klee, Wicken ꝛc. gefressen haben, nicht eher als eine Stunde nach der Fütterung. Den eingepferchten Schafen giebt diese

*) Ja es sind mir Thüringische Dörfer bekannt, wo die Schafe im Sommer gar nicht getränket werden. Z. B. führe ich nur das Gothaische Dorf Grauel an, in dessen Flur sich außer zwey Brunnen im Dorfe gar kein Wasser befindet, wo also die Schafe gar nicht zur Tränke geführt werden können, und sich doch dabey so wohl befinden, daß sie für die gesundesten und besten in der ganzen Gegend gelten.

tägliche Wanderung zur Tränke eine nützliche und nöthige Bewegung. Im Winter bedürfen sie bey ihrer trokkenen Nahrung des Trunks noch mehr, und sie müssen daher alle Tage dreymal mit Brunnenwasser ihren Durst löschen können. Einsichtsvolle Oekonomen setzen ihnen alle Tage einen vollen Kübel in den Stall, und lassen sie nach Belieben trinken, weil sie bey der Strohfütterung weniger und bey der Heufütternng mehr Wasser zu sich nehmen, dabey bedienen sie sich eines Vortheils, der die Wolle erstaunend wachsen macht, sie weichen nämlich zu gewissen Zeiten einen Rüböhlkuchen in den Kübel ein, und lassen die Schafe drüber saufen. Die Schafe lieben diesen Trank gar sehr.

Auch das Salz ist ihnen sehr heilsam *). Es baut der Verstopfung vor, macht Freßlust, und verhütet in sumpfigen Gegenden die Faulsucht. Man giebt es den Heerden, die ausgetrieben werden, in dürrem Wetter (sälzet sie) in Thüringen gewöhnlich alle 14 Tage in Salztrögen oder Salzrinnen in der Maaße, daß auf 20 Stück richtig 1 Pfund Salz kömmt; bey nasser Witterung versagt man es ihnen aber gänzlich, und zwar deswegen, weil sie alsdann, durch den Durst genöthigt, aus allen Wassern und zwar so viel trinken, daß sie sich allerhand Krankheiten zuziehen würden. In den Oertern,

wo

*) Es sind daher die Weiden an der See für die Schafheerden vortrefflich. Alle mit salzigen Dünsten geschwängerte Kräuter geben ihnen unvergleichliche Nahrung; ihr Fleisch wird schmackhafter; die Milch vermehrt sich, wird besser, und die Wolle weißer und sanfter.

wo die Schafzucht verbessert ist, bekommen sie diese Quantität alle 8 Tage; und dieß sollte allgemein eingeführt werden *).

Fortpflanzung.

Um die Schafzucht zu verbessern, kömmt das meiste darauf an, daß man bey der Fortpflanzung derselben mit der gehörigen Klugheit zu Werke geht.

Man wählt zur Zucht solche Widder, die einen dicken, kurzen Kopf, eine stumpfe Nase, kurze und enge Nasenlöcher, eine breite, hohe und runde Stirn, große und lebhafte Augen, große und wollige Ohren, einen starken, breiten Hals, einen starken länglichen Leib, einen breiten Rücken, ein breites Kreuz, großen Bauch, starke Hoden, einen langen Schwanz haben, und nicht nur am ganzen Leibe mit dichter, langer, wellenförmiger und feiner Wolle bekleidet, sondern auch an Kopf und Beinen, wo sonst weniger Wolle ist, rauh und gut bewachsen sind.

Eben so muß eine gute Schafmutter großleibig und breitschultrig seyn, große helle Augen, einen starken

*) Bemerkungswerth ist noch bey der Nahrung der Schafe, daß sie bey dürrer Witterung den Gänsekoth mit einer solchen Begierde fressen, daß sie zuweilen in vollem Jagen über einen solchen Platz laufen, wo dieß Federvieh gehütet wird, um einander zuvorzukommen. Sie müssen zu einer solchen Zeit (da sie es bey feuchter Witterung nicht thun, die Gänse müßten denn Trebern oder Gerstenschrot gefressen haben) etwas angenehmes und gesundes in diesem Nahrungsmittel finden.

und langen Hals, der fast wie ein Pferdehals gekrümmt seyn muß, breite Brust und Rücken, einen großen Bauch, lange Zitzen, kurze, dünne Beine, dichte, lange und feine Wolle, sonderlich um den Hals, Bauch und das Genicke haben. Die Schäfer schätzen vorzüglich diejenigen Schafe als gute Säugeschafe, die am Unterbauch nach dem Euter zu steifhaarig sind.

Da beyde Geschlechter ohnehin in unsern Gegenden meist ohne Hörner sind, so kann man um desto eher lauter solche zur Zucht wählen, die diese Waffen nicht führen, und sich also in der Schwangerschaft und in ihren sonstigen Kämpfen nicht schaden können. Eben so müssen sie auch ohne alle Flecken ganz weiß seyn, weil oft die Eltern mit den kleinsten Flecken ganz bunte Lämmer erzeugen.

Der Widder, wenn er eine gute Nachkommenschaft stiften soll, muß drey Jahr alt seyn, weil diese Thierart erst im dritten Jahre ausgewachsen ist. Neuere Oekonomen wollen ihn gar erst im vierten Jahre zulassen. Er kann, wenn er zuweilen etwas Hafer erhält, 50 und mehrere Schafe gehörig befruchten *). Er leistet im fünften und sechsten Jahre seine besten Dienste, und seine Kräfte dauern bis ins achte Jahr.

Das Schaf ist ebenfalls zu einer guten Nachzucht nicht eher tüchtig, als im dritten Jahre, bringt im vierten

*) Ein Stöhr hat oft in einer Nacht 70 Schafe befruchtet. Man darf also nur die Widder zur Begattungszeit gut füttern, so hat man ihrer wenig nöthig. Des Nachts stören sie vorzüglich gern, weil sie warm zusammengedrängt sind.

ten und fünften die besten Lämmer, und taugt nur bis ins neunte Jahr zum Mutterdienst.

Man weiß nach den untrüglichsten Erfahrungen, daß zur Verbesserung der Schafzucht der Widder das meiste beyträgt, und daß, wenn dieser lange und feine Wolle trägt, auch die Lämmer, die er erzeugt, lang- und feinwollig werden. Es ist daher eines jeden Pflicht, der Herr von einer guten und reichen Heerde werden will, daß er sich nach dem Beyspiel einiger klugen Oekonomen im Herbste etliche Spanische oder Englische Widder verschafft *), und sie mit ausgelesenen, feinwolligen Schafen begatten läßt.

Dabey besteht das ganze Geheimniß, in kurzer Zeit eine ganze Heerde guter Schafe zu bekommen, darinn, daß man drey bis vier Jahre hintereinander alle Jahre neue Englische oder Spanische Widder den alten Müttern beygesellt, die männlichen Lämmer, die aus dieser Zeugung entspringen, als zur Fortpflanzung untauglich schlachtet, die Abstammung also immer gehörig unterbricht, und niemals zuläßt, daß sich Blutsfreunde mit einander vermischen. Man hat bey diesem Verfahren oft schon bey der dritten Zeugung die Freude, daß die ganze Heerde

*) Einen solchen Widder kann man schon in unsern Gegenden für 1 Louisd'or kaufen. Ja ich habe sie vom Eichsfelde schon um eben den Preiß wie die andern Schafböcke erhalten, und ihre Wolle gab der ächten Spanischen nicht viel nach.

Heerde, ohne jemals wieder auszuarten, die feinste Wolle trägt, besonders wenn man noch diesen Vortheil benutzt, mit den Stöhren von einer Heerde zur andern zu wechseln, und dabey die Kleefütterung (dieß soll allemal die Bedingung seyn, wenn von einer merklichen und schnellen Verbesserung der Schafzucht die Rede ist), wie in Spanien und England, einführt *).

In Thüringen läßt man die Böcke vom Ende des Septembers bis zu Ende des Oktobers zur Begattung (bespringen, reiten, bocken, stöhren, stähren), und die Schafe bringen dann nach 21 bis 22 **) Wochen, also im Februar und März eins, selten zwey und nur höchst selten drey Lämmer zur Welt (lammen, lämmern). Ist aber ein Oekonom mit vielen und guten Futter versehen, so braucht er sich an keine Zeit zu binden, sondern kann die Schafe befruchten lassen, wenn er will, oder die Böcke beständig unter denselben lassen. Bey gutem Klee-

*) Das Clima und der Boden verhindert ganz und gar die Verfeinerung der Wolle nicht, wie man gewöhnlich einwendet. Das rauhe und kalte Schweden bestätigt dieß. Ehe man den Spaniern und Engländern die Kunst, die Wolle zu verfeinern, ablernte, war die Schwedische Wolle eben so schlecht, als die unsrige.

**) Ich weiß aus eigener Erfahrung und viele Schäfer, die aufmerksam sind, bestätigen es, daß das Schaf gewöhnlich mit einem Kälberlamme 21 und mit einem Bocklamme acht Tage länger, also 22 Wochen trächtig ist. Doch verursachen, wie man leicht denken kann, allzu gute und allzu schlechte Fütterung und Krankheiten hierbey Ausnahmen.

Kleefutter verlangt auch das Schaf in etlichen Wochen nach dem Lammen den Widder wieder, und man hat den großen Vortheil, daß es in einem Jahre zweymal Lämmer bringt. Zu dieser zweymaligen Begattung, die nach den besten Erfahrungen die Mutter nicht entkräftet, kann man sie auch, so wie jedes gelte (gelle, gölte) Schaf durch Hanfsamen, Hafer, oder durch ein Treibmittel, das aus Knoblauch oder Zwiebeln, mit Kleyen und Salz vermischt, besteht, reizen.

Nach der Begattung machen die Böcke mit den Hammeln und jungen Widdern eigene Heerden, und die Schafe bleiben allein.

Da die Schafmutter in ihrer Schwangerschaft ein sehr weichliches und empfindliches Thier ist, so muß sie besonders zu Ende derselben wohl in Acht genommen, mit gesunden Futter gefüttert, und ja nicht vorsätzlich gejagt werden. Sie ist auch mehr als ein anderes Thier schweren Geburten unterworfen, die nicht selten Mißgeburten verursachen; der Schäfer muß daher die Lage des Lammes im Mutterleibe und die Handgriffe bey der Geburtshülfe kennen. Damit sie sich bald wieder von ihrer Entkräftung erhole, reicht man ihr in den ersten Tagen gutes Heu, Gerstenschrot oder Kleyen mit etwas Salz vermischt, zu ihrer Nahrung, und damit sie sich gewöhne ihr Junges zu lecken und gern um sich zu leiden, so bestreut man es mit ein wenig Salz, wenn es gebohren ist. Gesunde Lämmer können gleich nach der Geburt laufen, und suchen das Euter von selbst, welches vorher rein abgeschoren worden ist, damit sie keine Wolle verschlucken, die sich sonst leicht im Leibe in Ballen verwandeln

wandeln und tödtlich werden könnte. Man versagt den Lämmern auch die erste reinigende Muttermilch nicht, und läßt sie entweder acht bis 10 Wochen, oder besser, so lange saugen, bis sie sich selbst entwöhnen.

Sobald man bemerkt, daß sie anfangen gröbere Nahrung aufzusuchen, so legt man ihnen von dem feinsten und besten Heu vor, oder setzt ihnen Kleyen hin, weil beydes ihr Blöken verhindert, und das Wachsthum der Wolle befördert; ja, wenn sie recht gut gedeihen sollen, so kann man ihnen neben der Muttermilch noch zuweilen Hafer, geschrotene Wicken, Klee und Gras geben. Man darf auch die jungen, schwächlichen Lämmer nicht sogleich mit ihren Müttern auf die Weide treiben, weil sie abgemattet werden, und Thau, Schnee, Kälte und Regen sehr üble Wirkungen auf sie machen. Das furchtsame und unempfindliche Schaf läßt sich sein Lamm wegnehmen, ohne sich zu wehren, ohne zu zürnen oder sonst eine traurige Empfindung zu erkennen zu geben; und zeichnet sich dadurch vor allen andern Thieren aus.

Von den Bocklämmern wird die nöthige Anzahl zu Zuchtböcken von weißer Farbe, starkem Halse, krummer Nase, breitem Rücken, munterm Betragen, und feiner und krauser Wolle ausgesucht.

Die Stöhrlämmer aber, die geschlachtet werden sollen, schneidet (hammelt) man nach vierzehn Tagen, und diejenigen, die Zuchthammel werden sollen, nicht eher als im zweyten Jahre, weil sie dann größer, stärker und wolliger werden und gleichwohl das zarte und wohlschmeckende Hammelfleisch erhalten.

Die

Die Beraubung der Mannbarkeit (Lämmerleuchten) geschieht auf verschiedene Art, indem man entweder nur einen Einschnitt in den Hodensack macht, und die Geilen herausdrückt *), welches das Hammeln auf Lämmerart genannt wird, oder mit zwey Einschnitten, welches das Hammeln auf Kälberart heißt, oder es geschieht durch Abschnüren, indem man den Hodensack fest zubindet und ihn nach vierzehn Tagen abschneidet oder nach Belieben abfallen läßt, oder durch Klubben, indem man den Hodensack zwischen ein Holz spannt und nach einiger Zeit wegschneidet. Der beyden letztern Arten bedient man sich vorzüglich bey erwachsenen Stöhrlämmern und bey alten Widdern. Da, wo man gewohnt ist, auch verschnittene Schafe, sogenannte Schafhämmel, Schöpfe zu halten, geschieht die Verschneidung nach der sechsten Woche, durch einen Einschnitt in der linken Seite der Lämmer, durch welche Oeffnung die beyden Eyerstöcke gezogen werden. Die Oeffnung nähet man hierauf wieder so zu, daß der Faden auf beyden Seiten herabhängt, und nach etlichen Tagen wieder herausgezogen werden kann.

Den muntern, starken, weißen, ungefleckten und wollenreichen Mutterlämmern, die man zur Zucht behalten will, schneidet man nach vierzehn Tagen bis drey Wochen

*) Die Thüringischen Schäfer machen bey dem Bocklamme einen Einschnitt in den Hodenbeutel und ziehen dann die Hoden sammt den Saamensträngen mit den Zähnen heraus.

Wochen die Schwänze ab zum Unterscheidungszeichen von den Widderlämmern, und wie man glaubt, als eine Erleichterung des Begattungsgeschäfftes.

Krankheiten *).

Die Schafe sind so wie alle zahme Thiere, die nicht mehr triebmäßig ihre eigentliche vom Schöpfer angewiesene Nahrung, wie die wilden Thiere, suchen können, und deren Lebensart so große Einschränkungen und Zwang leiden muß, vielen Krankheiten ausgesetzt.

Die Merkmale des Schäfers, wenn er den gesunden Zustand eines Schafs erkennt, sind folgende: Es muß den Kopf hoch tragen, lebhafte Augen, eine trockne Schnauze, feuchte und unschmutzige Nasenlöcher, einen guten und leichten Athem, behende Füße, festsitzende Wolle, eine rothe Haut, und besonders röthliche Augenadern haben. Diese Merkmale bezeugen mehrentheils die Gesundheit des Schafes, außer in der Faulsucht, der gewöhnlichsten Krankheit der Weideschafe in feuchten Sommern, welche sich erst im Februar oder in der Lammzeit in ihrem Daseyn vollkommen, ohne vorhergegangene deutliche Kennzeichen, zeigt **). Diese

1) Lun-

*) s. Sammlung einiger Abhandl. von verschiedenen Krankheiten der Pferde und Schafe. Nürnberg 1779 8.
v. Kloöb Abh. von den Hauptkrankheiten u. Verhalten der Schafe. Regensburg 1790. 8.

**) Die Thüringischen Schäfer haben daher ein Sprichwort: Michel ist ein Schmücker und Peter ist ein

1) Lungen- und Leberfäule entsteht mehrentheils dann, wenn die Schafe auf nasse Wiesen getrieben werden, oder in kalter Witterung bethautes oder bereiftes Futter genießen. Man beugt ihr durch das bloße Salzlecken, oder besser, wenn man das Salz mit Schwefel, Spießglas, Wachholderbeeren und bittern Wurzeln vermischt, vor. Als ein geheimes und sicheres Mittel gegen die Lungenfäule bey der Kleefütterung preißt man an, acht bis zehn Tropfen Terpentinöhl zweymal und bey nassem Wetter viermal wöchentlich unter obiges Salzfutter zu geben.

2) Eine andere Krankheit der Schafe ist die Seuche, wo bey der Oeffnung die kleinen Gedärme ganz blau angelaufen sind. Sie rafft ganze Heerden weg. Entdeckt man sie noch in ihrem Ursprunge, so heilt sie zuweilen Mithridat, oder Vitriolspiritus in Wasser eingegeben.

3) Das Lendenblut, wo die Schafe oft ganze Stücken Blut pferchen und das Blutbissen, wo sie Blut harnen, entsteht auf fetten Weiden von noch unbekannten Kräuterarten *). Warm Bier mit etlichen Eyern

ein Drücker; welches sie so auslegen, daß um Michaeli, wenn man Schafe kauft, auch die faulen noch die Kennzeichen der gesunden, z. B. rothe Augen und Haut haben, obgleich die Fäule schon ziemlich Wurzel in ihnen gefaßt hat, und daß erst um Peterstag (den 22sten Februar) diese Krankheit völlig ausbricht.

*) Den scharfen Hahnenfuß (Ranunculus acris) giebt man gewöhnlich für die Ursache an.

Eyern und vieler Butter hilft gewöhnlich. Beym Lendenblut ist heftiges Bauchschlagen, Dickwerden, und im Mastdarm eine starke Anhäufung von Blut, das so klebrig ist, als wenn es mit Leim vermischt wäre, zu spüren. Es hilft folgendes: 1/2 Eßlöffel voll Baumöhl, 1/2 Loth gereinigter Salpeter in warmen Wasser aufgelöst, ein frisches Ey; dieß untereinander gerührt und auf einmal eingegeben. Aderlasse und erweichende Klystire gegeben, wenn man kann, nämlich wenn man die Schafe zu Hause hat, helfen auch.

4) Die Maulsucht, die bey nasser Witterung die Schafe befällt, und wo sie einen dickgeschwollenen Kopf, dicke Lippen, Augen und Ohren bekommen, wird dadurch gehoben, daß man ihnen ein Stückchen Ohr nach dem andern abschneidet, wo bey dem Bluten die böse Feuchtigkeit mit weggeht, oder daß man ihnen in die Ohren mit einem Stückchen sogenannter Christwurz (Helborus niger, L. schwarze Nießwurz) einzieht. Im ganzen Kopf befindet sich bey dieser Krankheit eine gelbliche Feuchtigkeit.

5) Das sogenannte Feuer bekommen sie ebenfalls in kalten, nassen Wetter. Sie kriechen dabey zusammen, zittern und fressen nicht. Man zieht ihnen Nießwurz im Schwanz ein.

6) Die Erhitzung oder heiße Sucht entsteht im Sommer von allzu großer Hitze. Die Thiere sperren das Maul auf, schäumen und bluten aus der Nase. Eine Aderlasse an dem Unterkiefer, wo die Wurzel des vierten Backenzahns liegt, soll helfen. Man macht es daher nicht ohne Grund dem Schäfer zur Pflicht, in den

heißen

heißen Mittagsstunden des Sommers schattige Oerter mit seiner Heerde aufzusuchen *).

7) Das größte Unglück für eine Heerde ist, wenn die Pocken, (Blattern) unter ihnen zu wüthen anfangen. **). Die ganze Heerde wird insgemein angesteckt, wenn man nicht schleunig die angesteckten und reinen Schafe von einander absondert. Es giebt bösartige und gutartige; diese stehen einzeln nnd jene fließen zusammen. Die Schafe bekommen ein häßliches Ansehen, die Köpfe werden besonders dick und über und über mit Blattern, die den Kinderblattern ähnlich sind, und welche die Schafe auch nur einmal in ihrem Leben bekommen, besäet. Ein Pfund Talg oder Fett mit 1/4 Pfund Kienöhl oder Terpentin geschmolzen und äußerlich gebraucht, heilet sie. Auch braucht man innerlich, wenn sie weit um sich gegriffen haben, mit gutem Erfolg Spiesglas in Brunnen oder auf Brod, oder etliche Tage nacheinander 6 Tropfen Habacueöhl auf Brod eingegeben. Im Anfang der Krankheit giebt man ihnen Morgens und Abends jedesmal ein halb Loth gestoßene Lorbeeren mit

*) Dieß muß den Schäfern von der Obrigkeit bey schwerer Strafe anbefohlen werden, denn sonst nehmen sie alle Tage von dem Landmann 1—2 Gr. Haltgeld (wie sie es nennen) auf den Aeckern, und lassen den Schafen die schmachtendste Hitze 2 bis 3 Stunden des Mittags ausstehen, wodurch ihnen diese und viele andere Krankheiten zugezogen werden.

**) Wiedebantt prakt. Abh. über die vollkommene Heilung der Schafraude. Stettin 1790. 4.

eben so viel Schwefel und etwas Kleye vermischt. Auch thun Haarseile und Spanischfliegenpflaster gute Dienste. Essig, Salpeter, Kampher und andere kühlende und der Fäulniß wiederstehende Mittel machen immer die Hauptcur aus. Wenn die Pocken (auch andere ansteckende Krankheiten) in der Nähe sind, so muß man reinen frischen Theer in Wasser quirlen, und ihnen täglich davon zu saufen geben; dieß bewahrt sie vor der Ansteckung.

8) Das Schmiervieh sollte man auch gänzlich abschaffen, und dafür gutes reines einführen. Denn obgleich die Bläschen oder Liesen der Heerde nicht tödlich sind, so wird doch die Wolle, wenn sie die Schafe aufbeisen oder aufkratzen, durch den verursachten Grind verdorben, und das reine Vieh angesteckt; ja es kann zuweilen auch eine gefährliche Raude daraus entstehen. Beym Schmiervieh muß die Aufmerksamkeit des Schäfers das Beste thun, sonst leidet man an der Wolle großen Schaden. Vorzüglich ist im Winter die größte Aufsicht nöthig. Ein Oekonom in Thüringen hat den Versuch gemacht, und den Schafen immer reines frisches Wasser gegeben, sie alle 14 Tage in einem Bach gebadet, und hat dadurch sein Vieh, das mit lauter Schmiervieh umgeben war, gereinigt und rein erhalten. Die Schäfer machen die sogenannte Gosse, die sie in hölzernen Büchsen immer bey sich führen, aus schechtem Toback und Lauge drücken die Blätterchen auf, und gießen diese Salbe hinein. Einige Schäfer kauen den Toback, spucken dann auf die Wunde, und sagen, daß dieß Verfahren besser wirke. Menschenharn thut auch die Dienste, oder ein Decoct von 1|1/2 Loth Grünspan,

6 Loth gemeinen Rauchtobak und 1/2 Pfund Kaminruß.

9) Der Zungenkrebs wird wie bey den Kühen behandelt. (s. Krankh. d. Ochses Nr. 3.)

10) Befällt ein Schaf die Wanstkolik, welches man daran erkennen kann, wenn das Thier steif da steht, nicht frißt, tief Athem holt, zittert und aufgeschwollen ist, so treibt man es so lange herum, bis es pfercht, sperret ihm auch wohl durch ein Holz das Maul auf, wodurch es gereitzt wird herumzuspringen, und den Abgang des Windes zu befördern. Sie entsteht von allzufetten und bethauten Gräsern, die das Schaf in zu großer Menge genießt. Man hat auch die heftigsten Blähungen mit einer Hand voll Schnupftoback in Milch eingegossen vertrieben.

11) Die Ringkrankheit oder das Drehen (Kreisel, Dosell) der Schafe, welches von sogenannten Blasenwürmen, die im Gehirn in gewissen Wasserblasen ihren Sitz haben, und ihnen sehr große Schmerzen verursachen, herrührt, soll durch ein Loth rothen Gauchheil (Anagallis arvensis) in geschrotenem Malz pulverisirt eingegeben und kalten Gauchheilthee nachher eingegossen, vertrieben werden können. Andere spritzen dem drehenden Schafe Hirschhornspiritus in die Nase. Das beste und sicherste Mittel ist, daß man mit dem Hirn-Trokar die Wurmblase im Gehirn zerstöhrt und ihre Feuchtigkeit herauszieht. *)

*) S. Riemisch-Reutterische ausführliche Practik des Veterinär Trokarirens irrgehender Drehschafe ꝛc. Dresden u. Leipzig. 1791.

12) Die Vollblütigkeit (Blutkrankheit) und das damit verknüpfte Ersticken der Schafe erfolgt, wenn die Schafe aus dürrer elender Fütterung, sogleich in fette Weide kommen und die jungen Gräser zu gierig in Menge verschlucken. Man hilft ihnen durch eine Aderlasse.

13) Für die Wasserfucht, die von den Verstopfungen in den Eingeweiden entsteht, welche das Verhüthen und schlechtes Futter verursachen, kennt man noch kein sicheres Hülfsmittel. Zu Pulver gebrannte, durch ein Sieb geriebene und mit Salz vermengte Mohnhäupter den Schafen zu lecken gegeben, soll die Schafegeln, denen man diese Krankheit auch zuschreibt, tödten; auch hat sie die Natur wider die Wassersucht Salzlecken gelehrt, und einige Knospen von Wermuth, ihnen zuweilen gegeben, ist ein gutes Verwahrungsmittel. Auch soll gestoßener Gyps, mit etwas Kleyen und Salz vermischt, helfen. Eben diese Arzeney ist auch für diejenigen, die herzweich sind, oder Wasserköpfe haben, bewährt gefunden worden.

14) Den Durchfall bekommen die Schafe vom Grase, das mit Mehlthau befallen ist. Man stößt trokkene Erlenknospen zu Pulver, thut halb so viel trockenes Salz darzu und giebt jedem Schaf 2 Löffel voll.

15) Die Gelbsucht ist eine gefährliche Krankheit. Die Schafe haben gelbe Augäpfel und eine gelbe Haut. Sie sterben gewöhnlich nach drey Tagen. Man kennt noch kein probates Mittel dagegen. Gewöhnlich giebt man des Tages ein Quentchen gepülverte Enzianwurzel, und eben so viel venetianische Seife mit etwas Honig vermischt.

Feinde.

Der gefährlichste Feind der Schafe ist, unter den Raubthieren wie bekannt, der Wolf, unter den Raubvögeln der Steinadler (Falco aquila) und Seeadler (Falco ossifragus).

Die Blasenwürmer in der Leber und im Darmfell, die Bandwürmer in den dünnen Därmen (Taenia viscealis, hydatigena, orbicularis et ovina) und die Palisadenwürmer sind ihnen auch beschwerlich, ob sie ihnen gleich keine tödtliche Krankheit verursachen.

Die Nasenbremsen oder Stirngrübler (Oestrus nasalis) setzen ihnen ihre Eyer in die Nasenlöcher, und die Made der letztern soll ihnen auch eine Art Drehen verursachen.

Die Schafegel, (Egelschnecken, Leberwürmer, Leberegeln), welches ovale, platte, olivenbraune, schnekkenartige Würmer sind, die sich in den Gallengängen der Leber aufhalten, aus Eyern, die sich in allen Schafen von Natur selbst befinden, entstehen und ausgebrütet werden, verursachen in großer Menge einen langsamen Tod. Wenn sie nur einzeln da sind, schaden sie gar nichts, sondern nähren sich von der überflüßigen Gallenfeuchtigkeit. Sie selbst verursachen auch wie die neuesten Beobachtungen bezeugen, eigentlich keine Krankheit, sondern werden selbst durch Bösartigkeit der Galle z. B. bey der Wassersucht, den Kröpfen u. s. w. nur in Menge ausgebrütet und nachher erst schädlich. Man muß also nur durch gute Weide und Wasser jene Quellen zu verhüten suchen, so fallen die Klagen über Egelkrankheit von selbst weg. Trockene Weide, wiederholtes Salzfutter und Hafer helfen aber die Egel, die in Menge

da sind, tödten. Man hat bis jetzt eine große und eine kleine Art entdeckt. Bilhuber Sammlung von Beobachtungen über die sogenannte Egelkrankheit unter dem Rindvieh und den Schafen. Tübingen, 1791.

Die Schafzecken (Hippobosca ovina), eine Art Holzläuse, sind den Schafen auch eine sehr große Plage. Man wäscht sie mit Salzwasser, Eßig, oder mit Wasser, in welchem Toback oder bittere Mandeln abgekocht sind. Alle diese Mittel verscheuchen sie plötzlich. Nach der Wollschur entfernen sie sich auch von selbst, wenn die Schaafe zum erstenmal beregnet werden.

Die kleine Schafmilbe (Mistlaus, Acarus Ricinus) ist ein noch schädlicheres Ungeziefer. Sie rupfen sich an solchen Orten, wo sie von demselben gebissen werden, die Wolle aus.

Die Ochsenbremen (Tabanus bovinus) verfolgen sie stark, und saugen ihnen auf eine schmerzhafte Art das Blut aus.

Die Oekonomen beschuldigen auch eine Art bräunlicher Fliegen, Spinnfliegen (Hippobosca) genannt, daß sie ihre Eyer um die Fontenelle lege, unter derselben Wasserblasen verursache, in welchen sich die Maden dieser Insekten, welche auf dem Kopf einen rothen Punkt, und rückwärts zwey Haaken hätten, befänden, und ebenfalls ein Drehen der Schafe, so wie die Blasenwürmer verursachten. *)

Nur

*) Strunz freymüthige Briefe über die Schafzucht in Böhmen und Oestereich. Wien 1788. S. 179. Herr Strunz hat sich aber wohl geirrt, denn aus der nähern Angabe sieht man, daß er die Schaf- oder Nasenbremse (Oestrus

Nutzen.

Daß das Schaf ein sehr nützliches Thier ist, ein Thier, an dem alles gut und brauchbar ist, weiß jedermann.

1) Durch die Wolle, wodurch es so viele tausend Menschen ernährt, bekömmt es aber seinen vorzüglichsten Werth. Die Eigenschaften einer guten Wolle sind, daß sie lang, weiß, klar, weich, fest und elastisch ist. Und diese Eigenschaften alle erlangt auch unsere Thüringische nicht eher, als bis wir uns überwinden, spanische oder englische Stöhre zu unsern Heerden zu gesellen. Doch ist sie nicht schlecht. Man nimmt sie hier nur einmal ab, und zwar im Junius. Dabey wäscht man die Schafe vorher, da hingegen in andern Gegenden die Wolle nach der Schur gewaschen wird. Keine Art der Wäsche hat vor der andern etwas zum voraus. Man hat geglaubt, die Schafe, welche zweymal geschoren würden, gäben mehr Wolle als die Einschürigen, allein sichere Beobachtungen beweisen das Gegentheil, und die Einschürigen bringen noch überdieß den Vortheil der längern und theurern Wolle. Indessen schiert man die zweyschürigen zum erstenmal drey Wochen nach Ostern und bekommt die Winterwolle, und zum zweytenmale eine Woche vor Michaeli, und erlangt die Sommerwolle, welche besser ist. Die Lämmer scheeren einige im ersten Jahre, andere lassen sie bis zum

(Oestrus ovis et nasalis, Lin.) meynt. Von einer Art Hippobosca ist dieß auch nicht zu erwarten.

zweyten mit der Wolle gehen, und letztere haben größern Vortheil. Man unterscheidet dreyerley Sorten auf jedem Felle, a) die Kernwolle, vom Rücken und Hals, b) die Mittelwolle, vom Schwanz und den Schenkeln, c) die schlechte, von der Kehle, dem Bauch und den übrigen Theilen des Leibes, und man sondert bey der Schafschur jede Sorte besonders ab. Das Wachsthum der Wolle nach der Schur wird dadurch befördert, daß man die Schafe mit Hopfenwasser, Weinhefen und Oehldrüsen und etliche Tage mit Salzwasser wäscht. Ein gut gefütterter Hammel trägt in Thüringen sechs bis sieben Pfund *) Wolle, und ein Schaf vier bis fünf Pfund.

Der Nutzen der Wolle ist zu bekannt, als daß ich ihn hier genau zu beschreiben brauchte. Man macht daraus Tücher und allerhand Zeuche, Handschuhe, Hüte und viele Dinge mehr. Der Kürschner verarbeitet die Felle auch mit den Haaren, gefärbt und ungefärbt, zu Pelzen, Handschuhen, Decken u. dergl.

2) Daß das Fleisch, besonders der zweyjährigen Hammel, eine gesunde und angenehme Speise sey, ist bekannt genug. Man mästet sie mit eben dem Vortheil, als das andere Mastvieh, und es ist ein schädliches Vorurtheil,

*) Ich kannte einen Oekonomen, der ein außerordentlicher Liebhaber der Schafe war und sich gewöhnlich etliche Hammel hielte, die er besonders, ob sie gleich mit ausgetrieben wurden, gut fütterte und abwartete. Sie trugen ihm alle Jahre acht Pfund Wolle ein. Ein Beweis, daß alles auf die Fütterung und Wartung ankömmt.

urtheil, daß man ihnen immer das geringere Futter geben zu müssen glaubt, und nicht bedenkt, daß, je besser das Futter ist, das sie bekommen, desto größer auch der Nutzen wird, den man von ihnen zu genießen hat. Es weiß jeder verständige Oekonom, daß ein Hammel, der 16 Gr. mehr an gutem Futter, als z. B. Hafer und Rüben mit Salz vermischt, verzehrt, um 2 Rthl. theurer verkauft wird, als ein anderer, der durch sparsame Kost, mit bloßen Wirrgebünden von Stroh zur Schlachtbank tüchtig gemacht worden ist.

3) Die Schafmilch ist die nahrhafteste Milch und für manche Personen eine sehr angenehme Speise. Wenn man bey Kleefutter einen Ueberfluß an Milch bemerkt, und sich in einer Lage befindet, wo man mehr Vortheil aus der Milch, als aus der Wolle ziehen kann, so kann das Melken bis Crucis (den 14. Sept.) wohl erlaubt seyn. Allein unter andern Umständen ist das Schafmelken der größte Fehler in einer Schäferey; denn die Nahrungssäfte, die in die Milchadern geführt und ausgemolken werden, müssen nothwendig der Wolle und dem Fleisch am Zufluß ihrer erforderlichen Säfte und vorzüglich den Lämmern an ihrer nöthigen Nahrung entzogen werden. — In Island macht man aus der Herbstmilch der Schafe ein wohlschmeckendes Gericht, indem man sie so lange, bis sie dick wird, kochen läßt.

Die weiße Schafbutter lieben wenige Personen, desto mehrere aber die Schafkäse, zu welchen aber nicht die geronnene Milch allein, sondern auch die Sahne genommen werden muß, wenn sie ihren guten

Geschmack

Geschmack bekommen sollen. Das Schmelzen, welches ihre Fettigkeit verursacht, so wie das Anschmeißen der Fliegen, wird dadurch gehindert, daß man ihre Außenseite mit Salzwasser besprengt *).

4) Aus den mit der Wolle zubereiteten Schafellen macht man die sogenannten Schafpelze, und die auf diese Art bereiteten Lämmerfelle geben ein feines Futter unter die Kleidung, und werden zu Pelzen, Mützen, zu Verbrämungen gebraucht, und die besten kommen unter dem falschen Namen, ungebohrner Lämmerfelle aus Rußland zu uns.

5) Die Schafhaut gerbt der Roth- und Weißgerber und der Pergamentmacher, und der Schuster, Beutler, Buchbinder und Riemer verarbeitet sie. Aus den Lämmerfellen macht man dänische oder glasirte Handschuhe; aus den Hammelfellen Pergament und Oehlhaut, aus den Schaffellen Pergament zu Kindertrommeln, und das feinste geben die ungebohrnen Lämmerhäute.

6) Den Talg weiß der Lichtzieher und Seifensieder und jede gute Hausfrau in ihrer Oekonomie zu nutzen.

Um

*) Die guten Texelschen Käse werden von Schafmilch gemacht, und die grüne Farbe und den pikanten Geschmack, der sie eigentlich so beliebt gemacht hat, bekommen sie dadurch, daß man frische Schafgarbeeren mit Wasser einmengt, diesen Aufguß durchseigt und ihn mit der Käse-Matte vermischt. In den drey Sommermonaten werden von dieser Insel jährlich 275000 Pfund für ohngefähr 35000 Gulden ausgeführt.

Um Eyer lange Zeit frisch zu erhalten, überzieht man sie mit diesem Talg.

7) Die Eingeweide, als Lungen, Herz, Nieren, Leber und Kaldaunen werden gegessen, und einige Därme geben die so bekannten Darmsaiten und Raqueten. Die feinen Violin- und Harfensaiten werden von den Därmen der Lämmer gemacht, indem sie umgekehrt, rein gewaschen und auf einer Maschine zusammengedreht werden. Sonst braucht man sie auch um Wurstfleisch hinein zu füllen.

8) Von den Knochen wird von den Papiermüllern der Papierleim gekocht, und das Fett derselben, das man bey Zubereitung des Leims gewinnt, wird zu verschiedenem Gebrauch, z. B. der Geschmeidigkeit des Leders angewendet. Um die Rostflecken vom polirtem Stahl wegzubringen, ist das weißgebrannte Pulver von diesen Knochen gut. Man reinigt den Rostflecken erst mit Brandwein, alsdann reibt man ihn mit diesem Pulver trocken rein ab.

9) Der Schafmist ist endlich ein Hauptnutzen, den die Schafzucht gewährt. Er ist es, der es mit nöthig macht, daß man die Kleefütterung, wo man ihn in Menge von besonderer Güte und ohne Verlust enthält, allgemein machen sollte. Welche Fruchtbarkeit erlangen nicht diejenigen Aecker, auf denen der Pferch (Nachtdünger) gestanden, oder die mit Schafmist gedüngt worden sind? zwey Jahre hindurch geben sie die reichlichsten Erndten und sechs Jahre lassen sie noch die Spuren ihrer Düngung bemerken. Nur muß man beobachten, daß nicht die Waizen- und Gerstenäcker diese Düngung erhalten,

ten, wenn der Waizen gute Semmeln und die Gerste gute Graupen geben sollen. Man benutzt auch den Schafmist mit Oehl vermischt zum Walken, und die Egypter in Kahiro brauchen den Ruß vom verbrannten Schafmist zu Salmiak. Noch ein Nebennutzen desselben ist, daß er gedörrt in eine Wunde gestreut, dieselbe heilet, und frisch mit der mittlern Rinde des Erlenbaums in Sahne gekocht, eine sehr gute Brandsalbe ist.

10) Die Hörner und Klauen der Schafe geben nebst andern Abgängen von ihrer Wolle und Fellen z. B. die Pechzeichen, eine sehr vortreffliche Düngung.

11) Die Schafe sind auch, weil die geringste Aenderung des Wetters Einfluß auf sie hat, lebendige Barometer, und durch sie werden die Schäfer Wetterpropheten. Es mögen wohl in ihrem Gehirn eben die Veränderungen, wie in einem Wetterglase, vorgehen. Laufen sie, um nur einige Beyspiele anzuführen, schnell zusammen, trennen sich schnell wieder, und springen in die Höhe, so ist mehrentheils ein Gewitter nicht ferne; laufen sie aber des Abends auf Berge und Anhöhen und springen auf denselben herum, so folgt anhaltendes heiteres Wetter.

Schaden.

Die Schafe reißen auf nassen Wiesen die Wurzeln der Kräuter aus, benagen Bäume und Stauden, und besonders in Wäldern die jungen Kiefern. Dieser doppelte Schaden aber kann durch die Menschen verhütet werden, so wie der dritte, daß sie auch unschuldigerweise die großen, so wenig benutzten Triften in fruchtbaren

und

und bevölkerten Gegenden durch ihre Weide nöthig machen.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Ein gewisser Arzt zu Montier, Gachet de Beaufort, will in der Leber seiner Alpenschafe durch Zusammendrücken mehr als siebzig Stück weißer Schmeterlinge mit völlig ausgewachsenen Flügeln, halb eyrunden rauhen Kopfe von der Größe der Seidenwürmer gefunden haben. Es sind wahrscheinlich die Egelwürmer gemeynt. Büffons N. G. von Martini I. 307.

2) Die alten Aerzte empfahlen alles von den Schafen in der Medicin, sogar die Schafläuse, und noch jetzt plagt der gemeine Mann seine Kinder in der Pockenkrankheit mit Einnehmen der sogenannten Schaflorbeeren.

3) Der fliegende Sommer soll Ursach der Schaffäule seyn. Es wird hier von coexistirenden Dingen, wie so oft geschieht, ohne Grund eins zur Ursache des andern gemacht.

4) Daß wie bey allem Hausvieh, also auch bey diesem, viele auffallende und hartnäckige Krankheiten für Hexerey gehalten werden, ist eine bekannte Sache.

Die vierte Gattung.

Ziege. Capra.

Kennzeichen.

Diese Gattung hat acht untere Vorderzähne und keine Eckzähne.

Die Hörner sind hohl, zusammengedrückt, gereift, und beyden Geschlechtern eigen.

Das Kinn hat einen langen Bart.

Das Euter mit zwey Säugwarzen sitzt zwischen den Hinterfüßen.

Der Magen ist vierfach. Junge fallen gewöhnlich zwey, auch drey und eins, und diese werden z. B. im ersten Herbst hitzig.

6. Der Steinbock, oder die Alpenziege.

(Tab. IV. Fig. 1.)

Namen, Litteratur und Abbildungen.

Alpenbock, Europäischer Steinbock, Sibirischer Steinbock, Ybschen, Ybsch-Geyß.

Capra Ibex. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 196. n. 2.

Bouquetin. *Buffon* hist. nat. XII. 136. t. 13. Ed. de Deuxp. V. T. 5. f. 3. Uebers. von Otto XI. 7. 60. m. e. Fig.

Ibex.

Ibex. *Pennant* hist. of Quadr. I. 55. Meine Ueberf. I. 50.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 174.

Goeze's Fauna. III. 182.

Donndorfs zool. Beytr. I. 656. n. 2.

Höpfner's Magazin für die Naturkunde Helvetiens. II. 23.

v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 281.

Kennzeichen der Art.

Mit sehr langen, fast dreyseitigen, oben knotigen, nach dem Rücken zu gekrümmten Hörnern und einem Bart am Kinne.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses merkwürdige Thier übertrifft an Größe unsere Ziege weit, und wiegt im Alter einige Centner.

Der Kopf ist im Verhältniß mit dem übrigen Körper sehr klein; die Schnauze dick und etwas gekrümmt; die Augen groß, rund, hell und feurig; die Ohren kurz und eyrund. In der Bildung des Kopfs hat es mehr Aehnlichkeit mit dem Hirsch, als der Ziege. Der Bart ist sehr lang. Die Hörner haben eine schwärzliche Farbe und eine schräge Richtung nach hinten. Nach außen krümmen sie sich niederwärts, und sind mit der

Spitze bisweilen etwas einwärts gebogen. Ihre Länge beträgt anderthalb Ellen; sie sind also nach Verhältniß des Körpers und Kopfs sehr lang und stark. An ihrer Wurzel sind sie sehr breit und verjüngen sich ganz unmerklich nach ihren Spitzen hin. Ihre scharfen, nach der Länge gehenden, Kanten bilden eine Art von Vorderfläche, welche durch schräge, höckrige, und gleichlaufende Kanten bezeichnet ist. Diese höckerigen Queerkanten oder Knotenringe sind jedesmal in desto größerer Anzahl vorhanden, je älter das Thier ist. Das Gehörn eines alten Steinbocks wiegt wohl 20 Pfund, hat oft 24 Knotenringe, welche sein Alter anzeigen, und eins hält bis drey Maas Wasser. Er ist dickleibig. Die Beine sind dünn; die Klauen lang, scharf, gespalten, fest, spitzig, inwendig hohl, und nach der äußern Seite mit einem hervorstehenden Rande begränzt. Der Schwanz ist kurz, unten kahl, übrigens mit langen Borsten besetzt.

Der Bart ist rothfalb oder schwärzlich. Die Haare des Leibes sind lang, röthlichbraun, oder rothfalb, im Alter grau; längs dem Rücken geht ein brauner Streif, und ober- und unterhalb den Vorderbeinen befindet sich ein schwarzer und weißer Flecken. Der Schwanz ist an der Wurzel und den Seiten weiß, oben und am Ende schwarz. Im Winter ist der Leib mit einem doppelten Pelze bekleidet, der obenher ein ziemlich langes und sprödes, unten aber ein feineres und dichteres Haar hat.

Die Steinbockziege ist viel kleiner, fast um ein Drittel, aber doch merklich größer als die Hausziege,

ziege, hat einen kleinen Bart, weit kleinere Hörner *), eine hellere Farbe und zwey Zitzen.

Verschiedenheiten.

Nach den Abbildungen zu urtheilen, mag es wohl verschiedene Varietäten unter diesen Thieren geben, die aber beyde in den Tyroler- und Schweizer-Alpen sich aufhalten müssen. Die eine muß ein glattes hirschartiges Fell, und die andere ein langes zottiges Ziegenfell haben. Die letztere ist die bekannteste und gewöhnlichste. Sollte nicht etwa ersteres der Steinbock im Sommerhaar, und letzteres derselbe im Winterhaar seyn?

Merkwürdige Eigenschaften.

Sie sind scheu, flüchtig, und können, ohnerachtet es schwerfällige Thiere sind, mit der größten Leichtigkeit steilen Felsenwänden hinauf laufen, und abgeschnittene Felsen und die tiefsten Abgründe nöthigen sie nie ihren Weg zu ändern, sondern sie fliegen mit der größten Schnelligkeit schnaubend von einer Klippe zur andern; ja sie sind die stärksten Springer unter allen bekannten Thieren. Sie stürzen sich auch wohl von jähen Anhöhen herunter, ohne sich zu schaden, weil sie allezeit die Hörner vorhalten.

Von Merkwürdigkeiten ihres innern Körperbaues ist noch nichts bekannt.

*) Nach Hrn. v. Haller soll sie ungehörnt seyn, welches aber ungegründet ist.

Verbreitung und Aufenthalt.

Sie bewohnen die höchsten Schneegebirge, Felsen und Steinklippen der Alpen, daher man sie in dem Waliserlande, Savoyen, der Schweiz, auf den Pyrenäen, carpatischen Gebirgen, dem Taurus, Caucasus, in Siberien, Kamtschatka, und vielleicht auf den meisten hohen Gebirgen der alten Welt antreffen soll *). In Deutsch-

*) Nach den Erfahrungen und Behauptungen des Hrn. D. Girtanners (s. Lichtenbergs Magazin IV. 2. S. 32.) soll diese Art in Tyrol und den Steyerschen Alpen ausgegangen, und der einzige Ort, wo sie sich jetzt noch fände, die unbesteiglichen Gletscher des Thals von Aost in Savoyen seyn. Die Steinböcke anderer Gegenden hält er von ganz anderer Art. Das unbekannte Verschwinden derselben von den Alpen, da sie doch im vorigen Seculo daselbst noch sehr gemein waren, erklärt er sich so. Er sagt: die Größe des Steinbocks und die Länge und Schwere seiner Hörner zeige an, daß er nicht für die Gegend, die er jetzt bewohne, geschaffen sey. Sein natürlicher Aufenthalt schienen die subalpinischen Gebirge zu seyn. Hier hätten sonst bey den dichtesten Wäldern und einer geringen Bevölkerung ganze Heerden geweidet. Aber so wie die Bevölkerung zugenommen hätte, so wären auch die Steinböcke genöthiget worden, sich weiter in die Höhe auf die Felsen zu ziehen, um den Verfolgungen der Menschen zu entgehen. Hier hätte aber sogleich eine große Menge derselben aus Mangel an Nahrung, vor großer Kälte und durch die Raubvögel, welche den Jungen nachzustellen pflegen, ums Leben kommen müssen. Da der Steinbock ferner der Blindheit sehr unterworfen wäre, welche ihren Grund offenbar in dem sehr starken Rückprall der Sonnenstrahlen vom Schnee hätte, so verursachte

Deutschland sieht man sie noch selten in den hohen Schneegebirgen von Tyrol und Salzburg. Sie werden überhaupt jetzt in Europa sehr einzeln, und nur in den Savoyischen Alpen soll man zuweilen noch Rudel von zehn bis funfzehn Stück antreffen. Hier halten sie sich in kleinen Heerden auf den steilsten, für Menschen beynahe unzugänglichen Felsen auf, bahnen sich den Weg durch den Schnee, setzen über Abgründe weg, besteigen mit etlichen Sprüngen die höchsten und steilsten Felsen, wenn sie nur irgend eine kleine Unebenheit antreffen, wo sie sich anklammern können, und kommen nur in die Thäler, wenn sie bey Verfolgung nicht weiter klettern können, oder von den Schneelauwinen, und vom Schwindel, den sie zuweilen bekommen sollen, ergriffen werden. Sie lieben vorzüglich die Einöden, scheuen die heftige Sonnenhitze, so wie die übermäßige Kälte. Im Sommer bewohnen sie die Nordseite der Gebirge, im Winter aber suchen

ursachte auch dieß vielen den Tod. Die Jäger hätten ihm versichert, daß gegenwärtig kaum noch überhaupt hundert Stück von dieser ganzen Art Thiere übrig wären.

Der Erzbischoff von Salzburg unterhält in seinem, eine Stunde weit von Salzburg gelegenen Garten Hellbronn eine Heerde Steinböcke. In dem großen Park desselben ist in der Mitte ein waldiger Berg. Eine schroffe Felsenstirn auf einer Seite desselben dient diesen Thieren zu einem natürlichen Aufenthalt, und sie sollen ihrer zunehmenden Seltenheit wegen in den Gebirgen des Landes hier nachgezogen werden.

sie die Mittagsseite und die Thäler. Sie laufen über das Eis, sobald nur etwas Schnee darauf gefallen ist.

Nahrung.

Ihre Nahrung besteht aus Kräutern und allerhand wildem Gesträuche, so auf den höchsten Bergen wächst. Sie lecken beständig an den Steinen, besonders an solchen, welche vom Salpeter und Salz angelaufen, mürbe und kalkartig sind.

Fortpflanzung.

Der Steinbock tritt im October auf die Brunft, ist einen ganzen Monat hitzig, sammelt sich alsdann wieder in Rudel, und bleibt am Fuße der Gebirge. Die Ziege, die wohl 21 Wochen, wie die zahme trächtig ist, gebiert ein Junges, selten zwey. Diese lassen sich, wenn sie bald gefangen werden, leicht zähmen *), werden bey ihrer großen Munterkeit, die sie beybehalten, überaus kirre, und schmeichelhaft, wie die andern Ziegen, ja lassen sich sogar unter diesen mit der Heerde auf die Weide treiben und begatten sich mit ihnen. In Salzburg hat man den Steinböcken zahme Ziegen gegeben, um sich mit ihnen zu begatten, da die Steinbockziegen ausgegangen waren. In der dritten Generation werden sie den wilden Steinböcken gleich und können ausgesetzt werden.

Jagd.

*) Die Bewohner der Insel Creta sollen die Jungen mit den Hausziegen aufziehen.

Jagd.

Die Jagd des Steinbocks, welche am besten im Erndte- und Herbstmonat angestellt wird, ist wie die Gemsenjagd, sehr mühsam und gefährlich, und Hunde kann man dabey gar nicht gebrauchen. Wenn er vom Jäger so weit in die Enge getrieben und verfolgt wird, daß er keinen Anlauf mehr gewinnen kann, um sich von einem Felsen zum andern zu schleudern, so rennt er mit einem gewaltigen Stoß auf ihn zu, und stürzt ihn, wenn er nicht geübt genug ist, um mit der gehörigen Geschicklichkeit auszuweichen, in das nächste Thal herab.

Nutzen.

1) Das Fleisch des Steinbocks, das im Geschmack dem Hirschwildpret an die Seite gesetzt wird, soll zähe und schwer zu verdauen seyn, wird aber gegessen.

2) Die Hörner werden, so wie von andern Thieren verarbeitet, besonders zu Trinkgeschirren für Jäger und Hirten; große Herren lassen sie zierlich ausschneiden und mit Gold oder Silber einfassen, da sie alsdann theuer bezahlt werden; auch brauchen sie die Chineser und Türken zu den besten Bogen.

3) Die Haut wird mit den Haaren zu Kleiderfutter verbraucht, und ohne Haare von den Semischgerbern zu Leder zubereitet, welches aber wenig geachtet wird, da sie überaus dünn ist.

4) Das Blut wird in der Heimath dieser Thiere als ein schweißtreibendes Mittel gebraucht.

Schaden.

Er verursacht zuweilen den Tod des Jägers, der ihn verfolgt.

(5) 7. Die gemeine Ziege.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Das männliche Geschlecht heißt: Bock, zahmer Bock, Ziegenbock, Hausbock; das weibliche: Ziege, Geis, Hausziege, zahme Ziege.

Capra Hircus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 193. n. 1.

Bouc et Chevre. *Buffon* hist. nat. V. 59. Ed. de Deuxp. I. Tab. 3. F. 1. 2. Uebers. von Martini II. 3. Taf. 13. 14.

Domestic Goat. *Pennant* hist. of Quadr. I. 59. Meine Uebers. I. 55.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 154.

Goeze's Fauna III. 201.

Hückels Abhandl. von den Ziegen und zahmen Schweinen. Frankfurt und Leipzig 1756.

Donndorfs zool. Beytr. I. 648. n. 1.

v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 283.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Mit gebogenen, gekerbten, unebenen, hohlen Hörnern, die eine Rückenschärfe haben, und einem Barte am Kinn.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Ziege, welche jetzt ein so nützliches Hausthier allenthalben geworden ist, hat den Steinbock (Ibex) oder vielmehr die Bezoar-Ziege (Capra Aegagrus), oder auch wohl beyde zugleich zu ihrem Stammeltern.

Die Bezoarziege, oder die sogenannte wilde Ziege ist größer als unsere Hausziege, hat große runzliche, graubraune Hörner, welche dem weiblichen Geschlechte fehlen oder doch sehr klein sind, einen großen schwärzlichen Bart, einen grauröthlichen Körper, eine schwarze Rückenlinie und ein rauhhaariges Fell. Sie bewohnt die wildesten Gegenden vom Caucasus, die angränzenden östlichen Gebirge, Persien, Indien und Japan u. s. w. In ihr findet man den sonst so berühmten, aber wenig wirkenden Bezoarstein *).

In den Thüringischen Walddörfern findet man die zahme Ziege fast in allen Häusern. Man kann sie als

*) Ridingers jagdb. Thiere Taf. II.
v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 282.
Pallas nordische Beytr. IV. 386.

das Mittelthier zwischen dem Reh und Schaf betrachten, da sie so viele Merkmale mit beyden Thieren gemein hat. Ihre Größe ist nach ihrer Wartung und Nahrung verschieden. Gewöhnlich ist sie über vier Fuß lang und 2 1/2 Fuß hoch *).

Der Kopf des Bocks ist kurz, schmal, mit Haaren dicht bewachsen, welches ihm ein wildes Ansehen giebt. Er läuft von der breiten Stirn gerade aus bis zur Nase, die schiefe Löcher hat. Die Backen sind dick. Die Oberlippe hängt über die Unterlippe hin, und beyde sind mit Drüsen rund um besetzt. Der Mund enthält in der untern Kinnlade acht Schneidezähne; die Eckzähne fehlen, und auf jeder Seite stehen sechs scharfkantirte Backenzähne. Die Vorderzähne werden zu eben derselben Zeit, und in eben derselben Ordnung mit neuen verwechselt, wie bey den Schafen, und man kann also ihr Alter nicht nur, wie bey den Kühen, nach den Knoten der Hörner, sondern auch nach diesen Zähnen bestimmen. Die großen Augen haben einen eyrunden, oben und unten gedruckten, gelben Augapfel mit einer beynahe rechteckigen Pupille; sie spielen tückisch unter den langen Kopfhaaren hervor, und sind, so wie die langen Ohren, weit abstehend. Viele Böcke und Ziegen sind mit Hörnern versehen, die aber nicht einerley Beugung und Länge haben. Manche Böcke haben Hörner, welche über zwey Fuß lang sind. Sie sind mehrentheils geringelt, spiralförmig, oder bloß zurück gekrümmt, an

den

*) Par. Mß.: Länge 4 Fuß; Höhe 2 Fuß.

den Seiten zusammengedrückt, an der Wurzel breit, und an den auswärts gebogenen Enden spitzig zulaufend. Bis kurz vor der Spitze sind sie hohl, und machen die Scheide eines saftigen Knorpels aus, welcher in denselben in die Höhe steigt. Bey den meisten Ziegen und auch bey manchen Böcken findet man vor dem Halse einen langen Bart, oder zwey Verlängerungen der Haut, welche man Eicheln oder Glöckchen nennt, und die bis drey Zoll lang werden. Der Hals ist lang, der Rücken steigt allmählig bis zur Hüfte, und senkt sich alsdann plötzlich wieder. Der kurze Schwanz ist unten ganz glatt, die Beine sind dick und die Füße weißklauig.

Der Körper ist auf der Haut dicht mit weißer Wolle bedeckt, und über dieselbe legt sich dann das fünf Zoll lange Haar, und bildet auf dem Rücken einen Scheitel. Die längsten Haare befinden sich an den Hinterschenkeln; Hals, Kopf, Schwanz und Beine sind mit kurzen steifen Haaren besetzt. Die Farbe ist mehrentheils weiß, doch findet man auch schwarze, aschgraue, bläuliche, schwarzbraune, und mit diesen Farben gefleckte, und die licht- oder erbsgelben mit einem schwarzen Streifen über den Rücken sehen schön aus.

Die Ziege unterscheidet sich vom Bock durch den längern und glättern Kopf, längern und schmälern Hals, längern Leib, durch die kürzeren, weniger gebogene Hörner und kürzere, aber feinere Haare.

Merkwürdige Eigenschaften.

Die Ziege hat ein lebhaftes Naturel, so daß alle ihre Handlungen muthwillig, ungestümm und flüchtig geschehen.

schehen. Ihr ganzes Betragen ist wunderbar, widersprechend und launig. Sie bezeugt sich tückisch, und freundschaftlich, stößig und liebkosend gegen die nämliche Person. Bald ist sie sehr biegsam und bald wieder im höchsten Grade störrig. Heute geht sie ihrem Feinde muthig mit ihrer harten Stirn entgegen, und morgen bebt sie mit den größten Hörnern furchtsam vor ihm zurück. Heute begleitet sie ihren Versorger allenthalben hin, wohin er gehet, und morgen flieht sie ihn von weiten. Jetzt schleicht sie ganz bedächtlich und langsam ihren Weg dahin und plötzlich streckt sie sich zur Erde nieder. Jetzt springt sie muthwillig herum, schlägt vorn und hinten aus, und auf einmal steht sie still da, wie vom Blitz gerührt, und sieht starr vor sich hin. Ueberhaupt scheint sie aber von Natur dem Menschen zugethan zu seyn, und soll auch in öden Gegenden keine merkliche Wildheit annehmen. — Ihr Meckern und Schreyen, wodurch sie ihre Leidenschaften ausdrückt, ist jedermann bekannt. — Sie wird nicht über zwölf Jahre alt.

Bey der Zergliederung ist nichts ungewöhnliches bemerkt worden.

Aufenthalt und Nahrung.

Die Ziegen, welche entweder in einem eigenen Stalle allein, oder in einem Stalle neben anderm Vieh gehalten werden, verlangen ein reinliches und trockenes Lager, weil sie von Unreinlichkeit und Feuchtigkeit sehr leicht krank werden. So leicht sie die heißesten Sonnenstrahlen, Gewitter und Regengüsse ausstehen können, so sehr suchen sie aller Kälte nach Möglichkeit auszuweichen. Der

Stall,

Stall, oder Ort, wo sie stehen, muß also fast täglich gereinigt, und vorzüglich im Winter mit frischem Stroh bestreut werden.

Die Böcke befinden sich in Pferdeställen sehr wohl, wo sie das, was die Pferde von ihrem Futter herabfallen lassen, aufsuchen, und verzehren. Und dieß ist die leichteste Art sie zu ernähren. Sie dürfen aber keine Hörner haben, und die Schweife müssen den Pferden aufgeschürzt seyn, sonst fressen sie ihnen die Haare ab. In ihren Nahrungsmitteln verlangen sie Abwechselung. Im Sommer füttert man sie in Ställen am besten mit Bergkräutern und Gräsern, mit grünem Laub, Kohlblättern und geschnittenen Rüben u. s. f. Fettes Wiesen- und Gartengras verwüsten (verurzen) sie nur, indem sie ohne den dringendsten Hunger bloß die trocknen Kräuter aussuchen; doch können sie auch an Kleefutter gewöhnt werden. Das Laub der Brombeerstauden und Roßkastanien, so wie die Frucht von letzterm Baume, lieben sie gar sehr. Sie verabscheuen selbst die Wolfsmilch, welche sie purgirt, nicht. Man hat den Versuch gemacht, und ihnen 576 Kräuter vorgelegt, und gefunden, daß sie 449 davon fraßen, und 127 unberührt ließen. Bewundernswürdig ist es, daß ihnen ein ganzes Bündel Schierling nichts schadet, da hingegen Flöhkraut, die Blätter und Frucht vom Spindelbaum (Evonymus europaeus) ihnen Gift sind, und zu viel Eicheln ihnen so krampfhafte Schmerzen verursachen, daß sie zur Unzeit ihre Jungen werfen.

An manchen Orten werden sie im Sommer, entweder, wenn ihrer nicht viel sind, zugleich mit den Scha-

fen,

sen, oder, wenn sie eine Heerde ausmachen, von einem eigenen Hirten allein auf die Weide getrieben. Ein Mann ist nicht im Staude mehr als vierzig bis funfzig Ziegen zu weiden, weil sie sehr unbändig sind und leicht über Gräben und Zäune springen. In wilden, felsigen, bergigen, unfruchtbaren, trocknen und magern Gegenden ist es sehr wohl gethan, wenn sie ausgetrieben werden, und sie thun keinen merklichen Schaden, wenn sie nur von Weinbergen, jungen Laubholzgehegen und Gartenzäunen, weil sie die Rinde von vielen Bäumen, junge Zweige und Baumknospen sehr lieben, sorgfältig entfernt werden. Es ist grausam, wenn man diesen muntern und hurtigen Thieren in der Jugend zwey Vorderzähne ausbricht, und einen von ihren Hinterfüßen mit Durchschneidung einer Sehne lähmt, damit sie auf der Weide keinen Schaden thun sollen. Ein guter Hirte muß und kann eine solche Behandlung entbehrlich machen. Auf der Weide suchen sie besonders trocknes Moos, Steinflechten, dorniges Gesträuch und trockne Kräuter auf, und befinden sich in sumpfigen und feuchten Gegenden und zu fetten Weiden nicht wohl; daher man sie in ebenen Gegenden nur selten zu halten pflegt. Sie sind nicht so zärtlich, als die Schafe, können in der größten Sonnenhitze auf den Spitzen der Berge ihren Mittagsschlaf halten, und befinden sich so weit besser, als im Schatten auf dem weichsten Grase. Auch Regen und Ungewitter sind ihnen nicht zuwider, nur in der Kälte können sie nicht so gut, wie die Schafe, ausdauern. Das bethaute Gras, welches den Schaf- und Rindvieh so ungesund ist, ist ihnen gesund, und sie können daher des

Morgens,

Morgens, ehe der Thau verdünstet ist, auf die Weide geführt werden.

Den Winter über erhält man sie mit Heu von sogenannten dürren Gärten und Bergwiesen, und mit getrocknetem Laube, das im September abgestreift worden ist. Ihr Getränke, das sie täglich zweymal verlangen, würzt man mit Kleyen, Leinkuchen, und zuweilen mit Salz. Mit Hafer, Kohlrüben, weißen, gelben Rüben und Kartoffeln mästet man sie.

Fortpflanzung.

Die Ziegen werden in der Hauswirthschaft bis jetzo in Thüringen noch vorzüglich ihrer Milch halber gehalten, und da in derselben ein merklicher Unterschied in Ansehung des Geschmacks statt findet, indem manche Ziegen sehr übelschmeckende, oder wie die Landleute sagen, meckernde Milch geben, so werden nur diejenigen zur Zucht auserlesen, von welchen man gute, wohlschmeckende Milch bekommt.

Dabey muß eine Zuchtziege noch folgende Eigenschaften haben. Sie muß ziemlich hoch seyn, ein breites Kreuz, breite Lenden, dicke Schenkel, große Euter und lange Zitzen (Striche) und lange und viele Haare haben, und der Zuchtbock, der sich mit ihr begatten soll, muß groß seyn, einen kurzen, fleischigen Hals, kleinen Kopf, niederhängende Ohren, dicke Schenkel, starke Beine, viele und weiche Haare, und einen langen und dicken Bart haben. Und da es in unsern Gegenden Ziegen und Böcke mit Hörnern und ohne Hörner giebt, so, daß man bey letztern nur den Ansatz dazu unter der

Haut

Haut fühlt, so wählt der Landmann vorzüglich die ungehörnten, weil jene in den Ställen durch ihr muthwilliges Stoßen und Bohren die Wände beschädigen.

Allein neben dem Nutzen, den die Ziege durch ihre gute Milch leistet, würde man noch einen wichtigen durch ihre Haare erlangen, wenn man dieselben zu verfeinern suchte. Dieß könnte (wenn man nicht ganz diese gute Rasse einzuführen vermöchte) einstweilen durch die Vermischung unserer Ziege mit dem angorischen Ziegenbocke geschehen. Und man hat wirklich auch schon nicht ohne Vortheil den Versuch gemacht, und unsere Ziegen von angorischen Böcken bespringen lassen, und die Haare der Lämmer sind sehr verfeinert worden. Man könnte ihnen bald eine noch größere Güte verschaffen, wenn man bey der Fortpflanzung die nämlichen Regeln beobachtete, die man bey der Fortpflanzung der Schafe mit Spanischen Widdern befolgt. (s. Schaf Fortpflanz.)

Die Ziege verlangt den Bock (bockt) gewöhnlich nur in den Monaten September, Oktober und November, und man befriedigt ihr Verlangen alsdann, wenn man voraus sieht, daß die Lämmer zu einer solchen Zeit zur Welt kommen werden, wo ihnen das Wetter und Futter zuträglich ist. Sie giebt dieß Bedürfniß durch ein unaufhörliches Meckern zu erkennen. Zuweilen wird sie auch im Monat May noch einmal brünstig. Der geile Bock, der im zweyten Jahre eine Heerde von hundert Ziegen belegen kann, begattet sich zu allen Zeiten, und stinkt besonders im Herbste, wo sein Fortpflanzungstrieb am stärksten wirkt, sehr heftig. Die Gais trägt 21 bis 22 Wochen und setzt (hippelt, lammt) gewöhnlich eins

oder

oder zwey, zuweilen drey und selten vier Lämmer (Zickelchen), die sie vier oder fünf Wochen lang säugt. Sie hat oft schwere Geburten auszustehen, weswegen sie eine besondere Aufsicht verlangt. Man füttert sie vor und nach ihrer Niederkunft einige Tage mit Heu. Den Jungen keimen die Hörner im zweyten Monat hervor. Das Böckchen ist nach einem Jahre, und das Gaischen im siebenten Monate schon zur Fortpflanzung fähig. Allein man gestattet das Werk der Zeugung dem Bock nicht eher als nach dem dritten, und der Ziege nach ihrem zweyten Jahre, und nach dem fünften Jahre läßt man den Bock nicht mehr bespringen, und nach dem siebenten die Ziege nicht mehr trächtig werden, weil vor und nach dieser Zeit die Jungen keine gute Nachzucht geben.

Wenn man im Winter die Ziegen unter die Schafe stellt, so lassen sie sich, besonders die Jungen, von den Schafböcken bespringen, und bringen sonderbare Bastarden zur Welt, die beyderley Eltern ähneln.

Das Verschneiden der Böcke geschieht entweder im sechsten Monate, wenn man auf den Nutzen des Fleisches sieht, weil dieses dann nicht ganz den üblen Geschmack des Bockfleisches annimmt, saftig und zart wird, oder erst im zweyten Jahre, wenn man auf die Haut Rücksicht nimmt, welche, da sie alsdann ihr völliges Wachsthum erreicht haben, größer, stärker und dauerhafter wird.

Krankheiten.

Die Ziegen sind nicht so vielen Krankheiten ausgesetzt, wie die Schafe.

1) Von allzu fetten Kräutern bekommen sie leicht den Durchfall, der zuweilen zur Ruhr und tödtlich werden kann, aber im Anfang durch dürres Futter leicht sich hemmen läßt.

2) Außerdem sind sie eben so, wie die Schafe, der Drehkrankheit (Ringkrankheit, dem Schwindel) unterworfen, welche eben die Kennzeichen und Ursachen, wie bey den Schafen hat, und auf eben die Art geheilt wird.

3) Wenn sie nach dem Werfen aufschwellen, so gießt man ihnen zwey Löffel voll Wein mit Kümmel in den Hals.

4) Wenn sie die Wassersucht bekommen, so schneidet man ihnen unter der vordersten Schulter die Haut ein wenig auf, daß das Wasser herausläuft, und streicht das Loch mit weißem Pech zu.

5) Die von großer Hitze erhärteten Euter bestreicht man mit saurer Milch.

Noch einige Krankheiten mehr haben sie mit den Schafen gemein, welche sich auch wie bey diesen heben lassen.

Feinde.

Der Wolf. In gebirgigen Gegenden der Stein- und Seeadler. Der Kolkrabe sogar holt kleine Ziegen von der Weide. Eine Art von weißgelber Milbe plagt sie, und die Blasenwürmer und Madenwürmer oder Askariden verursachen ihnen oft Krankheiten.

Nutzen.

Nutzen.

Die Ziege nutzt durch Fleisch, Milch, Haut und Haare.

1) Die Ziegenlämmer, welche, wenn sie noch an ihrer Mutter saugen, geschlachtet werden, haben ein zartes, schmackhaftes und leicht verdauliches Fleisch, das dem Lammfleisch gleich geschätzt wird. Das Fleisch der Ziege ist, wenn sie guter Art ist, auch ohne Bocksgeschmack, aber härter und schwerer zu verdauen, als das Schöpsenfleisch. Der beschnittene Bock hat zwar ein nahrhaftes, aber allezeit noch unschmackhaftes Fleisch.

2) Der Talg, wovon nicht selten bey einer gemästeten Ziege zehn Pfund gefunden werden, wird von Gerbern zu Zubereitung des Leders und von Lichtziehern zur Verfertigung guter harter Lichter vorzüglich gesucht. In der Arzney wird es als zertheilend, schmerzstillend und heilend gebraucht, besonders ist es denen, die sich wund geritten haben, sehr nutzbar.

3) Einige Aerzte empfehlen die Galle wider die fallende Sucht als ein bewährtes Mittel. Wenn der Körper des Kranken vorher durch Abführung gereinigt worden ist, so muß derselbe die neun ersten Tage des Mayes hindurch die Galle von einem jungen Ziegenbocke in Honig aufgelöst, einnehmen. Dabey muß er sich nicht nur während der Kur, sondern auch nach derselben das ganze Jahr hindurch alles Weins enthalten.

4) Das getrocknete Blut wird bey Quetschungen, das geronnene Blut aufzulösen, gebraucht.

5) Die Ziegen werden bey uns bloß ihrer Milch *) halber gehalten, welches ein vortreffliches Getränke für gesunde und kranke Menschen ist, da sie dünner und leichter zu verdauen ist, als die Kuhmilch. Wie viele Haushaltungen in armen Walddörfern ernährt beynahe allein die Milch einer einzigen guten Ziege und trocknes Brod!

Vorzüglich aber ist die Milch wegen ihres medicinischen Nutzens berühmt, da sie nicht allein vielen Kranken ein gesundes Nahrungsmittel, sondern auch ein bewährtes Heilungsmittel ist. Es ist bekannt, daß die Ziege einen gereinigtern Geschmack hat, als die Kuh, und daher immer die besten Kräuter auswählt, da hingegen jene auf der Weide alles unter einander verschluckt. Man zieht aus diesem Grunde mit Recht bey Kranken die Ziegenmilch der Kuhmilch vor, und giebt ihr den Rang gleich nach der Eselsmilch, und sie ist noch fetter und nicht so ekel, als diese. Man hat bemerkt, daß die Ziege vorzüglich zusammenziehende und bittere Kräuter genießt, und schreibt deswegen ihrer Milch auch eine stärkende Kraft zu. Es ist sogar versucht worden, eine Ziege, deren Milch man zur Kur brauchen will, besonders

*) Man trifft auch zuweilen Böcke an, die neben dem Hodenbeutel noch mit einem Euter versehen sind, und Milch, wie die Ziegen geben. So befand sich 1763 auf dem Gute Waldau, nahe bey Bischoffswerder in Ostpreußen, und noch neuerlich in der Gegend um Göttingen ein Thier dieser Art. Auch in Waltershausen habe ich ein Paar solche Thiere im Jahr 1786 gesehen.

sonders mit einem oder etlichen Kräutern zu füttern, welche gegen die Krankheit, die man heilen will, vorzügliche Kräfte haben, und man rühmt die guten Folgen dieses Verfahrens. So hat man z. B. für schwindsüchtige, denen diese Milch sonderlich sehr heilsam ist, die Ziegen im Frühjahr mit Gänseblumen, Huflattig, Lungenkraut, Nesseln u. dergl. gefüttert; gegen den Scorbut mit Kresse, Bachbungen, Löffelkraut; gegen die Hämorrhoidalbeschwerden mit Schafgarbe, und alsdann diese Milch vortrefflich gefunden. Weiter hat man durch Versuche entdeckt, daß sie alle mögliche zu Pulver gestoßene Arzeneyen, wenn solche anfänglich in geringer, nach und nach aber in größerer Quantität unter das Futter gethan, und mit Küchensalz vermischt worden sind, ohne Widerwillen verzehrt haben, und ihre Milch dadurch die geläuterten Kräfte der Arzeney bekommen hat.

Die wohlschmeckenden frischen Ziegenkäse sind bekannt genug. — In Italien werden aus der Ziegen- und Schafmilch die süßen guten Käse gemacht, die den Namen Ricotta haben. Die süße Milch wird nämlich mit ihrem Rahm gesotten, und alsdann mit einer Säure von einigen Tropfen Salzgeist oder Laab geschieden, wodurch die schweren und groben Käsetheile zu Boden sinken, die leichtern und feinern aber mit dem Rahm in die Höhe steigen; diese werden mit einem kleinen spanneweiten runden Binsenkörbchen abgeschöpft, die Molke muß abtröpfeln, den folgenden Tag können diese Käsekörbchen schon verkauft und der Käse kann genossen werden.

6) Aus den Ziegenfellen wird Corduan, Saffian, Pergament, eine Art Juften, Chagrain und gewöhnliches weißgegerbtes Leder bereitet. Die schönsten Corduane kommen aus der Levante, Constantinopel, Schmirna und Aleppo; nächst diesen folgen die spanischen, ungarischen und französischen. In Deutschland macht man auch Leder, das man Corduan nennt; man ist aber an manchen Orten damit zufrieden, wenn man die schon bereiteten weißen Bocksfelle aus der Türkey meist über Venedig kommen läßt, und sie selbst närbet, färbt und glättet. Die Bocksfelle geben besonders gute Beinkleider und Handschuhe, und aus den ungebohrnen Lämmerfellen wird das feinste Pergament verfertigt. Das sogenannte Hühnerleder ist nichts anders, als die obere abgezogene weiß gelassene oder blau, grün, roth und violet gefärbte Haut des Ziegenfells, woraus die schönen Sommerhandschuhe gemacht werden, und die glasirten dänischen Handschuhe entstehen aus dem Leder der jungen Ziegenfelle.

In Arabien dienen die Ziegenfelle zu Schläuchen, welche für das Wasser die Haare auswendig, für Wein und Brandwein aber inwendig haben und so gut gepicht sind, daß das Getränke keinen Geschmack davon erhält. Dergleichen Schläuche werden von den Reisenden in den Wüsten gebraucht, sonst auch an andern Orten die Milch darinn aufbewahrt und Butter darinn gemacht, so wie sie in Kleinasien auch zu Eimern dienen. Die Kirgisen kleiden sich auch in Ziegenfelle, und in Astrachan trägt man Stiefeln davon. Die Chinesser kaufen sie von den Russen zu Pelzwerk. Niebuhrs Reise I. 212. 293. Pallas Reise I. 389.

7) Die

7) Die weichen kurzen Haare werden vom Hutmacher, mit andern Haaren vermengt, zu Hüten, und allein zu Stricken, Bürsten, besonders den sogenannten Magenbürsten und Pinseln benutzt, und die langen werden zu Parucken und Salleisten (Salbenden) an den Tüchern verarbeitet; lange und kurze aber spinnen die Landleute zu Garn und verfertigen daraus Strümpfe und Socken. Es würde sich der Mühe verlohnen, wenn man durch öfteres Kämmen der Ziegen und Trockenhaltung der Ställe diese Haare zu veredeln suchte, sie im Frühjahr abschüre, gleich den Kameelhaaren kämmte, spänne, und zu starken Zeuchen verweben ließ; und dieser Nutzen würde um desto größer werden, wenn man sich die Verbesserungen unserer Ziegen und ihrer Haare durch die Angorischen Böcke ernstlicher angelegen seyn ließe. Die einzelnen Versuche, die man mit glücklichem Erfolg in Deutschland schon gemacht hat, sollten uns zur Nachahmung reizen. — Aus den Ziegenhaaren macht man auch die in der Färberey gebräuchliche Haarfarbe.

8) Die Hörner werden zuweilen, wie anderes Horn von den Drechslern verarbeitet, und die arabischen Schröpfer zerschneiden, wenn sie schröpfen wollen, die Haut mit einem schlechten Messer, und setzen statt der Schröpfköpfe abgesägte Bockshörner auf die Wunde. Niebuhrs Reise I. 403.

9) Der Mist der Ziege ist eine gute Düngung, besonders auf kalten nassen Aeckern. Eben derselbe soll auch frisch in Gegenden gestreut, wo Maulwurfshaufen sind, ein wirksames Mittel seyn, dieselben zu verjagen, weil sie seinen Geruch nicht vertragen können.

Schaden.

Bey nachläßiger Hütung werden die Ziegen durch das Schälen der Bäume, Benagen der Zweige, und Abfressen der Knospen in den Gärten, Weinbergen und Wäldern schädlich, und die gehörnten zerstoßen die leimenen Wände der Ställe.

Irrthümer.

Die Nachtschwalbe, welche auch Ziegenmelker heißt (Caprimulgus europaeus) soll sich des Nachts den Ziegen an die Euter hängen und sie aussaugen. Sie fliegt aber bloß bey kaltem Regenwetter in Waldgegenden um die Stalle herum und fängt Insecten weg.

Varietäten.

So wie bey allen Hausthieren, also hat man auch bey der Ziege viele Nationalrassen, welche uns aber Hier, da sie ausländisch sind, wenig oder gar nicht interessiren können. Die nützlichste Varietät für uns ist:

a. Die Angorische Ziege.

Capra (Hircus) Angorensis. *Gmel. Lin.* l. c.

La Chevre d Angora. *Buffon* l. c.

The Angora Goat. *Pennant* l. c. *)

Beschrei-

*) v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 284.

Beschreibung.

Diese Ziege hat von Angora, ihrem Vaterlande, den Namen bekommen. Sie heißt auch Seidenziege und das Männchen Seidenbock und gehört zu unserer Art, weil sie sich auch in unserer kältern Gegend mit unserm Ziegengeschlechte begattet und fortpflanzt. Sie hat lang herabhängende Ohren, und unterscheidet sich dadurch von der unsrigen gar merklich. Die Augen sind groß, lebhaft, und stehen weit von einander. Die Hörner des Bocks sind lang, breiten sich in einer wagerechten Richtung von beyden Seiten des Kopfs aus, und winden sich in Schneckenlinien zusammen. Die Ziege hat kürzere und vorne niedergebogene Hörner, welche mit ihrer gekrümmten Spitze bis ans Auge reichen, und mancherley Biegungen und Richtungen haben. Der Hals ist kurz. Die Beine sind länger, aber der Leib kürzer als an der gemeinen Ziege.

Das Haar hängt in acht Zoll langen, feinen, seidenartigen Locken an den Seiten herab, so daß die halben Beine mit diesen lockigen Haaren bedeckt sind. Man hat sie auch von verschiedenen Farben; allein die eigentlichen Angorischen Ziegen sind blendend weiß.

Aufenthalt und Nahrung.

Diese Hausthiere werden in ihrem Vaterlande in großen Heerden unterhalten, und der Ertrag ihrer seidenartigen Haare macht den eigentlichen Reichthum von Angora aus. Nach dem Beyspiel der Holländer, Engländer, Venetianer und Schweden, hat man auch diese nützlichen Ziegen in Deutschland, im Oestreichischen auf

dem Fürstlich Lichtensteinischen Gütern, in Bayern, Franken, um Anspach herum, in der Unterpfalz, ohnweit Heidelberg zu Tossenheim an der Bergstraße, und an andern Orten einheimisch zu machen versucht. Sie gewöhnen sich sehr leicht an unser Clima, und nehmen mit eben der Nahrung und Wohnung, wie unsere gemeinen Ziegen vorlieb. Im Sommer weiden sie an den magersten und unfruchtbarsten Orten, indem sie vorzüglich die guten Kräuterspitzen lieben; im Winter aber und bey nassem und schlechtem Wetter nehmen sie auch mit bloßem Heu vorlieb. Bey guten Futterkräutern und Kleefutter befinden sie sich auch in einem reinlichen Stalle gar wohl. Sie müssen ihres Nutzens halber oft gekämmt und gewaschen werden.

Fortpflanzung.

Sie pflanzen sich nicht nur unter sich in unsern Gegenden fort, und bringen alle Frühjahr zwey auch wohl drey Junge zur Welt, sondern sie können auch mit Vortheil mit inländischen Heerden vermischt werden, und man kann schon in der vierten Zeugung auf diese Art Junge mit seidenen Haaren bekommen. Verhütet man besonders, daß kein Bock wieder mit dem von ihm abstammenden Gaisen zur Vermischung kommt, so gelangt man noch eher zu seinem Zweck, und man könnte auf diese Art in kurzer Zeit ein ganzes Land mit diesen nützlichen Thieren anfüllen. (Weiter s. Fortpflanz. der Ziege. S. 416.)

Nutzen.

Nutzen.

Sie pflanzen sich in unsern Gegenden allein, und mit unsern Ziegen fort, und können uns also eben so, wie den Arabern durch ihre Häute den schönen morgenländischen Saffian und Corduan, und durch ihre Haare, welche ihnen des Jahrs zweymal abgeschoren werden, das schöne Kämelhaar verschaffen. Aus letztern macht man das sogenannte Kameelgarn, welches eigentlich Kämelgarn heißen sollte, da diese Thiere in ihrem Vaterlande Kämel heißen. Schöne Zeuche, die meisten Brüsseler Kämelotte, viel sogenanntes Türkisches Garn werden aus diesen Haaren verfertigt. Auch mit andern Haaren vermischt, werden sie zu Parucken verarbeitet.

Außerdem ist auch ihr Fleisch, und ihre Milch, deren sie mehr als unsere Ziegen geben, sehr gut zu genießen.

Noch muß hier bemerkt werden:

b. Die Bastartziege (C. H. hybrida.)

Eine Mischung von Schaf und Ziege, wenn letztere vom Schafbock besprungen wird. Der Schwanz ist kurz, und das Haar zottig.

Die

Die fünfte Gattung.

Antilope. Antilope.

Kennzeichen.

Vorderzähne sind in der obern Kinnlade keine, in der untern acht.

Die Eckzähne fehlen.

Die Hörner sind einfach, hohl, inwendig knochenartig, mit einer hornigen Scheide versehen, die mehrentheils geringelt oder spiralförmig gedreht ist, — und werden nicht abgeworfen.

Das Kinn hat meist keinen Bart.

Ein Thränensack an den Augen (bey den mehresten).

Die Klauen sind (bey den meisten) zugespitzt.

Die Säugwarzen liegen zwischen den Hinterfüßen.

Der Magen ist vierfach; sie nähren sich daher von Vegetablien.

Die Fortpflanzung ist wie bey den Ziegen, doch bringen sie gewöhnlich nur ein Junges auf einmal zur Welt.

Die

Die meisten wohnen in Heerden von hundert und mehr beysammen. Wegen ihrer Schnelligkeit sind sie schon in den ältesten Zeiten zum Sprichwort geworden *).

Die Arten dieser Gattung stehen zwischen den Hirsch- und Ziegenarten mitten inne. Dem Ansehen und den Haaren nach gleichen sie den Hirschen; den Hörnern nach aber den Ziegen. Die falschen Hufe sind bey ihnen kleiner und sehen Warzen ähnlich. Sie bewohnen das wärmere Asien und Afrika, und nur eine Art ist deutsch, nämlich:

8. Die Gemse oder Felsen-Antilope.

(Tab. III. Fig. 2.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Gäms, gemeine Gemse, ziegenförmige Gems, Steinziege, wilde Feldgeis, Steingeis, Felsenantilope, Waldthier, Gratthier; das Männchen: Gemsbock, Damhirzlein.

Antilope Rupicapra, *Gmelin Lin.* I. 1. p. 182. n. 3.

Chamois.

*) 2. Sam. II. 18.

Chamois. *Buffon* hist. nat. XII. 136. 177. t. 16. Ed. de Deuxp. V. T. 11. f. 1. Ueberf. von Otto XI. 48. 109. m. e. Fig.

Chamois. *Pennant* hist. of Quadr. I. 72. Meine Ueberf. I. 66.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 105. n. 16.

Höpfners Magazin für die Naturkunde Helvetiens II. 111.

Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. V. 4. S. 143.

Goeze's Fauna. III. 149.

Donndorfs zool. Beytr. I. 621. n. 3.

v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 279.

Ridingers jagdbare Thiere. Taf. 12.

Kennzeichen der Art.

Mit aufrechten, hakenförmigen, runden, runzlichen, an der Spitze glatten Hörnern und braunem Körper.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Gemse gleicht an Größe und Gestalt dem Ziegenbock am meisten, und scheint nur um deswillen etwas

größer,

größer, weil ihre Füße höher sind, und ihr Hals gestreckter ist. Man darf sie nicht mit dem Steinbock verwechseln, von dem sie ihrer ganzen Gestalt und ihren Theilen nach völlig verschieden ist, und mit welchen sie außer den Haaren, und der Lebensart fast nichts gemein hat. Das deutlichste und am meisten in die Augen fallende Kennzeichen, wodurch sie sich von allen andern Thieren unterscheidet, sind ihre Hörner. Diese stehen gleich über den Augen hervor, sind schwarz, rund, aufrecht, mit runzlichen Ringen umgeben, mit einem glatten Haken, der nach dem Rücken zu gekrümmt ist, und an zehn Zoll lang. Sie werden mit dem Alter immer größer, und bekommen jährlich einen Ring mehr; die Spitze aber und der Haken bleiben immer glatt. Inwendig sind sie ausgefüllt, und haben nur an der Wurzel eine Höhle von einem Zoll. Vor den Hörnern befindet sich in der Haut eine Oeffnung, welche zu einer trockenen Höhle führt, welche ebenfalls diesen Thieren besonders eigen ist. Die Oberlippe ist ein wenig gespalten; die Augen sind groß, röthlich, hell, und scharfsehend; die Ohren ohngefähr fünf Zoll lang, und inwendig mit weißen Haaren besetzt. Der Schwanz ist drey Zoll lang. Die Klauen an den Füßen sind von unten her unausgefüllt und hohl, ziemlich lang, scharf zugespitzt, und weit aus einander stehend.

Die Gemse hat zweyerley Haare, längere und kürzere. Das längere nimmt den Kopf, Bauch und die Füße ein, und das längste am Bauch und Füßen ist 4 1/2 Zoll lang. Auf dem Rücken sind die Haare kürzer, so wie beym Rehbock; doch sind sie auch von zweyerley Art;

die

die eine nämlich ist lästiger und flammig, und zwischen diesen stecken kleine krause Futterhaare. Vorn unter den Knieen ist ein besonderer Haarbüschel. Die Farbe ist im ganzen schmutzig rothbraun; unten an der Kehle befindet sich ein breiter weißer Streif; und an der Stirne, neben den Hörnern und am Unterleibe ist die Farbe schmutzig weiß. Der Schwanz ist ganz schwarz. Die abwechselnde Verschiedenheit in der Farbe besteht darinn, daß die Haare im Frühjahr, wenn sie ihre Rauhheit und Länge verliehren, weißgrau, im Sommer röthlich und im Herbst wieder dunkelbraun, ja meistens sammtschwarz werden. Sonst giebt es auch weiße und gefleckte, doch letztere sehr selten.

Die Weibchen haben ebenfalls Hörner, obgleich kleinere. Sie sind vom Männchen weder in der Größe, noch einer andern auffallenden Eigenschaft unterschieden. Sie haben vier Zitzen.

Verschiedenheiten.

Man unterscheidet zwey Rassen. Die eine, von den Schweizern Gratthier genannt, ist klein und rothbraun, bewohnt die höchsten Bergspitzen und steilsten Felsen im Sommer, nährt sich von den besten Kräutern und verläßt die obersten Theile der Wälder auch nicht bey dem größten Eis und Schnee. Sie soll außerordentlich wild und scheu seyn. Die andere ist dunkelbrauner und etwas größer, hält sich in Büschen, Wäldern und zuweilen in den Thälern der Berge auf, nährt sich von guten Kräutern und kleinen Zweigen der Tannen, und heißt Waldthier. — Sollte aber nicht etwa

unter

unter beyden Rassen der Unterschied nicht größer und der nämliche seyn, wie unter Feld- und Waldhasen, oder Feld- und Berghirschen? Wer oft in der Natur selbst untersucht und beobachtet hat, findet diese Bemerkung vielleicht sehr wahrscheinlich.

Zergliederung *).

1) Die gewöhnlichen vier Magen der wiederkäuenden Thiere liegen ziemlich weit von einander entfernt.

2) Die Gallenblase ist in der Mitte des rechten Leberlappens.

3) Zwischen dem Fetthäutchen und der Niere ist ein leerer Raum, da es sonst gewöhnlich anliegt.

4) Die Lunge hat acht Lappen.

5) Das Gehirn ist groß, die krummen Gänge darinn sind häufiger als bey andern Thieren und die Zirbeldrüse ist dick und runder als gewöhnlich.

6) Der Sehnerven geht im Augsapfel außer der Achse, mehr gegen die Stirn, als gegen den Backen zu.

7) Die Krystallfeuchtigkeit des Auges ist auf der Oberfläche des Hintertheils dreyfach durch Lücken getheilt,

*) Perrault, Charras und Dodarts Abh. zur Naturgeschichte I. 235. Taf. 30. 31.

getheilt, die von ihrem Mittelpunkte nach dem Umkreise gehen. Man sollte glauben, eine solche außerordentliche Verschiedenheit müßte Verwirrung in Brechung der Lichtstrahlen verursachen.

Merkwürdige Eigenschften.

Es sind gesellschaftliche, muntere, flüchtige, vorsichtige, wilde, schüchterne und menschenscheue Thiere.

Ihre Stimme ist ein leises kaum bemerkliches Blöken; bey Furcht oder Gefahr aber pfeifen sie gar heftig, und bedienen sich dazu mit der Nasenlöcher.

Sie werden zwanzig bis dreyßig Jahre alt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die hohen beschneiten Alpen von Europa, in der Schweiz, Savoyen, Dauphine, die Pyrenaischen und Appenninischen Gebirge, und vielleicht die meisten Kettengebirge Asiens sind ihr Vaterland. In Deutschland trifft man sie auf den Gebirgen von Tyrol, Kärnten, Krain, Steyermark und Salzburg noch häufiger (wiewohl auch einzeln genug) als den Steinbock an. Sie lieben eine reine, dünne Luft, und eine warme, niedrige scheint ihnen unerträglich zu seyn; doch wagen sie sich nicht auf die höchsten, äußersten Felsenspitzen, wie die Steinböcke, sondern halten sich mehr in den mittlern Berggegenden, und zwar theils auf kahlen Steinklippen, theils im Gehölze und Buschwerk auf, und man sieht sie oft auf den Steinklippen heerdenweis zu sechzig und mehrern beysammen herum laufen. Sie weiden mit einander, ziehen mit einander von einem

Ort

Ort zum andern, und ergreifen mit einander die Flucht vor ihren Feinden. Sie sind furchtsamer im Klettern und Springen, als der Steinbock, und springen also weder so weit, noch so schnell als derselbe. Wenn sie einen Felsen hinauf oder herunter steigen, so geschieht solches nicht in grader, sondern in einer schrägen Linie, besonders wenn es bergab gehet. Ueber steile Felsen springen sie oft zwanzig bis dreyßig Fuß hoch hinunter, ohne sich halten zu können. Während eines solchen Luftsprunges schlagen sie nur drey- bis viermal mit ihren Füßen an den Felsen an. Die Wärme meiden sie so sehr, daß man sie auch im Sommer nirgends als im Schatten, bey Schnee und Eis antrifft, und im Winter in hohen und dichten Wäldern. Ihr Aufenthaltsort ist also im Sommer und Herbst immer auf den hohen Gipfeln und zwar an unzugänglichen Orten, in Steinrissen von Felsen eingeschlossen, oder an jähen Grasplätzen, aber immer nahe an Schnee und Gletschern. Sobald der Tag anbricht kommen sie unter den hohlen Felsen, eingefallenen Felsenstücken hervor (denn Höhlen und Nester haben sie nicht) und weiden. Sobald der Tag stärker hereinbricht ziehen sie sich aus Furcht vor Verfolgung in abgelegene, unzugängliche, rauhe, wilde, aber allezeit schattige Bergthäler, die sie vorzüglich lieben, und ruhen da neben dem Schnee, wie die gemeinen Ziegen aus. Sie wälzen sich sehr gern im Schnee und auf den Gletschern, wozu sie ihre große innerliche Hitze, womit sie die Natur begabt hat, treibt. Gegen Abend gehen sie wieder auf die Weide und bey einbrechender Nacht wieder unter ihre Felsen. So wie die Natur auf den

hohen Berggipfeln erstirbt, so ziehen sie sich auch herabwärts nach den Wäldern, und schlagen in den dichtesten und wärmsten Stellen ihre Wohnung auf, und zwar gern auf der Sommerseite und an solchen Orten, wo ihnen ihr Instinkt sagt, daß sie vor den Schneelauvinen am sichersten seyn. Sie suchen hier gern die sogenannten Wettertannen auf, weil sie deren niedere und ausgebreitete Aeste vor Kälte und Schnee schützen. Die unangenehmste und härteste Zeit ist für sie der Frühling, wo sie, um der rauhen Waldnahrung zu entgehen, bis zu den Häusern in die bewohnten Gegenden herab kommen. Sie gehen zu dieser Zeit in Bergen nach Plätzen, die an der Sonne liegen, ob ihnen gleich der Weg durch Schnee, der hoch und weich ist, sehr beschwerlich wird, da ihr Körper gar nicht so gebaut ist, daß er sie tragen kann, und sie beständig sinken. Wenn sie über ein solches tiefes Schneefeld fliehen müssen, so beschleunigen sie dadurch ihre Flucht, daß das letzte auf den Rücken des vor ihm gehenden springt, so über den Rücken aller andern setzt, und sich an die Spitze stellt; ihm folgt das vorletzte und thut ein gleiches, u. s. w.; und sie sind auf diese Art schnell über ein solches Schneefeld weg *).

Obgleich die Gemse ein gesellschaftliches Thier ist, so giebt es doch Einsiedler unter ihnen, wie unter den wilden Schweinen, die alle Gesellschaft scheuen, und nur einzeln für sich leben. Es sind die sogenannten Stooß-

*) Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. V. 4. S. 143.

Stooßböcke, welche deswegen so heißen, weil sie sich am liebsten in den Alp-Erlenstauden, die in der Schweitz Stooß heißen, aufhalten. Es sind dieß, wie bey den wilden Schweinen, alte Männchen, die vor Alter weißgrau und langhaarig sind. Sie sind immer die fettesten.

Nahrung.

Sie nähren sich im Sommer bis zum Herbste von den vortreflichsten Alpkräutern, welche die Natur blos für sie hervorgebracht zu haben scheint. Im Winter fressen sie das hohe Waldgraß, und haben sie dieses nicht, so dient ihnen das Moos, das von Tannenästen in weißen langen Bärten herabhängt zur Nahrung. Hier bleiben sie zuweilen, wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen, um dieß Moos zu erreichen, in den Aesten hängen, und man findet sie todt. Im Frühjahr suchen sie das jung aufkeimende Wiesengras auf. Von den unverdaulichen Zasern der Bärenwurz, Gemswurz, Allermannsharnisch u. d. gl. bilden sich in dem Magen im Winter harte rundliche Kugeln, die sogenannten Gemsenkugeln (Gemsballen, europäischer oder deutscher Bezoar), die äußerlich mit einem schwarzbraunen, lederartigen Häutchen umgeben sind, und denen man vor Zeiten, weil sie einen guten Geruch und bittern Geschmack haben, allerhand Heilkräfte andichtete. Sie weiden, wie gesagt, wie die Rehe des Morgens und Abends, selten am Tage. Daß sie unterdessen eine Schildwache, die Vorgeiß genannt, ausstellten, welche sich beständig umsähe, und sobald sie etwas höre oder sehe, ein lautes

Geschrey erhebe, wodurch die andern die Flucht ergriffen, gehört zu den Fabeln. Vielmehr ist jede ihre eigene Schildwache. Jede hält alle Augenblicke den Kopf in die Höhe, durchschaut die Gegend, oder durchwittert die Luft, und die erste, welche etwas Verdächtiges entdeckt, warnt die andern. Die Warnungsstimme besteht in einem starken Pfeiffen, welches so nachdrücklich ist, daß es sehr weit durch die Berge hallet, und so lange nach einander anhält, so lange es nur das Athemholen erlaubt. Anfänglich ist der Ton sehr hell und scharf, zuletzt aber nimmt er ab, und wird niedriger. Nachdem sie eine Weile ausgeruhet, so wiederholt sie diese Warnung, sieht sich nach allen Seiten um, stampft mit den Füßen auf den Boden, und in einem Augenblick ist die ganze Gesellschaft über die steilsten Felsen weg. Auch wenn sie sich gelagert haben, stehen ihnen Kopf und Augen immer in der Höhe, und man kann von ihnen mit Recht sagen, daß sie mit offenen Augen schlafen. Sie lecken mehr Schnee als sie Wasser trinken. Sie lieben, wie alle ihnen ähnliche Thiere, das Salz, und finden sich dahero gern bey Salzlecken und solchen Felsen ein, welche salzige Feuchtigkeiten ausschwitzen. Auch lecken sie Sand, und an Sandsteinen, vermuthlich um ihre Zunge zu reinigen. Im Winter werden sie sehr mager, und sind nur vor ihrer Brunftzeit vorzüglich fett.

Fortpflanzung.

Ihre Brunftzeit ist wie bey den Ziegen, um Martini und zu Ende des Aprils, und zu Anfang des Mays

ist

ist ihre Setzzeit. Jenes ist der Zeitpunkt, wo sich die großen Gesellschaften in kleinere vertheilen, und wo nur zwey und drey bey einander angetroffen werden. Die Männchen gerathen hierbey oft in schwere Zweykämpfe, wenn zwey nach einen Weibchen gehen. Der Ueberwinder empfängt, wie bey den Hirschen, den Lohn seiner Tapferkeit. Die Begattung geschieht, wie bey dem gemeinen Ziegengeschlechte. Die Gemse trägt, wie die Ziege, 20 bis 22 Wochen, und wirft mehrentheils nur 1, selten 2 Junge. Sie sucht blos ein trocknes und verborgenes Lager unter einem herüberhangenden Felsen auf, ohne sich ein besonderes Wochenbett zu bereiten. Sie säugt das Junge sechs Monate lang, und nimmt alle Beschwerden der Erziehung auf sich, weidet mit demselben in den sichersten Orten, und lehrt es, wenn es Stärke genug hat, über Felsen und Abgründe setzen. Man hat oft mit Verwunderung die mütterliche Sorgfalt beobachtet, wenn ein Feind nahe war, wie sie ihm zärtlich, wie eine Ziege meckernd, zuruft, wenn sie über einen Felsen gesetzt hat, und das Junge den Sprung vergeblich versucht, wie sie zurückkehrt, und den Sprung so lange vormacht, bis das Junge nachspringt. Wenn eine Mutter von ihren Jungen weggeschossen wird, so findet sich gleich eine andere ein, die es an Kindes statt annimmt. Dagegen ist es aber auch sicher, daß die Jungen ihre todte Mutter nicht verlassen, und deshalb oft lebendig gefangen werden. Diese trennen sich nicht eher von der Mutter, bis sie mannbar sind, welches im dritten Jahre geschieht. Sie sollen sich nur sehr jung, und sehr schwer zähmen lassen.

Krankheiten.

Da sie immer die frische gesunde Bergluft und die guten Alpenkräuter genießen, so sind sie wenig Krankheiten ausgesetzt. Doch bekommen sie von übermäßigem Salzlecken die Krätze. Ob ihnen die Gemskugeln, die man oft im Magen, in der Größe einer welschen Nuß bis zu einer Faust findet, und die, so lange sie in ihnen sind, weich, und nur erst an der Luft hart werden, Schmerzen verursachen, ist unbekannt.

Feinde.

Außer den Menschen verfolgen sie die Bäre, Wölfe, Luchse, der Bartgeyer und Gold- und Stein-Adler, und die Stechfliegen plagen sie gar sehr. Die Schneelauvinen vergraben zuweilen ganze Heerden.

Jagd.

Die Gemsenjagd, die in manchen Gegenden, wo diese Thiere wohnen, mit der größten Leidenschaft getrieben wird, ist mit vieler Gefahr verknüpft, und es stürzen jährlich Jäger von den Felsen in die Abgründe, indem sie von den Gemsen herabgeworfen werden, wenn sie ihnen den Paß besetzen wollen. Die Gemsenjäger spüren sie an der Fährte, die der Fährte der zahmen Ziege ähnlich ist, und sich in längern und weiter gesperrten Klauen ausdrückt. Die gewöhnlichste Art, sie zu erlangen ist, 1) der Anstand, d. h. daß man ihren Wechsel merkt, sich ohne Geräusch hinter Anhöhen, und Felsen, dem Wind entgegen, weil sie einen so guten

Ge-

Geruch haben, daß sie ihre Feinde und besonders das Pulver eine viertel Stunde weit riechen, anstellt, und sie mit einer guten Pürschbüchse, oder einen einlaufigen Gewehre, welches zu einem doppelten Schusse eingerichtet ist, todtschießet. Dieß kann man auch bey den Salzlecken, die man für sie anlegt.

2) Sonst stellt man auch Klopfjagden an, wie bey andern Thieren, indem sich Schützen den Wind entgegen anstellen, und sich durch Treiber und Hunde die Gemsen zutreiben lassen.

3) Man lappt sie auch, wenn sie auf niedrige Berge kommen, des Nachts ein, macht Feuer hinter die Lappen, und treibt sie am Tage zum Schuß.

4) Die eigentlichen Gemsenjäger, die Gemsensteiger heißen, scheuchen sie auch von einer Klippe zur andern immer in die Höhe, klettern mit scharfen Fußeisen nach, und wenn sie sie so weit gebracht haben, daß sie nicht weiter können, so treten sie ihnen ganz nahe, setzen ihnen das Thillmesser, eine Art Hirschfänger, an die Seite; die Thiere reiben es sich von selbst ein, und stürzen dann vom Felsen herab.

Nutzen.

1) Das Fleisch der alten Gemse ist ein hartes und zähes Wildpret, aber der Jungen ihres giebt eine vortreffliche Speise, und wird theuer bezahlt. Es giebt Gemsen von 70 bis 80 Pfunden.

2) Die Häute sind sehr dicht und werden vom Weißgerber zu sehr gutem Leder bereitet, das Beinkleider, Handschuhe, Kollers u. s. w. giebt. Die Kollers

halten sehr lange, und leiden gar nicht durch die Nässe. Man braucht es auch zur Reinigung des Quecksilbers, welches durchgedrückt wird. In Genf, Chambery, und Grenoble wird mit Gemsenhäuten ein großer Handel getrieben. Eine Haut kostet 6 bis 9 Gulden.

3) Die Milch soll die guten Eigenschafften der Ziegenmilch haben.

4) Das Talg wird, wie das Ziegentalg, benutzt, und eine fette Gems hat oft 10 bis 12 Pfund.

5) Die Hörner braucht man zu Stockknöpfen; die Schmiede zum Aderlassen der Pferde.

6) Das Blut (Schweiß aus der frischen Wunde trinken die Gemsenjäger, und glauben sich dadurch gegen den Schwindel auf den steilsten Felsen zu stärken. Ueberdieß hält man das Gemsenblut in der Medicin, besonders in der Pleuresie für sehr wirksam.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Wenn die Gemsen vor Sonnenaufgang Gems- oder Bärenwurz (Aethusa Meum) fressen, so sind sie schuß frey.

2) Sie sollen Schildwachen ausstellen.

3) Beym Herabklettern von den Felsen sollen sie sich mit den Hörnern anhalten. Sie halten sie vielleicht bloß wie mehrere behörnte Thiere beym Stürzen vor.

4) Sie sollen einen besondern Luftgang von den Zähnen zwischen den Hörnern hinaus haben.

5) Den Saft der Gemsenkugeln pressen die Jäger nach dem Herausnehmen aus, und schreiben solchem gegen Schwindel, und andere Zufälle Wunderkräfte zu.

zu. Von diesen ihrer Wunderkraft kommt ihr Name: Deutscher, oder Europäischer Bezoar, der sonst von Kühmist und saßrigen Kräutern nachgemacht wurde. Er wurde von den alten Aerzten als Schweißtreibend, Giftwiderstehend, wider den Schwindel, wider Magenkrämpfe, Bauchflüsse und die Ruhr ꝛc. gerühmt.

6) Das Unschlitt in der Milch zerlassen, sollte sonst die Lungensucht curiren.

7) Der gebrannte Koth mit Honig und Essig soll das Ausfallen der Haare hindern, und mit Wein die Gelbsucht heilen.

8) Die Galle dient für blinde Augen.

9) Die Leber gegen Durchfälle. Kurz fast alle Theile werden vom Jäger von diesem merkwürdigen Thiere zu Gelde gemacht.

b) Mit jährlich abfallenden Hörnern.

Die sechste Gattung.

Hirsch. Cervus.

Kennzeichen.

Unten sind acht Vorderzähne.

Bey einigen Arten finden sich auch einzelne Eckzähne in der obern Kinnlade.

Die Hörner oder Geweihe sind aufrecht, dicht und ästig, und fallen jährlich ab; aber die Weibchen sind mehrentheils ungehörnt.

Sie leben in Wäldern, sind flüchtig, und es soll ihnen die Gallenblase gänzlich fehlen.

Der Magen ist vierfach.

Die Alten bringen jährlich eins auch zwey Junge zur Welt, welche erst im zweyten oder dritten Jahre sich wieder fortpflanzen.

* Mit schaufelförmigen Geweihen.

9. Der Damhirsch.

(Taf. V. Fig. 1. 2.)

Namen, Schriften, und Abbildungen.

Das männliche Geschlecht: Damhirsch, Tannhirsch, Damling, und Dambock: das weibliche: Damthier, Damwild, Damhirschreh und Damgeiß.

Cervus Dama. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 178. n. 5.

Dain et Daine. *Buffon* hist. nat. VI. 167. t. 27. 28. Ed. de Deuxp. II. T. 2. f. 2. 3. Uebers. von Martini III. 110. Taf. 46. 47.

Fallow Deer. *Pennant* of Quadr. I. 113. Meine Uebers. I. 106.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 24. 128.

v. Mellins Anweis. zur Anleg. einer Wildbahn. 151. f. 1 — 6 Geweyhe; Fährten 162.

v. Wildungens Neujahrsgeschenk für Forstliebhaber 1796. 1. Taf. 1. 2.

Goeze's Fauna. III. 51.

Donndorfs zool. Beytr. I. 604. n. 5.

v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 249. A. B.

Ridingers Jagdb. Thiere. Taf. 7.

Kennzeichen der Art.

Mit zusammen gedrückten ästigen zurückgekrümmten, an der Spitze handförmigen und etwas rückwärts gespitzten Geweihen, die dem weiblichen Geschlechte fehlen, und abwechselnder, auch bunter Farbe.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieser Hirsch, der in Deutschland, besonders in den Brandenburgischen Gegenden nicht selten ist, hat eine mittelmäßige Größe, ist um ein ziemliches kleiner als der Rothhirsch, doch aber viel stärker als der Rehbock, erreicht fast die Längevon 4 1/2 und die Höhe von 3 Fuß *) und eine Schwere von 250 bis 300 Pfunden. Er gleicht in seiner Gestalt und Oekonomie dem gemeinen Hirsch gar sehr. Der Leib ist verhältnißmäßig stark, die Beine (Läufte) aber sind lang und dünne, die Ohren (Gehör) ist so lang, der Schwanz (Blume) aber weit länger. Uebrigens haben die Glieder des Leibes, das Gehör ausgenommen, fast gleiche Lage und Bildung. Er brunftet,

*) Pr. Ms.: Länge über 4 Fuß; Höhe fast 3 Fuß.

tet, setzet, wirft ab, setzt auf, und fegt das Gehörn, wie dieser, nur alles einen Monat später. Sein Geweih aber ist dünner, platter, dehnt sich mehr in die Breite, und ist nach Verhältniß mit mehr Enden besetzt, nach innen gekrümmt und endigt sich mit einer langen und breiten Krone (Schaufel). Denn wo die Krone bey den Rothhirschen ist, da wird das Gehörn des Damhirsches ganz breit, zuweilen zwey Hände breit, aber nicht dick. Bey den alten sind oft die Stangen über die Hälfte breit und dünne, und mit vielen, oft 38 bis 40, hoch, Enden versehen, aber die Enden sind weder hoch noch lang, sondern ganz kurz. Je besser nun der Hirsch ist, desto besser er die Schaufeln und Enden ausbildet (vereckt); und dieses Gehörn giebt ihm alsdann auch ein prächtiges Ansehen. Er wirft es nach Verschiedenheit seines Alters vom April bis zum Junius ab, und es sproßt ihm, wie dem edlen Hirsche, wieder mit rauhen Baste aus dem Rosenstocke, als ein weicher Kolben hervor.

Das Weibchen ist eben auch, wie beym Rothhirsch, schwächer, kleiner, leichter, hat kein Geweihe, und auch nicht das empfehlende Ansehen des Männchens.

Die gewöhnliche Farbe beyder Geschlechter ist im Sommer glänzend rothbraun mit weißen kleinen Flecken über den Rücken, den Keulen und Schultern; von dem Blatte geht horizontal ein weißer zwey Finger breiter Streifen bis an die Keulen, wo er sich in einem Winkel etwas herabsenkt und dann bis an den Schwanz hinläuft; neben dem Schwanze steht noch auf jeder Seite neben den weißen Streifen ein gleichlaufender schwarzer; dieser ist oben schwarz unten weiß; die Stirn bis zur Nase,

und

und der Oberhals sind schwarzbraun, letzterer an den Seiten heller; die Seiten unter der Einfassung, so wie die Aussenseiten der Beine hellgelblich; der Untertheil des Halses, Brust und Bauch, so wie die inwendige Seite der Beine weiß. So sehen sie bis zum November aus. Im Winter aber, wo sich die Haut mit grauen und dunkelbraunen Haaren verdichtet, verschwinden alle Flecken und Einfassungen, und von erstern sieht man nur noch auf den Keulen eine kleine Spur, denn die graue Farbe legt sich auf die hellen, und die dunkelbraunen auf die dunkeln Sommerhaare. Dieß Winterkleid dauert bis im Junius, wo sich diese Thiere verfärben oder die Winterhaare ablegen.

Außerdem giebt es noch mancherley Farbenvarietäten, die nicht so selten sind, als beym Rothhirsch, da sich dieses Wildpret bey uns, blos naturalisirt, in einen zähmern Zustande befindet, als jener. Man sieht daher weiße und schwarze Damhirsche; eben so, wie wohl seltner, weiß und roth- und weiß- und schwarzgefleckte; auch gelbe, graue, braune und schwärzliche. Der Unterleib fällt allzeit ins weiße.

Merkwürdige Eigenschaften.

Der Damhirsch ist von Natur in der Wildniß flüchtig, munter, scheu und muthig, und streitet oft um einen Weideplatz oder eine Gattin viele Stunden lang. In der Gefangenschaft aber legt sich sein Feuer, und er wird sehr kirre und furchtsam.

In der Begattungszeit hört man ein Geschrey von ihm, wie vom Rothhirsch, nur weniger stark, und es lautet fast, als wenn ein Mensch vomirt.

Die Antipathie zwischen den Roth- und Damhirschen, da man sagt, die Rothhirsche wichen ihnen, zögen gar weg, oder nähmen, wenn sie mit ihnen in einen Garten eingesperrt wären, von Kräften ab, ist ganz ungegründet, und nur alsdann, wenn beyde Arten an einem gemeinschaftlichen Platze gefüttert werden, oder sich äsen, müssen die Damhirsche warten, bis die Rothhirsche gesättiget sind, und oft das genießen, was ihnen jene übrig lassen. Auch wollen die Rothhirsche nicht an den Plätzen sich äsen, wo die Damhirsche zuvor gewesen, und vorzüglich ihren Unrath oder Losung hinterlassen haben.

Ihr Alter erstreckt sich ohngefähr auf zwanzig Jahre.

Verbreitung und Aufenthalt.

Der Damhirsch, so häufig man ihn auch jetzt in den ebenen Wäldern Deutschlands antrifft, ist eigentlich kein ursprünglich deutsches Thier. Er ist wild in Litthauen, in der Moldau, Griechenland, Kleinasien und bis zum nördlichen China herab anzutreffen. Von hieraus ist er aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst in die wärmern Gegenden von Europa nach Italien, Spanien, und Frankreich, und dann auch nach England und Deutschland gekommen.

Es sind gesellige Thiere, die sich in starken Rudeln versammeln, und nicht leicht zu trennen pflegen. Auch die alten Damhirsche machen sich nach der Brunst in Rudel zusammen, und leiden eher als die Rothhirsche junge Damhirsche und Weibchen unter sich. Diese sondern sich aber mehrentheils von selbst wieder ab, und es hält sich sodann das Wild oder Thier mit den jungen oder schlechten Hirschen zusammen. Sie lieben ebenes, mit kleinen Hügeln besetztes Erdreich, und verändern ihren Stand nicht so leicht und weit, wie die Rothhirsche. Vom Monat März bis zu Ende des Augusts suchen sie die Dickige auf, um sich vor den empfindlichen Mückenstichen zu sichern.

Nahrung.

Im Winter gehen sie in den Haiden, wo es Haidekraut oder junge Gehäue und Schläge giebt; und im Sommer nach den Wiesen, und dahin wo sie junges Holz, und Laub haben. Wo die Felder nahe an die Gehölze stossen, ziehen sie sich auch nach der Saat, und in das Getraide: doch machen sie solche weite Wechsel nicht nach ihrem Geäse, wie die Rothhirsche. Wenn Eichelmast vorhanden ist, so ziehen sie dieser gerne nach. Das übrige ist wie beym Rothhirsche.

Fortpflanzung.

Ihre Brunftzeit fällt einen Monat später, als bey den Rothhirschen, nämlich in Oktober, und währet einen ganzen Monat. Der Hirsch jagt sich lange mit dem Thiere herum, und dieses ist 8 Monate trächtig, setzet

meist

meist im Junius 1, selten 2 Kälber, und säuget sie bis wieder zur Brunft. Bis ins sechzehnte Jahr dauert die Zeugungskraft. Das junge Thier (Wildkalb, Tannkützel) brunftet schon im zweyten Jahre, wenn es keine Noth gelitten hat, sonst aber meist im dritten. Nach dem ersten Jahre wird das Hirschkalb ein Spießer (Spießert) und setzt Spieße auf; nach dem andern Jahre Gabeln, auch wohl sechs bis acht Enden; nach dem dritten Jahre acht oder zehn Enden, da denn die Stangen oben breit zu werden anfangen, alsdann heißt er ein angehender Schaufler; nach dem vierten Jahre zehn, zwölf, auch wohl mehr Enden, zu welcher Zeit auch die Breite der Stangen oben merklicher wird; nach dem fünften Jahre setzt der Damhirsch schon ziemlich breite Schaufeln auf und wird nach den Jahren benannt; und wenn er erst Schaufeln aufgesetzt hat, und es befinden sich dreyßig Enden daran, so wird er doch nicht nach den Enden benannt (angesprochen), sondern heißt ein guter Schaufelhirsch; ganz vollkommen heißt er ein alter Capital-Schaufler, oder ein rechter guter Schaufelhirsch.

Krankheiten.

Wie beym Rothhirsche. Im Jahre 1765 fielen in einem gewissen Amte 300 Stück an einer Seuche. Man beschuldigte die Eckern dieser Verheerung. *)

*) v. Schrebers neue Kameralschriften. V. 467.

Feinde.

Von den Luchsen und Wölfen werden sie verfolgt und von einer braunen haarigen Laus (Pediculus cervi) und von den Engerlingen (Oestrus) geplagt.

Jagd.

Die Fährte (Taf. XXIV. Fig. 15 a) im Gang und Trabe, b) flüchtig,) hat ebenfalls wieder die größte Aehnlichkeit mit der Fährte des Rothhirsches, und ein Damhirsch macht seine Spur so stark und breit, als ein Rothhirsch von sechs Enden, oder ein altes Roththier, und das Damthier läßt sich, wie ein Rothwildkalb im Oktober, spüren. Doch muß man wohl merken, daß bey aller Aehnlichkeit doch die Fährten der Damhirsche kürzer gefaßt, die Wände der äußersten Seiten der Ballen flächer und eröffneter, fast wie bey den zahmen Ziegen sind.

Uebrigens gehört er zur hohen Jagd, und wird eben so, wie der Rothhirsch gejagt. Wenn er von den Hunden verfolgt wird, so flieht er nicht so weit, als ein anderer Hirsch, weichet allen Wegen aus, suchet bald seinen Stand wieder, und stürzt sich gern ins Wasser um der Gefahr zu entgehen; wird aber alsdann meist gefangen.

Nutzen.

1) Das Wildpret der Damhirsche, ist zärter, feister, als das des gemeinen Hirsches, und besson-

sonders werden die noch an der Mutter säugenden Kälber allem andern Wildprete vorgezogen.

2) Die Häute sind fast noch besser als vom Rothhirsch, und geben feinere Beinkleider und Handschuhe. ꝛc.

3) Das Unschlitt ist auch besser, und hat, so wie das Haar, Geweih und die Klauen eben den Gebrauch, wie beym Rothhirsch.

Schaden.

Der Damhirsch schadet, wie man aus seiner Nahrung sieht, auf eben die Art, wie der gemeine Hirsch. Er schält im Winter gern die jungen Bäume ab.

Irrthümer.

1) Der Ostindische Schlangenstein (Pedra copra de Capello) soll aus den zerstückten und calcinirten Geweih gemacht werden. Es wird Betrug damit getrieben.

2) Die Medicin, welche die Alten von vielen Theilen dieses Thieres machten, konnte nur durch den Glauben wirken.

** Mit runden Geweihen.

(6) 10. Der Rothhirsch oder gemeine Hirsch.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Dieß ist das Thier, das wegen seines schlanken Wuchses, seines großen, leicht beweglichen Körpers,

seiner festen, biegsamen Schenkel und wegen seines ansehnlichen Kopfputzes die meisten wilden Thiere an Schönheit übertrifft; und das auch deswegen, und weil es der vorzüglichste Gegenstand der Jagdlustbarkeiten großer Herren ist, in der Jägersprache den Beynamen edel bekommen hat. Das Männchen heißt Hirsch, edler Hirsch, Hirschbock, Hirschboll, und das Weibchen Hirschkuh, Wild, Stückwild, Thier, und Hindin.

Cervus Elaphus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 176. n. 3.

Cerf, Biche et Faon de Cerf. *Buffon* hist. nat. VI. 63. t. 9. 10. 12. Ed. de Deuxp. II. T. 1. f. 1. 2. III. 3.

Stag. *Pennant* hist. of Quadr. I. 114. Meine Uebers. I. 108.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 220.

v. Wildungens Neujahrsgeschenk. 1794. 1. Taf. 1. 2. 3.

Goeze's Fauna. III. 2.

Donndorfs zool. Beytr. I. 591. n. 3.

Ridingers jagdbare Thiere Taf. 4. 5. Dess. rare u. monströse Hirsche und andere Thiere 101 Blätter.

v. Schre-

v. Schrebers Säugethiere V. Taf. 247. A—E.

Kennzeichen der Art.

Mit langen, runden, vielästigen, an den Zacken zurückgekrümmten Geweihen, im Sommer röthlichbrauner und im Winter röthlichgrauer Farbe.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Wuchs des Hirsches ist lang gestreckt und hoch. Er wird oft sieben Fuß lang, vier Fuß hoch, und der kurze Schwanz (Blume, Bürzel) hält eilf Zoll *). Der Kopf ist im Verhältniß gegen den übrigen Körper klein, länglich; das Stirnblatt lang und dick. Die Ohren (das Gehör), die beym geringsten Geräusch aufrecht stehen, und die Augen, welche gelb sind und im Affekte blitzen, sind groß und stehen weit aus einander. Unter dem Vorderwinkel der Augen befindet sich eine mehr als einen Zoll tiefe längliche Höhle, in welcher sich eine Materie, fast wie Ohrenschmalz gestaltet, aus Schweiß und andern ausschwitzenden Feuchtigkeiten sammelt, mit Haaren vermengt, anfangs weich wie Wachs ist, nach und nach aber, wie Horn und Stein, besonders an der Luft hart wird, und den bekannten Hirschbezoar, die Hirschthräne, giebt. Diese Masse wird, ob sie gleich anfangs widrig riecht, nach und nach sehr wohlriechend,

*) Par. Ms.: Länge 6 1/2 Fuß; Höhe 3 1/2 Fuß.

und die Jäger, welche sie zuweilen finden, wenn sie der Hirsch, den sie oft zur Last wird, an Bäumen und Sträuchern ausreibt, halten sie als eine, allen giftigen Seuchen widerstehende, Arzeney sehr hoch. Sie ist, wo sie aus den Augenwinkeln hervorkömmt, rund, glatt, glänzend, gelbbraun, und mit schwarzen Aederchen durchzogen. Die Nasenlöcher sind weit, rund und nach der Seite schief aufgeschlitzt. In der untern Kinnlade stehen acht breite Schneidezähne, wovon sich drey nach der rechten und drey nach der linken Seite etwas kehren. Sie fallen bis ins vierte Jahr einzeln aus und es schieben sich statt derselben neue, breitere, festere, und bräunere ein. In der obern Kinnlade stehen zwey krumme stumpfe Eckzähne, und auf jeder Seite der beyden Kinnladen sechs scharfe zackige Backenzähne: zusammen 34 Zähne. Die Hörner (Geweihe, Gehörn, Gestänge, Gewicht) sind rund, dicht, ästig, mit zurückgebogenen Spitzen (Enden), haben Augenzinken, stehen etwas seitwärts, und liegen im Laufe wasserrecht über dem Rücken. Hals und Rücken sind lang, ersterer erhaben, über sich hingewandt, und giebt dem Hirsch ein trotziges Ansehen, letzterer an den Lenden etwas eingebogen, an den Keulen und besonders am Hintertheil (Scheibe, Schirm, Schurz) dick und abgerundet. Die Schenkel sind hoch, wohlproportionirt, oben stark, und unten dünn; die Füße (Läufte) sind schwarzschalig, glänzend und mit zwey gleichfarbigen Afterklauen (Oberrücken, Geäfter), die ihnen besonders in der Flucht bergab, durch das Einsetzen, gute Dienste thun, versehen.

Gewöhn-

Gewöhnlich wiegt ein Hirsch drey bis vier Centner, aber nicht selten hat man ihn auch in unserm Thüringerwalde von einer Schwere von fünf Centnern und drüber gefunden; doch ist seine Größe und Schwere nach dem guten Futter, das er genießt, verschieden *).

Seine gewöhnliche Farbe ist vom Maul (Geäse) bis zum Bürzel fahlroth (daher der Name Rothwildpret) oder kastanienbraun, und am Bauche weißlich; doch verändert (verfärbt) er dieselbe zweymal des Jahrs, im Frühling und Herbst. Im April nämlich verliehrt er seine alten Haare, bekömmt neue, die entweder gemein roth, oder braunroth, oder gelbroth sind, und sich im November mit neuen verdichten, deren Spitzen ins weiße oder gelbweiße fallen, und der Haut ein graues Ansehn geben.

Doch findet man auch unter seinem Geschlechte, und zwar mehr als bey andern wilden Thieren Abänderungen in der Farbe; denn es giebt 1) ganz weiße **); 2) an Füßen und Kopf weiß gezeichnete

*) So erlegte z. B. der Herzog von Weisenfels 1726 einen, der acht Centner und zehn Pfund wog.

**) Bemerkenswerth ist, daß wenn sich männliche und weibliche Hirsche zusammen fortpflanzen, mehr rothe Junge ausfallen, als wenn man verstattet, daß ein weißer Hirsch mit einer rothen Hirschkuh brunftet. Da weiße Thiere immer schwächlicher Natur sind, so sind es auch die weißen Hirsche, werden weit zahmer, und haben auch ein feineres Wildpret.

nete *), 3) roth und weiß geschäckte, und endlich 4) auch, wiewohl selten, silberfarbene Hirsche **). Die Alten aber sind stets mehr grau, als roth gefärbt. Weiter werden als Varietäten aufgeführt

5) Die Berghirsche, welche die tiefen Gebirge bewohnen, gemeiniglich kürzer, stärker, schwerer und schwärzlicher, oder dunkelbrauner sind, als 6) diejenigen, welche sich in den Hölzern, die im platten, sandigen Lande liegen, aufhalten, Landhirsche heißen, langgestreckter, leichter und rothbrauner sind, und ein größeres und schöneres Geweih bekommen. 7) Die Brandhirsche haben lange schwarze zottige Haare am Halse, und halten sich gern auf Kohlstätten auf. Man sieht sie vorzüglich in den Böhmischen Wäldern.

Die Hirschkuh (Wild) unterscheidet sich merklich vom Hirsch. Es fehlt ihr nämlich ganz das majestätische Ansehen, da ihr die Natur nicht nur fast immer die Hauptzierde desselben, sein Geweihe, sondern auch seinen gut proportionirten Körperbau versagt hat. Sie hat nicht den schön gewölbten Rücken, nicht die dicken, runden Keulen, nicht den starken langbehaarten Hals, trägt nicht

den

*) Das Bläßwildpret hat von der Stirn bis zur Nase eine Bläße, mit weißen Streifen vorn herab an den Füßen. Das Bläßwildpret verfärbt sich oft im Alter ins ganz silberfarbene.

**) Die silberfarbenen oder aschgrauen Hirsche mit einem schwarzen oder dunkelbraunen Rückenstreif sind sehr schön, aber auch selten.

den Kopf so erhaben, sondern ist kleiner und dünner gebaut, und gebeugter als er.

Der Hirsch wechselt alle Jahre sein Gehörn. Der alte (gute) pflegt sich in den letzten Tagen des Hornungs (welcher Monat, wie manche Jäger glauben, davon den Namen haben soll) dasselbe abzuschlagen, oder es von selbst zu verliehren; die jüngern (schlechten) aber erst im März, April und May. Einige Jäger glauben fälschlich, daß die Engerlinge sich aus der ganzen Haut bis unter das Gehirn fräßen, und daß durch das Jücken, das daselst entstünde, diese Thiere gereizt würden, sich an den Bäumen zu reiben und zu stoßen, und dadurch das Geweihe abwürfen. Es löst sich aber vielmehr von selbst, indem an dem Orte, wo es angewachsen ist, ein Streifen oder Wulst rothes Fleisch in die Höhe quillt, und die Trennung entweder von selbst, oder durch eine geringe äußere Gewalt verursacht.

Schon nach den ersten fünf Tagen zeigt sich wiederum auf dem sogenannten Rosenstocke, der aus der Hirnschale kurz hervorstehenden, gefranzten, flachen Erhöhung, ein weicher mit einer rauhen Haut (Bast) umgebener Knorpel, der in vierzehn Tagen schon eine Stange von 1/2 Fuß mit den ersten Zacken (Augensprossen) bildet, nach den folgenden vierzehn Tagen noch einmal so groß ist, und den zweyten Schuß von Enden zeigt, und dann so fortwächst, bis das ganze Geweihe nach zehn bis vierzehn Wochen, mit diesem Baste eingefaßt, seine bestimmte Größe erhalten

hat

hat *). Unterdessen läuft er beständig mit niedergebogenem Kopfe herum, um das hervorsprossende Gehörn nicht zu beschädigen, und heißt ein Kolbenhirsch. Wenn das Geweihe seine vollkommen harte Spitzen hat (vereckt ist), welches bey alten Hirschen im Julius und bey den jüngern im August statt hat; so fängt der häutige Ueberzug an sich abzulösen, der Hirsch fühlt ein Jücken, und wird dadurch genöthigt, sich erstlich an weichen, schwachen, und dann an stärkern, härtern Holz, als an jungen Kiefern, Fichten und Tannen, Sahlweiden, Eichen, Birken und Aespen zu reiben, und dadurch diesen Bast gänzlich abzuschlagen. Man nennt dieß das Schlagen, Fegen und die Himmelsspur, weil nämlich der Jäger an der Höhe der Stelle, wo er sich gerieben hat, seine Höhe, und dadurch seine Größe und Alter erkennen (ansprechen) kann. Er reinigt es auch zuweilen in einem Tage, und genießt den Abgang, wenn er nicht gestöhrt wird, selbst, der sonst eine köstliche Speise für die Ameisen ist; auch von den Waldleuten sorgfältig aufgesucht, getrocknet, und zu allerhand Wunderkuren gebraucht wird. Anfangs sieht das gereinigte Gehörn weiß aus, nach etlichen Tagen wird es gelb, und in vierzehn Tagen hat es seine bestimmte schwarzbraune, oder dunkelgelbe Farbe; und die Spitzen desselben macht

er

*) In der Jägersprache heißt der unterste Theil an jeder Stange noch: die Rose; die krausen Knöpfchen an der Rose und den Stangen, die Perlen; die nächsten Enden an den Augensprossen, die Eissprüßel, und die obersten Enden, die Krone.

er durch öfteres Stoßen in die Erde, den Sand und Kies wieder weiß. Es entsteht, wie man aus wahrscheinlichen Gründen vermuthen kann, aus den Hauptbestandtheilen des männlichen Saamens, die, da sie an andern Orten jetzt entbehrlich sind, durch die feinsten Kanäle hierher geleitet werden, das alte abtreiben, und in einem neuen erhärten. Bey der Castration bleibt nämlich das Geweihe, wenn es da ist, stehen, und wenn es nicht da ist, wächst es auch nicht vollkommen wieder, sondern treibt nur, wenn die Zeit seines Wachsthums herbey kömmt, einen kleinen monströsen Knorpel. Eben dieß geschieht bey einer bloß starken Verletzung des Geschlechtsgliedes (Kurzwildprets, Geschröts; der Ruthe, des Ziemen, Zimmels). Auch der junge Hirsch erhält erst, wenn er anfängt mannbar zu werden, sein erstes Gehörn, und der Alte eilt erst dann zur Begattung, wenn dasselbe völlig erwachsen ist, und also dieser Saft an einem andern Orte zu einem edlern Zwecke entwickelt und verbraucht werden kann. Die Anzahl und Gestalt der Enden an einem Geweihe ist nach dem Alter, der Nahrung und andern zufälligen Ursachen verschieden. Der junge Hirsch setzt nach dem ersten Jahre bloß zwey Spiese ohne Enden auf, nach dem zweyten eben so viele oder gewöhnlicher zwey Gabeln, d. h. zwey Spiese mit einem Ende an jedem; nach dem dritten bekömmt er sechs oder acht Enden, nach dem vierten eben so viel, nach dem fünften zehn, auch wohl mehr oder weniger Enden *), und

*) Die Anzahl der Enden wird dadurch bestimmt, daß man die Enden an derjenigen Stange, wo die mehrsten sind, zählt und verdoppelt.

und dieß geht in diesem Verhältniß bis zum achten Jahre fort, nach welcher Zeit die Anzahl der Enden gänzlich unbestimmt ist; doch kennt der Jäger das Alter des Hirsches an der Dicke der Stangen, an der Rose, die jetzt dicht am Kopfe sitzt, an den Perlen, die stärker und durchsichtiger werden, an den breitern und tiefern Rinnen, und an der breitern und ausgehöhltern Krone. Man hat Hirsche gejagt, deren Geweihe 66 Zacken *), 3 Fuß Höhe und 28 bis 30 Pfund Schwere hatten. Selten weicht die Stellung und Biegung der Enden in der Folge von der Form ab, die sie im dritten und vierten Aufsatz hatten. Nur Verletzung, während der weichen Hervorsprossung, können ihnen eine andere Richtung geben und Mißgewächse verursachen. Ein Gehörn, das drey, vier und mehrere Spitzen am Gipfel der Stangen zeigt, heißt ein Kronengehörn; ist es daselbst breit mit mehrern Zacken an den Seiten, ein Handgehörn, und haben die Enden verschiedene Krümmungen, ein widersinniges Gehörn.

Zerglie-

*) Friedrich der Erste, König von Preußen, schoß 1696 in dem sogenannten Cartheuser- oder Jacobsdorfischen zum Amte Fürstenwalde gehörigen Forste einen Hirsch von 66 Enden, und machte mit dem Geweihe Friedrich August, Könige von Pohlen und Churfürst von Sachsen ein Geschenk. Es wird als eine Seltenheit in der Moritzburg aufbewahrt. Oben in der Krone ist eine Art von Becher, aus welchem fremde fürstliche Personen trinken.

Zergliederung.

1) Die Eingeweide kommen mit denen der Kühe völlig überein; auch die Knochen, nur daß sie nicht so stark sind.

2) In der Leber ist keine Spur von einer Gallenblase zu entdecken; doch müssen feine Gallengänge da seyn, da sie bitter schmeckt. Und wäre der Sitz der Galle im Schwanz, wie man aus der Beobachtung und Erfahrung schließt, daß er ganz gelbgrün aussieht und vor Bitterkeit von den Hunden nicht einmal gefressen wird, so müßte die Leber doch feine Kanäle haben, die vom Schwanz bis zu ihr giengen.

3) Im Magen findet man zuweilen den Hirschbezoar und in den Eingeweiden, wiewohl selten, Würmer. s. unten.

Merkwürdige Eigenschaften.

Das Geschrey des Hirsches ist dem Geschrey der Kühe ähnlich, nur anhaltender und heller, sonst läßt er, und die alte Hindin auch einen kleffenden abgebrochenen Laut (ein Schmälen, Melden) von sich hören, wenn sie einen Menschen, oder sonst etwas auffallendes bemerken.

Das höchste Alter des Männchens erstreckt sich bis ins dreyßigste Jahr, das Weibchen aber kann ein höheres Alter erreichen, da es nicht den heftigen zerrüttenden Affekten unterworfen ist.

Der

Der Hirsch ist von Natur sanftmüthig und gesellig, zeigt in seinem Betragen Großmuth und Adel. Er ist mit einem scharfen Gesicht, leichten Gehör, und überaus feinem Geruch begabt. Seinen Feinden sucht er anfangs durch die Behendigkeit seiner Füße, und versagen ihm diese den Dienst, durch allerhand listige Schwenkungen zu entgehen; befreyen ihn auch diese nicht, so bemüht er sich, sie durch seine Stärke und durch die Kraft seiner bewaffneten Stirn zu überwältigen. Er ist auch neugierig und listig; wenn man ihm pfeift oder anruft, so bleibt er stehen, besieht Vieh und Wagen, die ihm begegnen, scheut auch die Menschen nicht, wenn sie keine Hunde und Flinte bey sich haben, und geht gelassen und stolz vor ihnen vorbey. Er liebt die Musik so sehr, daß er in der Jagd auf den Klang des Waldhorns, der Schallmey und Flöte herbey kommt, und dadurch auch zum Stillstehen gebracht werden kann. Daher haben auch vielleicht die Hüfthörner ihren Ursprung.

Zur Beförderung seiner Reinlichkeit putzt er sich nicht nur immer seine Nasenlöcher, wie das Rindvieh, mit der Zunge, sondern braucht auch diesen schlüpfrigen Schleim zur Bestreichung und Abglättung seiner Haare.

Verbreitung und Aufenthalt.

Der Rothhirsch ist nicht bloß in Deutschland zu Hause, sondern in mehrern Ländern der alten und neuen Welt. In Europa geht er von 64 Grad der Breite an bis herunter nach Griechenland. In Asien geht er von der Mongoley an bis nach Ceylon herab. In

Afrika

Afrika, wo er etwas kleiner ist, findet man ihn in der Barbarey, auf Guinea, in Abyssinien u. s. w. In Amerika trifft man ihn von der Hudsonsbey bis nach Brasilien herab an. Im Thüringerwalde ist er gemein und von ungemein schönem Wuchs und Gehörn.

Ihren Aufenthalt oder Stand ändern die Hirsche, theils wegen ihrer Nahrung, theils wegen Aufsetzung ihres neuen Gehörns, theils wegen der Brunft. Im Winter, wenn in hohen Gebirgen der Schnee sehr tief liegt, ziehen sie sich in die Vordergebirge, beym Anfang des Frühlings aber, wenn sie den jungen Saamen genossen haben, wieder zurück. Sie haben überhaupt ihren bestimmten Bezirk, den sie bewohnen, und den sie sich in einer einsamen Gegend wählen. Aus demselben kann sie nur das Wachsthum ihres Geweihes, die Brunft, der große Hunger, das Holzfällen, und harte Verfolgung verdrängen. Im Winter suchen sie in großen Dickigen den trockenen Abhang eines Hügels auf, wo sie vor kalten Winden und häufigem Schnee sicher sind, und scharren sich Laub und Moos in ihr Lager. Im Frühjahr, wenn ihr Gehörn weich ist und wächst, suchen sie niedriges schwaches Gebüsch auf, durch welches sie ohne Anstoß laufen können. Sie leben außer der Brunftzeit in großen Gesellschaften (Truppen, Rudeln) beysammen. Die alten Hirsche, welche wenigstens fünf Jahr alt seyn müssen, machen nämlich die eine Gesellschaft aus, das Wild mit den Jungen bis ins dritte Jahr, männlichen und weiblichen Geschlechts, die andere, und die Hirsche von drey und vier Jahren die dritte.

In ihrem Ruhelager (Bette) deckt bey kalter Witterung ein Hirsch den andern, um sich zu erwärmen.

Nahrung.

Die ordentliche Zeit ihrer Nahrung (Geäse) von ihrem Standorte aus nach zu gehen (den Wechsel zu halten), ist des Abends beym Untergang der Sonne, und zwar geschieht dieß im Trabe (Trollen). Sie bleiben die ganze Nacht und ziehen in der Morgendämmerung wieder zu Holze, halten sich aber, wenn es ungestöhrt geschehen kann, so lange in den Vorhölzern auf, bis die Sonne den Morgenthau von ihnen und den Gebüschen getrocknet hat. Dieser Rückzug geschieht langsam und heißt der Kirchgang. Im Frühjahr suchen sie, sobald der Schnee die Erde entblößt, die junge Saat und die Brunnenkresse dem Wind entgegen, oft eine Meile weit, auf, und verschaffen sich dadurch ihre verlohrnen Kräfte in kurzer Zeit wieder.

Nach dem Verluste ihrer Kopfzierde halten sie sich gleichsam aus Schaam einige Tage im Holze verborgen, und genießen bloß die ihnen nahen Frühlingskräuter und Knospen. Sie pflegen sich überhaupt alsdann, so lange ihr Gehörn noch weich und zart ist, aus Furcht der schmerzlichen Verletzung, entweder in hohen einzeln Stangenhölzern, oder lieber in niedrigen Buschhölzern bis zum May aufzuhalten, und von da aus die Wiesen und Felder, die jungen Gehäue und Schläge zu besuchen, und sich an dem jungen Sommerwuchse, an den männlichen Blüten (Kätzchen) der Haseln, Zitterpappeln und Weiden zu erquicken. Diejenigen, die nicht ruhig in

den

den Vorhölzern leben können, ziehen sich nun in den Hochwald zurück, wo sie alsdann Gras, Laub und Kräuter genug haben, um sich zu äsen. Wenn aber denjenigen, die gehegt werden, die Wintersaat zu zähe wird, so suchen sie die Sommersaat so lange auf, bis jene reife Körner erhält, wo sie sich dann bey solcher Nahrung so wohl befinden, daß sie ganze Tage in den hohen Korn- und Waizenfeldern liegen bleiben, und dem Landmann keinen geringen Schaden zufügen. Sie verlassen diese Nahrung wieder, sobald der Hafer, ihre angenehmste Speise, und die Flachsknoten reifen, und raubt ihnen dieses der erndtende Landmann, so machen sie sich seine Grummetwiesen, seine Kraut- und Rübenfelder zu Nutze, in welchen sie endlich ihre größte Feistigkeit und diejenige Stärke erlangen, die ihnen bey ihrer jetzt eintretenden Begattungszeit so nöthig ist.

Bey ihren Räubereyen auf Aeckern und Wiesen sollen sie Schildwachen ausstellen, die ihnen durch ein weittönendes Auftreten mit den Vorderfüßen die drohende Gefahr zu erkennen geben; alsdann jagen die ältern Hirsche die jüngern allemal vor sich hin.

Wenn sie jenseits eines Strohms gute Nahrung sehen, oder wittern, so schwimmen sie alle Nacht über.

Während der Begattungzeit nehmen sie sehr wenig Speise zu sich, und suchen nur für den höchsten Hunger die nahen Kraut- Rüben- und Erbsenäcker auf, und genießen alsdann auch Eyerschwämme (Dotterschwämme, Pfifferlinge, Riechböcke, Agaricus Cantharellus), Fliegenschwämme (Todenköpfe, Agaricus muscarius) und Kuhpilze (Boletus bovinus). Bis zum harten Winter

bedienen sie sich der Eicheln, des wilden Obstes, des absterbenden Grases, mancherley Beeren, vorzüglich der Ebereschen, die sie in der Schneuß, wenn sie in dieselbe kommen und nicht gehindert werden, alle Tage ausfressen und der jungen Sprößlinge der Bäume und Sträucher, alsdann aber müssen sie mit Baummoos, besonders von den Birken, mit den Spitzen des Haidekrauts, und altem welken, unter dem Schnee mit ihren scharfen Klauen hervorgescharrten, Gras, mit junger Aespen- Weiden- Pappel- und Fichtenrinde, mit Buchen- und Birkenknospen, und den jungen Loden von diesen Bäumen, mit Mistel, den sie an Windbrüchen finden, mit Ginster, Brombeerblättern, Epheu, Kresse und andern Wasserpflanzen, wenn sie nicht von Jägern auf sogenannten Wildraufen mit Heu und Stroh gefüttert werden, vorlieb nehmen. Zu dieser Jahrszeit wagen sie sich in den Walddörfern auch in die Gärten, schälen die jungen Obstbäume, und lesen wohl gar vor den Scheunen und Ställen das verstreute Stroh und Heu auf.

Sie äsen langsam, und wo möglich mit Wahl, und suchen nach der Sättigung allezeit einen Ruheplatz zum Wiederkäuen. Dieß geschieht wegen des langen Halses nicht mit der Leichtigkeit, wie beym kurzhälsigen Rindvieh, sondern durch ein heftiges Aufstoßen, das man von weitem sehr deutlich wahrnehmen kann.

Nicht nur in Thiergärten, sondern auch in Wildnissen bereitet man ihnen im Frühjahr und Sommer Salzlecken, indem man in ein Behältniß aus zusam-

sammengefügten Säulen (einen Schrank), ohngefähr drey Fuß im Quadrat, einige Karren Leimen führt, unter denselben schichtweiße ein halb Viertel Salz streuet und einen stumpfen Kegel aus dieser gemengten Masse bildet. Man umzäumt zuweilen einen solchen Platz mit Pfählen und Latten so hoch, daß die andern Thiere nicht herbey kommen, die Hirsche aber diesen Zaun leicht überspringen können, und sie finden sich des Abends und Morgens sehr gern dabey ein.

Im Frühjahr, Herbst und Winter trinken sie wegen ihrer saftigen und feuchten Nahrung sehr wenig, allein in der hitzigen Brunftzeit und im heißen Sommer suchen sie die hellen Bäche oft auf. Sie kühlen sich auch zu der Zeit in denselben, und in flachen Teichen (kühlen sich), baden sich zuweilen und lieben überhaupt in schwülen Tagen die kühlen Oerter sehr. — Der balsamische Duft der Ameisen muß ihnen ein angenehmer und stärkender Geruch seyn, denn so oft sie einen Haufen antreffen, zerscharren sie ihn, stehen stundenlang dabey, und ziehen diesen Balsam mit wollüstigen Mienen in sich.

Fortpflanzung.

In Gegenden, wo diese Thiere geheget werden, also häufig sind, und wo sie gute Fütterung haben, trennen sich die alten Männchen schon zu Ende des Augusts (um Bartholomäi) und suchen ihre Weibchen in den Wäldern von der Zeit der Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung mit gänzlichen Verlust ihrer angebohrner Schüchternheit auf. Sie thun dieses mit ei-

nem melancholischen Ansehen und mit niederhängendem Kopfe, indem sie wie die Spürhunde mit der Nase auf dem Erdboden immer dem Winde entgegen ziehen, und so sicher ihre Geliebte auffinden. Ihre Brunftzeit tritt also zu Ende des Augusts oder zu Anfang des Septembers (Egidii) ein. Bey den jüngern Hirschen aber zeigt sich der Begattungstrieb immer einen halben oder ganzen Monat später. Diese Zeit der Begattung überhaupt dauert fünf bis sechs Wochen. Die Oerter, wo sie im vorigen Jahre die Freuden der Liebe genossen haben, wissen sie genau wieder zu finden. Das Weibchen läßt den Hirsch vorzüglich des Morgens zu (beschlagen), und er bleibt demjenigen, welches er zuerst antrifft, die ganze Brunftzeit über vorzüglich gewogen; doch üben beyde Gatten nicht die gehörige eheliche Pflicht der Treue gegen einander aus, sondern vermischen sich wechselweise auch mit andern, und er besonders fühlt sich oft stark genug mit 20 Weibchen der Liebe zu pflegen. Jetzt ist es auch, wo das sonst so sanftmüthige Thier den Affekt des Zorns zeigt, der oft in Wuth ausartet. Sobald der Hirsch nämlich in seiner heftigen Brunft auf ein Trupp Thiere stößt, so ist sein erstes Geschäffte, alle die jungen Männchen, die sich bisher in dieser Gesellschafft befanden, zu verscheuchen, welche dann verstohlnerweise, oder wenn der alte furchtbare Nebenbuhler weggeschossen worden ist, mit einem einsamen Thier ihren Geschlechtstrieb befriedigen können. Treffen aber bey dieser Gesellschaft zwey erwachsene Hirsche zusammen, so sehen sie erst einander grimmig an, scharren die Erde auf, erheben ein entsetzliches Geschrey und beginnen dann mit ihrem

Be-

Gehörn unter dem Schall, als wenn starke Stangen zerbrochen würden, die blutigsten Gefechte, wobey sie sich zuweilen mit den scharfen Enden todspießen, oder so in einander verwickeln, daß sie nicht wieder aus einander können, und jämmerlich auf dem Wahlplatz für Hunger sterben (enden) müssen. In diesem Kampf empfängt auch mancher eine Wunde, die ihm zeitlebens zu einem elenden Thiere (Kümmerer) macht. Kurz vor der Brunftzeit und während derselben scheinen sie auch wirklich zu diesem Kriege die Spitzen ihre Waffen durch Reiben an den Bäumen zu schärfen, wodurch sie den Glanz und die Glätte einer Politur erhalten. Das Weibchen sieht allzeit diesen Kämpfen gelassen zu, und überläßt sich nach denselben dem Sieger sogleich. Den heftigen Drang ihres Zeugungstriebes kündigen die Hirsche durch Aufscharrung des Bodens mit den Vorderläufen und Augensprossen, welches man den Brunftplan machen heißt, an, vorzüglich aber durch ein fürchterliches Geschrey, das sie besonders in der Abend- und Morgendämmerung von sich hören lassen, und das, je brünftiger sie werden, an Heftigkeit und Stärke zunimmt, so, daß man es eine Stunde weit hören kann. Sie ziehen sich dadurch dicke Hälse, ja zuweilen Kröpfe zu. Dieß thun aber nur die Alten; denn diejenigen, welche noch nicht ihr viertes Jahr erreicht haben, schreien gar nicht, und die es erreicht haben geben, wie wohl selten, einen hohlen gebrochnen Laut von sich. Nur selten lassen die Hirsche im Jänner und Hornung diese grausenerweckende Töne hören, und es wird, wenn es geschieht, für eine Vorhersagung noch bevorstehender großen Kälte ange-

angesehen. Zur Brunfzeit bekömmt auch ihr Unterleib durch die Schärfe des Saamens eine schwarze Farbe (den Brand), die sich mit der neuen Verfärbung im Herbste wiederum verliert.

Nach der Begattung sucht jedes dieser Thiere seine verlassene Gesellschaft wieder auf.

Man legt auch an bequemen Orten auf Grummtwiesen oder auf Haiden, welche mit Hafer und Rüben bepflanzt sind, Brunftplätze (Blome) an, die mit einem sehr tiefen Graben, der nach innen zu aufgeworfen ist, und Zwischengänge (Wechsel) hat, oder mit einer dichten Hecke mit Oeffnungen umgeben werden. Hier kann der Liebhaber der Jagd hinter der Hecke, im Graben, oder in einem erhabenen Schirm die Hirsche der Liebe pflegen sehen, und nach Gefallen die besten auslesen und schießen. Man macht ihnen auch an solchen Orten mit Waldhörnern Musik, und bemerkt, wie sie aufmerksam zuhören und sich darüber freuen.

Die Mutter trägt (ist schwer, geht hochbeschlagen) 8 1/2 Monat oder 40 Wochen, schleicht sich bey bemerkter Endigung ihrer Schwangerschaft von der Gesellschafft weg, und gebiert (setzt) gemeiniglich im Monat May in jungen Schlägen oder dicken finstern Gehölze auf einem Lager (Bette) von Moos ein und nur sehr selten zwey Kälber *). Vier Tage bleibt das Junge hier

*) Doch giebt es auch in Thüringen Exempel von Müttern, die drey Kälber brachten, und zwar etliche Jahre hinter einander.

hier liegen, und man kann es betasten, dann läuft es aber mit seiner Mutter davon. Anfangs geht es ihr nach, wenn es aber stärker geworden ist, geht es vor ihr her. Die Mutter hegt die zärtlichste Liebe gegen dasselbe, eilt beym geringsten Geräusch zu seiner Hülfe herbey, drückt es, wenn die Gefahr zu nahe ist, ins hohe Gras und Gebüsch nieder, sucht alsdann den Feind auf Abwege zu bringen, und säugt es so lange, bis sie sich wieder trächtig fühlt, da es sich alsdann schon selbst ohne Milch ernähren kann. Bis zum dritten Monat ist seine Farbe weißgelb und braun gefleckt. An einigen Orten heißt es bis zu Michaelis, an andern bis zum folgenden März ein Kalb; ist es männlich, ein Hirschkalb, ist es weiblich, ein Wildkalb. Das Wildkalb bekommt von da an bis zu seiner Begattung im zweyten oder dritten Jahre, den Namen eines Schmalthiers, Althiers, einer Hindin (Hündin,) das Hirschkalb aber nach dem ersten Jahre, wenn es nur einzelne Spieße aufgesetzt hat, welche nach dem sechsten Monate hervor zu keimen anfangen, den Namen eines Spießers, Spießhirsches, und im zweyten Jahre, wenn es an den Spießen die Augensprossen bekommt, eines Gabelhirsches. Wenn der Hirsch dreyjährig ist, so heißt er ein Hirsch vom zweyten Kopf, im vierten Jahre, nennt man ihn einen Hirsch vom dritten Kopf, und im fünften vom vierten Kopf, im sechsten Jahr ist er ein schlechtjagdbarer Hirsch, und im siebenten ein jagdbarer. Er wächst bis ins achte Jahr, und wird von der Zeit an ein Kapitalhirsch genannt.

Die

Die Jungen lassen sich zähmen, lernen ihren Futterer bald kennen, und kommen bey seinem Ruf, oder bey dem Ton eines Instrumentes herbey. Man nimmt sie sehr jung weg, läßt sie an einer Kuh saugen oder gießt ihnen die Kuhmilch ein. Man zieht sich manchmal Hirschkühe zu diesem Zwecke auf, daß man die wilden Hirsche durch sie zur Brunftzeit auf bestimmte Plätze lockt. Sonst bedienten sich die spätern römischen Kaiser *), und die alten Deutschen ihrer zum Zug; zum Reiten aber haben sie niemals gebraucht werden können, außer daß man ehedem die Grausamkeit begieng, die Wilddiebe auf Hirsche zu schmieden, um sie dadurch allmählig im Gehölze in Stücken reißen zu lassen.

Krankheiten.

1) Die sogenannte Knotenkrankheit ruinirt oft, wie die Pest, die ganze Wildbahn eines Forstes **). Wenn der Jäger diese Krankheit an dem Rothwild bemerkt, so kann er weiter nichts thun, als er pürschet das gesunde weg, oder jagt es in andere Forste, und läßt das hinkende

*) August II. König von Pohlen fuhr mit einem Zuge von acht Hirschen. Auch der verstorbene Herzog von Zweybrücken und der Herzog von Meiningen hatten sonst weiße zu eben diesem Gebrauch.

**) Beschreibung dieser Krankheit s. Ochse. S. 336. In den Jahren 1748 und 1778 fielen viele hundert Stück Rothwildpret an dieser Krankheit im Herzogthum Gotha.

hinkende, da diese Krankheit mehrentheils mit Hinken, welches die Knoten verursachen, verbunden ist, durch Hunde fangen, schneidet ihnen die Knoten aus, und reiniget die Wunden mit Eßig und Salz, welches Verfahren die Genesung bewirket.

2) Giftige Thaue machen auch oft große Niederlagen unter diesem Wild, indem sie die Auszehrung besonders die Leberfäule verursachen.

3) Die Ruhr erfolgt zuweilen, wenn nach einem harten und langanhaltenden Winter die hungrigen Hirsche bey plötzlich eintretender warmen Frühlingswitterung zu viel junge Knospen von Kräutern und Bäumen fressen. Man muß daher die Hirsche im Winter immer mit Heu füttern.

4) Eine zu große Menge Engerlinge über der Gurgel, verursacht ihnen auch oft den Tod.

5) Das Verhalten des Urins macht den männlichen Hirschen oft große Schmerzen, besonders in der Brunftzeit.

6) Die Hirsche leiden auch zuweilen am Zahnweh, indem ihnen die Eck- und Backenzähne faul werden *).

In

*) Wenn sich die Jäger zuweilen wunderten, warum die Hirsche bey der besten Aesung mager oder gar Kümmerer waren, so habe ich diese Krankheit oft als die Ursache gefunden.

7) In ihren Magen findet man auch zuweilen weißgelbe, schalige Steine, welche den Bezoarsteinen gleichen, in Gestalt einer Kugel, welche Hirschbezoar, Hirschballen, Hirschkugeln, Hirschsteine heißen, und woran sie oft viel leiden.

Feinde.

1) Die Luchse und Wölfe tödten die Hirsche.

2) Die Nasenbremse (Oestrus nasalis L.) legt die Eyer in die Nase derselben, wodurch die Engerlinge (Enderlinge, von welchen die Jäger fälschlich glauben, daß sie sie mit ihrem Futter verschluckten, in dem Magen und in zweyen Beuteln unter der Zunge (Weidemesser) über der Gurgel (Droßel) entstehen, und sich hier bis zu ihrer vollkommenen Größe von einem zähen Schleim, der immer in Ueberfluß vorhanden ist, ernähren. Im Julius geben sie diese Larven durch ein beständiges Nießen aus der Nase von sich. Diese verpuppen sich in der Erde und verwandeln sich in vier bis fünf Wochen in das eigentliche Insekt, den Nasenkriecher.

3) Die Ochsenbremse (Oestrus bovis) legt die Eyer in die Haut, und verursacht die Engerlinge unter derselben.

4) Eine Laus (Pediculus Cervi), welche die Jäger Hirschwanze nennen, weil sie braun und breit ist, plagt besonders die Kümmerer gar sehr. Es ist vielleicht eine Hippobosca.

5) Die

5) Die große Holzwespe *), deren Stich die tödtliche Knotenkrankheit verursachen soll.

6) Auch Blasenwürmer (Taenia) und Egelwürmer (Fasciola) findet man in ihnen. Hr. Dr. Zeder (s. Schriften der Berliner Gesellschaften naturforschender Freunde X. 1. S. 65. Taf. III. f. 8 — 11.) hat auch eine große Menge Splitterwürmer (Festucaria Cervi) in den Magenzellen gefunden.

Jagd. **)

Der Jäger hat mancherley Kennzeichen, wodurch er das Daseyn eines Hirsches in einem gewissen Bezirke vor-

*) Sirex Gigas. L. auch Riesenwespe. Das Weibchen bohrt mit seinem sägeförmigen Legestachel in verwundetes oder beschlagenes Tannnen, Fichten, und Kiefernholz, und legt die Eyer drein.

**) Ich kann nicht unterlassen hier folgende eigene Bemerkung einzutheilen, welche die nahe Verbindung jedes Thiertheiles des alten mit dem des Jungen im Mutterleibe augenscheinlich darthut und für die Zeugungstheorien von nicht geringen Einfluß seyn kann.

Den 27sten Jänner 1797 wurde ein Thier geschossen das ein Hirschkalb trug, zwey Kugeln saßen neben einander in der linken Seite des Kopfes, und einige Schroten an der rechten Seite; merkwürdig war, daß die zwey Kugeln an der nämlichen Stelle, so wie die Schroten mit Blut unterlaufene blaue Flecken verursacht hatte, so wie ich schon vorher bey einer trächtigen Kuh am Kalbe den mit geronnenen Blut unterlaufenen und blauen Schlag mit dem Beile gesehen hatte.

vorher sagen kann. Von einem guten Jäger wird erfordert, daß er nicht nur die Fährten (Tab. XXIV. Fig. 15. a) im Gange und Trabe, b) flüchtig) des Spießers bis zum Kapitalhirsch, durch alle Alter hindurch, kenne, sondern auch die Fährten der alten, trächtigen und gelten Thiere von den Fährten der alten Hirsche, und die Fährten der jungen trächtigen Thiere von denen der jungen Hirsche zu entscheiden wisse, ja sogar ihre Schwere anzugeben im Stande seyn müsse. Und wirklich so schwer die Sache zu seyn scheint, so leicht ist dem aufmerksamen Beobachter, besonders wenn er sich dabey dieses Mittels bedient, daß er sich den Lauft des Hirsches, dessen er sich bemächtigt, und dessen Spur er sehr genau beobachtet und aufgezeichnet hat, aufhebt, und sich nach und nach von mehrern eine Sammlung verschafft, die ihm das verschiedene Alter dieser Thiere anzeigt.

Wir begnügen uns hier nur einige vorzügliche Kennzeichen der Hirschfährten auszuzeichnen. Eines jagdbaren männlichen Hirsches Fährte ist ohngefähr 3 1/2 Zoll lang und 2 1/2 Zoll breit. Seine Schalen sind breiter und stumpfer, als des weiblichen ihre, welche schmal und spitzig zu laufen. Seine Ballen sind länger, breiter und stärker, drücken sich tiefer ein, und zwar in Gestalt eines Herzens, da hingegen der Hirschkuh ihre nur gerade und schmal auslaufen, und auch vor den Ballen nicht die gewölbte Erhöhung (den Burgstall), wie jene verursachen. Er tritt beynahe gar nicht in die Vorderfährte, sondern einen Finger

breit

breit dahinter, da hingegen das Thier in die Vorderfährte tritt.

Die Spießer haben keine scharfe Spitzen an den Klauen, welche gespalten sind, die Afterklauen stehen hoch und sind sehr spitzig; bey den andern jungen Hirschen wird alles nach und nach stumpfer, und die Afterklauen stehen mit zunehmendem Alter niedriger (sie werden kürzer gefesselt). Im Schnee, Sand, Thon, Thau und Gras lassen sich die Fährten immer beobachten. Sonst merkt der Jäger auch noch auf die verschiedene Gestalt der Excrementen (Losung).

Man bemächtigt sich des Hirsches auf vielerley Art.

Er ist es, der die großen theuern Jagdlustbarkeiten, die Hauptjagden verursacht. Zur Vervollkommung dieses Vergnügens legt man hierbey oft Teiche an, durch welche die Hirsche gezwungen werden (Wasserjagd), welches sie auch sehr geschickt, und zwar in der Ordnung thun, daß der größte voran schwimmt, und der folgende immer seinen Kopf auf den Rücken des vordern stützt. Auch bey einem solchem Jagen hält ihre sonstige Sanftmuth die Probe nicht aus, denn wenn sie sich zu sehr eingeschlossen und in Gefahr fühlen, werden sie oft so wüthend, daß sie Menschen und Hunde mit ihrem Geweihe hart verwunden, zu Boden werfen und mit Heftigkeit auf ihnen herum stampfen. Auch hier ist es, wo sie die größte Schnellkraft ihres Körpers um ihre Schenkel zeigen, indem sie oft über ein Tuch oder Garn von 14 Fuß

Höhe

Höhe springen, überfallen. Sonst werden sie auch von den Jägern geklappert, oder am Anstand gepürschet. (s. in der Einl. Jagd.)

Wenn sie in Hirschnetzen gefangen werden sollen, so werden diese dem Wind entgegen aufgestellt, so daß die Forkeln inwendig stehen. — Die grausamen Parforcejagden haben größtentheils aufgehört; auch martert man die Hirsche nicht so oft mehr langsam durch die zerfleischenden Bisse der Hetz- und Jagdhunde todt.

Die guten jagdbaren Hirsche, welche wenigstens 10 Enden haben und drey Centner wiegen müssen, werden vom May an bis in die Mitte Septembers geschossen, die Schmalthiere und Kälber bis Weihnachten; doch pflegt hier die Leckerhaftigkeit der Menschen auch Ausnahmen zu verursachen. Ueberhaupt aber muß der Jäger allzeit nach Maßgabe seines Wildstandes jagen. Wäre die Wildbahn nicht stark besetzt, so daß sich noch mehrere Stücke, ohne Schaden der Landwirthschafft, nähren könnten, so sollte er nur das alte abständige Wildpret schießen; wäre aber kein Mangel dran, so schösse er jährlich so viel alte Hirsche als zum Beschlagen unnöthig sind; oder hätte er wenig Hirsche und mehrere Thiere, so benutzte er von diesen diejenigen, welche gelte gehen, oder sonst alt sind.

Nutzen.

Der Vorzug, den der Mensch diesem Thiere vor allen andern wegen seiner Schönheit einräumt,

hat

hat verursacht, daß man von jeher darauf bedacht gewesen ist, alles von ihm zu nutzen.

1) Das Fleisch (Wildpret) des Hirsches ist nach Alter, Geschlecht und Jahrszeit von verschiedenem Werthe. Das Fleisch von jungen Hirschkälbern verschafft uns sehr schmackhafte Braten; das der Spießer ist mittelmäßig, von Schmalthieren schon besser. Das Wildpret der jungen Hirsche von drey bis vier Jahren hat den dritten Rang; vom vierten bis siebenten ist es schon härter. Das vom Weibchen ist immer milder und besser als von Männchen. Nur zur Zeit der Hirschfeiste von Jacobi bis zur Brunftzeit hat das Hirschwildpret den besten Geschmack; vor derselben aber einen schlechten, und nach derselben wieder einen noch schlechtern. Kurz vor und in der Brunftzeit können sie nur genoßen werden, wenn man ihnen gleich nach der Erlegung das Kurzwildpret ausschneidet, sonst bekommt ihr Wildpret einen gar zu widerlichen Geschmack. Das derb gewachsene an den Keulen, Blättern (Bügen), vorzüglich der Theil vom Schwanze über den Keulen bis an die Rippen (Federn), welcher Ziemer heißt, und der Rücken, geben die besten Braten; nach diesem folgen die Kehlbraten, zwey Streifen am Halse, wo der Schlund und die Gurgel liegt, die Mehrbraten, zwey Streifen, die über den Nieren und am Rückgrat liegen, und zuletzt kömmt das Kochwildpret, worunter das übrige, Hals, Brust und die Seiten, (Krieben, Wümmer, Wände) begriffen sind. Die Hirschohren werden wie Nudeln klein geschnitten, als ein Fricasse' zugerichtet, und die Läufe

te werden wie Rinder- und Kälberfüße, oder als Sülzen (Sulze) verspeiset.

2) Die Haut, wenn sie nicht zu sehr durch die Engerlinge durchlöchert ist, giebt weißgegerbt vortreffliche Beinkleider, Handschuhe, Reitkoller, Degenkoppel, und anderes Riemenwerk, rothgegerbt gute Stiefeln, und wird auch als Pelzwerk z. B. zu großen Müffen verarbeitet.

Nach Georgi (Reise I. 151.) machen die Tungußen Schläuche aus den Häuten, und überziehen auch ihre hölzernen Schneeschuhe mit dem Fell von den Füßen, deren auswärts gekehrte Haare das zurückgleiten auf den Bergen verhindern.

3) Die Haare dienen zum Ausstopfen der Sättel, Stühle, Polster und Kissen, die guten zu Tapazierungen, die groben zu Fußdecken.

4) Die Hirschsehnen brauchen die Tungusen und Kalmucken zum Nähen; eben so die Einwohner von Hudsonsbay, welche sich derselben auch zugleich zu ihren Bögen bedienen. (Pallas Reise I. 231. Ellis Reise 143.)

5) Die Geweihe sind eine Jagdnutzung, müssen in Jägerhäusern zum Zierrath Haaken seyn, und geben roh oder geraspelt und grün gepeitzt Griffe zu Messern und Hirschfängern. Die Köche machen daraus mit und ohne Wein eine nahrhafte und stärkende Gallerte. Mit gebrannten und pulverisirten Hirschhorn macht man den Kaffe klar, und man braucht es auch um das Bier, das etliche Tage alt ist, hell zu machen und wider die Säure zu bewahren. Auf eine Tonne rechnet man für einen Groschen pulverisirtes Hirschhorn. Dieses

ses wird mit zwey Kannen von dem nämlichen Bier ans Feuer gesetzt, aufgekocht, und warm in die Tonne gegossen. Das Bier bleibt eine Nacht ruhig liegen, und wird alsdenn auf Flaschen gezogen.

Die Hirschkolben werden im Wasser gekocht, geschält, mit Baumöhl und Eßig getränkt und wie Salat gegessen, oder mit Trüffeln und sauern Limonen zugerichtet und fricassirt, oder mit einer gewürzten Butterbrühe zubereitet.

Man macht auch aus dem Hirschhorn eine Hirschhornschwärze, die man eben so wie die Elfenbeinschwärze brauchen kann.

Die Apotheker machen aus dem Hirschhorn verschiedene Präparate. Das gebrannte Hirschhorn soll ein absorbirendes Mittel seyn, die Schärfen dämpfen, die Schweiße befördern, und die Würmer vertreiben. Der Hirschhornspirittus, der gleichsam verstorbene Lebensgeister wieder beleben soll, und mit andern Arzeneyen versetzt, in vielerley Krankheiten gebraucht wird, ist bekannt genug. Sonst giebt es noch das Hirschhornmagisterium, den Hirschhornliquor, das Hirschhornöhl, das das Hirschhornsalz, und das Hirschhornsälbchen.

6) Aus den Klauen machen die Drechsler Ringe und dergleichen Dinge.

7) Das Mark ist eine gute Salbe, das Eisen vorm Rost zu bewahren, soll außerdem Schmerzen lindern, die Hitze in Fiebern stillen, aufgesprungene Hände heilen, gelähmte Glieder wieder geschmeidig machen, wenn man es so warm als möglich auflegt.

8) Das Unschlitt braucht der Lichtzieher und Seifensieder; sonst ist es zu Wund- und Brandpflastern

stern gut, heilt wundgelegene Theile kranker Personen, erfrorne Hände und Füße, und leistet den Reisenden, wenn sie die müden Füße damit bestreichen, heilsame Dienste.

Schaden und Mittel dagegen.

Die Hirsche schaden dem Landmann an seinen Feld- und Gartenfrüchten und dem Forstmann an seinem jungen Holzanflug, indem sie in harten Wintern die Zweige der jungen Birken und vorzüglich der Rothbuchen abbeißen. Man findet zuweilen eine große Strecke junger Buchen, deren Spitzen so scharf abgebissen sind, wie wenn sie jemand mit dem schärfsten Messer schief abgeschnitten hätte*). — Mittel, sie von Kohlgärten abzuhalten, sind, daß man über den Zaun eine Linie zieht, und im Felde an jede Ecke seines Ackers ein Stückchen Teufelsdreck einer Welschennuß groß in Leinwand genäht, flach eingräbt, oder besser und sicherer, daß man einen Faßreif nimmt, die inwendige Seite mit Teufelsdreck in Bergöhl zerlassen, bestreicht, und den Reif in die Erde sticht. Der Regen kann alsdann diese Materien nicht abwaschen, und der Geruch erhält sich lange Zeit. Sie wittern diesen ekelhaften Geruch von weiten, und fliehen ihn, wie den Hund. Hanfsaamen um die Aecker herum gesäet, sichert den Feldbau auch, so wie die eingesteckten Krautpflanzen ein Gemisch von altem Schmeer und Schießpulver, womit man die am Ende stehenden Pflanzen bestreicht.

Irr-

*) Diesen Klagen können große Herren durch Thiergärten abhelfen, s. v. Mellins Unterricht eingefriedigte Wildbahnen oder große Thiergärten anzulegen und zu behandeln. Berlin 1800. Ein vortreffliches Werk!

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Wenn manche Jäger von Pferde- oder Bockhirschen reden, so verbinden sie damit keine richtigen Begriffe. Es kann freylich die Einbildungskraft in diesem Hirsche Aehnlichkeit mit dem Pferde, und in jenem mit dem Bocke finden, allein dieß ist nichts reelles.

2) Den Hirschthränen schreibt man Wunderkräfte zu, die der Eigennutz erdacht und die Leichtgläubigkeit angenommen hat.

3) Der Hirsch verschluckt die Larve der Nasenbremse nicht mit dem Futter.

4) Das Verhalten des Urins soll der Hirsch durch folgendes fabelhaftes Mittel curiren. Er sucht eine Kröte oder giftige Schlange in ihren Löchern auf, zieht sie durch heftige Athemzüge mit der Nase hervor, tritt sie todt und verschluckt sie. Alsdann läuft er aus allen Kräften, erhitzt sich, wirft sich ins Wasser und ist curirt. Plinius Naturgesch. nach Große. II. 300.

5) Eben so soll der Geruch von angezündetem Hirschhorn ein vortreffliches Mittel zur Vertilgung der Schlangen seyn. Ebendaselbst.

6) Wenn der Hirsch sein Gehörn an einer Buche oder Birke fegt, so soll es röthlich, an einer Eiche braun, und an dem Hornbaum und der Zitterpappel schwärzlich werden.

7) Die Hirschzähne sind aus Aberglauben ein Amulet geworden, und werden in goldenen Ringen, besonders von den Jägern getragen. Sie sind dann vor aller Zauberey auf der Jagd sicher. Eben so sollen die Ringe von den Klauen wider die Krämpfe dienen.

8) Aus einem am Feuer gelinde gebrannten Stückchen Hirschhorn soll man auch bisweilen den zu Wunderkuren gebrauchten Schlangenstein (Piedra de la serpente) machen.

9) Die Kolben, wenn sie noch zart und blutig sind, in kleine Stückchen zerschnitten, und mit Kreuzwurzsaft über einen Kolben gezogen, sollen einen vortrefflichen Spiritus gegen giftige Bisse geben.

10) Der Knorpel, oder das röthliche Beinchen (Hirschkreuz, Hirschbein, Herzbein), das man in dem Herzen des Hirsches an der linken Seite vor der Oeffnung zweyer Arterien findet, welches wie zwey halbe Monde an einander liegt, gewöhnlich 3/4 Zoll lang und 1/2 Zoll breit ist, soll gepülvert in mancherley Zufällen der Weibspersonen, sonderlich in Hämorrhoidalzufällen und hypochondrischen Dämpfen gute Dienste thun, und man findet es noch immer in den Apotheken.

11) Das gedörrte Blut mit Essig eingenommen soll den Schweiß treiben, und bey Verrenkungen, Verhebung und Stechen im Leibe vorzüglich helfen. Sonst brauchte man noch in der Medicin, die Hirschknochen,

knochen, die Hirschklauen, den Hirschsprung, das Hirschherz, die Hirschblase, die Hirschgeilen, die Hirschruthe, das Laab aus dem Magen ungebohrner Hirschkälber und andere Theile mehr.

(7) 11. Das Reh.

Namen, Schriften, und Abbildungen.

Das Männchen heißt der Rehbock oder Bock schlechthin, und das Weibchen Reh, Rieke, Hille, Ziege, Gais.

Cervus Capreolus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 180. n. 6.

Chevreuil et Chevrette. *Buffon* hist. nat. IV. 198. Ed. de Deuxp. II. T. 3. f. 1. 2. Ueberf. von Martini III. 123. Taf. 48. 49.

Roe. *Pennant* hist. of Quadr. I. 120. Meine Ueberf. I. 114.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 220. 227.

v. Wildungens Neujahrsgeschenk 1797. 1. Taf. 1. 2.

v. Mellins Anweis. zu Anlegung einer Wildbahn. 164. m. e. Fig. 166. 1—5. Geweihe; 170 Fährten.

Goeze's Fauna III. 60.

Donndorfs zool. Beytr. I. 609. n. 6.

v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 252. A. B.

Ridingers jagdb. Thiere. Taf. 9.

Kennzeichen der Art.

Mit kleinen, runden, aufrechten, krotigen, am Ende zweygabligen Gehörn, das dem Weibchen fehlen, unmerklichem Schwanze, im Sommer braunrother, im Winter grauer Farbe, und weißem Steiß.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß artige schmuckere Thier hat mit dem Hirsch und der Ziege viele Eigenschaften gemein. In der Art der Fortpflanzung und Ernährung ist es der Ziege sehr ähnlich, und in der Gestalt und Farbe dem Hirsch; doch streitet es in vielen Stücken mit letzterm noch um den Vorzug. Es hat nämlich feurigere Augen, glänzendere und glättere Haare, geschmeidigere Glieder, ist zwar kleiner, aber dafür auch von der Natur mit mehr Lebhaftigkeit, Muth und Stolz begabt worden. In seinem ganzen Betragen zeigt es mehr Gewandheit und Verschlagenheit. Es kämpft mit jungen Hirschen und behauptet immer als Sieger sein Recht.

Seine

Seine Größe ist vier Fuß und vier Zoll *), die Höhe zwey Fuß acht Zoll, und der Schwanz (die Blume) ist ein Zoll lang und kaum merklich. Der Kopf ist klein, aber wohlgebildet und läuft in eine stumpfe Schnauze aus. Die Augen sind groß und haben einen blaulichen ovalen Augapfel. Die Thränenhöhlen fehlen. Die Ohren sind sechs Zoll lang, spitzig, inwendig und auswendig wollig, und stehen weit von einander. Im Munde stehen in der untern Kinnlade sechs Vorderzähne, welche ihm in der Ordnung, wie dem Schafe, vom zweyten bis vierten Jahre ausfallen und durch neue breitere ersetzt werden, — keine Eckzähne und auf jeder Seite oben und unten sechs scharf gespitzte Backenzähne, deren jeder inwendig zweymal ausgehöhlt und auswendig zweymal auswärts gebogen ist.

Dem Kopf des Rehbocks giebt das kurze, ästige, länglich runde, gerade aufrechtstehende, rostfarbene, knotige, unebene und dichte Gehörn eine besondere Zierde. Er trägt seinen wohlgebildeten langen Hals hoch, und sein Rücken ist wenig eingebogen. Seine Beine (Läufte) sind schlank und die schwarzen Klauen (Schalen) mit den gleichfarbigen eyrunden falschen Hufen (Afterklauen) glänzen, wie polirt. Unter dem ersten Gelenke der Hinterbeine steht eine wulstige Schwiele. Sein vorzügliches Merkmal, woran ihn der Jäger schon von weiten erkennt, ist ein langer Haarzopf unter dem Leibe in der Gegend des Zeugungsgliedes (Pinsels).

Die

*) Par. Ms.: Länge gegen 4 Fuß; Höhe 2 1/2 Fuß.

Die Rieke hat einen schmälern Kopf, längern und dünnern Hals, schmälere Brust und schlankern Leib. Sie ist gewöhnlich ungekrönt, doch findet man sie auch wiewohl sehr selten, mit einem Gehörne von zwey Zoll Länge ohne Enden versehen, das sie ebenfalls, wie er, jährlich abwirft. Sie zeichnet sich schon in der Entfernung durch ihren niedrigtragenden Hals und besonders durch den langen gelben Haarbüschel am Geburtsgliede (Feigenblatt) sehr kenntlich aus.

Die Farbe ändern die Rehe, so wie die Hirsche, des Jahrs zweymal. Vom Frühjahr bis zum Herbst sind die Haare kurz und weich, gelbbraun oder rostfarben; im Winter aber sind sie länger, rauher, aschgrau und bekommen durch die gelben und weißen Spitzen, die sie haben, eine röthlichgraue Farbe. Sonst läuft über die Nase, an der Oberlippe weg, ein schwarzer Streif, der übrige Theil der Nase ist bis an die Augen schwarz und weiß gesprengt, das Untermaul weiß, die Ohren mit einer schwarzen Einfassung geziert, und an der Wurzel weiß, die Kehle gelb, der Unterhals mit zwey weißen Flecken bezeichnet, und der Bauch schmutzig weißgelb. Die Hinterbacken sind im Winter ganz weiß, im Sommer schmutzig gelbweiß, und dadurch unterscheiden sie sich von dem andern Rothwildpret. Das Haar ist an der Wurzel immer grau; und am Bauche und den Hinterschenkeln befinden sich zwey Haarnäthe.

Auch das Gehörn wechselt der Rehbock alle Jahr. Im siebenten Monat setzt er seinen ersten Hauptschmuck, zwey kurze Spiese auf. Diese werden bey den folgenden Wechselungen länger, und erscheinen im vierten

Jahre

Jahre mit zwey Enden, welche sich alsdann alle Jahre mit neuen vermehren, bis sie die Zahl sechs oder acht erreicht haben. Selten findet man Rehbocksgehörne mit zwölf Enden. Nach der Brunft wirft er sein Gehörn jedesmal ab, welches ihm dann im dritten Monate wieder vollkommen gewachsen ist. Das rauhe Bast desselben schlägt er im Februar und März an den Birken, Sahlweiden, Tannen und Kiefern ab, und ordentlicherweise sollte sich dasselbe in zwey Spitzen endigen, allein weil er seinen noch weichen Putz nicht, wie der Hirsch, schont, oder schonen kann, und unvorsichtig und muthwillig genug ist, an den Sträuchern und Bäumen damit anzustoßen, so findet man ihn gar oft mit wunderlichem Gehörn versehen.

Es giebt auch Farbenvarietäten: 1) das schwarze Reh. Man trifft es vorzüglich im Schaumburgischen und Hessischen an. Sie sind kohlschwarz. Sie pflanzen sich fort, aber es fallen nicht immer bloß schwarze, wenn zwey schwarze zusammen brunsten.

2) Das dunkelbraune Reh, mit gelben Hinterbacken.

3) Das geschäckte Reh. Entweder roth und schwarz, oder roth und weiß geschäckt. Sehr selten.

4) Das weiße Reh.

5) Das Bastartreh. Vom Schaf und Reh oder von der Ziege und dem Reh. Die Gestalt ist dann von beyden Eltern gemischt. s. Schaf.

Zer-

Zergliederung.

Hier findet sich alles wie beym Hirsch. Auch die Gallenblase sucht man vergeblich. Hier kann aber die Galle aus ganz natürlichen Ursachen nicht im Schwanze sitzen.

Merkwürdige Eigenschaften.

Beyde Geschlechter des Rehwilds können sehr schnell laufen, fertig schwimmen und ihr scharfes Gesicht und feiner Geruch macht, daß sie ihren Feinden oft entgehen; sie richten deshalb den Kopf immer in die Höhe und nach dem Winde zu und können einen Menschen auf 300 Schritt weit riechen (im Wind vernehmen).

Ihre Stimme, welche sie in der Brunftzeit und besonders dann hören lassen, wenn ihnen etwas unvermuthetes aufstößt, ist ein helles weitschallendes dreymaliges Bellen (Schmälen), welches sie in einiger Entfernung langsam schleichend, so lange fortsetzen, bis sie dasjenige deutlich sehen, was sie stutzig machte, und ist es ein Mensch oder Hund, so laufen sie mit der größten Schnelligkeit stumm davon.

Ihr unverkürztes Lebensziel erstreckt sich bis ins sechzehnte Jahr.

Verbreitung und Aufenthalt.

Man trifft das Reh in den meisten Ländern von Europa an, und zwar im Norden bis Norwegen hinauf. In Deutschland ist es in den mehresten Gegenden häufiger als der Rothhirsch, sollte es aber

nicht

nicht seyn, da es an den Holzungen mehr Schaden als dieser thut.

Die Rehe lieben trocknen Boden und trockne Luft. Ihren Aufenthalt haben sie daher gern auf hohen Plänen an den äußersten Gränzen der Waldungen, wo die Hafer- Erbsen- Linsen- und Grummetfelder in der Nahe sind, in lichten Hölzern, in Gegenden, wo faule Bäume und vorzüglich die jungen Schläge nahe sind und die Brombeerstauden häufig wachsen. Sie vereinigen sich nicht, wie die Hirsche, in starke Truppen (Rudel), sondern leben nur in Gesellschaft von drey, vier und fünf Stücken, selten von zehn bis zwölf. Der Bock ist beständig um seine Gais, deren er eine, zwey, höchstens drey hat, lebt unter denselben, und seinen Jungen, wie ein Hausvater, und vertheidigt sie bis auf den Tod. Es besteht daher auch eine Rehgesellschaft nur aus einer Familie, die so lange in der schönsten Vertraulichkeit zusammen lebt, bis die Jungen wieder neue Familien errichten können. Im Sommer suchen sie den alten Standort wieder, den sie sich einmal zu ihrem Aufenthalte erwählt haben, wenn sie der harte Winter in niedrige dicke Laub- und Schwarzwälder getrieben hatte. Ehe sie sich niederlegen, scharren sie allezeit mit ihren Vorderläuften einen runden Platz, des Sommers um auf der frischen kühlen Erde zu liegen, und des Winters um den Schnee wegzubringen, der ihnen sonst die Haare naß und schmutzig machen würde.

Nahrung *).

Es sind wie die Ziegen leckere Thiere. Ihrer Nahrung (Geäse) gehen sie gern des Abends und Morgens auf trocknen Wiesen, in jungen Gehegen und Holzschlägen nach, wo sie sich an den besten Kräutern und Gräsern, an dem Laub der Weiden und besonders der Pappeln erquicken. Der Bock tritt allezeit zuerst aus dem Holze, und kundschaftet die Gegend aus, ob es sicher ist, und die Ziege folgt ihm nach; hingegen wenn sie verjagt werden, oder aus Furcht fliehen, so geht sie voran, und er folgt nach, um sie erst in Sicherheit zu lassen. Die Berberis- und Brombeerstauden sind ihnen ein sehr angenehmes Futter und nächstdem das Genist (Ginster). Sie ziehen auch im Frühjahr, wenn das Getraide noch jung ist, zu Felde, und thun im Sommer den Waldeinwohnern auf ihren Hafer- Erbsen- und Linsenäckern, besonders aber in ihren Gemüßgärten, bey zu starker Hegung und Vermehrung großen Schaden, indem sie vorzüglich die Bohnenblätter so sehr lieben, daß sie bey aller ihrer natürlichen Schüchternheit und Furchtsamkeit durch die rauschendsten Verscheuchungsmittel nicht vertrieben werden können, und im Winter sind sie den Baumgärten durch das Benagen der jungen Obstbäume eben so nachtheilig. Da sie zu dieser Jahrszeit in Wäldern nur selten so viel genießbares Moos, Wasserkräuter und Gräser,

*) Die ausführliche Nahrung siehe in meiner Diana oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur- Forst- und Jagdkunde. I. 65.

fer, Binsen, Kletten und Distelknospen, Weidenblätter Eicheln, Bucheckern und dergleichen abgefallene Früchte finden, wodurch sie sich völlig sättigen könnten, so füllen sie ihren Magen mit Baumknospen, Baumrinden und jungen Zweigen, die ihnen oft unverdaulich sind. In der größten Hungersnoth hat man sie auch wohl gar ans Aas gehen sehen *). In harten Wintern bekommen sie Haferschütten aufgesteckt.

Den Durst können sie sich im Nothfall ohne Quelle durch Ableckung des Thaues und Regens von den Blättern und durch Schnee löschen.

Das Salz lieben sie, wie die Hirsche; fuhlen sich aber nicht.

Fortpflanzung.

Der feurige, lustige Bock tritt vom Ende des Novembers bis zur Mitte des Jänners auf die Brunft, und

*) Daß die Fleischnahrung ihnen nicht ganz zuwider ist, kann ich mit einem zahmen jungen Reh beweisen, das ein benachbarter Jäger so gewöhnt hat, daß es am Tage ins Feld und im Wald geht, und wenn es hungert wieder kömmt. Dieß frißt gewöhnlich und am liebsten Brod, und säuft Milch. Trocknes Brod frißt es allein und säuft die Milch nach; in Milch eingeweichtes Brod aber läßt es stehen. Sein liebster Fraß sind die Eingeweide von wilden und zahmen Thieren, besonders Lunge und Leber. Es frißt aber auch ordentliches Fleisch roh und gekocht. Lederne Handschuhe und alles Lederwerk fressen die zahmen Rehe, so wie Hirsch- und Damwildpret gern.

und da er, wenn er nicht von andern Weibchen, die ihrer Männchen beraubt sind, verführt wird, seinem einzigen Weibchen treu ist, und von keinem Nebenbuhler in dem ruhigen Besitz seiner Gattin gestöhrt wird, so brunftet er auch nicht so lange als der herumflatternde Edelhirsch, und also nur einen halben Monat. Er begattet sich gewöhnlich nur einmal des Jahrs, und nur die Schmalrieke läßt sich zuweilen aus Geilheit im August von einem hitzigen jungen Bock, doch ohne Befruchtung, bespringen (beschlagen, *). In der Brunftzeit scheucht er

*) Noch neuerlich hat man mit Zuversicht behauptet, die Brunftzeit des Rehes sey im August und es trage also darnach 9 bis 11 Monate; allein nach meinen eigenen und den Erfahrungen so vieler Forstmänner, kann ich dieser Behauptung nicht beytreten. Aus dem Beweise, den man aus dem Wachsen und Abwerfen der Geweihe hernimmt, ergiebt sich wohl weiter nichts, als daß die Natur hier nicht den nämlichen Weg betritt, den sie beym Hirsch gewählt hat. Auch die einzelnen Beyspiele in Thiergärten beweisen das nicht, was sie beweisen sollen; denn hier verursacht das Futter und die halbe Zähmung solche Anomalien.

Den ganzen Herbst durch vom August 1796 an bis in den Januar 1797 habe ich durch Hülfe des Hrn. Försters Bürger zu Tabarz von acht zu acht Tagen die Traggefäße der Rehe untersucht und erst in der Mitte des Decembers die Gänge derselben so schlüpfrig, erweitert und aufgeschwollen gefunden, daß die Brunftzeit heranzunahen schien. Den ersten Januar öffnete ich eins, das mit dem Bock gieng, wo entweder die Befruchtung im Augenblick geschehen oder doch die Brunft ganz nahe gewesen seyn mußte, denn es fanden sich alle Wege mit einem

er aus Eifersucht oder Schaam seine Jungen weg, und schreyt zuweilen dumpfig und abgebrochen, wovon ihm der Hals aufschwillt. Er geht auch alsdann gern in die Waldbäche und scharrt den Boden darinn auf, und die Haare werden ihm am Bauche von den beizenden Saamen schwarz. Die Rehziege trägt 5 1/2 Monat oder 21 Wochen, und setzt im May und Junius mehrentheils zwey Junge, ein Männchen und ein Weibchen, selten eins, noch seltner drey, an einen düstern einsamen Ort in Bergen oder in ein dichtes Gebüsch oder ins hohe Gras der Waldwiesen. Vier oder fünf Tage vorher, ehe sie setzt, sucht sie sich nach und nach von ihrem Gatten, ohne daß er es bemerkt, zu entfernen, den ersten Tag nur etliche Stunden, den andern länger und so fort, bis sie am letzten gar unsichtbar bleibt und ihre Jungen gebiert. Sie thut dieß wahrscheinlich deswegen, weil sie glaubt, der Vater würde seine Kinder auffressen, wie es zuweilen zu geschehen pflegt. Acht Tage bleibt sie also von ihm getrennt, alsdann aber sucht sie ihn wiederum in dem alten Stande auf und führt ihn freudig zu seinen Jungen. Diese blöken ihn, wie die jungen Lämmer, liebreich an, unterdeß ihm seine zärtliche Rieke allerhand Lieb-

einem gelblich weißen zähen Schleim angefüllt, die auch in der Mitte der Gebärmutter etwas geronnen schienen. Daß die Rehe die Brunft bis dahin verspart hatten, lag vielleicht in dem sehr kalten Winter und dem hohen Schnee, welcher den December über fiel, und wodurch bey ihnen also die Brunfthitze nicht so schnell wirkte. s. Meine Diana oder Gesellschaftsschrift. I. 495.

Liebkosungen macht. Von der Stunde an trägt er nun wieder für sie und seine Jungen die größte Sorge. Diese muntern niedlichen Thierchen sind anfangs buntgeflecke, nämlich roth und weiß. Sie saugen vier Monate, laufen aber nach etlichen Tagen schon mit ihrer Mutter davon. Die gute Rieke liebt sie so sehr, daß sie bey dem geringsten Geschrey derselben blindlings herbey gelaufen kömmt, und oft einen Menschen, der sie betastet, ungescheut umrennt. Mann nennt die jungen Rehe auch Rehkälber, Rehkätzlein, Rehkützel, Rehzicklein, wenn die männlichen ein Jahr alt sind, Spießböcke, Spießer und die weiblichen, Schmalthiere, Schmalrehe, Schmalrieken. Man kann sie, obgleich mit vieler Mühe, zähmen und gewöhnen, daß sie, wie die Hunde, mit im Wald laufen. Sehr selten fallen ganz weiße Rehe *).

Krankheiten.

1) An eben der Knotenkrankheit, die die Hirsche zuweilen im Thüringerwald befällt, leiden auch die Rehe.

2) Die Engerlinge (s. Hirsch) sollen ihnen zuweilen bey zu sparsamer Nahrung, wenn der harte Winter bis in die Mitte des Frühlings dauert, den Magen durchfressen, und wenn sie sich im späten Frühjahr in einen Klumpen

*) In dem Thiergarten zu Kopenhagen gab es sonst eine Menge weißer Hirsche, Damhirsche und Rehe.

Klumpen ballen, um zu ihrer Verwandlung ausgespieen zu werden, den Schlund und die Luftröhre verstopfen, daß sie elend sterben müssen.

3) In harten Wintern genießen sie viele Baumrinden und junge Zweige, welches unverdauliche Futter sich oft in ihrem Leibe in einem Klumpen zusammenwickelt, in ihren faltigen Magen wie eingeleimt festsetzt, und die Auszehrung verursacht, wenn es nicht durch die bald hervorkeimenden Frühlingsblätter der Birken- und Haselstauden ausgeführt wird. Und dieß ist die Ursach, warum oft bey tiefem und lange liegendem Schnee die ganze Wildbahn der Rehe ein Opfer des Todes wird.

4) Auch der Durchfall oder die Ruhr, die nach langem Hunger und zu viel genossenem jungen Laube und fettem Grase entsteht, streckt viele im Frühjahr todt darnieder.

5) Der häufig gefallene Mehlthau verursacht die Leberfäule. So 1780.

6) Sie werden auch blind. So fieng den 4ten Nov. 1798 ein Hühnerhund eins auf dem Tabarzer-Revier im Gothaischen, das ganz gut bey Leibe war, aber auf einem Auge ganz und auf dem andern fast ganz blind war.

Feinde.

Der jungen Rehe Feinde sind die Füchse, wilde Katzen und Wiesel (s. Wiesel), und der alten die

Wölfe, Luchse und Hunde; doch fängt der Fuchs im Winter, wenn der Schnee eine Ruft vom Froste hat, welche das Wild im Laufen hindert, auch alte Rehe und Böcke. Beym Anblick des grimmigen Wolfes und Luchses gerathen diese schüchterne Thiere in die größte Furcht und ergeben sich oft freywillig, dem Hunde aber entgehen sie mehrentheils durch List. Wenn sie sich nicht durch eine schnelle ununterbrochene Flucht retten können, so verwirren sie entweder seine Spur durch Seitensprünge oder drücken sich plötzlich auf die Erde nieder, lassen ihn über sich hinsetzen oder ruhig vorbey laufen.

Da das Reh ein reinlicheres Thier ist, als der Hirsch, so ist es auch mehr von Holzböcken (Acarus) und Läusen (Pediculus cervi) befreyt, als er. Die Bremsen (s. Hirsch), welche dem Hirsche ihre Eyer im September in die Haut und Nase legen, thun es auch dem Rehe. Die Keulen sind oft unter der Haut ganz durchwühlt. Man findet auch langgegliederte und Blasen-Bandwürmer in den Eingeweiden und am Netz.

Jagd.

Die Fährte (Tab. XXIV. Fig. 16. a) gehend oder trabend, b) flüchtig) der Rehe ist geschränkt und fast stets gezwungen; doch spalten sie auch ihre Klauen, wenn sie flüchtig sind, und setzen alsdann auch die Afterklauen ein. Die Hinterfährte ist allezeit kleiner, als die Vorderfährte, und der Bock macht seine Spur etwas stumpfer, als die Ziege, der Unterschied ist aber kaum merklich. Sie werden eben so, wie der

Hirsch

Hirsch gejagt, gepürschet, geklappert und im Garn gefangen. Noch ein besonderes Jagen ist das Rehblatten, wo der Jäger mit einem Stückchen Birkenschale oder mit einem Apfelblatt den zweystimmigen Ton der Rieke nachahmt, auf welchen betrügerischen Ruf der Bock wie ein Pfeil geflogen kömmt, aufs Blatt geschossen wird, und so den Todt der Liebe stirbt. (s. in der Einl. Jagd.)

Nutzen.

1) Das Wildpret dieser Thiere ist eine vortreffliche Speise, und man nützt es das ganze Jahr. Besonders delikat ist das der Kälber von zwölf bis achtzehn Monaten, und die Rehzunge.

2) Das Rehtalg wird wie das Hirschunschlitt benutzt und zuweilen noch jetzt in der Medicin gebraucht.

3) Die Haut wird roh gahr gemacht und zu Stühlen, Polstern und Satteldecken verbraucht. Die gemeinen Chineser tragen kurze Kamisöler davon, an welchen das Haar auswärts gekehrt ist. Zu Krasnojarsk braucht man sie so zu Reisepelzen. Die Tunguſen und Büraten machen aus den Häuten der Rehköpfe, denen sie die Ohren und das junge Gehörn lassen, Jagdkappen. Die vornehmen Krasnojarskischen Tataren bedecken ihre Hütten und deren Thüren mit Rehfellen *).

*) Pallas Reisen III. 12. 127. 239. J. G. Gmelins Reise I. 380.

Die Louisianer wissen die Rehhäute sehr gut zuzubereiten, wozu sie besonders das Gehirn dieser Thiere als das vorzüglichste Material nützen. Es gehen viele davon nach Frankreich, und bekommen zu Niort den Namen von Gemsenfellen.

Bey langwierigen Krankheiten ist wider das Wundliegen ein Rehbocksfell das beste Mittel. Man nimmt nämlich eine langhaarige Rehbockshaut, legt auf die rauhe Seite ein Tuch, welches man mit Hirschtalg bestreicht, und wickelt den Kranken nackend in dasselbe. Gegen das Drücken der Pferde an der Brust werden Stückchen rauhe Haut unter die Kummte u. s. w. gemacht.

Das weißgegerbte Leder ist feiner als das Hirschleder, und es verarbeitet es der Beutler, wenn es nicht von Engerlingen zu sehr durchlöchert ist, zu guten Beinkleidern, Handschuhen u. dergl.

4) Die Haare dienen zu Fütterung der Polster und Stühle, und sind theurer als die Hirschhaare, weil sie sich nicht so leicht zusammenballen.

5) Die Gehörne werden als Haaken in Landwohnungen angenagelt, von den Drechslern zu Tabacksstopfern und Pfeifenröhrchen gedreht, und von Messerschmidten zu Messerstielen gebraucht.

6) Diese Thiere sollen auch in Waldungen durch ihren Mist und Urin Anlaß zu Salpetererzeugungen geben *).

Scha-

*) Pallas Reise III. 407.

Schaden.

Das Reh stiftet eben den Schaden, den der Hirsch stiftet, und noch größern, da es sich in Waldungen im Winter von den jungen Pflanzen, und im Frühjahr vorzüglich von den Knospen der jungen Bäume und der Sträucher nährt, und auch in Gemüßgärten seine Nahrung sucht.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Die Begattungszeit soll im August fallen und der Bock nach der Brunfzeit das Gehörn abwerfen.

2) Das Gehörn nimmt nicht von dem Safte der Bäume, woran es gefegt ist, die Farbe an, sondern diese richtet sich nach der Farbe des Thiers.

3) Daß das Wildpret wider die Ruhr, die Leber gegen trübe Augen, die Galle gegen Sommerflecken, die Milz gegen die Kolik und der Koth gegen die gelbe Sucht u. s. w. helfe, gehört zu den Vorurtheilen der alten Aerzte und Jäger.

II. Mit Vorderzähnen in der obern Kinnlade.

Die siebente Gattung.

Schwein. Sus.

Kennzeichen.

In der obern Kinnlade sind (meist) vier gegen einander zugekehrte, und in der untern sechs hervorstehende Vorderzähne.

Eckzähne zwey oben und unten.

Der Rüssel ist muskulös und abgestutzt.

Statt der Haare sind steife Borsten da.

Mehrere Säugwarzen liegen an der Seite des Leibes bis zur Brust hin.

Der Magen ist einfach, und die Nahrung besteht aus dem Thier- und Pflanzenreiche, doch mehr aus letzterm.

Sie bringen viel Junge zur Welt, und diese pflanzen sich schon das zweyte Jahr fort.

Unter diese Gattung, welche in der Lebensart von den vorhergehenden gar merklich abweicht, sich in vielen

Stücken

Stücken den Raubthieren nähert und durch den scharf abgestumpften, beweglichen Rüssel, der ihnen zu Ausgrabung ihrer Nahrungsmittel dient, gar sehr auszeichnet, rechnen wir nur eine Art.

(8) 12. Das gemeine Schwein.

Sus Scrofa. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 217. n. 1.

Kennzeichen der Art.

Vorn auf dem Rücken stehen steife Borsten, und der kurze Schwanz ist am Ende behaart; das wilde hat kurze etwas abgerundete Ohren und ist schwarz von Farbe; das zahme hat lange zugespitzte Ohren und ist meist weiß von Farbe.

Diese Art begreift das zahme und wilde Schwein unter sich. Der wilde Eber ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, der Stammvater, und nur die Zähmung, eingeschränkte Lebensart und verschiedene Nahrung hat die kleinen Abweichungen seiner Abkömmlinge, der Hausschweine verursacht. Denn noch begatten sich zahme und wilde Schweine unter einander und zeugen fruchtbare Junge. Doch um diese Abweichungen gehörig zu bemerken, theilen wir diese Art in zwey Rassen ein, in die zahme und in die wilde.

a) Das zahme Schwein.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Das männliche Geschlecht heißt: Eber, Zuchteber, Kempe, Matz, Bär, Hacksch, und das weibliche: Sau, Zuchtsau, Lose, Muhr. Das geschnittene Männchen wird Pork und das Weibchen Gelfen oder Mos, die verschnittene alte Sau aber Börgen genannt. Die Jungen nennt man Ferkel und wenn sie noch saugen Spanferkel.

Sus Scrofa domesticus. *Gmelin Lin.* l. c. β.

Cochon, Verrat et Cochon lait. *Buffon* hist. nat. V. 99. t. 16 et 17. f. 2. Ed. de Deuxp. I. T. 4. f. 1. 5. Ueberf. v. Martini II. 35. Taf. 17. 19. Fig. 2.

Tame Hog. *Pennant* hist. of Quadr. I. 140. Meine Ueberf. I. 132.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 189.

Goeze's Fauna. III. 372.

Donndorfs zool. Beytr. I. 740. n. 1. β.

v. Schrebers Säugeth. V. Taf. 321.

Gestalt

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Das Schwein stammt wohl eigentlich aus Indien und ist von da in die ganze Welt verpflanzt worden *). In einigen Stücken ist es zwar durch das Klima und die Nahrung abgeartet, doch hat es noch allenthalben die wesentlichen Kennzeichen beybehalten.

In Thüringen werden ziemlich viele Schweine gezogen; und sie behaupten vor andern einen merklichen Vorzug.

Der Kopf ist lang gestreckt, endigt sich am Rüssel mit einem platten runden Knorpel, in dessen Mitte ein Knochen enthalten ist, durch welche die beyden Nasenlöcher laufen, und hängt auf die Erde herab. Die Backen sind breit und hager, so wie der ganze Kopf, an welchem der kurze, breite Hals mit seinem steifen Nacken eingezwengt ansitzt. Der hintere Theil der Hirnschale ist sehr erhaben. Der langgestreckte Rüssel ist mit einem steifen, durch zwey Muskeln beweglichen Knorpel versehen, der ihnen zum Wühlen beförderlich ist. In der obern Kinnlade stehen vier gegen einander zugekehrte und in der untern sechs etwas hervorstehende Vorderzähne. Die untern sind von ganz anderer Gestalt, als die obern, welche

*) Nach Amerika ist es aus Europa gekommen, und zum Theil wieder verwildert. In den Wäldern von Süd-Amerika findet man große Heerden solcher verwilderten Schweine; man nennt sie Warren.

welche anstatt breit und scharf zu seyn, lang, rund, um die Spitze stumpf sind, und mit den untersten fast einen rechten Winkel machen. Doch findet man auch zuweilen in der obern Kinnlade vier bis sechs und in der untern vier bis acht Schneidezähne, so daß ihre Anzahl entweder oben und unten gleich ist, oder wenn sie ungleich ist, allemal im untern Kiefer auf jeder Seite einer mehr steht als im obern. Der Mund ist zu beyden Seiten oben mit zwey kurzen, und unten mit zwey längern hervorragenden Eckzähnen (Hauzähnen, Hauern), bewaffnet. Sie sind beym Eber größer, als bey der Sau und dem Porkschweine, welchen sie kaum aus dem Munde hervorragen; beyde Geschlechter gehen mit diesen Waffen ihren Feinden trotzig entgegen. Mit den übrigen Backenzähnen, deren auf jeder Seite oben und unten sieben stehen, hat ihr Gebiß zusammen 42 bis 44 Zähne. Sie verlieren in ihrer Jugend keinen davon, wie die andern zahmen Hausthiere, sondern die ersten Zähne wachsen immer fort, daher man aus der Größe derselben, besonders der Waffenzähne, unter andern ihr Alter erkennen muß. Die Augen sind klein und liegen tief im Kopfe. Die Ohren ziemlich lang, breit, dick, vorwärts gerichtet und schlaff. Uebrigens ist ihre äußerliche Gestalt bekannt genug. Der Leib ist langgestreckt und dick; der Rücken ein wenig erhaben; das Kreuz schmal und spitzig *); die Seiten breit und lang; die Vorder-

*) Die Schweine mit breitem Rücken, welcher durch die zu stark gewölbten Rippen gebildet wird, liebt man nicht, weil sie weniger Speck ansetzen und den Käufer hintergehen.

Vorderbeine kurz, stark und gerade, die Hinterbeine aber länger, und schmalkeulig; der Schwanz dünn, kurz, büschlich und schlängelt sich gewöhnlich zirkelförmig, welche Krümmung man schon an den Ferkeln von sechs Wochen gewahr wird. Die Schweine wachsen bis ins fünfte und sechste Jahr, werden mit den Jahren immer größer und schwerer, und man hat sie durch gute Wartung und Futter oft zu einer Größe von sieben Fuß und drüber gezwungen.

Die Farbe ist bey den zahmen Schweinen meist weiß, doch giebt es auch schwarze, oder schwarz und weiße, auch rothe, oder roth und weiße, auch braune, und gelbe, und bey denen von vermischten Farben sieht man auch die Haut an den Stellen anders gefärbt, wo die Borsten von der übrigen Farbe abweichen. Der gewölbten Rücken ist mit hohen harten und steifen, die Seiten aber sind mit kurzen schwachen Borsten besetzt; die längsten und stärksten sind vier bis fünf Zoll lang und bilden gleichsam eine Mähne, die vom Kopf bis auf das Kreuz herab geht. Sie bestehen, da sie viel härter als die Haare und Wolle anderer Thiere sind, aus einer knorplichen Materie, die dem Horn ähnlich ist, und theilen sich am Ende alle in verschiedene Spitzen, wodurch sie gespalten

gehen. Man glaubt nämlich der breite Rücken und die erhabenen Seiten wären mit Speck besetzt. Man nennt solche Schweine in hiesigen Gegenden Stifter, weil sie aus dem Stift Hildesheim stammen sollen. Die Böhmische Art liebt man bey uns auch nicht, weil sie zu kurz gebaut ist.

spalten werden können. Das Ende des Mauls, die Kopfseiten, die Gegend um die Ohren, die Kehle, der Bauch und Schwanz haben hingegen sehr wenig Borsten, und sind fast nackend. Der Schwanz ist am Ende langhaarig. Unter dem Halse haben einige zwey Warzen, oder Anhängsel wie die Ziegen hangend; man kauft diese sehr gern und hält sie, doch ohne Grund, für die besten.

So wie bey allen zahmen Thieren, also giebt es auch bey dem Schwein Nationalrassen. Für uns sind noch besonders merkwürdig: 1) Die rothgelben Ungarischen Schweine; 2) die kleinen stachelhärigen schwarzen in Böhmen, die man wild in Gärten hielt, und dann, statt zu schlachten, schießt, damit sie einigermaßen den Geschmack des wilden Schweins erhalten, und 3) das einhufige zahme Schwein, welches eine ganz eigene Varietät ist.

Zergliederung.

Sonst glaubte man, daß man die Menschen-Anatomie am Schweine studieren könne, weil wir in Rücksicht des innern Baues ganz mit diesen Thieren übereinstimmten. Allein die Gleichheit ist nicht so groß, als man sie gemacht hat. s. Lichtenbergs und Voigts Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. VI. 1. S. 3.

Eine Menge Eingeweidewürmer hausen in den Schweinen. s. unten.

Merk-

Merkwürdige Eigenschaften.

Der Geruch dieser Thiere übertrifft ihren Geschmack, ihr Gehör und Gefühl. Ihr Rüssel ist ein sehr brauchbares Instrument für sie; sie besitzen sehr viele Stärke darinn und können geschickt damit in der Erde wühlen. In ihren übrigen Handlungen aber zeigen sie die größte Trägheit und Ungeschicklichkeit, indem sie keine Geschmeidigkeit in Gliedern, einen gezwungenen und steifen Gang und eine fast gänzliche Unbeweglichkeit im Rücken und in den Lenden haben. Ob sie gleich unter allen Säugethieren die wenigsten Fähigkeiten zu besitzen scheinen, und daher einen großen Eigensinn haben, so hat man sie doch schon tanzen gesehen, und in England und Deutschland hat es wohl schon Leute gegeben, die sie gelehrt haben allerhand Kunststücke machen, z. B. sich todt stellen, zählen u. s. w. Der ganze Umfang ihrer Triebe scheint sich übrigens bloß auf eine wüthende Brunst und unmäßige Freßbegierde einzuschränken, daher sie auch oft ihre eigenen Jungen anfallen. Diese Gierigkeit aber scheint von dem dringenden Bedürfniß, ihren Magen stets gefüllt zu haben, und ihr unreinlicher und gleichgültiger Appetit von ihrem stumpfen Geschmack und Gefühle abzuhängen. Nur durch lange Uebung lernen sie ihre Wohnung, wenn sie von der Weide zurückkommen, wiederfinden. Sie lieben die Unreinigkeit gar sehr, und sich in Morästen und Pfützen herum zu wälzen, ist ihnen wegen ihrer hitzigen Natur Wollust und — Nothwendigkeit zur Vertilgung ihres häufigen Ungeziefers.

Ihre

Ihre Stimme ist ein Grunzen, und bey der Beleidigung, Fesselung, Todesnoth, und wenn Gewitter und starke Platzregen sie auf der Weide überfallen, ein hochtönendes gräßliches Geschrey. Wenn unter der Heerde ein Schwein diese Töne angiebt, so stimmen die übrigen alle sogleich zu einem Concert mit ein, und eilen einander zu Hülfe. Der Eber grunzt nicht so laut als die Sau.

Sie können ein Alter von zwanzig Jahren erreichen.

Aufenthalt.

Alle Zuchtschweine verlangen einen trockenen, warmen, geräumigen und reinen Stall (Koben), den man wegen ihres übelriechenden Mistes an einen abgelegenen Ort des Hofes bauen muß, weil dieser Geruch dem Menschen unangenehm ist; ja schädlich werden kann. Besonders nöthig ist es, daß man ihn von den Pferdeställen entfernt anlegt, da das Roß diesen Geruch und das Grunzen der Schweine noch weniger vertragen kann, als der Mensch, und oft davon krank werden soll. So unreinlich diese Thiere selbst auch sind, so verlangen sie doch einen reinlichen Wohnplatz, welcher wenigstens alle acht Tage zweymal frisch ausgestreuet werden muß, weil sie sonst weder gedeihen noch fett werden. Auch dürfen Eber und Sau nicht in einem Koben beysammen wohnen, weil ersterer sich zu sehr entkräften, unzeitiges Ferkeln der letztern verursachen, oder die Jungen fressen könnte.

Nahrung.

Diese Thiere besitzen eine so erstaunende Freßgierde, daß sie aus allen Reichen der Natur Nahrung zu sich nehmen, und sogar den Auswurf anderer Thiere verzehren. Da sie im Frühjahr auf unbebaute Aecker, im Sommer auf wüste Haiden und Anger, im Herbst in die Getraidestoppeln von einem Schweinehirten getrieben werden, so fressen sie alles, was ihnen auf dem Wege aufstößt, todte Thiere, Koth, Obst, Körner, Kräuter, Wurzeln; und lieben vorzüglich sumpfige Oerter, wo Binsen, Rohr und andere Wasserpflanzen wachsen, deren Wurzeln ihnen sehr angenehm schmecken müssen. Wie der Ritter von Linne' beobachtet hat, so fressen sie 72 Arten Gewächse, und rühren 171 nicht an. Man kann sie wirklich unter die fleischfressenden Thiere zählen, da sie nicht allein Aas verzehren, sondern auch oft ihre Jungen selbst fressen, die flachvergrabnen Leichen ausgraben, und selbst kleine unwehrsame Kinder anfallen; letzteres thun vorzüglich die hungrigen saugenden Sauen. Wegen ihres feinen Geruchs wittern sie alle süßen Wurzeln unter der Erde und graben sie aus, so wie sie auch nach den Engerlingen, Regenwürmern und Feldmäusen wühlen. Dieser Fähigkeit halber hat man sie auch in manchen Ländern wie die Hunde gewöhnt, die Trüffeln aufzusuchen. In den Gegenden, wo Eichen- und Buchwälder sind (Eckerich ist), werden sie in dieselben, von der Mitte des Septembers bis in die Mitte des Novembers getrieben. Hier erhalten sie die beste und gesündeste Mast, sonderlich wenn der flüßige Speck, der aus dieser Kost entsteht, durch eine kurze

Gerstenfütterung zu Hause noch etwas mehr Derbheit erhält. Damit sie bey dieser Weide den Wurzeln der Bäume und Stauden durch ihr Wühlen nicht schaden mögen; so ist es manchen Orten gebräuchlich, ihnen eine Sehne am Rüssel zu zerschneiden, oder einen Ring in die Nase zu legen. Vor Thau, Reif, Schnee und Regen müssen sie sehr in Acht genommen werden.

Die Hausmast derselben besteht vorzüglich in den Abfällen von Mehl, geschrotenen Getraide, Trebern, Spülich, gekochten Möhren, Kürbissen, Rüben und Kartoffeln, und man sieht daher leicht, daß denjenigen Leuten, die solche Abgänge und Fütterung haben, die Mästung dieser Thiere vorzüglich vortheilhaft seyn muß. Ueberhaupt ist zu bemerken, daß das Schwein immer den Trank und solche Speisen liebt, die saftig, oder doch durch warmes Wasser saftig gemacht worden sind. Die Knollengewächse dürfen ihnen nicht zu warm gegeben, sondern erst nach zwölf Stunden, und gut gequetscht werden. Die stärkste und kürzeste Mastfütterung sind Erbsen, wenn man sie im Ueberfluß hat, oder, weil sie sich nicht weich kochen, nicht in der Küche nutzen kann. Sie werden mit heißem Wasser begossen, und bleiben so lange stehen, bis sie aufgequollen sind, dann werden sie den Mastschweinen unter ihr Getränke nach und nach gegeben. Mit acht bis zehn Metzen kann man in kurzer Zeit das größte Schwein fett machen. Den besten und wohlschmeckendsten Speck giebt die Roggenmast, wenn dieß Getraide mit gutem Wasser, oder mit Molken erweicht wird. Wenn man auf wilde Kastanien kochendes Wasser schüttet, um ihnen die Bitterkeit zu benehmen,

so

sind sie ebenfalls ein vortreffliches Mastfutter. Man hat auch jetzt in unsern Gegenden angefangen nach dem Muster der Engländer die Kleemast auszuüben, allein viele versichern, daß bey dieser Kost die Schweine nicht nur mit einem beständigen Durchfall geplagt würden, sondern auch der Speck eine übie Farbe bekäme, nicht lange dauerte und den guten gewöhnlichen Geschmack nicht hätte. Sie damit im Sommer groß zu füttern und ihnen dann im Herbst eine derbe Mast zu geben, wäre noch das zweckmäßigste *). Vor dem Bilsenkraute und den Pfefferkörnern muß man das Futter sichern, weil ihnen beydes Gift ist. Auch zu heiße und zu sehr gesalzene Brühe, z. B. von gesottenen Fischen, ist ihnen tödtlich.

Fortpflanzung.

Jeder Hauswirth muß die Anzahl der Schweine, die er hält, nach der Gegend, in welcher er wohnt, und

*) Ein geschickter Oekonome in unserer Gegend rühmt folgende Kleefütterung für die Schweine. Im Sommer füttert er den Klee grün, und zwar mit untermischter Fütterung von dem Abgang in der Küche und von Kleyen. Für den Herbst und Winter aber mäht er im Sommer solchen Klee, der noch nicht blüht, bringt ihn nach Hause auf die Futterbank, schneidet ihn klein, streut ihn auf den Boden, daß er welk und nach und nach trokken wird, wodurch er also seine Kräfte nicht verliert. Diesen getrockneten Klee brühet er alsdann mit heißem Wasser auf, vermischt ihn mit Gerstenschrot und versichert, daß er besser füttere als Kartoffeln oder Rüben.

nach den Nahrungsmitteln, die er ihnen mit Vortheil geben kann, bestimmen. Für Gutsbesitzer, Müller, Becker, Bierbrauer, Brandweinbrenner, Stärkfabrikanten, und für diejenigen Landleute, die Eichel- und Buchmast, oder sonst genugsamen Abfall von Getraide, Milchwerk, Gartengewächsen, Obst, Rüben, Kartoffeln ꝛc. haben, ist die Schweinezucht sehr rathsam.

Man rechnet auf einen Eber zehn bis zwölf Sauen. Zu einem guten Zuchteber wird erfordert, daß er breit, kurz, dick und untersetzt sey, einen kurzen stumpfen Rüssel, kleine feurige Augen, große und herabhängende Ohren, einen langgestreckten und dicken Hals, schmächtigen Bauch, schmalen Rücken, kurze und starke Schenkel, breite Keulen, viele Haare und wo möglich schwarze Borsten habe, weil man bemerkt hat, daß die weißen Schweine schwächer sind. Eine gute Zuchtsau aber muß langgestreckt und kurzbeinig seyn, einen spitzigen Kopf, lange Seiten, einen dicken und breiten Bauch, wenigstens zwölf lange Zitzen (Späne) haben, und von einem fruchtbaren Stamme seyn.

Die Schweine sind schon im achten Monate mannbar; man läßt aber den Eber sich nicht eher als nach einem anderthalbjährigen Alter begatten, und die Sau erst im zweyten Jahre (hauen). Die beste Zeit die Mutterfau belegen zu lassen, ist der Oktober und März; ob es gleich gebräuchlicher ist, sie vom September bis April zukommen zu lassen.

Da der Eber für sich nicht sehr hitzig, die Sau aber desto geiler ist, so wird er vorzüglich durch ihre

Reizun-

Reizungen in heftige Brunst gesetzt, und sie geht ihm auch nach, wenn sie schon trächtig ist. Mehrentheils bewirkt die erste Begattung sogleich die gehörige Befruchtung. Nach sieben Jahren sind beyde zur Zucht untüchtig, ob sie gleich ihre Zeugungskraft bis ins funfzehnte behalten. Die Mutter ist ohngefähr vier Monate dick, und man will bemerkt haben, daß eine einfarbige funfzehn, und eine gefleckte achtzehn Wochen trage. Sie wirft (ferkelt) unter allen Säugethieren die mehresten, nämlich 4 bis 24 Junge, hegt schlechte Sorgfalt für sie, indem sie dieselben auch sogar, ohne ein gehöriges Lager zu machen, hinlegt. Sie wird gleich nach dem Werfen wieder hitzig (braußig), und man kann ihr daher mit Vortheil den Eber des Jahrs zweymal zulassen. Wenn man sie um Martini belegen läßt, so fallen die Ferkel gegen den April in eine gelinde Jahrszeit. Will man sie aber in einem Jahre zweymal zur Zucht brauchen, so kann man zur ersten Begattung das Ende des Augusts wählen, so kommen die Junge im Jänner; hierauf folgt die zweyte Begattung, und die Junge erscheinen in der Erndtezeit. Wenn die Junge drey Wochen alt sind, so läßt man sie mit der Mutter auf die Weide gehen, damit sie Bewegung haben, und sich gewöhnen ihr Futter zu suchen. Sie dürfen nicht über sechs Wochen saugen, sondern (die Absetzferkel) müssen alsdann mit weicher Kost, als Abgängen von Milch, Mehl und Speisen erhalten werden, so auch, wenn die Mutter gleich nach dem Ferkeln stirbt. Von dem ersten Wurf, den die junge Sau thut, wählt man aus bekannten Ursachen keine Junge zu Zuchtschweinen, und keiner, weder

der jungen noch alten, läßt man mehr als acht durch ihre Milch nähren, weil sie sonst zu sehr abgemattet wird, und mehrere Junge nicht gedeihen können. Man schlachtet lieber die übrigen als Spanferkel nach vierzehn Tagen, oder verkauft sie. Sie sind, wenn sie gebohren werden, meistentheils weiß, da sie sich aber nachher immer im Kothe wälzen, so verändert sich ihre Farbe und wird schmutzig braun oder grau.

Vom zweyten bis zum sechsten Monate pflegt man sie zu beschneiden, und zwar, entweder im Frühjahr oder im Herbste, um der Gefahr, die entweder aus zu großer Hitze oder Kälte nach dieser Operation entstehen könnte, vorzubeugen. Auch die ausgedienten Alten beschneidet man in unsern Gegenden und mästet sie; ob man gleich diese Verstümmelung in andern Ländern an Alten und Jungen für unnöthig hält. Die Mästung gedeiht aber in der That beschnitten besser, weil sie sonst zu oft hitzig werden und dann zu jener Zeit nicht zunehmen; bey dem Eber das Fleisch auch seinen unangenehmen Geschmack behält.

Die Jungen werden gewöhnlich nur ein Jahr alt; man treibt sie im Sommer mit auf die Weide, steckt sie im Herbst, weil zu dieser Jahrszeit Futter im Ueberfluß da ist, und sie durch die Ausdünstung viel weniger, als im heißen Sommer verlieren, ein, und mästet sie acht bis zwölf Wochen, dann sind sie, wenn sie anders von guter Art waren, zum Schlachten tüchtig.

Den jungen Eber, den man zur Zucht ausgewählt hat, muß man in seiner Jugend von den Saumüttern absondern, damit er sich nicht schwäche. Eben so müssen

ihm

ihm die Hauzähne mit einer Zange abgebrochen werden, damit er keinen Schaden verursache.

Es fallen bey den Schweinen vierlerley Mißgeburten aus z. B. mit Elephantenrüsseln, mit acht Beinen u. s. w *).

Krankheiten **).

Diese Thiere sind vielen Krankheiten ausgesetzt, besonders werden sie leicht krätzig und lausig, welche Uebel man durch die Reinigung und öfteres Baden verhüten kann.

1) Die Seuche entdeckt sich durch wäßrige Augen, und Kopfhängen nach der Seite, Mattigkeit und Abneigung zum Fressen, und entsteht vom Genuß vieles schlechten Futters besonders auf dem Weideplätzen, wenn Mehlthau gefallen ist. Man macht einen sehr guten warmen Mehltrank, schüttet 1/2 Pfund graues klargemachtes Leberkraut, ein Stück rohen Ocker, eines Eyes groß, ein Loth pulverisirten Salpeter dazu, läßt das Thier hungern, bis es davon frißt; thut dieß etlichemal, bis es wieder Appetit bekömmt; mischt unter alles Futter eine Zeitlang Leberkraut und etwas Salpeter, und das Schwein geneset mehrentheils.

*) Goeze's Fauna a. a. O. S. 383.

**) s. der Thierarzt bey den Kranheiten der Schweine nebst einen Anhang von den Krankheiten der Bienen. Leipzig 1797.

2) Die Bräune (Feuer), welche eine Entzündung des Rachens und Halses ist, durch plötzliche Erkältung oder Mangel des Saufens bey großer Hitze entstehen soll, und an der schwarzbraunen Zunge, erschwertem Schlucken und Athemholen kennbar ist, wird oft glücklich durch den kühlenden Saft der Hauswurz (Sempervivum tectorum L.) mit dem Futter vermischt, gehoben. Da es aber oft schleunige Hülfe erfordert, so braucht man lieber wiederholtes Aderlassen, und einen warmen Breyumschlag um den Hals von Leinsaamen, Pappelkraut und Kamillen in Wasser gekocht; so dann kocht man Leinsaamen in Wasser und Milch, seiht es durch und sprützt es lauich warm dem Schwein mit einer Sprütze in den Hals. Sobald es schlucken kann, bringt man ihm häufig Salpeter bey.

3) Der Spaat und die Verrenktheit der Glieder, wo sie besonders den Hintertheil nicht gehörig führen können, verhindert man, wenn man die Mutterfau nicht im kalten Winter ferkeln läßt, die jungen Schweine warm und nicht zu lange eingesperrt hält. Wenn bey dieser Krankheit, die man auch den Hinterbrand, das Brandblut nennt, sich im Munde, an der Zunge und im Halse kleine Bläschen finden, und die Borsten, wenn man sie ausziehet, blutig sind, so giebt man ihnen alle Morgen eine Pille von einem halben Loth Antimonium, einem halben Quentchen Schwefel und einem halben Quentchen Kampfer mit ein wenig Mehl und Honig ein.

4) Der Zungenkrebs richtet auch oft große Niederlagen unter den Schweinen an (s. Ochs. S. 337).

5) Der

5) Der Durchfall, der von schlechtem Futter entsteht, wird dadurch gehoben, daß man in jedes Futter eine Hand voll klein geschnittene Tormentilwurzel thut.

6) Die Finnen (oder Franzosen) sind nach neuern Entdeckungen die Behältnisse für unbewafnete Augen unsichtbarer Würmer (Blasenwürmer*) und das Fleisch solcher Schweine ist so schädlich nicht, als man gewöhnlich sich einbildet. Als ein bewährtes Verwahrungsmittel gegen dieselben führt man an, daß jedes Stück gleich anfänglich bey der Mastung des Morgens nüchtern 1/2 Loth Spießglas mit etwas saurer Milch empfange, und daß man dieses nach 14 Tagen noch einmal wiederhole. Das beste Mittel soll seyn: Man nehme ein Nösel Kümmel, ein Nösel Salz, ein Nösel durchgesiebte Buchenasche, menge dieß unter einander und gebe täglich einem Schweine soviel man mit fünf Fingern greifen kann in das Getränke, davon wird das Schwein gereinigt.

7) Die Gall- oder Schwindsucht haben die Schweine, wenn sie abzehren und mager werden. Ein Loth Antimonium und 1/2 Loth venetianische Seife in Wasser aufgelößt und alle Tage eingegeben, soll diese Krankheit allzeit heben. Zuweilen werden aber auch die Schweine mager und bekommen einen trockenen

*) s. Goeze neueste Entdeckung: daß die Finnen im Schweinefleisch wahre Blasenwürmer sind. Halle 1784 m. e. Kupfert.

Husten, wenn sie Durst leiden müssen. Dieser Husten läßt sich durch Molken sehr leicht stillen.

8) Das Verfangen geschieht, wenn sie sich überfressen oder übersaufen. Es werden ihnen alsdann die Ohren kalt und die Freßlust verliert sich. Man schneidet ihnen in die Ohren, daß sie bluten, und giebt ihnen etwas Bergöhl oder Krummholzöhl ein.

9) Wenn sie die Pocken oder den Ausschlag bekommen, so braucht man zerstoßnes Spießglas mit etwas Schießpulver oder mit Senf, Ofenruß und Gerstenmehl, welches man ihnen auf die Zunge streut.

10) Sie bekommen auch leicht Beulen, und harte Geschwulste an manchen Gliedern. Das beste Mittel ist, dieselben, wenn sie weich sind, zu öffnen, den Unrath rein heraus zu drücken, und den Ort mit Talg und Theer zu beschmieren.

Feinde.

Der grimmige Wolf liebt das Fleisch der jungen Schweine gar sehr, und raubt sie also in den Gegenden, wo er zu Hause ist, von der Weide, und wo er kann, auch aus den Ställen.

Junge Schweine und Triebschweine werden von der großen und breiten Schweinslaus (Pediculus Suis. Lin.) geplagt. Bey den größern Schweinen verliehrt sie sich bey gutem Futter von selbst, und bey jungen kann man sie durch Waschung mit Holzlauge, oder

mit

mit Wasser, worin schwarzer Taback abgekocht ist, vertilgen.

Wenn sie beym Wühlen in der Erde eine Maulwurfsgrille (Gryllus Gryllotalpa L.) verschlucken, so zerkratzt sie ihnen den Magen und die Eingeweide, und sie sterben an der Epilepsie. Eben dieß erfolgt, wenn sie einen Molch (Lacerta Salamandra L.) verschlungen haben.

Es befinden sich auch viele Eingeweidewürmer in ihnen. In der Leber haußen Egelwürmer und große Blasenwürmer (Hydatigena orbicularis), letztre auch im Netze. In den Därmen findet man oft ganze Bündel Zwirnwürmer (Gordius), und besonders den großen Kratzerwurm (Echinorynchos Gigas); auch Haarwürmer (Trichocephalus Suis), Rundwürmer (Ascaris suum) und Fadenwürmer (Asc. filiformis). Den Finnenwurm (s. Krankheiten), welches eine Art von dicht zusammengewickelten Bandwurm (Taenia Finna) mit Saugblasen und Haakenkranz ist, findet man im Fleisch, und besonders unter der Zunge. Die Gestalt ist wie perlenartige Drüsen.

Nutzen.

1) Der ökonomische Nutzen dieses Thieres ist bekannt genug, da beynahe keine Haushaltung mehr ohne dasselbe bestehen kann; wiewohl der häufige Genuß des

Flei-

Fleisches eben nicht zu empfehlen ist *). Wenn das Mastschwein in seinem engen Koben allein, wie es ohnehin geschieht, ohne große Bewegung liegt, so gelangt es in kurzer Zeit zu einer außerordentlichen Fettigkeit. Man hat daher verschnittene Sauen geschlachtet, die sechs bis neun Centner wogen, deren Speck fast zu einer Dicke von einem Fuß aufgewachsen war, und in welchen die Mäuse, da solche Schweine beständig ohne aufzustehen an ihrem Troge liegen, und in dem fetten Fleisch keine Empfindung haben, sich eingefressen, ja sogar genistet hatten **). Man mästet und schlachtet aber gewöhnlich die Schweine, ehe sie ein Jahr alt sind; freylich sieht man hierbey nicht auf vielen und dicken Speck, sondern nur auf gutes Fleisch und schmackhafte Schinken. Zum Räuchern wählt man besonders gern den Speck der Müller- Becker- und Gerstenmast, da derjenige von der Brandweinsmast thranig, triefend, gelb und übelschmeckend ist. Die Englischen, Pommerschen und Mainzischen Schinken sind bekannt genug. Aus den jungen Ferkeln macht man eine besondre Delikatesse.

2) Daß

*) Die Mahomedaner dürfen dieses Thier nicht berühren, geschweige essen. Aus dieser Ursache sollen die Chineser sich nicht haben entschließen können, den mahomedanischen Glauben anzunehmen.

**) Der Graf von Büffon führt ein Englisches Schwein an, das 850 Pfund gewogen; und zu Ludwigsburg war 1775 ein 2 1/4 jähriges Schwein, das 884 Pfund wog, 9 Fuß 4 Zoll lang, und 4 Fuß 5 Zoll hoch war.

2) Daß man übrigens vom Schweine fast alles nutzen kann, weiß jedermann. Fleisch, Blut, Schmeer, Eingeweide, alles wird von Menschen gespeißt. Das Schweineschmalz braucht man außer zur Speise zu allerley Pomaden, als Wagenschmier, und um Pressen und andere Instrumente und Maschinen einzuschmieren. Ja der Arzt und Wundarzt weiß verschiedene Theile von ihnen zu Arzeneyen, und besonders ihr Schmalz zu Salben zu gebrauchen. Ein Pfund desselben mit einem Viertelpfund reinen Wachs in einem glaßirten Topf zusammen geschmolzen, ist eine gute Salbe für aufgesprungene Lippen und Hände.

3) Die Schweinsgalle ist ein wirksames Mittel wider die oft gefährlichen Dornstiche und wider alle Wunden; man hebt sie daher gern durchgeseihet in einem Glase auf.

4) Buchbinder, Sattler, Riemer und Siebmacher verlangen die gegerbte Schweinshaut; und mit den Haaren dient sie zu Decken vor die Stubenthüren u. s. w.

5) Die Borsten werden zu Bürsten, Pinseln, Kehrbesen, zu beweglichen Stielen bey künstlichen Blumen von den Putzmachern verarbeitet, und der Schuhmacher braucht sie an seinen Schuhdräthen statt der Nadeln.

6) Die Blase braucht man zu Tabacksbeuteln, um Flaschen zu verbinden, wie die Eingeweide um Würste hinein zu füllen, und zu Ballons.

7) Die

7) Die Zähne dienen zum Poliren, und man giebt sie auch den zahnenden Kindern in den Mund, um durch das Draufbeißen das Durchbrechen der Zähne zu befördern.

8) Der hitzige Dünger thut seine gute Wirkung in einem festen und nassen Boden und ist sonderlich bey Hopfenpflanzungen und dem Hanfbau der beste. Auch soll ein Guß von Schweinemist ein gutes Heilungsmittel für Pflanzen seyn, die der Frost getroffen.

In England werden seit einigen Jahren manche Tücher mit warm gemachten Menschenharn und diesem Mist gewalken, und diese Walke hält man bis jetzt noch in England geheim.

9) Daß einige Gegenden Deutschlands und auch Thüringens durch Verschickung der Schinken, Würste und des Specks viel Geld gewinnen, und daß den Seefahrern dieses geräucherte und eingesalzene Fleisch unumgänglich nöthig ist, erhöhet den Verdienst dieses Thiers noch mehr. Allein es macht sich auch in andrer Rücksicht gar sehr verdient. Selbst das bloße Wühlen im festen, filzigen Boden ist nicht immer unnütz, zu geschweigen, daß dadurch viele noch unvollkommene, nagende, und andere nach ihrer vollkommenen Entwickelung dem Pflanzenreich schädlich werdende Insekten getödtet werden.

In Ungarn treibt man um die Heuschrecken zu vertilgen viele hundert Schweine auf die Felder, und bey uns treibt man sie im Herbst zur Ausrottung der Feldmäuse in die Haferstopfeln. Hier wühlen sie

nicht

nicht nur die Nester dieser Mäuse auf um den eingetragenen Hafer zu verzehren, sondern fressen auch die Maus, die sie antreffen, und zwar zuerst.

10) Wegen ihres feinen Geruchs kann man sie zu Aufsuchung der Trüffeln abrichten.

11) Durch ihre Freßbegierde reinigen sie die Luft von den Pestdünsten gestorbener Thiere, abgestandener Fische und andern Aeses.

Schaden.

Die hungrigen säugenden Sauen haben oft kleine Kinder gefressen.

Von Gärten und Wiesen müssen diese Thiere abgehalten werden, weil sie dieselben durch ihr Wühlen nach Wurzeln, Insektenlarven und Würmern ruiniren.

Die Krebse muß man von ihnen entfernen, sonst sterben sie. Wenn man mit einem Kober voll Krebse durch eine Heerde Schweine geht, so bekommen sie gleich Verzuckungen und sterben.

Zu den alten Vorurtheilen kann man rechnen, daß man sonst frische Schweinsbrühe, Mist, Gehörknochen, Zähnen, Geilen und andere Theile in der Medicin brauchte.

b) Das wilde Schwein.

(Taf. IV. Fig. 2.)

Namen, Schriften, und Abbildungen.

Schwarzwild, Schwarzwildpret; sonst wilde Sau; das männliche Geschlecht Keuler und das weibliche Bache. So wie der Hirsch edel heißt, so wird das wilde Schwein seines Muthes und seiner Stärke wegen ritterliches Thier genannt.

Sus Scrofa ferus. *Gmelin Lin.* l. c. a).

Sanglier et Marcassin. *Buffon* hist. nat. V. 99. t. 14. 17. f. 1. Ed. de Deuxp. I. T. V. f. 1. 2. Ueberf. von Martini II. 35. Taf. 18. F. 1. Taf. 19. F. 1.

Wild Hog. *Pennant* l. c.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 189.

v. Mellins Anweisung zu Anl. der Wildbahnen. 172. m. e. Fig. 178. m. e. Fig. u. Fährten.

Goeze's Fauna. III. 394.

Donndorfs zool. Beytr. a. a. O. a).

Ridingers jagdb. Thiere Taf. 6.

Gestalt

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Thiere, die in allen Welttheilen, die kältesten Zonen ausgenommen, verbreitet sind, unterscheiden sich vorzüglich von den zahmen Schweinen durch ihre schwarze, grau- oder bräunlich schwarze Farbe, woher eben dieser weidmännische Ausdruck Schwarzwildpret stammt, durch den längern Kopf, gröbern Rüßel (Gebrech, Wurf), mehr gebogenen Vorkopf, durch die vier größern Eckzähne, welche sie mit auf die Welt bringen, wovon die obern das Gewerft, Gewehr und die untern die Hauer, Haderer heißen, durch die kürzern, rundern, mehr aufrecht stehenden Ohren, stärkere Beine (Läufte), entferntere Klauen, steifere Borsten, den kürzern und fast gerade herunter hängenden Schwanz (Pürzel, auch Krückel). Durch ihre Waffen, die zwey großen krummen, scharfen Zähne in jeder Kinnlade, wovon die untern den Rüßel fletschend aufsperren, bekommen sie ein fürchterliches Ansehen. Diese untern Zähne besonders wachsen mit dem zunehmenden Alter immer fort, ragen im vierten Jahre drey Finger breit über das Gewerft hervor, und werden im sechsten Jahre gelblich, so daß nur die Spitze weiß bleibt. Der Eber (Keuler) haut damit nach der Seite zu beständig über sich, und einem liegenden Menschen kann er daher nicht leicht großen Schaden zufügen; die Sau (Bache) aber, die keine hauenden Zähne, sondern nur kurze Haaken hat, haut mehr unter sich, reißet, beißet und wird daher auch dem Liegenden furchtbar. Der Keuler wetzet sie durch das Anstreichen an den obern so scharf, wie ein Messer.

Wenn er aber erst sieben Jahr erreicht hat, so kann er mit denselben keinen großen Schaden mehr verursachen, denn alsdann sind ihm die Spitzen halbmondförmig einwärts nach den Augen zu gewachsen, und verbieten ihm den schädlichen Gebrauch derselben.

Obgleich die mehresten Thiere dieser Art eine schwärzliche Gestalt haben, durch die schwarzen, oben in eine graue oder röthliche Spitze sich endigenden Borsten (Federn), welche die Ohren, den Schwanz und die Beine ganz schwarz, den übrigen Leib aber rußschwarz machen, so giebt es doch auch Verschiedenheiten, und es werden graue, weiße und halb schwarz und halb weißgefärbte unter ihnen gefunden. Unter diesen Borsten, die besonders auf dem Rückgrat weg sehr stark und lang sind, befindet sich eine Lage kurzer Haare, die fein, wollig und grau ist, im Winter sehr dicht wird, ihnen als ein Winterpelz sehr nützlich ist, und unsern zahmen Schweinen als entbehrlich meistens fehlt. Diese Wollenlage verwandeln die alten Keuler, wenn sie sich in der Brunstzeit in ihren harten Kämpfen an den Vorderschultern (Blättern), und auf dem Rücken über den Keulen verwundet haben, durch das Reiben an harzigen Fichten und Kiefern in einen dicken Panzer (Harnisch), an welchem Kugeln und Spieße abprellen. Solche Schweine bekommen auch den eigenen Namen Panzer- oder Harnischschweine. Im Alter färben sich Stirn, Rüßel und Schultern grau.

Sie leben 20 bis 25 Jahre.

Ihre Stimme, die sie besonders im Kampfe hören lassen, ist so wie ihre übrige Gestalt, Eigenschaften und

Betra-

Betragen den Hausschweinen ziemlich gleich, nur daß sie dieselben noch in der Größe übertreffen, und einen weit schärfern Geruch (Witterung) und das feinste Gehör haben *). Ein ausgewachsenes Schwein ist fünf Fuß vier Zoll lang, und drey Fuß zwey Zoll hoch **), doch macht die häufige und gute Nahrung bey diesem gefräßigen Thiere, daß es oft noch eine ansehnlichere Größe erreicht und zwey bis vierhundert Pfund wiegt.

Der Keuler macht sich von der Bache von weiten durch die längern, weit heraus stehenden Zähne, wodurch sich der Rüßel stark in die Höhe wirft und durch den mit einem Haarbüschel umwachsenen Zeugungstheil kenntlich.

An den innern Theilen findet sich bey der Zergliederung kein Unterschied zwischen den wilden und zahmen Schweinen.

Aufenthalt.

Die wilden Schweine werden in Thüringerwalde fast allenthalben, wo die Natur ihnen ihr Futter nicht versagt, und wo man ihre Vermehrung nicht vorsätzlich hemmt, angetroffen. Sie befinden sich gern im dicken Gebüsche, das an nasse und sumpfige Gegenden (Laug) gränzt, und wechseln ihren Aufenthalt nach ihren Nahrungsbedürfnissen. Sie lieben die Gesellschaft, und man sieht oft einen Haufen (Häufel, Schaar, Rudel, Rotte)

*) Der Vers ist ja bekannt: Aranea tactu: aper auditu.

**) Par. Mes. Ueber 4 1/2 Fuß lang und fast 3 Fuß hoch.

von 40 Stücken, die zusammen leben und sich mit gemeinschaftlicher Stärke gegen die Anfälle der Raubthiere vertheidigen. Daß dieß letztere ein Grund ihrer Gesellschaftlichkeit ist, erkennt man unter andern daraus, daß sobald nur eins zu Grunzen anfängt, sich die ganze Nachbarschaft zur Gegenwehr rüstet. Eine solche Gesellschaft aber besteht aus etlichen Sauen mit ihren Jungen (Frischlingen), aus zwey- und dritthalbjährigen männlichen und weiblichen Schweinen, heißt im vorzüglichen Verstande ein Rudel Schwarzwildpret und nur selten trifft man auch einen alten Keuler (Hauptschwein, hauend Schwein) dabey an. Wenn das männliche Schwein 2 1/3 Jahr alt ist, so geht es vom Rudel (Schwarzwildpret) ab, und bekommt den Namen eines angehenden Schweins; sobald es aber drey Jahr alt ist, heißt es ein dreyjähriger mit dem vierten ein vierjähriger und mit dem fünften ein fünfjähriger Keuler, oder hauendes Schwein; alsdann ist es ein Hauptschwein. Diese alten Keuler leben alle, wie die Einsiedler, allein, und verachten die jungen Schweine.

Ihr Lager, welches sie sich zu ihrem gewöhnlichen gesellschaftlichen Aufenthalt verfertigen, findet man im dickſten Walde, in trockenen Gründen und Brüchen, und ist ein weites aufgewühltes Loch, welches sie mit Reißern, jungem Holz, das sie auch selbst mit ihren Hauern abschlagen, mit Laub und Moos dicht auszufüttern und weich zu machen wissen, und welches man seiner Tiefe und Rundung halber einen Kessel zu nennen pflegt. Hierinn bringen sie mehrentheils den ganzen Tag zu.

Nah-

Nahrung

Die Zeit ihrer Nahrung (Gefräß, Fraß, Schütt) nachzugehen, ist der Abend, und sie besuchen die Wiesen und Aecker. Im Vorsommer müssen sie mit bloßem Gras, Kräutern, Wurzeln, Würmern und Insecten, denen sie oft durch die Stärke ihres Kopfs und Rüssels zwey Ellen tief in der Erde nachgraben (nachbrechen), vorlieb nehmen. Hierbey thun sie den Wiesen, wo viel Kümmel und die Eberwurz wächst, deren Wurzeln sie vorzüglich lieben, den größten Schaden; indem eine kleine Familie in einer einzigen Nacht einen guten Wiesenacker in einen gepflügten Feldacker verwandeln kann. Im Sommer ziehen sie sich in Feldern nach den Erbsen- Linsen- Hafer- Kraut- Rüben- und reifenden Roggenäckern, und richten daselbst keine geringe Verwüstungen an. Der Herbst verschafft ihnen dann endlich ihr eigentliches Futter durch die Eicheln, Bucheckern, Kastanien, und das Holzobst, deren Genuß sie etliche Meilen weit von ihrem Standorte lockt. Die sogenannte Erdmast, die aus Klumpen Maden besteht, welche häufig in nassen Herbsten unter dem Moose angetroffen werden, und sich in eine Art von Raubfliegen (Asilus) entwickeln, macht sie vorzüglich feist. Ihre Leckerbissen sind die Haselnüsse und Trüffeln, denen sie sehr geschickt nachgraben und welche ihrem Wildpret einen sehr angenehmen Geschmack geben. Im Winter gehen sie auch das Aas, besonders des Pferdes, womit die Füchse in Wäldern gefüttert werden, an (ludern), und graben tief nach den Farrenkrautwurzeln.

Fortpflanzung.

Nur in der Begattungszeit (Brunst, Brunft, Rollen), die in das Ende des Novembers und Anfang des Decembers (um Andreä) fällt, und fast fünf Wochen, ja oft bis in den März dauert, gesellen sich die alten Keuler zu den Bachen, und jagen (preschen) alsdann die jungen vom Rudel weg in hitzigen und blutigen Kämpfen. Zu dieser Zeit sind sie ohnehin in einer Art von Wuth, die sich durch Knirschen und den stark mit Schaum umflossenen Rüssel bemerklich macht, und fürchterlich gegen jeden aufstoßenden Nebenbuhler ausbricht; auch geben sie alsdann einen besonders starken, süßekeln Geruch von sich, den die Hunde sehr weit wittern. Sie haben in ihren Kämpfen eine besondere Stellung. Sie streifen sich mit den Schultern und Rücken scharf an einander, und wenden den kurzen Hals so, daß der Kopf des einen, die Schultern des andern mit den Zähnen berührt; alsdann schlagen sie die Zähne in die Schultern, und reißen zuweilen so stark und tief ein, daß die Verwundung gefährlich wird. Gewöhnlich suchen sie alsdann das Harz der Fichtenbäume auf, dessen Balsam die Wunde heilt. Die alten einsiedlerischen Eber sind die grimmigsten, und man findet an ihnen oft sehr viele große und harte zugeheilte Narben, welche Beweise ihrer ehemaligen Tapferkeit sind.

Die Bache wird oft zweymal des Jahrs hitzig, und die jungen Schweine halten die ordentliche Paarzeit auch nicht, sondern gerathen entweder früher oder später in die Brunft, nachdem ihre Nahrung gut oder schlecht ist.

Eine

Eine Bache trägt vier Monate, oder achtzehn bis zwanzig Wochen, und gebiert (frischt) um Lichtmesse oder Fastnacht vier, fünf und acht, auch wohl zwölf Junge. Wenn sie ihre Stunde nahe fühlt, verläßt sie ihre Gesellschaft und Familie, und verbirgt sich in ein Dickig, woselbst sie sich und ihren Jungen ein sanftes Lager von Aesten, Moos und Laub, das sie im Rüssel zusammenträgt, unter einen dichten Baum oder Strauch, zubereitet. Die Jungen bleiben drey Tage hier so stille liegen, daß man sie betasten kann. Nach acht Tagen aber entfernen sie sich schon mit ihrer Mutter. Sie säugt dieselben, wie die zahme Sau, sucht nach zwey Monaten, wenn sie im Laufen ausdauern können, mit ihnen ihre alte Gesellschaft wieder auf, und behält sie so lange um sich, bis sie wieder frischen will.

Von dem Lager ihrer Jungen entfernt sie sich aus heißer Mutterliebe nicht weit, kömmt beym geringsten Geschrey derselben, wie eine Furie, zu ihrer Beschützung herbeygerennt, und fährt mit äußerster Wuth und ohne Schonung gegen den Feind los, der ihr dieselben rauben will *). Wenn die Mutter durch ihr scharfes Gehör und ihren sehr feinen Geruch von weitem Gefahr merkt, und dieß durch starkes Schnauben und Grunzen zu erkennen giebt, so suchen sich die Jungen augenblicklichst unter die dicksten Sträucher, in altem Laube oder im

*) Fast bey allen wilden Thieren ist es gewöhnlich, daß das Männchen zur Begattungszeit, das Weibchen aber, nachdem es die Jungen zur Welt gebracht hat, am wildesten und grausamsten ist.

im Gras zu verbergen, und lauern und horchen da so lange mit der größten Stille, bis die Alte wieder ruhig ist. Sie sind anfangs rothgefleckt, mit schwarzen, braunfalben und weißen Streifen, welches ihr bunter Rock heißt, und üben sich sehr bald im Kämpfen. Sechs Monate heißen sie Frischlinge, alsdann aber bis sie 2 1/2 Jahre alt werden, übergegangene Frischlinge, oder die Männchen Beckerlein, und die Weibchen Bachslein. Sie werden sehr zahm, laufen sogar im Wald und kommen wieder zurück.

Krankheiten.

Diese wilde Rasse ist den Krankheiten nicht ausgesetzt, welche die zahme so leicht befällt, hat auch keine Finnen*); doch sterben sie manchmal für Hunger in sehr harten Wintern, wo sich dann oft in einem Lager sechs bis acht beysammen legen und ruhig einschlafen.

Auch allzuheiße Sommer (wie 1782) verursachen ihnen den Brand, das Feuer oder die Bräune, woran zuweilen ganze Gegenden aussterben. Z. B. 1796 im Anhalt-Bernburgischen.

Feinde.

Der Wolf raubt Frischlinge und junge Schweine, wobey das ganze Rudel sich ihm in einem Kreise entgegen stellt. In Gesellschaft fällt er auch die alten an. Sie werden auch von den Blasenwürmern (Hydatigena), Haarwürmern (Trichocephalus) und

*) Diese findet man aber in derjenigen wildern Rasse, die aus der zahmen entsprungen ist. v. Mellin Unterricht große Thiergärten anzulegen. S. 183.

und Egelwürmern geplagt. Da man in der eigentlich wilden Rasse keine Finnenwürmer antrifft, so schließt Hr. Hofr. Blumenbach (s. Handbuch der N. G. 8te Aufl. S. 415.), daß die Finnenwürmer ein Beyspiel von organisirten Körpern wären, die erst lange nach der Schöpfung gleichsam nachgeschaffen zu seyn schienen.

Jagd.

Die Gegenwart der wilden Schweine in ungewöhnlichen Orten spürt der Jäger an der Fährte, die sie den Hirschen ähnlich machen, nur daß die ungeraden Klauen (Schalen) nicht so tief, als die Ballen eingedrückt, und die Schritte kürzer sind (Tab. XXIV. Fig. 17.). Wer die zahme Schweinefährte kennt, kennt auch die wilde, nur daß die zahmen, jung und alt, abgenutzte Schalen haben, und keinen Beytritt machen. Die wilden machen nämlich die vordere Fährte allezeit stärker, als die hintere, und treten mit dem Hinterlauft allezeit in die Vorderfährte, nur ein wenig mehr auswärts, weil sie hinten breiter als vorne sind. Die Afterklauen setzen sie allemal ein. Die Jungen haben schärfere Schalen, schreiten mit geschlossenen Spitzen, und drücken ebenfalls die weiter aus einander gedehnten Afterklauen in den Boden.

Ihre Jagd, die von St. Galli bis heilige drey Könige dauert, ist sehr gefährlich, und Hunde und Jäger befinden sich dabey in Lebensgefahr. Bey Verwundungen durch die Büchse rennen sie rasend nach

dem Orte zu, wo der Schuß herkam, und hauen entweder im Vorbeylaufen nach der Seite hin, oder stemmen sich, wo es möglich ist, mit dem Hintertheile des Leibes an einen Baum, und fechten so mit der größten Wuth und Verzweiflung gegen eine Menge Menschen und Hunde. Gegen die wilden Hetzhunde suchen sie ihren Hinterleib in einem Bache, Sumpf, Dickig oder Dornstrauch zu sichern, und hauen alsdann fürchterlich um sich.

Sie werden zu den grausamen Hetzjagen durch aufgestellte Fallgarne, in welche sie gescheucht werden, und wo man ihnen mit einer Zange den Rüssel zukneipt, lebendig gefangen.

Mit dem kleinen Zeuch werden sie eingelappt, und man schießt sie entweder, oder sie werden durch den Anruf: Huy-Sau! auf welches Wort, dessen Laut sie in Zorn setzt, sie auf den angestellten Jäger blind zu rennen, durch ein Fangeisen (Schweinespieß) an der Brust durchstochen (abgefangen). Diese letztere gefährliche Art zu tödten ist die gewöhnliche beym Schwarzwildpret, und macht ein vorzügliches Stück der Jägerkunst aus, weil wirklich viel Fertigkeit und Stärke dazu gehört, die Brust eines wüthenden Ebers zwischen den Vorderfüßen zu zerspalten.

In Streifjagen werden sie durch die abgerichteten Hunde (Saufinder, Finderhunde) aufgesucht, vor welchen sie sich stellen, dann durch die losgelassenen Hetzhunde gepackt, und vom Jäger abgefangen werden.

Man

Man schießt sie auch Abends, wenn sie zu Felde ziehen, auf dem Anstand von einem Baume herab, oder erlegt (pürscht) sie in Wäldern durch Geschoß, indem man sie die Finderhunde aufsuchen läßt, oder an einem Platz, wohin man Gerstenmalz, Erbsen und Kartoffeln wirft, und sie dadurch herbey lockt. Ein solcher Platz heißt die Saukirre.

Ihre Jagd ist am gewöhnlichsten und besten im November (nach Martini) wo sie am feistesten, aber auch am grimmigsten sind. Im December spürt man sie allenthalben.

Wenn man ein Bestätigungsjagen auf sie anstellen will, so dürfen sie nicht zu enge bestätigt werden, sonst gehen sie wegen ihres scharfen Geruchs durch.

Sie gehören zur hohen Jagd.

Nutzen.

1) Das Fleich (Wildpret) der wilden Schweine ist eine bessere und gesündere Kost für die Menschen, als das der zahmen. Es ist trocken, mürbe, leichter zu verdauen, weil sie sich beständig bewegen, folglich ihre Nahrungsmittel mehr ausarbeiten, und nicht so vielerley unverdauliches Futter genießen. Sie setzen oft, wenn sie gute Eichel- Buch- und Erdmast haben, sehr dick Speck an. Man macht gute Schinken und Ribbenbraten aus ihrem Fleisch, und Würste aus ihrem Blute. Der wilde Schweinskopf macht, wie bekannt, durch seine Zubereitung, eine besondere Delikatesse aus. In

der

der Brunftzeit verdirbt das Wildpret in etlichen Stunden, und nimmt einen sehr starken und widrigen Geruch an, wenn man die Hoden (Kurzwildpret,, nicht gleich wegschneidet *).

2) Die sehr dicke Haut (Schwarte) wird roh zu Ranzen, Kumten und Decken vor die Thüren und in Chaisen verbraucht, und das gegerbte Fell zu Riemen, Büchern, Schuhsohlen, Sieben und auf mancherley Weise mehr genutzt. Man macht auch Pergament aus den Häuten. Die Tunguseu tragen die Häute mit den Haaren auswärtsgekehrt als ein Kleidungsstück, welches ihnen ein thierischwildes Ansehen giebt **).

3) Die Zähne poliren und glätten.

4) Die Haare haben eben denselben und einen noch vorzüglichern Gebrauch als die Borsten der zahmen Schweine. Die Wolle läßt sich spinnen und zu Unterfütterungen gebrauchen.

5) In der Medicin brauchte man sonst die Zähne, und das Schmalz braucht man jetzt noch zu erweichenden Salben.

6) Man

*) Die Alten pflegten die jungen Ferkel von wilden Schweinen, wenn sie sie habhaft werden konnten, zu verschneiden, und wieder laufen zu lassen; sie wurden dadurch viel feister und ihr Wildpret weit schmackhafter.

**) Georgi Reisen I. 164.

6) Man sollte den Versuch, unsere Zuchtschweine durch Einfangung und Zähmung männlicher wilder Frischlinge zu veredeln, den man doch nicht ohne Vortheil will gemacht haben, ernstlich wiederholen.

Schaden.

Den Wiesen und Aeckern sind sie schädlich, und sollten also nur in solchen waldigen Gegenden gehegt werden, wo sie dem armen Landmann nicht so sehr zur Last fielen *).

*) Wie alles Wildpret zum Nutzen und Vergnügen der Fürsten und reicher Gutsbesitzer erhalten, und alle Klagen des Landmanns über Wildschaden verhütet werden können, darüber lese man das so eben erschienene, auf eigene Erfahrung gegründete, vortreffliche Werk des Herrn Reichsgrafen von Mellin: Unterricht eingefriedigte Wildbahnen oder große Thiergärten anzulegen und zu behandeln. Mit Kupfern. Berlin bey Maurer, 1800.

Zweyte Ordnung.

Säugethiere mit Zehen. Digitata.

Erster Abschnitt.

Raubthiere. Ferae.

Die Vorderfüße der Thiere dieses Abschnitts sind mehrentheils größer, als die Hinterfüße, und bilden daher eine größere Vorder- als Hinterfährte.

Es fallen ihnen, so wie den wiederkäuenden Thieren, die Vorderzähne in ihrer Jugend aus, erst die obern und dann die untern.

Sie nützen vorzüglich durch Vertilgung der den Oekonomen schädlichen kleinen Nagethiere und durch ihren Balg.

Die achte Gattung.

Hund. Canis.

Kennzeichen.

In der obern und untern Kinnlade stehen sechs gleich lange Vorderzähne, wovon einige tief gefurcht sind.

Die Eckzähne stehen einzeln, sind lang, spitzig, und gekrümmt.

Die Backenzähne sind zackig, und sechs bis sieben auf jeder Seite.

An den gespaltenen Füßen sind vorne fünf, und hinten vier mit unbeweglichen Nägeln versehene und an der untern Fläche hinten durch eine Art Schwimmhaut verbundene Zehen.

Die Fährten dieser Thiere sind einander sehr ähnlich und gehen bey den wilden in einer Linie weg d. h. sie schnüren; sie laufen geschwind, besteigen aber die Bäume nicht.

Ihre Nahrung besteht vorzüglich in Fleisch, daher sie auch heißhungrig und reißend sind. Doch leben sie nicht bloß von lebendigem Raube, sondern genießen auch Aas.

Das

Das Weibchen hat mehrentheils zehn Säugwarzen, vier an der Brust und sechs am Bauche; die an der Brust fehlen dem Männchen. Dieses hat eine höckerige Ruthe, wodurch bey der Vermischung ein Zusammenhängen verursacht wird. Sie bringen mehrere Junge zur Welt, und diese pflanzen sich noch im ersten Jahre fort.

Von dieser Thiergattung kennen wir in Deutschland und Thüringen drey Arten.

(9) 13. Der gemeine Hund.

Namen, Literatur und Abbildungen.

Hund, eigentlicher Hund. Das Männchen heißt: Hund, Räder, und das Weibchen: Hündin, Fäche, Batze, Debe, Teve, Betze, Luppe, Tiffe, Thöle, Zippe, Tache, Brücke, Metze, Lusch, Zaupe, Zatze, Lutsche und Tausch.

Canis familiaris. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 65. n. 1.

Chien. *Buffon* hist. nat. V. 185. Ed. de Deuxp. I. 224. Uebers. von Martini und Otto II. 88. XV. 84.

Faithfull Dog. *Pennant* hist. of Quadr. I. 225. Meine Uebers. I. 243.

v. Zim-

v. Zimmermanns geogr. Zool. I 130.

Naturgeschichte der Hunde nach ihren verschiedenen Arten ꝛc. Augsburg 1790.

v. Mellins Anweisung zu Anlegung der Wildb. 1799.

Der Freund der Schooshündchen. Ein Neujahrsgeschenk für Damen. 1797.

v. Schrebers Säugeth. III. 318.

Donndorfs zool. Beytr. I. 150. n. 1.

Kennzeichen der Art.

Mit einem krummen mehr oder weniger in die Höhe und mehrentheils nach der linken Seite zu gebogenen Schwanze.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Hund ist seit langen Zeiten auf der ganzen Erde, wie der Mensch, ausgebreitet, und es ist daher schwer zu bestimmen, welches sein eigentliches Vaterland ist, wo er sonst allein als wildes Thier gewohnt, und dann von da sich allenthalben fortgepflanzt hat *). Man nimmt

*) Die sogenannten wilden Hunde, welche man jetzt in Congo und Unteräthiopien u. s. w. antrifft, und

nimmt dafür Ostindien an, weil er daselbst in den ältesten Zeiten bekannt war, und von da nach Afrika und Europa verhandelt wurde. Noch schwerer aber ist zu bestimmen, ob er nur einen Stammvater hat, wofür man den Schäferhund hält, und ob dann die Abänderungen bloß den verschiedenen Himmelsstrichen und Nahrungsmitteln zuzuschreiben sind, oder ob nicht vielmehr wegen der großen Verschiedenheiten und Abweichungen in der körperlichen Bildung mehrere Thierarten als Hundeschöpfer angenommen werden müssen, durch deren Vermischung alsdann die verschiedenen Rassen leichter erklärt werden können. Neuere behaupten sehr wahrscheinlich, daß die Hunde keine eigentlich ursprüngliche Thierart ausmachten, sondern daß der Wolf, Schakall *) und Fuchs ihre Stammväter, und durch diese verschiedene Vermischung, durch Nahrung und Klima die mannichfaltigen Hunderassen entstanden wären **).

Die äußere Gestalt dieses Thieres ist folgende.

Der

die in ganzen Heerden beysammen leben, scheinen eher eine verwilderte zahme Rasse, als die eigentliche wilde Stammrasse zu seyn.

*) Canis aureus, auch Goldwolf. Er ist wie ein Spitz gestaltet, und hat die Größe zwischen dem Wolf und Fuchs. Er wird in Asien häufig angetroffen. B. d. Richt. 15, 4.

**) Es scheint, als wenn man in der Naturgeschichte in Ansehung des Ursprungs der Hunde nie aufs reine kommen würde.

Der Kopf steht horizontal, ist immer länglich, hat einen flachen vorwärts abhängigen Scheitel, an dessen Hintertheile meist eine scharfe Erhöhung der Länge nach fühlbar ist. Die Schnauze, von den Augen an gerechnet, macht ohngefähr die Hälfte des Kopfes aus. Die Unterlippe wird an dem nackten und gezähnelten Seitenrande von der obern bedeckt. Die Nase ragt über der untern Kinnlade hervor, ist chagrinartig und immer feucht. Die Nasenlöcher sind halbmondförmig und auswärts umgebogen. An den Seiten des Mundes befinden sich fünf oder sechs Reihen borstenartiger Haare. In beyden Kinnladen stehen sechs Vorderzähne parallel und senkrecht, wovon einige an einer oder beyden Seiten eingekerbt sind, die äußersten in der obern Kinnlade nicht genau an die innern schließen, und die äußersten in der untern Zäckchen zur Seite haben. Die gekrümmten längern Hundezähne stehen einzeln. In der obern Kinnlade sind auf jeder Seite sechs und in der untern meist sieben Backenzähne, wovon die vordern schmal und vielspitzig sind. Ueberhaupt hat der Hund gewöhnlich 42 Zähne. Die Zunge ist lang, etwas flach und glatt. Die Augen stehen ein wenig schief, und am innern Augenwinkel bemerkt man eine kleine Nickhaut. Die Ohren sind zugespitzt, bald hängend, bald aufgerichtet, der obere Rand der Gehöröffnung ist umgebogen, der hintere Rand zweyfach und der vordere dreyfach. Im Gesichte sind sieben mit Haaren besetzte Warzen. Der Hals ist rund, beynahe so lang als der Kopf, der Leib fast rund, und, so weit als die Brust geht, stark und hinten dünner. Das Weibchen hat an jeder Seite

fünf, selten nur vier Brüste, nämlich an jeder Seite der Brust zwey und des Bauchs drey. Die hintern Beine sind etwas höher, als die vordern. Vollkommene Zehen haben sie eigentlich nur vier, der fünfte ist ein unvollkommener Daumen an dem Hintertheile der Füße. Die Ferse sieht man höher an den Beinen, als eine kahle Zehe ohne Klaue. Den Schwanz (Ruthe) tragen alle Hunde mehr oder weniger in die Höhe, und mehr oder weniger krumm gebogen. Ihr ganzer Körper ist dicht mit Haaren besetzt *), wovon die auf dem Rücken härter, als die übrigen sind.

Die Farbe ist, wie bey allen zahmen Thieren, sehr verschieden, und in den Haaren der Haut lassen sich funfzehn Näthe deutlich unterscheiden, eine auf jeder Seite hinter dem kleinern Augenwinkel, eine auf jeder Seite in einem halben Cirkel um das Ohr herum, eine auf jeder Seite von dem Ohr an mit verschiedenen Biegungen an dem Halse herunter bis zu dem obern Ende des Brustbeins, wo sie von beyden Seiten in einem Winkel zusammenstößt, eine, die von dem obern Ende des Brustbeins über dasselbe herunter bis zu der untersten Spitze läuft, eine auf jeder Seite des Bauchs zwischen dem Nabel und den Weichen, eine überzwerg auf jeder Seite am After, eine hinten an jedem Beine, bis an die Ferse. Man bemerkt diese Näthe besonders sehr deutlich an den kurzhaarigen Hunden, und diese Thiere unterscheiden sich dadurch sehr merklich von den andern,

die

*) Nur der Türkische nackte Hund macht hier eine Ausnahme.

die zu dieser Gattung gehören, vom Fuchs und Wolf.

Die Stimme ist bey den meisten knurrend, bellend und heulend, bey einigen bloß heulend, und bey andern, z. B. den Isländischen, bloß leise murrend. Sie geben dadurch ihre Leidenschaften zu erkennen, und es ist wunderbar, daß viele Hunde den hellscheinenden Vollmond, fürchterliche Gestalten, blasende Instrumente, das Geläute der Glocken u. s. w. verabscheuen, und dieß durch gräßliches Heulen zu erkennen geben. Besonders eigen ist ihnen auch noch, daß sie sich auf allem Aase wälzen *).

Ihr zunehmendes Alter kann man einigermaßen daran erkennen, daß ihre Haare dunkler stumpf und ungleich, und im hohen Alter an der Schnauze, auf der Stirn und um die Augen grauer, die Zähne schwarz, stumpf und ungleich werden, und im Alter ausfallen. Sie überleben zuweilen zwanzig Jahre, und werden im Alter gern blind und taub **).

*) Ihre Eigenschaften der Seele siehe Nutzen.

**) In Gotha habe ich einen weißen Spitzhund gekannt, der über 26 Jahr alt wurde. Freylich ward er wie ein alter Mensch gepflegt, denn er bekam in seinen alten Tagen nichts als weißes Brod und kräftige Fleischbrühe, ward sogar eingesiegelt, wenn der Besitzer weggieng, so lieb hatte er den alten treuen Gefährten. Er war zuletzt fast ganz blind und gänzlich taub.

Wir führen hier folgende jetzt bey uns einheimische Hauptrassen, die man reine nennen kann, an, deren Bildung merklich von einander abweicht, und denselben wird man die Spielarten, welche durch die mannichfaltige Vermischung entstehen, und die man in einfache, doppelte und dreyfache u. s. w. Blendlinge eintheilen kann, leicht unterordnen können, so wie ich es von den bekanntesten selbst thun will*). Die Ausbreitung jeder Rasse in ihren Varietäten aber genau anzugeben, ist fast unmöglich, da sie aus so vielen Ursachen so mannichfaltig ausfallen müssen.

1) Der Haushund (Hofhund, Heidehund, Spitz, Pommer).

Canis familiaris pomeranus, Lin. Chien Loup. *Buffon* 242. T. 29. Ed. de Deuxp. I. T. 7. f. 3. Martini Uebers. II. 165. Taf. 24.

Die

*) Sonst macht man auch folgende vier Abtheilungen unter den Hunden: 1) Hunde mit langem Kopf und dicker Schnauze. a) Bauernhund, b) großer Dänischer, c) Jagdhund, d) Spürhund, e) Hühnerhund, f) Dachs, g) Pudel. 2) Mit langer enger Schnauze. a) Der Spitzhund, b) Windhund. 3) Mit rundem Kopf, runder Schnauze, stumpfer Nase, hangenden Lefzen. a) Bullenbeißer, b) Mops, c) Dogge. 4) Mit rundem Kopf, länglicher Schnauze und langen Haaren (die kleinste Rasse). a) Kleine Pudel, b) Seidenhund, c) Englischer kleiner Wasserhund, d) Bolognefer, e) Löwenhündchen.

Die Größe ist verschieden, doch ist er allezeit größer, als ein Fuchs. Der Kopf ist lang; die Stirne platt; die Ohren sind klein und gerade in die Höhe stehend; die Schnauze gestreckt, spitzig, nicht sehr gekrümmt; die Füße stark; der Schwanz aufgerichtet, vorwärts und zwar nach der linken Seite sehr krumm gebogen. Hierher gehört

a) Der Pommer. Er ist glatt- und kurzhärig, am Bauch, Kehle, Schenkeln und Schwanz aber sehr langhärig, von schwarzer, brauner und gefleckter Farbe,

b) Der Heidehund ist kurz- und steifhärig, mit etwas wolligem Schwanze, mit einer weißen Kehle, sonst meist fuchsroth, selten schwarz von Farbe.

c) Der Wolfshund (weißer Spitz). Ist bloß an Kopf, Ohren und Füßen kurzhaarig, sonst langhaarig, schneeweiß oder gelblichweiß. Ein sehr gemeiner Hausshund in Thüringen, den besonders die Fuhrleute gern um sich haben. Ich habe einen Hund dieser Art gesehen, der die Größe eines Hühnerhundes mit langen zottigen seidenartigen Haaren hatte. Vielleicht ein Blendling vom Wolfs- und Seidenhunde.

d) Der Fuchsspitz (Wißbader Spitz). Man sagt, daß er von der vorigen Art und dem Fuchs herstamme. Er hat einen runden Kopf, eine hohe Stirne, sehr spitzige Schnauze und sehr lebhafte Augen. Das Gesicht ist schwärzlich, und der übrige Körper fuchsroth. Der Körper ist sehr wollig und mit einzelnen Stachelhaaren besetzt, und der Schwanz ist ein ordentlicher Fuchsschwanz, doch trägt er ihn gekrümmt, wie ein

Spitz. Er übertrifft kaum die Größe eines Fuchses, ist selten und falsch.

e) Der Sibirische Hund.

C. f. sibiricus.

Chien de Siberie. *Buffon* 242. t. 30. Ed. de Deuxp. I. T. 8. f. 2. Ueberf. von Martini II. 168. Taf. 25. f. 1. XV. 85.

Er ist nicht viel vom Wolfshunde verschieden. Doch ist der Kopf etwas runder und langhaarig; die Farbe schwarz, weiß oder grau. Er ist in Rußland sehr gemein.

f) Der Isländische Hund.

C. f. islandicus.

Chien d'Islande. *Buffon* 242. T. 31. Ed. de Deuxp. I. T. 8. f. 3. Ueberf. von Martini II. 167. Taf. 24. f. 2.

Der Kopf ist rundlich; die spitzige Schnauze kurz; die aufrechten Ohren haben hangende Spitzen; der Schwanz ist gewunden und aufrecht; der Hals dick und kurz; der Leib kurz oder kraushaarig; die Farbe verschieden, meist bunt. Er war vor einiger Zeit der Modehund in Holland und dadurch sehr verfeinert und vervielfältiget.

g) Der Schäferhund (Bauernhund).

C. f. domesticus.

Chien

Chien de berger. *Buffon* V. 241. t. 28. Ed, de Deuxp. I. T. 8. f. 3. Ueberf. II. 164. Taf. 23. f. 1.

Er hat eine lange, etwas dickere Schnauze als der Spitz, und kleine Ohren, die zur Hälfte steif und oben umgebogen sind. Die Haare an der Kehle, Hals, Bauch, Schenkeln, und Schwanz sind länger als an den andern Theilen des Leibes.

Von dieser Art zieht sich der Jäger in Thüringen die sogenannten Saufinder. Er wählt dazu die schwarzen oder braunen, und gewöhnt sie zu ihrem Geschäffte, indem er ihnen Schweiß von wilden Schweinen zu fressen (zum Genüß) giebt, sie auf zahme Schweine hetzt und sie anbellen läßt. Von Natur sind diese Hunde auch gut zu Aufsuchung der Dachse, wenn solche des Nachts im freyen Felde ihre Nahrung suchen. Man zieht auch aus ihnen Triffelsucher*).

*) In Thüringen unterrichten die Triffeljäger ihre ihre Hunde auf folgende Weise. Sie lassen einen Hund lange hungern, alsdonn geben sie ihm ein Stückchen Brod mit einem Stückchen Triffel. Ist der Hund gelehrig, so braucht man es nur einmal. Alsdann nimmt man ihn hungrig mit im Wald, wo Triffel gesucht werden, gräbt eine Triffel ein, legt daneben ein Schnittchen Brod, und führt ihn auf den Platz, und er gräbt sie gewöhnlich aus, und nimmt sein Stückchen Brod und läßt die Triffel liegen. Da die Triffel einen sehr starken Geruch von sich geben, so wird er dann gewiß bald durch Scharren

Ueberhaupt ist diese Hunde-Rasse sehr gelehrig und nützlich; besonders zeichnen sich die kleinen Spitze durch ihre Klugheit und Geschicklichkeit aus.

Zu Haushunden nimmt man dunkelfarbene, damit sie nicht von Dieben, und zu Schäferhunden hellfarbene, damit sie nicht vom Wolf erkannt werden.

2) Der Bullenbeißer, (Bärenhund, Bärenbeißer, Wachthund).

C. f. molossus.

Dogue. *Buffon* 249. T. 43. Ed. de Deuxp. I. T. 13. f. 4. T. 14. f. 1. Uebers. II. 180. 16. Taf. 36. F. 1.

Ridingers Thiere Taf. 3. Dessen allerley Thiere Taf. 58. 67.

Er ist der Statur nach größer als der Wolf; hat eine dicke, kurze, aufgeworfene und glatte Schnauze, eine stumpfe Nase, dicke herunterhängende Wangen, ein geiferndes Maul, und kleine herabhängende Ohren. Der Kopf ist dick und breit, die Stirne platt, der Hals lang und dick, die Brust breit, der Schwanz in die Höhe stehend und vorwärts umgebogen. Die Lefzen, die äussersten Haare der Schnauze, und die äußersten Theile der Ohren sind meist schwarz, die übrigen Haare erbsgelb

Scharren dieselben selbst angeben, daß sie ausgehackt werden können. Er bekommt dann allezeit ein Schnittchen Brod.

gelb, blaßgelb, blaßfahl, glatt, kurz, etwas länger am Schwanz und Dickbeinen. Die Schenkel sind voll starker Muskeln, so wie überhaupt der ganze Hund starkleibig ist.

Er bellt dumpfig und kurz; sonst ist er zahm und gutherzig, aber an Ketten gelegt und angehetzt für Fremde fürchterlich. Seine Stärke ist außerordentlich, deshalb muß er Güter und Häuser hüten. Bey der Jagd nützt er als Hetzhund, da er Hirsche und Schweine an den Ohren zu fangen, zu halten, und zu würgen Kräfte genug hat. Auch zum Stiergefechte wird er gebraucht. Man giebt ihn auf Meistereyen, läßt ihn da mit Aas füttern, wodurch er stark, gesetzt, und muthig wird. Der Jäger zieht sich von ihm, dem Windhunde und dänischen Hunde nützliche Bastarte zur Hetze auf.

a) Der Bullenbeißer mit der Hasenscharte.

C. f. palmatus.

Die Schnauze ist etwas länger als an jenen; die Oberlippe ist wie beym Hasen bald ganz bald nicht ganz gespalten; die Füße sind mit oder ohne Schwimmhäute; das Haar glatt und schmutzig erbsgelb oder aschgrau.

b) Der Rundkopf.

C. f. orbicularis.

Ohngefähr von der Größe eines Hühnerhundes. Der Kopf ist kugelrund, die Schnauze kurz und spitzig; der Leib kurz und dick; der Schwanz lang und stark;

der

der Kopf bis zur Hälfte so wie die Beine schwarz, der übrige Leib röthlichgelb.

c) Der englische Hund, (Dogge, Kammerhund).

C. f. anglicus.

Dogue de forte race. *Buffon* 252. t. 45. Ed. de Deuxp. I. T. 14. f. 2. Ueberf. II. 186. Taf 37.

v. Mellins Anweisung 212. m. e. Fig. Ridingers Thiere Taf. 1.

Dessen Hunde. Taf. 2. obere Fig.

Er stammt vom Bullenbeißer und dem gemeinen Bauernhunde oder großen dänischen Hunde ab. Man findet ihn drey Fuß hoch. Der Unterschied von dem Bullenbeißer beruht hauptsächlich auf der Größe, worin er jenen weit übertrifft; sonst hat er eine etwas längere Schnauze, einen gestrecktern Leib, und die Farbe ist mehr abwechselnd. Man richtet ihn eben so wie jenen auf wilde Schweine und Hirsche ab, sie bey den Ohren fest zu halten, ohne sie zu beschädigen.

d) Der Metzger- oder Fleischerhund.

C. f. laniarius.

Er ist kleiner, hat eine längere gerade auslaufende, nicht so stumpfe Schnauze, und nicht so lappige Oberlippen; die Ohren sind mittelmäßig, mehrentheils halbhängend; der Leib hinten dünner; die Haare glatt und

die

die Farbe gewöhnlich braun oder schwarz. Man haut ihm gern den horizontalen Schwanz ab; doch giebt es auch Arten, die mit Stumpfschwänzen gebohren werden.

e) Der Saufinder, (Saubeller).

C. f. aprinus.

v. Mellins Anweisung. 209. m. e. Fig. Ridingers Thiere Taf. 11. Dessen Hunde. Taf. 9.

Er kömmt in Ansehung der Gestalt mit dem vorigen überein, hat aber ein langes rauhes Haar, und ist gewöhnlich schwarz von Farbe. Man unterrichtet ihn an zahmen Schweinen oder auf der Saujagd an angeschossenen Sauen, und dadurch daß man ihm die Fährte zeigt, und abriechen läßt. Wenn diese Hunde die Sau gefunden haben, so geben sie durch das Anschlagen ein Zeichen von sich, alsdann wird diese gewöhnlich mit größern Hunden gehetzt. Man kann also auch zu dieser Absicht kleinere Hunde brauchen. (s. oben n. 1. g.).

f) Der Saurüden.

C. f. suillus.

Ridingers Thiere Taf. 12.

Er hat einen starken Kopf mit ziemlich flacher Stirn; die Schnauze ist hinten dick und vorne spitzig; die Beine sind hoch, und der Leib läuft nach hinten

dünne

dünne zu. Er ist lang und rauhhaarig am ganzen Leibe, und von brauner oder schwarzer Farbe.

Er wird, wie die Metzgerhunde gewöhnt, wenn der Saufinder das Schwein angemeldet hat, sich demselben an die Ohren zu hängen, und es festzuhalten.

g) Der Mops, (Steindogge).

C. f. Fricator.

Doguin. *Buffon* 252. T. 48. Ed. de Deuxp. I. T. 13. t. 4. Uebers. II. 186. Taf. 36. F. 2.

Er ist nicht leicht über zwey Fuß lang und vom Bullenbeißer und andern kleinen Hunden entstanden. Der Kopf ist rund und etwas platt, die Schnauze mehrentheils schwarz, kurz und aufgeworfen; die Nase abgestumpft; die Lefzen sind dünner und kürzer, als am Bärenbeißer; die Ohren herabhängend. Das Haar ist glatt, kurz, gelblich oder schwarz, wie bey seinem Stammvater, dem er auch außerdem in der Leibesgestalt ähnelt. Man schneidet ihm die Ohren gewöhnlich ab, um ihm noch ein mopsmäßigeres Ansehen zu geben. Er hat einen sanftmüthigen Charakter; pflanzt sich nicht häufig fort, und wird in Thüringen nur noch einzeln als Schooshund angetroffen.

h) Der Bastartmops.

C. f. hybridus.

Roquet *Buffon* 253. T. 41. f. 2. Ed. de Deuxp. I. T. 13. f. 1. Ueberf. II. 188. Taf. 34. F. 2.

Der Kopf ist klein; der Scheitel erhaben; die Nase dick und wie die Schnauze aufgeworfen; die Augen sind groß und hervorstehend; die Ohren klein und halbhängend; der Leib hinten eingezogen; die Beine hoch und dünne; das Haar glatt, einfarbig oder gefleckt.

Er stammt vom Mops und vielleicht vom kleinen dänischen Hunde ab.

i) Das alikantsche Hündchen.

C. f. Alicantensis.

Chien d'Alicante. Freund der Schooshündchen. p. 51. Taf. 11.

Mit runden Kopf, stumpfer Nase und langen seidenartigen Haaren. Ein kleiner weißer schwarzköpfiger Schooshund. Vom Mopse und kleinen Spanischen Wachtelhunde abstammend.

k) Der Artoisische Hund.

C. f. Artoiensis.

Artois *Buffon* 253. Ein Bastart vom Mops und Bastartmops.

3) Der Jagdhund, (Bragre).

C. f. sagax.

v. Mel

v. Mellins Anweis. 218. m. e. Fig. Ridingers Thiere Taf. 5. die 2 Figuren zur Rechten. Dessen Hunde Taf. 10.

Der Kopf ist rund, stark, breit, der Hinterkopf mehrentheils eingefurcht, oder hat eine deutliche Erhöhung (Kamm). Die Schnauze ist eben so lang, aber stärker als am Bauernhunde. Die Ohren sind dick, breit und hängen lang herunter (sind gut behangen). Der Leib ist lang gestreckt und mäßig stark. Die Beine sind fleischig, und die Afterzehen haben Klauen. Der Schwanz ist von der Wurzel an dick und läuft spitzig zu, steht in die Höhe gerichtet, und beugt sich etwas vorwärts. Das Haar ist etwas rauh, und die Farbe ist verschieden.

Die Jäger unterscheiden dreyerley Jagdhunde:

A) Den deutschen, welcher mittelmäßig lange Ohren hat, haarig, flüchtig und leicht von Leibe ist.

B) Den polnischen, welcher stärker und schwerer ist, und längere Ohren hat. Beyde Arten sind von Farbe roth, braun, braunroth, gelb, wolfsgrau, und nur selten schwarz.

C) Den englischen und französischen, der das Mittel zwischen jenen beyden hält, und weiß ist mit schwarzen, braunen, gelben oder rothen Flecken; also den getiegerten Jagdhund.

Diese Hunde, welche eine große Stärke besitzen, schnell laufen, und besonders einen ungemein feinen Geruch

Geruch haben, werden zum Spüren, Aufsuchen, Aufjagen und Verfolgen des Wildes gebraucht.

Es gehören unter diese Rasse alle diejenigen Hunde, die bey den gewöhnlichen Jagden ganz unentbehrlich sind, und ohne welchen der Jäger nicht Jäger seyn kann. Sie sind in Ansehung ihrer Größe verschieden, und nach dieser und andern vorzüglichen Eigenschaften wird ihr Gebrauch bestimmt. Vorzüglich sieht man bey der Wahl dieser Hunde zu einem Geschäffte darauf, daß man junge Hunde eben dazu abrichtet, wozu ihre Eltern abgerichtet waren, weil ihnen eine eigene Fähigkeit zu solchen Verrichtungen angeboren zu seyn scheint.

a) Der Leithund (Spürhund).

C. f. venaticus.

v. Mellins Anweis. S. 199. m. e. Fig. Ridingers Thiere Taf. 4. Dessen Allerley Thiere. Taf. 69.

Dieser muß eine starke Brust, einen untersetzten Körper, nicht zu hohe Füße haben, und von mittelmäßiger Größe seyn. Der Kopf darf kurz, die Schnauze aber nicht spitzig seyn, weil er eine dicke und breite Nase haben muß, in welcher das Häutchen, welches zum Riechen bestimmt ist, mehr Platz einnimmt, vermittelst dessen er die Fährten der Thiere desto deutlicher wittern kann. Das Haar ist braun, weiß, gelblich, auch mit mehrern Farben gefleckt.

Seine Bestimmung besteht darinn, den Aufenthalt des Wildes auszuspüren. Den Namen Leithund hat er daher erhalten, weil er während seiner Arbeit an einem langen Riemen, der das Hängeseil heißt, geführt oder geleitet wird. Man liebt die gelben Leithunde. Sie bleiben beständig in einem trockenen Hundestalle, der gegen die Sonne gebaut ist, an einer Kette liegen, und bekommen des Tages dreymal Brod mit Milch, oder guter Fleischbrühe, abgebrühtes Roggen- oder Haferschrot, zuweilen etwas frisches Wildpret, und guten Hirschschweiß. Den jungen Leithund läßt man fleißig aufgebrochene Thiere beriechen und berupfen. Das Abrichten desselben, das sogenannte Arbeiten geschieht im Junius *), und man nennt diese Zeit die Behängzeit. Der Jäger zieht des Morgens vor Sonnenaufgang, wenn das Wildpret etliche Stunden ins Holz zurück ist, mit dem Leithunde, der an ein Seil angebunden ist, längs dem Holze hin, und lehrt ihn die Fährten aufsuchen (anfallen). Kann er dieses und er ist ein Jahr alt, so nimmt er ihn mit auf die Viehtriften und lehrt ihn hier die Hirschfährte von denen des Viehes unterscheiden, damit er auch durch eine ganze Heerde hindurch den Hirsch aufspüren kann. Ist ein Hund faul, so muntert er ihn dadurch zu seiner Arbeit auf, daß er in ein Gebüsch einen gefällten Hirsch verbirgt, welchem er in eine Klaue ein Stückchen Wildpret, das stark

mit

*) Nicht im May, weil das Wild häret, und also der Hund auf die Fährte leicht verdorben werden würde

mit Blut (Schweiß) bestrichen ist, steckt, alsdann eine andere Klaue in Schweiß eintancht, und damit auf hundert Schritte eine Spur bis zum Hirsche macht, ihn auf dieselbe führt, und mit Liebkosen den Bissen aus der Schaale heraus holen und genießen läßt. Man sucht gern den Wind entgegen die Fährte, weil sonst der Hund die Witterung des Wildes bekommt, und sie übergeht. Hat der Jäger eine ganze Gegend mit dem Leithund umzogen, alle Ein- und Ausgänge eingeschlossen, und findet keine Fährte vom Wild wiederum heraus, welches an der graden Anzahl der Wiedergänge *) erkannt wird, so ist das Wild bestätigt **), und der Jäger steckt zum Zeichen der glücklich vollendeten Arbeit ein Eichen- oder Buchenreiß (einen Bruch) auf seinen Hut, wenn er mit seinem Hunde nach Hause zieht.

b) Der Schweißhund (Birschhund).

C. f. Scoticus.

v. Mellins Anweisung. 205. m. e. Fig. Ridingers Thiere Taf. 10.

Nächst dem Leithunde der nöthigste und nützlichste Jagdhund, welcher dem Schweiß verwundeter Thiere nachgeht, und anzeigt, wo sich dieselben befinden. Es kann ein mittelmäßig großer Jagdhund seyn, nur ist ihm

*) Des Aus- und Eingehens.

**) s. oben Bestätigungsjagd S. 116.

auch eine breite Nase nöthig. Der Kopf ist gewöhnlich gestreckt, so wie der Leib; die Beine sind mittelmäßig; die Ohren groß; die Haare mittelmäßig lang; die Farbe braun, roth und schwarz.

Er wird zu seiner Verrichtung zubereitet, indem man ihm oft Schweiß vorhält, und ihn an solche Orte führt, wo man dergleichen hingebracht hat. Diejenigen, welche von einem Dänischen Hunde und einem Jagdhunde erzeugt worden, und von rothbrauner Farbe sind, werden für die besten gehalten. Sonst braucht man auch dazu die Dachs- und Hirtenhunde, welche leicht nach dem Schweiße gehen. Ein geübter und guter Schweißhund jagt, wenn er gesundes Wildpret antrifft, dasselbe erst weg, sucht alsdann die Fährte des angeschossenen Thieres wieder auf, um es nun ungehinderter verfolgen zu können.

c) Der Hühnerhund (vorstehender Hund, Bodenhund, Wachtelhund).

C. f. avicularius.

Braque, Braque de Bengale. *Buffon* 245. T. 33. 34 Ed. de Deuxp. I. T. 9. f. 1. 2. Uebers. II. 171. Taf. 27. 28. Ridingers Thiere Taf. 14. Allerley Thiere Taf. 32. 36. 58. 66. 86.

Der Kopf ist stark; die Schnauze lang und stumpf; die Ohren sind lang und gut behangen; der Kopf und die Füße stark; der Schwanz fleischig und kurz, und wird

wird gewöhnlich abgestutzt. Es giebt kurz- und langhärige. Erstere sind die gewöhnlichsten. Die Farbe ist weiß, schwarz, gelb und braun gefleckt. Die einfarbigen sind selten.

Die Tiegerhunde oder Bengalischen Hunde sind weiß mit schönen runden egalen meist schwarzen Flecken.

In Thüringen liebt man mehrentheils gefleckte und von mittlerer Größe.

Man dressirt sie gewöhnlich, wenn sie drey Viertelsjahr alt sind; sie können aber auch noch im zweyten und dritten Jahre abgerichtet werden. Die hartnäckigen und ungelehrigen werden meistens die besten. An Rebhühnern selbst, die ihnen vorgelegt werden, lehrt sie der Jäger dieses Federwildpret aufsuchen, vor dasselbe hintreten (es zu stehen), daß er es entweder im Sitzen vor ihnen, oder im Flug, wenn er ihnen zuruft, es aufzujagen, schießen kann. Sie müssen es ihm auch unverletzt überliefern. Diejenigen, welche par force abgerichtet werden, werden besser. Die spielend dressirten haben meist keinen guten Appell und werden meistens zum Aufsuchen, die gut dressirten aber zum Vorstehen gebraucht *).

*) s. Jesters kleine Jagd. 1r B. Königsberg 1792.
E. S. (chneiders) Anleitung zur Erziehung eines jungen Hühnerhundes. Braunschweig 1791.

Sie zeugen oft Junge mit abgestutztem Schwanze *).

d) Der Wasserhund.

C. f. aquatilis.

Ridingers allerley Thiere. Taf. 42.

Er ist kürzer und gedrungener gebaut und hat kürzere Ohren und längere Haare, wie jener.

Zur Wasserjagd nothwendig.

Dieser kann auch zugleich Hühnerhund seyn. Man richtet ihn eben so, wie jenen ab. Die rauhhaarigen Jagdhunde sind die besten darzu.

e) Der Parforce- oder Laufhund.

C. f. gallicus.

Chien courant. *Buffon* 243. t. 32. Ed. de Deuxp. I. T. 8. f. 1. T. 11. f. 1. Uebers. II. 168. n. 8. Taf. 26.

Man wählt darzu einen französischen oder englischen großen Jagdhund, welcher einen länglichen Kopf, breite Stirn, langbehangene Ohren, hohe Hüften, dicke Lenden, grade Knie hat, und einen hellen Laut von sich giebt (laut anschlägt). Er muß so grausam seyn, und in

*) Ueber diese Erbfehler siehe Schulz über einen monströsen Canarienvogel. S. 17.

in Gesellschaft von mehrern seines Gleichen einen Hirsch auf der Fährte so lange verfolgen, bis er ermüdet zur Erde hinstürzt.

f) Der Stöberhund.

C. f. irritans.

Mit langer Schnauze; kurzen Beinen; behangenen Ohren, und langen Haaren, besonders Baarthaaren.

Der oben (n. c) beschriebene Hühnerhund ist gewöhnlich in Thüringen auch Stöberhund. Er muß Hasen, Rebhüner, Schnepfen und andere Vögel zehn bis zwanzig Schritte vor dem Jäger aufsuchen und auftreiben, damit er sie schießen, oder durch Windhunde hetzen kann. Wenn die Jäger einen guten Stöberhund haben wollen, so nehmen sie einen Bastarten von einem kleinen Jagdhunde und Dachshunde, der sich gut in dieses Geschäffte finden lernt.

Wie wir gesehen haben, so giebt es unter dieser Abtheilung Hunde, welche mehrere Jagdgeschicklichkeiten zusammen in sich vereinigen, und zu verschiedenen Verrichtungen zugleich gebraucht werden können; allein man kann sich freylich auch nicht allezeit mit Gewißheit auf sie verlassen.

Sie werden alle in einem Alter von zehn Monaten zu ihrem Geschäffte angewiesen, und man kann sie leicht mit bloßem Brod und guter Brühe ernähren.

4) Der Budel (großer Budel, Wasserhund, Barbet, ungarischer Wasserhund).

C. f. aquaticus.

Grand Barbet *Buffon* 246. T. 37. Ed. de Deuxp. I. T. 10. f. 3. Uebers. II. 174. T. 30.

Ridingers Thiere Taf. 18. Dessen allerley Thiere Taf. 42.

Er ist der gelehrigste und treueste Hund; lernt allerhand lustige Handlungen verrichten, und läßt sich auch eben so, wie der Hühnerhund, zur Jagd abrichten. Besonders geht er gern und zwar aus natürlichem Triebe ins Wasser, und ist daher zur Jagd der Wasservögel sehr geschickt. Zu diesem Gebrauch pflegt man ihn zu scheeren, den Schwanz abzustutzen, einen großen Bart und die Augenbraunen stehen zu lassen, damit er desto besser schwimmen kann. Er lernt auch Trüffeln suchen. Was seine Gestalt anbetrifft, so ist er von mittelmäßiger Größe, der Kopf ist dick und rund, die Schnauze kurz und stumpf, die Ohren breit und herabhängend, der Leib dick und kurz, der Schwanz fast horizontal herabhängend, die Beine kurz und stämmig, das Haar kraus und wollig. Er wird alle Jahre geschoren, und sein Haar wird von Hutmachern und Strumpfwirkern benutzt. Hierher gehört:

a) Der kleine Budel (Zwergbudel).

C. f. aquaticus minor.

Petit

Petit Barbet. *Buffon* 250. t. 38. f. 2. Ed. de Deuxp. I. T. 12. f. 1. Ueberf. II. 183. Taf. 13. f. 1.

Er gleicht dem Budel durchgängig, ist aber kleiner, und hat eine weniger dicke Schnauze. Das Haar an den Ohren ist überaus lang und gerade herunterhängend.

5) Der Seidenhund (Spanische Wachtelhund, langbehaarter Bologneser, große Seidenhund, Seidenbudel).

C. f. extrarius.

Epagneul. *Buffon* 246. T. 38. f. 1. Ed. de Deuxp. I. T. 11. f. 4. Ueberf. II. 175. Taf. 31. Fig. 1.

Der Kopf ist stark und rund, die Ohren breit, hängend und mit langen Haaren versehen, die Brust stark, die Schenkel kurz und der Schwanz in die Höhe stehend. Das Haar ist etwas gerollt, lang und sanft anzufühlen, gewöhnlich weiß, und nur selten braun oder schwarz. Er ist gutherzig und scheint den Mops aus den vornehmen Häusern vertrieben zu haben. Da er nicht die Gelehrigkeit des großen Budels, obgleich die Größe hat, so ist er ein bloßer Stubenhund. Seine weichen Haare geben gute Hüte und Strümpfe. Hierher gehört auch:

a) Der kleine Seidenhund (kleiner Spanische Wachtelhund).

C. f. hispanicus.

Freund der Schooshündchen. S. 34. Taf. 1.

Er ist bloß kleiner, als die vorhergehende Art. Das Haar ist lang, weiß oder geschäckt, und seidenartig. mit mehrentheils braun- oder schwarzgefleckten Ohren,

b) Der Bouffe.

C. f. ustus.

Er stammt vom großen Spanischen Wachtelhund und vom Budel ab. Er hat Figur des Körpers, Haar und Farbe von seinen Eltern geerbt, und mehrentheils an den Ohren schwarze oder braune Flecken.

c) Der kurzhaarige Bologneserhund.

C. f. brevipilis.

Gredin. *Buffon* 247. T. 59. f. 1. Ed. de Deuxp. I. T. 11. f. 2. Uebers. II. 176. Taf. 32. Fig. 1.

Der Kopf ist klein und rundlich; die Schnauze kurz; das Ohr lang; der Schwanz aufwärts gekrümmt, und das Haar wellenförmig, kurz, schwarz und gefleckt.

d) Der Pyrame.

C. f. flammeus.

Pyrame. *Buffon* 247. T. 39. f. 2. Ed. de Deuxp. l. c. f. 3. Uebers. a. a. O. f. 2.

Er

Er ist klein, und hat bey ähnlicher Gestalt feuerfarbene Flecken auf schwarzem Grunde.

Ist diese Art Hunde ganz schwarz, so nennt man sie gewöhnlich Englische Wachtelhunde, weil sie aus England stammen.

e) Der langhärige Bologneserhund (Angorische Hund, Bologneserhündchen, Maltheserhündchen, Spanisches Hündchen, Schooshündchen).

C. f. militaeus.

Bichon. *Buffon* 257. t. 40. f. 1. Ed. de Deuxp. I. t. 12. f. 2. Uebers. II. 184. Taf. 33. f. 1.

Es ist von ungemein kleiner Statur. Es stammt vom kleinen Budel und kleinen Spanischen Wachtelhunde ab. Den runden Kopf und die stumpfe Schnauze scheint es vom kleinen Budel, und die langen glatten Haare, womit der Körper und sonderlich das Gesicht besetzt ist, von dem Spanischen Wachtelhunde zu haben.

Man macht aus ihm, indem man seinen Hinterleib schiert, einen Löwenhund. Er wird von der Größe eines Eichhörnchens angetroffen. Man wäscht ihn nämlich in der Jugend mit Brandewein, daß ihm die Haut zusammen schrumpft, giebt ihm sein Futter spärlich, und zwingt dadurch seinen Wuchs in solche enge Gränzen. Durch Begattung mit Budeln, Spitzen, Möpsen u. a. m. entstehen vielerley Arten von Schooshündchen.

f) Das eigentliche Löwenhündchen.

C. f. leoninus.

Chien-lion. *Buffon* 251. t. 40. f. 2. Ed. de Deuxp. I. t. 12. f. 3. Ueberf. II. 185. Taf. 33. f. 2.

Es scheint aus einer ähnlichen Vermischung, wie das vorige Bologneserhündchen entstanden zu seyn, doch muß noch ein kurzhaariger Hund zu seinem Daseyn beygetragen haben. Es unterscheidet sich von dem Bologneser nur dadurch, daß der Hintertheil des Körpers, außer der zottigen Schwanzspitze, dünn oder vielmehr kurzbehaart ist. Das lange Haar am Hals, das einer Löwenmähne nicht unähnlich sieht, und der starke Haarbüschel am Schwanz haben ihm diese Benennung verschafft.

6) Der große Dänische Hund (Dänischer Blendling).

C. f. danicus.

Grand Danois. *Buffon* 240. T. 26. Ed. de Deuxp. I. T. 12. f. 4. Ueberf. II. Taf. 22.

Er hat die Gestalt fast völlig, wie der Schäfer- oder Bauernhund (n. 1. g), nur sind Körper, ja alle Theile größer. Die Ohren sind kurz und schmal; die Beine hoch; das Haar kurz, rothgrau, hellgrau, schwarz, auch weißgrau mit schwarzen, fahlen und andern Flecken.

Die

Die Bastarte, welche man von ihm und dem Windhunde, oder dem gemeinen Jagdhunde erlangt, geben gute brauchbare Hunde zur Jagd, und man richtet von ihnen die Biber- und Fischotterhunde wegen ihres scharfen Gebisses zum Anpacken ab.

a) Der Harlekin oder kleine Dänische Hund.

C. f. variegatus.

Petit Danois. *Buffon* 147. T. 41. f. 1. Ed. de Deuxp. I. T. 6. f. 2. Ueberf. II. 177. Taf. 34. f. 1.

Es soll eine bloße Varietät von obigen seyn, allein er scheint eher vom Mops und Spitz abzustammen. Der Kopf ist rund und groß; der Scheitel erhaben; die Schnauze kurz, gerade, zugespitzt; die Ohren sind klein, halbhängend; der Leib hinten eingezogen; die Beine dünn; der Leib mit großen oder kleinen Flecken besetzt.

Ein Schooshund.

Von diesem leitet man den Türkischen Hund, dem die Haare fehlen, ab.

7) Der Neufundländische Hund.

C. f. terrae novae.

Blumenbachs Handb. der N. G. 5te Aufl. S. 98.
Dessen Abbildungen naturhist. Gegenstände. Heft I. Taf. 6.

An Gestalt und Größe gleicht er dem großen Schäferhunde. Die Schnauze ist etwas dick; die Ohren sind mittelmäßig und hängend; die Schwimmhaut zwischen den Zehen sehr groß, daher er mit der größten Leichtigkeit schwimmet; das Haar lang, zottig und seidenartig, besonders am Schwanze; die Farbe gewöhnlich schwarz- und weißbunt.

Ein außerordentlich gelehriger Hund; der aus Neufundland zu uns gekommen ist. Wenn und von wo diese Hunde nach Neufundland gekommen sind, darüber weiß man nichts Befriedigendes. Bey der ersten Niederlassung der Engländer 1622. fand man sie dort nicht vor.

8) Der gemeine Windhund (Wind).

C. f. grajus.

Levrier, *Buffon* 240. T. 27. Ed. de Deuxp. I. T. 7. f. 2. Uebers. II. 162. Taf. 23. f. 2.

v. Mellins Anweis. 224. m. e. Fig. Ridingers Thiere Taf. 7. Dessen allerley Thiere. Taf. 68.

Er ist der schönste Hund; alle Theile des Körpers sind dünner und schlanker, als an andern. Der Kopf ist klein, gewölbt, lang und zugespitzt; die Schnauze schmal;

schmal; die Lefzen sind kurz; die Ohren schmal, dünne, aufgerichtet, und nur an den obern Enden umgebogen; der Hals ist lang, der Rücken gebogen, der Bauch enge; die Schenkel sind hoch und mager; der Schwanz ist glatt, lang und herunterhängend, das Haar bald kurz und glatt, bald zottig und krauße. Dieß letztre sind die sogenanten zottigen Windhunde (C. f. hirsutus).

Ursprünglich kommen diese Hunde aus der Levante. Sie laufen am schnellsten und bellen nicht viel. Es giebt vielerley Arten derselben, die in Unterabtheilungen gebracht werden müssen. Die größten braucht man bey der Jagd zu Hetzhunden auf Sauen und Hirsche. Zum Jagen und Hetzen der Hasen und Füchse wählt man aber diejenigen, die von mittler Größe sind, denn jene sind zu schwer im Laufen und zu hoch, diese Thiere zu fangen (wegzunehmen). Die Alten müssen die Jungen im Herbste selbst anführen, und sie lernen ihre Kunst durch Uebung. Durch die Vermischung mit andern Hunden bekömmt man verschiedene Bastarten, die der Liebhaber der Jagd gut nutzen kann. Denjenigen Windhunden, die man zur Jagd brauchen will, löst man gleich nach ihrer Geburt die innere Afterklaue an den Vorderfüßen, und die kleinen obern Ballen ab, denn jene hindern sie im Laufen, und diese werden bald wund, daher sie sich bey dem Jagen wegen des Schmerzes, den ihnen das Anstreichen verursachet, schonen. Sie werden nicht unter einem Jahre zu ihrer Bestimmung angewiesen, und derjenige, der darzu gewöhnt ist, den gefangenen Hasen herbeyzutragen, heißt der Ritter.

a) Das

a) Das kleine Windspiel, (Englisches Windspiel, der kleine Windhund).

C. f. italicus.

Levron *Buffon* 241. Ed. de Deuxp. I. 268. Ueberf. II. 163.

Ridingers Thiere Taf. 15. Oeffen allerley Thiere Taf. 89.

Es ist der kleinste Hund dieser Art, welcher zur Jagd gänzlich untauglich ist, und nur wegen seiner Schönheit als Schooshund ernährt wird. Er hat einen kleinen und langen Kopf, einen sehr schlanken Hals, und kurze Haare. Die Farbe ist meist gelblich.

Er ist aus England zu uns gekommen, ist außerordentlich gefräßig, und hat die gute Eigenschaft als Schooshund, daß sich in seinem kurzen Haare die Flöhe nicht gut aufhalten können.

b) Der große Irländische Windhund.

C. f. hibernicus.

Le Matin? *Buffon* 239. t. 25.

Ridingers Thiere Taf. 8. Allerley Thiere Taf. 68.

Er hat die Größe einer Englischen Dogge, und alle Theile sind stärker und größer als am gemeinen Windhunde. Der Kopf ist mager und lang; die Ohren sind

halb-

halbhängend; der Leib dünn; die Füße fleischig; der Schwanz etwas gekrümmt; die Haare glatt.

Er war sonst in Irland gemein und wurde zur Wolfsjagd gebraucht. Die Blendlinge von ihm und den Bullenbeißer sollen außerordentlich gut zur Hirsch- und Saujagd seyn.

c) Der Curshund.

C. f. Cursorius.

v. Mellins Anweis. 215. m. e. Fig.

Ridingers Thiere Taf. 13. Dessen Hunde Taf. 12.

Er ist ein Abkömmling des Windhundes und des Dänischen Hundes. Er hat einen langen Kopf, eine platte Stirn, eine stärkere Schnauze als der Windhund, kleine halbhängende Ohren, lange und fleischige Beine, und einen längern und schlankern Leib, als der Dänische Hund, und nähert sich dadurch mehr dem Windhunde. Das Haar um dem Hals, unter dem Bauch, und am Schwanze ist oft etwas länger, als das übrige, und die Farbe ist verschieden.

Er wird vom Jäger gebraucht, sowohl das angeschossene und verwundete Wild zu verfolgen und einzuholen, als auch das unverfehrte zu hetzen und zu fangen.

d) Der nackte Hund.

C. f. aepyptus.

Chien Turc. *Buffon.* 248. T. 42. f. 1. Ed. de Deuxp. I. T. 13. f. 2. 3. Ueberf. II. 178. Taf. 35. F. 1.

Er heißt auch Barbarischer Hund. Die hohen Füße und der schlanke, hinten sehr dünne Leib giebt ihm das Ansehen des kleinen Windspiels; allein der Kopf ist dicker und die Schnauze kürzer. Außer den Bartborsten sieht man fast keine Haare, und die Farbe ist braun, aschgrau, schwärzlich, oder auch fleischfarbig. Die große Hitze der heißen Länder soll alle Keime der Haare vertilgt haben.

e) Das Türkische Windspiel.

C. f. turcicus.

Ridingers Thiere Taf. 9.

Dieser Hund ist größer als das kleine Windspiel. Er hat einen schlanken Leib; sehr lange hängende Ohren; ein krauses Haar und besonders einen sehr langbehaarten Schwanz. Man sagt, daß er vom Irländischen Windhunde abstamme.

9) Der Dachshund, (Dachskriecher, Dachsschlieffer, Dachswürger, Dachsfinder).

C. f. Vertagus.

Bey der Bieber- Dachs- Fischotter- Fuchs- und Kaninchenjagd ist er sehr brauchbar. Es ist ein kleiner

Hund

Hund, und hat einen dicken Kopf, eine lange starke Schnauze, hängende Ohren, einen langgestreckten Körper, dessen Rücken etwas ausgehöhlt ist, kurze Beine und ein glattes Haar. Seine Haut ist mehrentheils schwarz, oder braun mit rothen Flecken auf der Brust, über den Augen und unten an den Füßen. Zur Jagd wählt man die mittelmäßig großen und krummbeinigen, weil sie in enge Höhlen kriechen müssen. Man unterrichtet sie durch Anhetzen an Katzen, und durch Einlassung in die Höhlen vorgemeldeter Thiere mit einem ältern Hund, der seine Kunst versteht. Hat man einen Dachs ausgraben, so kann man ihm die Zähne ausbrechen, in eine breterne Röhre, die mit Erde beschüttet ist, fahren lassen, aus welcher ihn der junge Dachshund herausholen muß. Auf die Füchse macht man sie hitzig, indem man ihnen erstlich gekochtes Fuchsfleisch, dem der üble Geruch ein wenig benommen ist, und dann rohes, zu fressen vorlegt, und zum Fischotterfang gewöhnt man sie so, daß man ihnen, wenn man sie sehr hungrig hat werden lassen, erstlich das Futter in flaches Wasser setzt, und alsdann in tieferes, daß sie dazu schwimmen müssen. Ihr Naturell lehrt sie auch schon von selbst in die Höhlen der Thiere kriechen.

Man hat von diesen kleinen Jagdhunden vorzüglich zwey Arten:

a) Den krummbeinigen Dachshund, dessen Vorderschenkel auswärts gekrümmt sind.

Basset à jambes torses. *Buffon* 245. T. 35. f. 2. Ed. de Deuxp. I. T. 10. f. 1. Ueberf. II. 172. Taf. 39. F. 1.

b) Den geradeschenkeligen Dachshund, dessen Schenkel gerade und natürlich gebildet sind.

Basset à jambes droites. *Buffon* 245. T. 35. f. 1. Ed. de Deuxp. I. T. 10. f. 2. Ueberf. II. Taf. 29. F. 2.

v. Mellins Anweis. S. 229. m. e. F.

c) Der zottige Dachshund unterscheidet sich von dem gemeinen, blos durch sein längeres krauses Haar.

d) Das Hündchen von Burgos.

C. f. villosus. Le Burgos.

Freund der Schoßhündchen S. 52. Taf. 12.

In der Gestalt gleicht er dem Dachshunde, in den langen Haaren aber dem kleinen Spanischen Wachtelhunde. Der Kopf ist rund, die Schnauze stark und zugespitzt; der Leib gestreckt; die Beine sind kurz. Die Farbe ist gewöhnlich weiß mit schwarzen Kopf.

Ein artiges Schooßhündchen.

Es giebt auch noch andere Bastarten vom Dachshunde, die sich durch den langgestreckten Leib und die kurzen

kurzen Beine kenntlich machen; allein es würde zu weitläuftig werden, sie hier alle zu beschreiben.

Zergliederung.

Ihre Zergliederung überhaupt ist von jeher, wie unten beym Nutzen angegeben worden, für die Aerzte wichtig gewesen.

Als Raubthiere haben sie einen einfachen häutigen Magen und eben solche häutige dünne Därme.

Ihre Lungen sind vorzüglich groß und fest, welches auch ihre Natur erfordert. Eben aus dem Grunde ist die Geruchsnervenhaut in der Nase außerordentlich groß und gefaltet und der ganze Nasenbau drüsig, damit die feinsten Ausdünstungen aufgefangen werden können.

Die Gekrösdrüse ist doppelt.

Der sogenannte Tollwurm unter der Zunge ist ein bloßer zur nöthigen Beweglichkeit der Zunge gehöriger Muskel, der nichts von solchen organisirten Theilen hat, was man Kopf, Mund, Glieder oder Schwanz nennen könnte.

Daß die Eingeweide des Hundes viele Rund- Spul- und Bandwürmer enthalten ist unten bey den Feinden bemerkt.

Aufenthalt.

Der Aufenthalt der Hunde richtet sich nach ihrer Bestimmung. Sie lieben die Reinlichkeit, und wollen daher den Ort, den man ihnen zum Aufenthalte anweiset, immer reinlich gehalten haben.

Wenn sie ruhen, so sitzen sie entweder auf beyden Hinterfüßen, oder legen dieselbe auswärts, und die Vorderfüße vorwärts so, daß sie den Kopf darzwischen legen können. In der Wärme oder Sonne strecken sie alle Viere von sich und legen sich auf die Seite, im Kühlen aber und des Nachts ziehen sie alle Viere an sich, krümmen den Rücken und stecken die Schnauze zwischen die Hinterbeine. Sie schlafen sehr leise, aber unruhig, haben oft böse Träume, brummen und bellen daher im Schlafe, wie wenn sie es mit einem Gegner zu thun hätten.

Nahrung.

Da der Hund zu den fleischfressenden Thieren gehört, so ist seine natürliche und liebste Nahrung Fleisch, welches er frisch und noch lieber halb verfault verzehrt. Aus dem Pflanzenreiche genießt er Birnen, und besonders Pflaumen, vielleicht als bloße Leckereyen, und alle von Menschen zubereitete Vegetabilien, und besonders die mehligen Speisen sehr gern. Inzwischen ist es am besten, wenn man ihm, um ihn gesund und stark zu erhalten, nur die Ueberbleibsel von Fleisch, Knochen, gute Brühe und Brod oder auch letzteres nur allein,

und

und zwar zu bestimmten Zeiten giebt. Als Arzeney, vorzüglich wenn er purgiren oder vomiren will, welches er nöthig hat, da seine Haut gar wenig zum Schwitzen geneigt, und dem Druck der veränderlichen Witterung merklich ausgesetzt ist, welches in den edlern Theilen unangenehme Empfindungen verursacht, frißt er einige stachliche Kräuterarten, um aber die spitzigen Splitter von Knochen, die ihm im Magen und den Gedärmen unangenehme Empfindungen machen und schaden können, einzuhüllen, Quecken- und anderes Halmengras, das er auch im Winter unter dem Schnee hervorsucht. Die Landleute halten diese Erscheinung für eine Anzeige der Veränderung des Wetters, welches man aber schon aus den Mienen, die er bey dieser Kost macht, für das, was es ist, erkennen muß*). Er säuft wenig und wegen seiner langen Zunge, die er vorne etwas unterwärts umbiegt, schwer; man setzt ihn nichts als klares frisches Wasser vor. Seinen beizenden Unrath, dessen er sich mit Zwange entledigt, legt er gern auf kahle Plätze, und den Harn läßt das Männchen mit einem aufgehabenen Hinterbeine an erhabene Orte. Wenn sich einige von ihnen zum erstenmal sehen, so scheinen sie sich dadurch zu begrüßen, daß sie mit freundlichen Mienen unzähligemal auf einen Platz pissen.

*) Der Hund verdaut das Queckengras nicht, sondern giebt es ganz unversehrt von sich, und man findet allzeit in den Exkrementen, wenn er es gefressen hat, die feinsten und spitzigsten Knochensplitter fest mit demselben umwickelt.

Fortpflanzung.

Die Begattung (das Laufen, Belaufen) des Hundes ist überhaupt genommen an keine gewisse Zeit gebunden, doch geschieht sie mehrentheils des Jahrs zweymal, und zwar im Sommer oder Winter. Wer gute Hunde ziehen will, nimmt darzu einen kurzen, untersetzten Hund und eine gestreckte Hündin. Die Hündin reizt den Hund, der sich zu jeder Jahrszeit willig finden läßt, zu diesem Geschäffte der Liebe, und der Hund wittert ihr Verlangen auf allen Schritten, die sie gegangen ist, und folgt ihr beständig nach. Wenn er ihr nahe kommt, so zeigt er sein Verlangen durch öfteres Wasserlassen an einen erhabnen Gegenstand und durch Scharren auf der Erde mit den Vorder- und Hinterfüßen, vielleicht dieß letztere um sie beym Aufspringen nicht zu kratzen, und macht sonst noch allerley wunderbare Sprünge und Wendungen. Die Hitze dauert zehn bis vierzehn Tage, und sie ergiebt sich ihm mehrentheils nicht vor dem siebenten, nachdem einen oder zwey Tage vorher ihre Geburtstheile die Spuren eines Blutflusses haben bemerken lassen (gezeichnet haben) Sie läßt auch mehrere Hunde und von verschiedenen Rassen zu, woher eben die vielen Ausartungen entstehen, hängt mit dem größten, die sie vorzüglich liebt, am längsten zusammen, trägt neun bis zehn Wochen oder 63 Tage, wird als Jagdhündin in den letzten Wochen nicht auf die Jagd geführt, und wirft drey bis funfzehn Junge (Wölfe). Diese sind zehn bis zwölf Tage blind, und werden von der Mutter allein sorgfältig gepflegt, gesäugt und ernährt. Sie leckt, erwärmt, vertheidigt

theidigt und trägt sie an der Haut des Halses von einem bequemen Orte zum andern.

Die Jungen von einer Hündin, die zum erstenmal gebohren hat, nimmt man weg, weil sie mehrentheils nicht groß werden, und die Mutter selbst durch die Säugung entkräftet, und in ihrem Wachsthum gestöhrt wird. Uebrigens werden derjenigen Hündin, von welcher man eine gute Nachzucht zu hoffen hat, gewöhnlich nur einige, welche die gesundesten und munterſten sind, gelassen, welche sie wenigstens zwey Monate säugen muß, und denen, wenn sie durch die Muttermilch ihren Hunger nicht hinlänglich stillen kann, zuweilen Kuhmilch, oder in Milch eingeweichtes Brod vorgesetzt wird. Sie bleiben aufs höchste sechs Monate bey ihr.

Man zieht sonderlich diejenigen, die im Frühling gebohren sind, auf, weil sie im Sommer einen bessern Wuchs erhalten, und besser ihrer Bestimmung gemäß unterrichtet werden können, als diejenigen, welche im Spätsommer, Herbst oder Winter zur Welt kommen, und man hält sie gern und glücklich zu dem Geschäffte an, welches ihre Eltern trieben, weil sie sich dazu weit geschickter und billiger finden lassen, als zu einem andern. Die jungen Jagdhunde zieht man lieber mit Brod und Suppe, als bey Fleischern, Schäfern und Feldmeistern mit Fleisch und Aas auf, weil sie von letzterm unsauber werden, den Geruch verlieren, und nicht lange dauern.

Sie können schon nach dem neunten Monate ihr Geschlecht fortpflanzen, aber man läßt es ihnen nicht eher als nach dem ersten Jahre zu.

Krankheiten.

Unter den Hausthieren sind die Hunde vorzüglich vielen Krankheiten unterworfen, da sie nicht nur viele unangemessene Nahrungsmittel genießen, sondern auch überhaupt eine ihnen ganz natürliche Lebensart führen müssen. Wir wollen hier die vorzüglichsten *) mit ihren besten Heilungsmitteln angeben.

1) Fieberregungen (Fieber). Sie entstehen aus verschiedenen Ursachen, und äußern sich, mehrentheils auf folgende Art: Der Hund ist frostig, hat kalte Ohren, Nasen, und bleiche Lefzen, thut ängstlich, hängt den Kopf zur Erde nieder, und verliert die Freßlust. Die Natur hilft sich mehrentheils selbst, wenn ein Durchfall entsteht, und wenn dieß nicht geschieht, so giebt man ihm Rhabarber mit ein wenig Salz vermischt in einer Pflaume als Purganz ein, und die Krankheit hebt sich gewöhnlich.

2) Die Bräune (der Halsgeschwulst). Diese Krankheit stammt von schleuniger Abwechselung der Kälte und

*) s. Wie kann man mit gutem Erfolg kranke Hunde behandeln. Eine gründl. und nützl. Abhandlung von den Krankheiten der Hunde nebst den Heilmitteln. 8. Landshut und Leipzig. 1792.

und Hitze und von Wassermangel her, wodurch Stockung der Säfte und des Bluts in den kleinsten Adern entsteht. Das Zäpfchen im Hals und die Luftröhre entzündet sich, und der ganze Hals schwillt an. Man legt dem kranken Hunde äußerlich ein Kißchen mit zertheilenden Kräutern auf, reibt ihm das Maul mit Salbey aus, und schüttet ihm Essig, mit etwas Schießpulver vermischt, ein. Oder man öffnet ihm unter der Zunge und an den Ohren eine Ader, dann reibt man ihm den ganzen Rachen mit einer Mischung von Weizenmehl, pulverisirter Salbey und Salz aus, und giebt ihm alle zwey bis drey Stunden einen Eßlöffel voll Gummischleim oder noch besser saure Molken.

3) Flüsse. Sie entstehen von scharfen, zähen, dicken und verdorbenen Säften, und äußern sich durch örtliche Schmerzen oder Lähmungen an einem oder dem andern Theile des Körpers. Ein gelindes Reinigungsmittel oder zertheilende Pillen von zwey bis vier Gran Spießglas und drey bis sechs Gran Krebsaugen, beydes pulverisirt, und äußerliches Reiben und Waschen mit Kampfer heilen die Krankheit.

4) Lähmung der Glieder. Sie hängt mit obiger Krankheit zusammen, hat eben die Ursachen, wozu noch Erkältung zu setzen ist. Man wäscht den Hund das gelähmte Glied mit Ameisenspiritus und bäht es mit Umschlägen von Wachholdern in Wasser gekocht.

5) Das Verschlagen. Eine nicht seltene Krankheit der Jagd- und Hühnerhunde, die auf Hitze zu kalt trinken

trinken und dann ausruhen. Sie bekommen gewöhnlich Lähmung der Füße. Ein lauwarmes Ameisenbad hilft oft.

6) Die Räude, welche, wenn sie nicht angeerbt ist, von Erkältung, Unreinigkeit und schlechtem Wasser, sonderlich bey fetten und müßigen Hunden entsteht, und durch die dadurch verursachte Schärfe und Erhitzung des Geblüts in kleinen Bläschen und Geschwüren zuerst hinter den Blättern und Knieen sich zeigt, und dann oft den ganzen Körper einnimmt, ist eine ansteckende Krankheit. Man zählt vier- bis sechserley Arten, die kleine rothe, wo kleine röthliche Bläschen zum Vorschein kommen, die große, wo mehrere Stellen große Geschwüre bekommen, die gemeine, wo fast im Ganzen der Körper mit einer schuppigen Rinde überzogen wird, und die schwarze, bey welcher dem Hund die Haare ausfallen Wenn der Ausschlag nicht eitert, so heißt es die trockne, und wenn er eitert, die fette oder feuchte Räude. Das Waschen mit folgendem Decocte hilft vorzüglich. Man thut drey bis vier Loth weiße Nieswurz in einen neuen Topf, in welchen ein Quart Covent oder Nachbier gegossen wird, verklebt den Topf mit Sauerteig, läßt es bis zur Hälfte einkochen und thut dann eine gute Messerspitze voll Spiesglas (Antimonium crudum) hinzu. Andere rühmen folgende Salbe: Man nimmt zwey Händevoll wilde Kresse, zwey Händevoll Alantkraut, eben so viel Mengelwurz und Goldwurz, siedet diese Species in Essig und Lauge, thut zwey Pfund Seife darzu, und bestreicht damit den räudigen Hund.

7) Die

7) Die Hundeseuche (Hundekrankheit). Sie überfällt gewöhnlich Windhunde, Spürhunde, Doggen und andere große Hunde zwischen dem achten und zwölften Monate ihres Alters, Hühnerhunde, Dachshunde und andere kleine Hunde aber zwischen dem vierten und neunten, und fängt sich gewöhnlich mit thränenden Augen an, welches sie oft blind macht. Hierauf fängt der Hund an matt zu werden, geht wenig, schläft viel, verliert die Freßlust, und kann zuletzt die steif gewordenen Hinterbeine nicht fortschleppen, der Leib fällt nach hinten zu fast eben so sehr zusammen, als er in der Mitte aufgetrieben wird, die Haut am Unterleibe wird gelb und welk, und oft zeigen sich große Eiterblasen daran, er friert beständig, der Puls schlägt äußerst schnell, das Wasser läuft ihm aus Mund und Nase, dabey ist die Zunge ganz blaß, und er riecht übel aus dem Halse. Die Krankheit dauert, wenn sie stark ist, etwa sieben Tage. Zuvörderst müssen dem Hunde unter der Zunge die zwey Adern gelassen werden, daß es hinlänglich blutet, alsdann wird dieses Recept gekocht.

R.	Praecipitat rub.	4 Gran
	Antim. crud.	4 Gran
	Salmiac	6 Gran
	Ind. Rhabarb.	8 Gran.

Alles wird pulverisirt, gemischt, in vier Theile getheilt, und dem Hunde alle oder einen Tag um den andern, je nachdem er von starker Natur ist, gegeben, aber einige Stunden darauf saufen lassen. Wenn man dem Hunde einen Tag um den andern eingiebt, so

muß

muß man ihm an dem freyen Tage Leinöhl eingeben und ihm zu seiner Nahrung nur Kuhmilch, so warm sie von der Kuh kommt, reichen. In Wilhelm Taplins Stallmeister I. steht S. 374. ein oft und wiederholt erprobtes Mittel gegen die Hundeseuche. Es ist zum Erbrechen eine Pille von zehn Gran Jalappe und drey Gran Brechweinstein mit Honig oder Hagebuttenconserven gehörig geformt, und zum Eingeben mit Butter stark bestrichen. Dieß kann nach den Umständen entweder in der nämlichen Dosis oder vermindert noch ein- bis zweymal gegeben werden. Dann werden in einem Tage mehrmalen ein starker Abfutt von Raute, 1/2 Pfund Laxirlatwerge und Küchensalz von jedem 1/2 Loth und Baumöhl 2 Eßlöffel voll, wohlgemischt und hinlänglich warm als Klystier beygebracht.

Wenn sich der kranke Hund wieder zu erholen anfängt, so giebt man ihm in geringen Portionen Milchsuppe.

8) Aehnlich, aber weit gefährlicher ist die Staupe. Sie entsteht von Stockung und Verdickung der Säfte und vorzüglich von einem im Magen befindlichen zähen Schleim. Entweder die Krankheitsmaterie sucht sich gleich anfangs durch die Nase des Patienten einen Ausweg zu verschaffen, oder der dicke zähe Schleim bleibt hartnäckig in dem Magen zurück, wodurch die Krankheit fast unheilbar wird. Ekel gegen Nahrung, trockene heiße Nase, stätes Schnäufeln, Husten, Neigung zum Erbrechen ohne Erfolg sind die Zeichen der Krankheit. Beym schwächern Grad der Krankheit giebt man dem Patien-

ten

ten eine Pille von 6 bis 8 Gran Ipecacuacha, die man in mehrere kleine zertheilt, bis Erbrechen erfolgt. Dann gießt man ihm täglich einigemal ein Paar Tropfen Kienöhl in die Nase. Wenn sich kein Ausfluß aus der Nase zeigt, so wäscht man ihm mit dem oben Nr. 6 angegebenen Nieswurz-Decoct und giebt ihm täglich ein Pulver von 6 Gran Antimonium crudum, 3 Gran Merc. dulcis und 4 Gran Herbae Belladonnae. Doch muß man sich beym Einschütten der Arzeneyen vorsehen, da der Speichel oft giftig, und der Hund mit einer Art von stillen Wuth behaftet ist.

9) Die Tollheit oder Wuth. Die Hunde werden vorzüglich im Alter damit befallen, und zwar entweder im Sommer bey allzu großer Hitze, oder im Winter bey allzu großer Kälte, vornehmlich wenn sie sich aus der Kälte sogleich an warme Orte legen *). Auch Mangel des Saufens und frischen Wassers, heftige Zahnschmerzen, womit die Hunde sehr oft befallen werden,

*) Man hat die Bemerkung gemacht, daß in Gegenden, wo eine trocknende Luft herrscht, die Hunde eher toll werden, als in Gegenden, wo es feucht ist. Denn die Hunde, welche in der Hitze mit offenem Munde und vorhängender Zunge laufen, treffen in letztern Gegenden mehr Feuchtigkeit an, welche ihre Zunge immer naß, ja bisweilen in der größten Sonnenhitze so naß erhält, daß das Wasser in häufigen Tropfen auf die Erde fällt, welches man in erstern Gegenden nicht sieht. Diese Feuchtigkeit erhält ihr Geblüt durch die abgekühlte Zunge und Lunge in der gehörigen Temperatur.

den, vermodertes Fleisch in heißen Tagen, und vorzüglich versagte Begattung, scheinen Ursachen dieser gefährlichen Krankheit zu seyn. Die Jäger unterscheiden zweyerley Arten: 1) die hitzige oder die reissende, und 2) die laufende Wuth. Die erstere ist die allergefährlichste; was einem solchen kranken Hunde begegnet, beißt und vergiftet er, es sey Mensch, Hund, oder ein anderes Thier. Seine wie Glas glänzenden Augen sind etwas gebrochen, er trägt den Schwanz in die Höhe, und schäumt nur wenig. Die mit der letztern Art behafteten Hunde laufen beständig, meilenweit von einem Orte zum andern mit niedergesenktem Kopfe und Augen, die von einer Entzündung roth sind, lassen die blaue Zunge heraus und den Schwanz herunter und eingezogen hängen, schäumen stark, suchen die Hunde auf und beißen sie, aber nicht leicht die Menschen. Diejenigen Hunde, welche sie blutend beißen, werden auch toll. Beyde Aeußerungen der Tollheit lassen sich durch Merkmale vermuthen, auf die jeder Liebhaber der Hunde aufmerksam seyn muß, um die traurigsten Folgen dieser Krankheit zu verhindern. Sie meldet sich nämlich an durch ungewöhnliche Schläfrigkeit und Traurigkeit, durch beständiges Aufsuchen warmer Oerter, als Oefen und dergl., durch öfteres Hinschleichen nach dem Futter ohne zu fressen, durch schlaffe Ohren und Schwanz, durch Murren, wenn Menschen und Thiere ihnen zu nahe kommen, oder sie beunruhigen. Wie gefährlich es also sey, Schooshündchen zu halten, und wie behutsam man mit ihnen umgehen müsse, wird man daraus abnehmen können, weil man diese Vorboten der

Wuth

Wuth leicht als eine gleichgültige Unpäßlichkeit ansehen, und dadurch sich das allergrößte Unglück zuziehen kann.

Man hat diesem Uebel von langen Zeiten her vorzubeugen geglaubt, indem man den Hunden, wenn sie drey Vierteljahr alt waren, die weißliche Sehne, die unter ihrer Zunge liegt, und der Tollwurm genannt wird, herausschnitt, und man sagte, daß sie dadurch entweder gar nicht toll würden, oder doch, wenn sie ja die Wuth bekämen, nicht bissen, sondern stille lägen, bis sie stürben. Allein man verursacht leider! diesen Schmerz den Hunden ohne Nutzen, und hat die traurigsten Beweise von der Trüglichkeit dieses Vorbeugungsmittels. Denn dieses Zungenband, das nur den Thieren dieser Gattung eigen ist, dient darzu, ihnen ihre besondere Art des Saufens, das in einem geschwinden Hin- und Herziehen der Zunge besteht, zu erleichtern. Die vorzüglichsten Arzeneymittel, die man jetzo bey Menschen, welche so unglücklich gewesen sind, von einem wüthenden Hunde gebissen zu werden, mit dem besten Erfolg braucht, sind, äußerlich Brennen und dadurch verursachtes Eitern der gebissenen Stellen, und innerlich der eigentliche Maywurmkäfer *), als Maywurmslatwerge, und die Wurzel der Tollkirschstaude (Atropa Belladonna), die gepülvert in gewissen Dosen von einem geschickten Arzte gegeben werden muß.

Ein

*) Meloe Proscarabaeus et maialis L. Sie geben bey der geringsten Berührung ein Oel aus den Beingelenken, dem die Heilkraft eben zugeschrieben wird.

Ein bewährtes Mittel beym tollen Hundebiß soll noch folgendes seyn (die Species sind für eine erwachsene Person angegeben): 7 Loth Beyfuß, 6 Loth Camillenblumen, 6 Loth Wegbreitblätter, 3 Loth Liebstock, 5 Loth Guthangel oder Ebrotanum, 27 Stück gute frische Lorbeeren, 2 1/2 Quentchen pulverisirtes Eibenholz. Alles wird klein geschnitten, jedes schichtweis in einen eisernen oder sonst guten Topf gethan, mit 3/4 Stoff gutem Bier und eben so viel kaltem Wasser übergossen, der Topf mit einer Stürze bedeckt, mit Steinen beschwert, mit Teig verklebt und vier Stunden mäßig gekocht, so daß kein Dampf heraus geht, alsdann nach und nach abgekühlt, durch ein leinen Tuch geseiget, und in Bouteillen gefüllt und verstopft. Gut ist es sechs Portionen für sechs Patienten zugleich zu machen, weil alsdann die Arzeney mehr Kraft erhält. Den Patienten wird die Ader am Arme gelassen, alsdann nimmt er des Morgens und Abends jedesmal 1/8 Stoff oder 1/2 Quartier. Die Portion muß ganz ausgetrunken werden. Die Wunde wird mit Essig rein gehalten und mit dieser Arzeney auf Tüchern belegt.

Diese Arzeney wird auch bey Thieren gebraucht. Sie soll probat seyn.

Frische Zwiebeln in einen Umschlag auf die Wunde gelegt, soll probat seyn, es wird immer abgewechselt und die Zwiebeln sind allezeit schwarz. s. Allgemeine deutsche Bibliothek. 96. B. 1. St. S. 89.

Ein

Ein sicheres Mittel bey der Hundswuth im Anfang der Krankheit soll seyn: Mineralischer Turpith, einem erwachsenen Hunde vier Gran mit gereinigten Salpeter oder Weinsteinrahm in Pillenform gegeben. Es muß in zwey Stunden Erbrechen bewirken, sonst wird es noch einmal gegeben. Bessert sich der Hund, und zeigt Freßlust, so giebt man ihm am folgenden Tage saure Milch und der Hund soll so genesen *).

10) Triefende und entzündete Augen. Eine gewöhnliche Krankheit der Hunde, die man dadurch hebt, wenn man ihnen bloßes Wasser von faulen Borsdorfer Aepfeln, oder Rosenwasser, in welchem ein wenig Bleyzucker zerrieben ist, auf die Augen legt.

11) Der Durchfall. Diesem sind die Jagdhunde oft unterworfen, wenn sie sich nach einer großen Erhitzung erkälten. Man unterscheidet diese Krankheit vom bloßen dünnen Leibe dadurch, daß die Exkremente sehr flüßig, und mit allerhand fremden Materien abgehen. Bohnenmehl mit Siegelerde vermischt zu einem Brey gekocht, und den Hunden nüchtern zu fressen vorgesetzt, curirt diese Krankheit, welche, wie die Ruhr, ansteckt. Ein Brechmittel von zehn bis zwölf Gran

*) Ist der Hund getödtet, und man will wissen, ob er toll war, so giebt man folgendes Zeichen als zuverläßig an, daß man ein Stück Braten in den Rachen des todten Hundes herumreibe, selbiges einem ausgehungerten Thiere vorwerfe; läßt dieses den Braten liegen und läuft mit Schrecken davon, so war der erlegte Hund wüthend.

Ipecacuanha im Anfang der Krankheit ist auch dienlich. Bis der Leib gestopft ist muß der Hund bloß Suppe mit Schöpsenfett geschmelzt fressen.

12) Die Verstopfung. Dieses Uebel erkennt man an den vielen unnatürlichen Bewegungen der Hunde, um den Unrath von sich zu geben, und es ist besonders bey jungen Hunden gewöhnlich. Man purgirt sie. (s. n. 1.) *)

15) Der Ohrkrebs (Ohrwurm). Diese Krankheit fängt mit einem Geschwulst an der Spitze oder hinter den Ohren an, aus welchem eine stinkende Materie fließt, die immer weiter um sich frißt. Mit dem besten Erfolg brennt man den angegriffenen Theil mit einem glühenden Eisen, oder schneidet die Stelle aus.

14) Der Kropf (Halsgeschwulst) rührt von einer stockenden Feuchtigkeit her, die eine widernatürliche Ausdehnung der Haut verursacht, so daß die Hunde weder fressen noch saufen können. Man zertheilt diesen Geschwulst,

*) Mit Clystiren gleich zu helfen ist schädlich. Man giebt den Kräften, womit sich die Natur immer selbst hilft, durch diesen unnatürlichen Weg der Hülfe, eine ganz schiefe Richtung, und man muß alsdann, wie bey den Menschen, die durch dieses Mittel verwöhnt sind, bey jedem kleinen kränklichen Zufall sich desselben bedienen. Ist die Krankheit so hartnäckig, daß man bloß durch dieß Mittel zu helfen gedenkt, so macht man ein Clystir von Camillenknospen, Fenchelsaamen in Wasser gekocht und etwas Leinöhl und Salz zugethan.

schwulst, indem man den Hunden warme Umschlage von in Essig dick gekochten Linsen um den Hals legt.

15) Verrenkungen. Man zertheilt den Geschwulst leicht durch ein Quart Weinessig, ein halb Quart weißen Wein und ein Loth Salmiak. Ist kein Geschwulst da, so reibt man den leidenden Theil mit einer aus Oehl und Schweinefett bereiteten Salbe.

16) Wunden. Diejenigen, welche die Hunde belecken können, heilen von selbst sehr bald, und die andern behandelt man, wie an den Menschen.

Feinde.

Die Hunde werden von den Fliegen, Bremen (Tabanus), Stechfliegen (Conops) und Mücken gar sehr verfolgt, und die Stechfliegen setzen sich vorzüglich gern in großen Gesellschaften an die Ohren, saugen das Blut aus, und verursachen dadurch Entzündung dieser Theile und Grind. Wenn man die Hunde mit Wasser bestreicht, worinn bittere Mandeln und Wermuth zerrieben sind, so sind sie vor diesen Verfolgern sicher.

Die Kuhmilben *), die auch Hundezecken, Hundeläuse genannt werden, fressen sich besonders den jungen Hunden, die nicht reinlich gehalten werden, in die Haut ein, und verursachen Grind. Desgleichen

*) Acarus ricinus, L. Sie sehen gelblich aus.

plagen die Hundemilben *) und Hundeflöhe, die etwas heller aussehen, als diejenigen, welche die Menschen heimsuchen, diese Thiere gar sehr. Man trifft auch zuweilen, und zwar in Menge, Filzläuse (Pediculus pubis) auf ihnen an. Eben so sind sie oft mit kleinen Zangenläusen (Ricinus), die ihnen kahle Flecken fressen, überfäet. Man schwemmt, zur Vertilgung aller dieser Feinde, die Hunde im Seifenwasser, siedet grüne Nußschalen in Wasser ab, und bestreicht sie nach dem Bade damit, und sie weichen von ihnen.

Der Bandwurm **), den man den Hundebandwurm nennt, wird bey den Hunden häufig angetroffen, Das Nufferische Specificum, welches aus Farrenkrautwurzeln mit Honig und Scammonium, von jedem gleichviel, bereitet, und den Hunden nach einer Suppe gegeben wird, soll den Wurm tödten und abführen. Oft werden sie auch vom Spul- und Springwurm (Ascaris) geplagt.

Wenn die Hunde, besonders die jungen, viel Rund- oder Bandwürmer bey sich haben, so sind Unluft, Schwindel, Heißhunger, convulsivische Bewegungen und vorzüglich Beißen in die linke Seite des Unter-

*) Acarus reduvius, L. Sie sind grauröthlich.

**) Taenia canina, L. Der Hundewurm. Er ist schmal und besteht aus langen Gelenken. Man findet eigentlich dreyerley Arten im Hunde, den Kettenbandwurm, den kürbiskernigen, und den zackengliedrigen.

Unterleibes die Anzeigen davon. Man nimmt acht Gran Sabadillsaamen und Kapseln (Semen et capsul. Sabadillae) und acht Gran Gummi guttae praepar. mit einer kleinen Mischung von Rhabarber und macht sie zu einer Pille. Diese Arzney braucht man sechs bis acht Tage hintereinander und laxirt dabey den Hund mit Glaubersalz und Rhabarber.

Andere nehmen 1 Scrupel Wermuthsaft, 1 Scrupel Leberaloe, 2 Scrupel Hirschhorn, 2 Scrupel Schwefel, machen dieß mit Nußöhl zu einer Pille und geben es dem Hund wie oben ein.

Nutzen.

Wegen der Menge vorzüglicher Eigenschaften und der großen Nutzbarkeit, wodurch die Hunde dem ganzen Menschengeschlechte wichtig werden, hat man sie von den ältesten Zeiten her ihrer natürlichen Wildheit entrissen, oder wie andere wollen, sich dieselben durch die Begattung der gezähmten wilden Thiere ihrer Gattung zu verschaffen gesucht, und ihnen unter den zahmen Hausthieren einen vorzüglichen Platz angewiesen. In ihnen vereinigen sich auf eine sehr nützliche Art Schönheit, Stärke, Geschwindigkeit und eine Menge anderer Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir an andern Thieren zerstreut bewundern. Besonders zeichnen sie sich durch ihre Gelehrigkeit, und die Feinheit ihrer äußerlichen Sinne aus. Außerdem sind sie gerne um die Menschen, und sind denselben bewundernswürdig getreu. Sie lassen für ihre Herren das Leben, und wenn sie

auch barbarisch von ihnen behandelt werden. Sie wissen sie durch ihre Hauptsinne, Gehör und Geruch, von tausend Personen zu unterscheiden, verstehen ihren Wink und ihre Mienen, und suchen sie, wenn sie sie verlohren haben, in der Entfernung einer Tagereise oft wieder auf. Sie unterwerfen sich willig den härtesten Züchtigungen, vergessen die Beleidigungen sehr bald, und gedenken der Wohlthaten sehr lange. Sie hassen alle Faulheit, und suchen sich daher immer was zu schaffen zu machen. Sie sind wachsam und beschützen Häuser, Güter und Heerden. Keine Heerde, kleines oder großes Vieh, kann ohne sie in Ordnung erhalten werden. Sie lassen sich zu allerhand künstlichen und lustigen Handlungen abrichten, als den Bratspieß und Schleifstein zu drehen, zu tanzen, zu trommeln u. s. f. Sie ziehen kleine Schlitten und Karren, und werden daher in Kamtschatka im Winter, wie die Pferde gebraucht. Vier Hunde ziehen drey erwachsene Personen und 60 Pfund Gepäcke sehr behende fort, und ihre gewöhnliche Ladung ist 240 Pfund. Sie werden sogar in Nordamerika auch zum Lasttragen gebraucht *). Auch in Frankreich pflegt man sie an manchen Orten an den Wagen zu spannen, um Waaren fortzubringen. Sie suchen Trüffeln und zeigen den Ort, wo sie dieselben durch ihren feinen Geruch spüren, dem Trüffeljäger durch Kratzen an. Den größten Nutzen aber leisten sie bey der Jagd anderer Thiere.

*) Sam. Hearne Journey from Prince of Wales's Fort in Hudsonbay to the northern ocean. London 1795. 4.

Thiere *). In Norwegen gewöhnt man sie zum Vogelfang, und zum Klettern auf solche steile Anhöhen, wohin ihnen kein Mensch folgen kann. Es hält mancher Pachter oft sechzehn solcher Vogelhunde. Sie sind klein, lang und geschmeidig, und haben kurze Füße. Diese Jagd trägt solchen Pächtern oft das meiste ein. Auch zum Fischfang lassen sie sich abrichten. Ja man würde ein Buch schreiben können, wenn der ganze Umfang ihres Nutzens, den sie durch ihre vorzügliche Seelen- und Leibeskräfte leisten, beschrieben werden sollte.

Auch durch den Tod werden sie den Menschen noch nützlich.

Ihr Fleisch ist sehr schmackhaft, und in Grönland, Ostindien, China und auf der Goldküste hält man ganze Heerden, die man mästet, schlachtet und ißt. Und es scheint in der That, als wenn die Vorsehung uns durch ihre so starke Vermehrung ein schickliches und wohlfeiles Nahrungsmittel hätte anbieten wollen. Vor Alters wurde es nach Hippokrates (περι διαιτης II.) Bericht in Griechenland und nach Plinius (hist. nat. XXXIX. 4.) Zeugniß in Rom gegessen. Auf den neu entdeckten Inseln des Südmeers, besonders auf Otaheite wird der von Vegetabilien genährte und in heiß gemachten Steinen gebackne Hund, als eine große Delikatesse nicht nur von den Eingebohrnen, sondern selbst von den Europäern gespeist.

*) s. die Rassen der Hunde.

Das Fett, sonderlich von verschnittenen, wenn es gut ausgelassen worden ist, schmeckt wie Gänsefett, heilt innerliche Gebrechen, und hilft, so wie ein genossener Braten von ihnen, den Schwindsüchtigen.

Die Haut liefert weiß gegerbt gute Handschuhe und Unterfutter unter Masken, und roth gegerbt Schuhe und Stiefeln.

Die Kamtschadalen bereiten die Hundefelle auf eine besondere Art zu, und machen aus diesem Pelzwerke die prächtigsten Staats- und Festtagskleider. Auch bey den Chinesen stehen sie in Ansehen, und diese kaufen daher von den Russen oft das Stück für einen Rubel. Man beschlägt auch bey uns Stühle damit, macht Kissen, Tobacksbeutel und Mützen davon, und der Kürschner verarbeitet die Felle der Budel als Unterfutter, und zu Müffen und Handschuhen. Strümpfe von Fellen und Haaren kaufen die Podagristen und die Haare einiger, als der Budel, geben feine Hüte, Strümpfe und Salleisten an manchen Tüchern.

In Oertern, wo vieler Saffian bereitet wird, als in Frankreich und der Levante hält man viele Hunde bloß um ihres scharfen Kothes willen, den man sammelt, und damit, auf die Fleischseite gelegt, das Haar der Felle wegbeizt.

Und wie viel ist die Arzeneykunde der Zergliederung dieser Thiere schuldig? An lebendig zergliederten Hunden lernen mehrentheils junge Aerzte den innern

thieri-

thierischen Bau, den Mechanismus des Athemholens, die Circulation des Bluts, die Reizbarkeit der Nerven u. dergl. kennen.

Die Arzneymittel von den Hunden, der Speichel, das Gehirn, die Leber, die Galle, das Blut, das Haar, das Herz und der weiße Koth, weißer Enzian (Album graecum. Merde de Chien:) genannt, sind ziemlich aus der Mode gekommen, doch braucht man letztern noch mit gutem Erfolg zur Reinigung der Wunden von bösartigen Geschwüren.

Bey Kolikschmerzen, die von Erkältung herrühren, bindet man junge auf den Unterleib.

Bösartige Flechten und Engbrüstigkeit hat man glücklich damit vertrieben, indem man junge Hunde mit ins Bett genommen hat. Sie bekommen diese Krankheit und die Kranken genesen. Eben so sind Lähmungen der Arme geheilt worden, indem man einen Hund auf dem leidenden Arme schlafen ließ*).

Die Schmerzen des Podagras sollen durch das Lecken der Füße gelindert werden, und oft den Hund kontrakt machen. Eben dasselbe heilt auch Wunden und Geschwüre.

Manchen Kindbetterinnen und stillenden Müttern leisten junge Hunde, die noch blind sind, gute Dienste, indem

*) Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. II. 4. S. 195.

indem sie ihnen entweder den zu großen Ueberfluß von Milch aussaugen, oder die zu tiefliegenden Brustwarzen in die Höhe ziehen und verbessern.

Neuerlich hat man auch den Magensaft der Hunde, so wie aller Raubthiere, für äußerliche Krebsschäden und andere faulen Geschwüre gar sehr angepriesen *)

Schaden.

Man würde den Hunden gar keine schädlichen Eigenschaften zuschreiben können, ob sie gleich oft im Zorn, wo sie die Haare sträupen und mit den Augen funkeln, unschuldige Menschen und Thiere anfallen, wenn sie nicht so leicht mit der fürchterlichen Krankheit der Hundewuth befallen würden **).

Oft beschuldigt man auch mit Unrecht die Katzen, daß sie die Vögel in der Schneuß ausnähmen, da es oft die Bauernhunde und Spitze eben so gern thun.

Irrthümer und Vorurtheile.

Die Behauptung, daß die Südamerikanischen Hunde nicht bellen könnten und die Europäischen dahin gebrachten, zu bellen aufhörten, beruht auf einem Mißverständniß. Die ersten Eroberer von Amerika fanden nämlich

*) A. a. O. III. 3. S. 80.
**) s. Krankheiten. S. 592.

nämlich in Mexiko ein stummes Thier Techichi, das den Hund an Gestalt ähnlich war, und dieß hat durch eine Verwechselung den Anlaß zu jener Behauptung gegeben. Auch mag dieß mit eine Ursache seyn, daß der Wolf, welcher nicht bellt, vor der Entdeckung Amerikas, der Amerikaner Hund war. Molina Naturgeschichte von Chili. S. 239.

2) Daß die Hunde, denen der Tollwurm genommen wäre, nicht toll würden, ist oben schon erwähnt worden.

3) Außer denen vorhin angegebenen unwirksamen Arzeneymitteln von Theilen des Hundes werden auch noch folgende angegeben, die wirklich noch bey manchem einfältigen Landmann im Gebrauch sind:

a) Wenn man sich wehe gethan oder etwas im Leibe zerrissen hat, so muß man einen jungen Hund essen, ehe er noch sieht.

b) Wenn man den ausgeschnittenen Tollwurm bey sich trägt, so schadet einem kein toller Hundebiß.

c) Ein Wurm aus dem Aase eines tollen Hundes aufgelegt, vertreibt die Wasserscheu.

d) Das sehnige, auch gesalzene Fleisch eines tollen Hundes ist ein Mittel wider die Hundewuth.

e) Vom tollen Hunde auf die Wunde gelegt, verhindert die Wasserscheu.

f) Wenn

f) Wenn man den Backenzahn eines tollen Hundes, womit er gebissen, in Leder eingenäht, am bloßen Arm trägt, so wird man von keinem tollen Hunde gebissen.

g) Den Tollwurm dreymal um einen unfruchtbaren Baum getragen und eingenommen, bringt dem Gebissenen Genesung.

h) Wer von einem tollen Hunde gebissen ist, und nimmt von dessen Galle nur einer Linse groß ein, so muß er entweder in sieben Tagen sterben, oder hat, wenn er diese überlebt, Hoffnung zur Genesung.

4) Wenn man ein Haus mit dem Blute eines schwarzen Hundes bestreicht, so kann es nicht behext werden, eben so, wenn man das männliche Glied desselben unter die Thürschwelle gräbt.

5) Wenn man baumwollene Dachte mit Ohrenschmalz von Hunden bestreicht, und sie in einer grünen Lampe mit Oehl anbrennt, so scheinen alle herumsitzende Personen Hündeköpfe zu haben.

6) Die Haut vom männlichen Glied an der Stelle, wo jemand sein Wasser gelassen hat, mit Erde bedeckt, verursacht, daß er, so lange die Haut mit Erde bedeckt ist, das Wasser nicht halten kann.

7) Die Krallen eines Hundes nebst Drachenschwanz bey sich getragen macht fast, daß man nicht kann überwunden werden.

8) Wenn

8) Wenn man die im Hundekoth gefundenen Knöchelchen Kindern anhängt, so verbrennt sich keins.

9) Wenn man einen Weintrinker dazu bringen will, daß er Lerm anfangen soll, so darf man ihm nur einen Stein, worein ein Hund gebissen hat, in den Wein werfen.

10) Wenn ein Hund nicht entlaufen soll, so muß man ihn vom Kopf bis zu den Füßen mit Butter bestreichen und mit einem grünen Rohr vom Kopf bis zum Schwanz messen.

11) Wenn einem ein Hund nachlaufen soll, so darf man ihm nur an ein Tuch riechen lassen, worein die Haut, in welcher ein junger Hund zur Welt gekommen, gewickelt ist, oder ihm einen gekochten Frosch vorwerfen.

12) Soll dich kein Hund anbellen, so halte einen Zahn von einem schwarzen Hunde in der Hand, oder auch einen lebendigen Frosch. Besser aber ist, wenn man das Herz eines schwarzen Hundes verzehrt.

(10) 14. Der gemeine Wolf.

Taf. VI. Fig. 1.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Wolf und Wolfhund; das Weibchen Wölfin.

Canis Lupus. *Gmelin Lin.* I 1. p. 70. n. 2.

Loup. *Buffon* hist. nat. VII. 39. t. 1. Ed. de Deuxp. II. T. 5. f. 1. Ueberf. von Martini IV. 57. XV. 93.

Wolf. *Pennant* hist. of Quadr. I. 248. Meine Ueberf. I. 261.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 148.

v. Schrebers Säugeth. III. 346. Taf. 88.

Goeze's Fauna. I. 135.

Donndorfs zool. Beytr. I. 180. Nr. 2.

Ridingers wilde Thiere. Taf. 21.

Kennzeichen der Art.

Mit dicken Kopf, spitziger Schnauze, aufrechten Ohren, und buschigen zwischen die Hinterbeine gezogenen Schwanze.

Gestalt

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Man könnte den Wolf billig einen wilden Hund nennen, so sehr ist er demselben in seinem innern und äußern Körperbau ähnlich. Er hat beynahe die völlige Gestalt eines großen Schäferhundes, doch einen stärkern und gestrecktern Leib, einen größern Kopf, und höhere stämmigere Füße. Auch in den Kinnladen und in den Muskeln des kurzen Halses und der Beine besitzt er eine größere Stärke, so daß er Ochsen und Pferde niederzureißen im Stande ist.

Die Länge seines Körpers ist vier Fuß auch drüber und die Höhe drey Fuß *). Der Kopf ist länglich, der Hinterkopf dick und stark, die Stirn flach und breit, die Schnauze von den Augen an spitzig wie am Fuchs. Der Rachen ist beynahe bis an die Ohren gespalten. Die Zunge ist lang und rauch. Er hat, wie die Hunde sechs gelappte Vorderzähne in beiden Kinnlagen, vier einzelne große Eckzähne (Fänge) und auf jeder Seite sechs zackige Backenzähne. Doch sind sie in der Bildung von den Hundezähnen unterschieden. Die beyden äußern Vorderzähne in der obern Kinnlade haben nämlich nur eine Spitze, und sind gegen die nebenstehenden schief abgeschnitten, und die nämlichen in der untern Kinnlade haben an der Seite nach den Eckzähnen zu ein Zäckchen,

*) Par. Ms. Körper 3 Fuß 6 Zoll; und drüber Höhe 2 Fuß 6—8 Zoll; Schwanz 1 Fuß 6 Zoll.

Zäckchen, die beyden folgenden in der obern und untern sind ebenfalls damit versehen, die beyden mittelsten aber haben an beyden Seiten eins. Jeder von diesen Zähnen hat auf der innern Fläche fast ringsumher eine erhabene Einfassung, die in der untern Kinnlade weniger stark ist. Die Eckzähne sind etwas auswärts gebogen, und an der vordern sowohl, als an der hintern Seite mit einer stumpfen Schneide versehen. Der vorderste Backenzahn ist klein, rundlich und stumpf, der zweyte breitlicher, und die folgenden spitziger, breiter und stärker, als beym Hund Die dunkel grünlichgelben Augen, und die Augenlieder sind abwärts gesenkt, und die Augen stehen also schiefer, als beym Hund, sind klein, funkeln im Dunkeln, und sind wegen ihres scheelen Blicks schauerlich anzusehen. Die Ohren sind kurz, spitzig und stehen aufgerichtet. Der Hals ist kurz und stark; die übrige Proportion des Leibes, wie beym Hunde. Den dick behaarten Schwanz (Ruthe, Standarte), welcher ein Fuß zehn Zoll lang wie ein Fuchsschwanz gestalten und in der Mitte etwas dicker ist, trägt er entweder grade herabhängend, oder die Spitze (Blume) zwischen die Beine (Läufte) eingezogen. Seine derben Füße sind mit grade stumpfen Nägeln (Klauen) besetzt und die Hinterballen stark und herzförmig. Im Gange (Trabe) ist er plump, langsam und schüchtern wegen der vielen Verfolgungen, denen er von Menschen ausgesetzt ist.

Das Haar ist ziemlich lang, am Unterleibe und den Hinterkeulen am längsten, am Halse steif und besonders an den Seiten aufrecht stehend, und wechselt im Sommer und Winter die Farbe. Im Sommer ist es auf

dem

dem Rücken rothgrau, im Winter aber gelblichbraun mit grau und schwarz gemischt und am Bauche immer schmutzig weiß oder weißgrau. Der Schwanz hat gleiche Farbe. Die Vorderfüße sind gelbbräunlich mit einem weißen Streif auf der innern und einem schwarzen auf der obern Seite, welcher bis an den eigentlichen Fuß reicht, und die Hinterfüße auf der auswendigen Seite bräunlich und auf der inwendigen weißgrau gezeichnet.

Den, welchen ich im Jänner 1798 auf dem Thüringerwalde sah, war folgender Gestalt gezeichnet. Die Hauptfarbe war fuchsgelb nach dem Rücken zu mit Schwarz überlaufen, und dieß macht denn die sogenante Wolfsgraue Farbe. Die Einfassung des Rachens gelblichweiß; 21 Bartborsten auf jeder Seite der obern Kinnlade; die Schnauze fuchsroth bis zu den Ohren; zwischen Augen und Ohren der Kopf gries d. h. weißlich, schwarz und grau; die Wangen gelblich; am ganzen Leibe die Grundwolle aschgrau; am Oberleibe die Mitte der Haare fuchsgelb, die Spitzen schwarz, daher das gelbliche schwarzmelirte Ansehen; die Seiten fuchsroth mit weiß gemischt; der Unterleib fuchsgelb; die äußere Seite der Vorder- und Hinterbeine fuchsroth, erstere vorne schwarz angelaufen; die inwendigen Beine gelblichweiß; der Schwanz wie der Rücken, am Ende schwarz zugespitzte Haare.

Die Wölfin hat einen spitzigern Kopf und dünnern Schwanz, ist niedriger und schwächer.

Man sagt, daß die Afrikanischen Wölfe große Köpfe und Hälse hätten; die Amerikanischen aber

kleiner als die Europäischen wären. In Frankreich soll es auch zweyerley Rassen geben, die eine mit hohen Läufen, die von dem geschwindesten Windhunde kaum eingeholt werden könnte; die andere sehr dick und untersetzt. Solche Abweichungen treffen sich auch in Deutschland, und unter allen Thieren. Einige machen auch einen Unterschied unter den lang- und kurzhärigen.

Farbenvarietäten: 1) Der weiße gemeine Wolf. C. L. albus.

Eine Seltenheit. 2) Der schwarze Wolf (Canis Lycaon) so wie

3) der Hauswolf oder der gezähmte Wolf gehören nach Amerika.

Zergliederung.

Hier zeigen sich von dem Hunde folgende Abweichungen.

Die Brust ist weit und mit zwölf Rippen ausgefüttert. Die Luftröhre ist ebenfalls weit. Die Lunge besteht aus zwey großen Lappen, davon der rechte wieder in vier und der linke in drey getheilt ist. Das Herz ist beynahe rund. Der Magen im Grunde groß und in der Mitte enge. Die Leber ist am Rande gelblichroth, und scheint in Riemen abgetheilt zu seyn. Sie besteht aus zwey großen Lappen, die zusammen neun

kleine

kleine haben, woran die Jäger ein Kennzeichen der Jahre und des Alters haben wollen. Die Harnblase ist sehr groß.

Merkwürdige Eigenschaften.

Der Geruch des Wolfs ist so wie sein Gesicht und Gehör, sehr scharf. Seine größte Stärke besitzt er in den vordern Theilen des Körpers, in dem Hals und den Kinnbackenmuskeln. Er läuft mit einem Hammel, den er im Rachen trägt, ohne diesen die Erde berühren zu lassen, ziemlich schnell davon. Er bellt nicht, sondern heult gräßlich, wie ein Hund.

Von Natur ist er ungeschickt und furchtsam, aber die Noth macht ihn verschlagen und beherzt. In den Wildnissen der gemäßigtern Himmelsstriche Europens geht das Männchen in Gesellschaft seiner Gattin oder eine Gesellschaft von mehrern (Rotte), wenn es nöthig ist, zusammen auf den Raub aus. Beyde Männchen und Weibchen haben einen allen Thieren unausstehlichen Geruch. Sie riechen fast wie die Füchse, doch weit stärker und widriger, und man kann den Geruch lange nicht von den Händen bringen, wenn man einen Wolf den Balg abgezogen (gestreift) hat.

Sie sollen 15 bis 18 Jahre leben.

Verbreitung und Aufenthalt.

Dieß Raubthier, das in allen Welttheilen und fast unter allen Zonen in Wäldern wohnet, wird in Deutschland

land immer seltner, und ist in Thüringen fast gänzlich ausgerottet. Nur selten kömmt es aus den östreichischen, mährischen, böhmischen und fränkischen Wäldern herauf und durchstreift in harten und anhaltenden Wintern die dicksten Gegenden des Thüringer Waldes *). Unsere Jäger halten es daher für ein Zugsäugethier, wie die Zugvögel.

Der Aufenthalt der Wölfe ist unbeständig, wegen ihrer Nahrung. Vorzüglich lieben sie düstere Wälder, Dickige, Brüche mit morastigen und trocknen Stellen, in welchen sie sich am Tage verbergen. Hier ist es auch, wo sie sich begatten, und die Mutter ihre Jungen gebiert.

Nahrung.

Der Wolf ist unter den Raubthieren vorzüglich dasjenige, welches mit vieler Mühe und weiten Reisen seine Nahrung sich verschaffen muß, und die Erlangung derselben hängt immer von einem ohngefähren Zufall ab. Der Mensch verbirgt mit äußerster Sorgfalt immer alle diejenigen Thiere vor ihm, von deren Raub er sich nähren muß, und diejenigen, welche nicht unter menschlicher Aufsicht stehen, machen ihm immer die größte Mühe, sie in den dicksten und größten Wäldern aufzusuchen

*) In den waldigen und gebirgigen Gegenden von Niederöstreich, Steyermark, Kärnten und Salzburg werden sie noch am häufigsten angetroffen.

suchen und sich ihrer zu bemächtigen. Besonders geht es ihm im Winter zuweilen sehr kümmerlich, wo ihn aber auch bey großem Hunger seine sonstige Furchtsamkeit verläßt und Kühnheit an ihre Stelle tritt. Des Tages über hält sich der gefräßige und unersättliche Wolf im Frühjahr in den dicksten Gehölze und im Sommer, wo möglich, in hohen Getraide auf, und geht gewöhnlich nur, wie die Diebe, des Nachts auf den Raub aus. Er verfährt dabey sehr behutsam, und nimmt die besten Maasregeln, um sein Leben nicht in Gefahr zu setzen. Er geht nie aus seinem Hinterhalte hervor, ohne vorher zu wittern und zu horchen, und soll sich, wenn er nur mit dem Fuße an etwas anstößt, vor Unwillen Geräusch gemacht zu haben, in denselben beißen. Er scheut gespannte Stricke, Thüren und Thore und springt lieber über Hecken und Mauern. Er hat einen sehr feinen Geruch (Witterung) und wittert über eine Viertelstunde weit, sehr genau, was für eine Art des Raubes ihm zu Theil werden wird; und ist ihm dieser nach seinem Gaumen, so sind die andern Thiere, welche ihm an dieser Jagd begegnen, vor seinem Morden sicher. Im größten Hunger greift er Menschen an, und hat er einmal ihr süßes Fleisch gekostet, so lauert er beständig auf diese Nahrung, schleicht in die Dörfer, raubt Kinder, und gräbt sogar die todten Leichname aus. Im Hunger fällt er auch in Gesellschaft wilde Schweine, Pferde und erwachsenes Rindvieh an, besonders, wenn sie des Nachts auf der Weide bleiben, auch jagt er auf diese Art Hirsche, vorzüglich trächtiges Rothwildpret, ja sogar Bären. Mit seinem Weibchen allein ermüdet er listig

das schnelle Reh und den jungen Hirsch, wobey zu bewundern ist, daß man, wenn Schnee liegt, findet, daß das Weibchen gerade in die Fußtapfen des Männchens getreten ist, daß man also glaubt, nur ein Wolf habe diese Spur gemacht. Im Winter, wenn der Hunger zu groß ist, und sie Paar und Paar nichts erjagen können, versammlet sich zuweilen eine ganze Gesellschaft Wölfe durch ein gräßliches Geheul zu einer förmlichen, künstlichen Jagd. Sie vertheilen sich auf die Wege (Wechsel), welche das Wild, das sie fangen wollen, gewöhnlich zu gehen pfleget, und jagen es dann einer dem andern zu, um es desto leichter zu ermüden und zu erhaschen. Lämmer, Frischlinge und Gänse sind die Lieblingsspeisen des Wolfes. Trifft er letztere auf der Weide an, so würgt er einige, legt ihre Hälse kreuzweiß über einander, faßt sie daran mit seinem Rachen, und läuft so mit ihnen davon. Die Schaafe stiehlt er aus den Horden und Ställen. Er ist oft so dreiste, daß er sich bey trüber, neblicher, regenhafter und schneyender Witterung an die an Schaf- und Viehställen liegende Hecken schleicht, und sich unter den Schwellen durchgräbt. In den Ställen würgt er dann alles, ist in diesem Geschäfte oft so emsig, daß er auch die Schüsse und alles Klingeln, das ihm sonst so sehr zuwider ist, nicht scheut; und ist er einmal in einem Hof eingebrochen, so wagt er alles, um einen Hund, ein Schaf, Schwein, eine Ziege, oder ein Stück Federvieh mit fortzuschleppen. Hasen, Kaninchen, Ratzen, Hamster, Maulwürfe, Mäuse und Waldvögel erlauscht er sehr listig. In Ermangelung lebendiges Viehes stillt er auch seinen Hun-

ger

ger mit ausgeworfenen Eingeweiden und mit Aas, und in der äußersten Noth fällt der Stärkere den Schwächern selbst an. Seinen Raub weiß er sehr künstlich aus der Haut, ohne große Verletzung derselben, auszuschälen. Nach genossener Mahlzeit wälzt er sich. Er purgirt sich auch zuweilen, wie die Hunde mit Gras, oder schafft sich die Knochensplitter auf diese Art aus dem Magen und den Gedärmen.

Noch ist zu bemerken, daß die Wölfin nicht leicht in der Nähe ihrer Jungen raubt, damit diese unentdeckt bleiben.

Fortpflanzung.

Die Zeit der Begattung (Ranzzeit, Rollzeit) beginnt zu Ende des Decembers und dauert bis in die Mitte des Hornungs; doch bleibt jedes Paar nur 14 Tage hitzig. Zwey und drey Wölfe kämpfen oft grimmig um ein Weibchen. Bey ihrer Begattung hängen sie, wie die Hunde, wegen des aufschwellenden knochenartigen Wulstes an ihrer Ruthe zusammen. Das Weibchen ist des Jahr nur einmal und zwar 2 1/2 Monat oder 11 Wochen trächtig, und wirft (wölft) alsdann in einsamen düstern Wäldern in einem selbstgegrabenen Loch unter Baumwurzeln, oder unter einem Ufer, oder in einem alten vergrößerten Dachs- oder Fuchsbau auf ein von Moos bereitetes Lager, ihrem Alter nach, 3 bis 9 Junge, welche einer gewöhnlichen falschen Sage nach, mehrentheils weiblichen Geschlechts seyn sollen. Die Jungen werden blind gebohren, bleiben in diesem Zustande 10 Tage, die Mutter säugt sie 5 bis 6 Wochen und verbirgt sie, bis sie laufen

fen können, sehr sorgfältig vor dem Vater und ihres Gleichen, welche sie sonst auffressen würden. Sie trägt sie auch, wie die Füchsin, wenn sie die Witterung von Menschen in ihrer Abwesenheit merkt, am Halse von einem Orte zum andern. Sie soll ihnen Anfangs ihre Nahrung vorspeyen, oder wenigstens vorkauen, bis sie rohes Fleisch und lebendige Thiere, die sie ihnen vorträgt, um damit zu spielen, und sie selbst zu tödten, verdauen können. In diesem Zeitpunkte, sagt man, führe sie erst dem Vater zu ihrem Lager, und zeige ihm seine Kinder, welcher sie dann zärtlich zu lieben, und treulich zu beschützen pflege; doch überläßt er die Nahrungssorgen für dieselben der Mutter allein. Die jungen Wölfe sind von weißlichrother Farbe, und bleiben bey der Mutter, bis sie sich wieder begattet. Sie sind nach zwey Jahren fast gänzlich ausgewachsen und zur Fortpflanzung fähig.

Wenn man junge Wölfe noch blind bekommt, so kann man sie durch eine Hündin säugen lassen; sie lassen sich aber demohngeachtet schwer zähmen, und werden allzeit mit zunehmendem Alter wieder mißtrauisch und wild. In Persien lehrt man sie in ihrer Jugend tanzen und mit einer großen Anzahl Menschen kämpfen, und giebt alsdenn mit solchen abgerichteten Wölfen dem Volke ein Schauspiel. Ein solcher Wolf soll oft mit 500 Thalern bezahlt werden.

Mit Hunden zeugen sie fruchtbare Bastarten, die als Schweißhunde gut zu gebrauchen seyn sollen*).

Krank-

*) s. Lichtenbergs u. Voigts Magazin für das neueste aus der Physik u. s. w. V. 2. S. 186. Pal-

Krankheiten.

Die Wölfe werden, wie die Hunde, mit der Räude und Tollheit, auch in der Wildniß, befallen, und ihr Biß in der Wuth ist ohne Rettung tödtlich. Der Jäger kennt einen wüthenden Wolf an der hin- und herwankenden unregelmäßigen Fährte.

Feinde.

Alle Hunde haben eine natürliche Abneigung gegen den Wolf, und diejenigen, die sich stark genug fühlen, greifen ihn auch muthig an. Besonders scheint der starke Bauernhund seine angebohrne Feindseligkeit gegen ihn am mehresten an Tag zu legen, indem er bey seinem Anblick die Haare in die Höhe sträubt, und ihn muthig verfolgt. Siegt er, so läßt er seine Beute den Raben und andern Wölfen. Siegt aber der Wolf, so frißt er seinen Raub auf. Die Wölfe fressen sich auch einander selbst auf; und ein kranker oder verwundeter verschafft seinen gesunden Kameraden allezeit eine herrliche Mahlzeit. Von den gelben Hundeflöhen werden sie sehr geplagt. Die Nattern, welche man sonst in ihnen gefunden zu haben vorgab *), sind nichts anders als große

Pallas Nordische Beyträge. I. 154.

Naturforscher. XV. S. 23. Hier ist besonders merkwürdig, daß von dem Fleischerhund, welcher sich mit einer Wölfin begattete, ein Bastartwolf halb grau war, und wie der Vater einen abgestutzten Schwanz hatte.

*) Die Jäger wollen sie besonders in den Nieren finden.

grose Spulwürmer; auch langgliedrige Bandwürmer findet man in ihren dünnen Därmen, und gewöhnlich allemal.

Jagd.

Die Jäger spüren das Daseyn eines Wolfes an der Fährte (Tab. XXI. Fig. 1.), welche mehr lang als breit, und einer großen englischen Hundefährte nicht unähnlich ist, nur daß die zwey mittern Zehen enger zusammen und die zwey äußern besser abstehen, und überhaupt besser geformt sind, als bey der englischen Dogge, die gemeiniglich mit offenen Klauen geht. Seine Ballen sind auch weit stärker, breiter, weiter von den Zehen abstehend, und drücken die Gestalt eines Herzens mit drey sichtbaren Grübchen im Boden ab. Er schreitet weit regelmäßiger und fester, als irgend ein großer Hund in einer Linie fort (schnürt), wankt niemals in seinem Gange, sondern setzt allezeit, wenn er gehet, den Hinterfuß gerade in die Vorderfährte, und wenn er trabet, die Hinterfährte allezeit drey Finger breit von der vordern ab, und diese ist weit größer als jene. Wenn ihn die Jäger gespürt haben, und seinen Aufenthalt wissen, so wird er eingelappt und auf diese Art in Gruben, die mit Baumästen oder Stroh bedeckt sind, gefangen. Man stellt ihm auch große eiserne Wolfsfallen, eine Art großer Schwanenhälse auf. Er muß aber vorher, ehe eine solche Falle aufgestellt wird, mit in Gänsefett gebratener Rehleber gekirrt und alsdann die aufgestellte Falle, und der Braten, der an ihr befestigt ist, mit Genist von einem Ameisenhaufen bestreut werden. Man sprengt

ihn

ihn auch in Thüringen in einem Treibjagen durch Trommel- und Pfeifenschall und Schreckschüsse in Netze und schlägt ihn darinn tod, oder, wenn keine Netze da sind, so stellen sich da, wo er vorbey traben muß, Schützen an, und erlegen ihn mit der Flinte. Ein Hund, welcher nicht darauf abgerichtet ist, geht ihn nicht leicht an, und die Wunden, die er ihm reißt, heilen auch schwer. In seiner Gefangenschaft ist er so zahm, daß man ihn ohne Gewehr tödten kann (s. S. 158).

Nutzen.

Dieß Raubthier ist wohl bestimmt in unbesuchten Wildnissen das Ebenmaaß unter dem Wild und den schädlichen Thierarten, die der Mensch daselbst nicht nutzen kann, zu erhalten.

Sein Balg giebt ein gutes Pelzwerk, welches keine Insekten besuchen. Man braucht ihn zu Wildschuren, Müffen, und andern Kleidungen, zu Pferdedecken, Decken vor die Stubenthüren, zu Fußsäcken, zum Schwarzfärben, und ein Stück kostet oft 5 bis 6 Rthlr. Je weißer das Haar ist, desto schöner und kostbarer sind die Bälge. Sie werden aus Rußland, Polen, Frankreich, Virginien und andern Ländern zu uns gebracht.

Das Leder weißgahr gegerbt, giebt die dauerhaftesten Pauken- und Trommelfelle, Handschuhe und andere Sachen.

Der Zähne bedient sich, in Stiele eingefaßt, der Mahler, Goldschmidt, Kupferstecher, Vergolder und Buchbinder

binder zur Glättung und Polirung ihrer Arbeiten. Man faßt sie auch mit Silber ein für Kinder, um durch das Beißen auf dieselben das Durchbrechen der Zähne zu erleichtern, welches aber andere Zähne und Steine auch bewirken.

Sein stinkender Athem macht, daß man sein grobes Fleisch nicht ißt; ja die Hunde wollen es gebraten nicht fressen. Doch genießen es die Kalmucken, Tunguſen, und die ärmſten Lappländer.

Noch einen kleinen Nutzen ſtiften die jungen Wölfe, indem ſie, ehe ſie noch ſtark genug ſind, ſelbſt zu jagen, die Felder vom Aas reinigen.

Schaden und Mittel dagegen.

Der Schaden, den dieſe Raubthiere ſtiften, ergiebt ſich aus ihrer Nahrung. Den Menſchen fallen ſie nur in dem größten Hunger an *). Der Wanderer iſt in den größten Wildniſſen vor ihnen geſichert, wenn er Feuer aufſchlagen, oder ſonſt einen klirrenden Schall hervorbringen kann. Der Reuter braucht nur etwas rauſchendes, eine Kette, einen Strick, oder ein Strohſeil

*) Doch hat man geſehen, daß ſie auf den Schlachtfeldern die flachverſcharrten Leichname ausgegraben, und verzehrt haben. Von dieſen Wölfen, die das Menſchenfleiſch einmal gekoſtet haben, ſagt man, daß ſie alsdann die Menſchen, und den Schäfer eher als die Heerde anfielen. Sie haben in Deutſchland den Namen Währwölfe, vor denen man ſich wahren oder hüten ſoll.

seil hinter sich her zu schleppen, so flieht der Wolf. Ist er gesättigt, so verjagt ihn auch jeder Hund. Auch scheuet er sich vor einem Seil, das über eine Hecke gezogen ist, über welche er seines Raubes halber springen muß.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) In der Medicin brauchte man sonst Fleisch, Gedärme, Lunge, Herz, Galle, Magen, Knochen und Losung. Getrockneter pulverisirter Wolfsleber bedienen sich die Jäger noch immer, und wie sie sagen, mit gutem Erfolg für trocknen Husten, und frischaufgelegtes Fett für böse Augen. Sonst sollte auch dieß letztere fürs Podagra helfen, und das Blut für die Kolik.

2) Wenn man über seinen Koth Wasser schüttet, und die Schafe damit betröpfelt, so sollen sie in wolfreichen Gegenden vor seinen Anfällen sicher seyn.

3) Sonst sagte man, daß sich der Wolf vorher, ehe er ein Thier verfolge, erst recht satt Erde fresse, um im Laufen desto schwerer und fester zu seyn.

4) Das lächerlichste Vorurtheil vom Wolfe haben wohl die Kamtschadalen. Wenn ein Weib Zwillinge gebiert, so sagen sie, eins habe den Wolf zum Vater. Daher werden Zwillingsgeburten bey ihnen für eine große Sünde gehalten *).

*) s. Stellers Kamtschatka. S. 117.

(11) 15. Der gemeine Fuchs.

Namen, Literatur und Abbildungen.

Birkfuchs, Rothfuchs, Waldfuchs und Feldfuchs; das Weibchen; Füchsin, Fähin, und Betze.

Canis Vulpes. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 73. n. 4.

Renard. *Buffon* hist. nat. VII. 75. t. 6. Ed. de Deuxp. II. T. 5. f. 2. Ueberf. von Martini IV. 97.

Fox. *Pennant* hist. of Quadr. I. 161. Meine Ueberf. I. 264.

v. Schrebers Säugeth. III. 354. Taf. 90.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 205.

Goeze's Fauna I. 162.

v. Wildungens Neujahrsgeschenk. 1796. S. 26. Taf. 3. seltene Füchse.

Donndorfs zool. Beytr. I. 194. n. 4.

Ridingers wilde Thiere. Taf. 23.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Mit geradem Schwanze, fuchsrothem Leibe, weißer Brust und Schwanzspitze.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Fuchs ist eines der schlauesten, aber auch boshaftesten Thiere. Er raubt eben so fürchterlich, wie der Wolf, braucht aber nicht so viel Kräfte anzuwenden, seine Raubsucht zu befriedigen, da er mit mehr Klugheit zu Werke geht.

Die Länge seines Körpers beträgt etwas über 2 Fuß; die Höhe 1 Fuß 2 Zoll und der Schwanz ist 1 Fuß 4 Zoll lang *). Sein ganzes äußeres Ansehen gleicht einem mittelmäßigen Schäferhunde, oder einem Windspiele, wenn man sich kürzere Beine hinzudenkt. Ueberhaupt ist der Bau seines Körpers schlank. Der breite Kopf hat eine platte Stirn, und läuft in einer langen Schnauze spitzig aus. Der Mund hat ein sehr scharfes Gebiß. Die sechs obern Vorderzähne sind größer und spitziger, als die untern. Die zwey obern größern gekrümmten Eckzähne (Fänge) stehen von den Vorderzähnen etwas ab, um den zwey untern Platz zu machen. Oben befinden sich auf jeder Seite sechs und unten sieben Backenzähne, wovon die letztern nur wahre stumpfe Mühlzähne ausmachen, die vordern aber dreyeckig und scharf zugespitzt sind. Einem skeletirten Kopfe sieht man die List und die Schalkhaftigkeit des Thieres deut-

*) Par. Ms. Körper 1 Fuß 10 Zoll; 1 Fuß Höhe; Schwanz 1 Fuß 1 Zoll.

deutlich an. Die Zunge ist lang, schmal und rauh. Die Nase ist, wie bey einem Hunde, eingekerbt und wittert weit. Die Augen liegen, wie beym Wolf, schief herab, sind braunroth und funkeln. Die Ohren stehen aufrecht, immer gespitzt. Der übrige Körperbau ist, wie beym Hunde, und der Bauch läuft, wie bey einem Windhunde, von der erhabenen Brust an schmal zu. Der Schwanz (Standarte, Stange, Ruthe, Lunde) ist dick, mit weichen Haaren besetzt, zottig, liegt beym Gehen auf der Erde auf und wird nur beym Laufen ausgestreckt.

Die Farbe des Kopfes, der Schultern bis zur Hälfte des Rückens ist dunkel rostfarbig, oder fuchsroth mit gelbem Grunde, und der übrige Theil des Rückens bis zur Schwanzspitze (Blume) ist noch überdieß mit weiß überlaufen, welches die weißen Spitzen der Haare verursachen. Die Seiten laufen nach dem Bauche zu weiß aus. Lippen, Backen, Kehle und ein Streifen an den Beinen herab sind weißlich. Die Haare der Brust und des Bauchs haben einen blauen Grund und nur die Spitzen sind weiß, daher diese Theile ins aschgraue fallen. Die Schwanzspitze ist weiß. Die roströthlichen Vorderfüße enthalten vier Zehen, welche, so wie die Ohrspitzen, schwarz gezeichnet sind, und die Hinterfüße fünfe. Sie sind alle mit unbeweglich langen Nägeln versehen. Ein alter Fuchs wird von Jahr zu Jahr grauer, die Brust wird weißer und die Haare um die Spitze seines Zeugungsgliedes (Ruthe) werden endlich ganz weiß.

Die Füchsin ist etwas schlanker gewachsen, als der Fuchs, ihre Kehle fällt von Jugend auf mehr ins weiße,

und

und ihr Kopf ist spitziger; übrigens ist sie ihm vollkommen gleich.

Varietäten.

In Thüringen und überhaupt in Deutschland kennt man außer diesem beschriebenen gemeinen Fuchs folgende Farben-Spielarten:

a) Den Brandfuchs (Canis Alopex. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 74. n. 5.)

Sein vorzüglichstes Kennzeichen soll die schwarze Schwanzspitze seyn. Er ist mehrentheils kleiner, seine Haare sind röther, als beym Birkfuchs und mehr mit schwarz überlaufen. Der ganze Unterleib ist mehr aschgrau oder schwärzlich, als weiß, welches die dunkeln Spitzen der weißlichen Haare verursachen, und auf der Brust befindet sich meist ein weißer Punkt.

Bey uns nennen die Jäger junge Füchse von ein bis drey Jahren Brandfüchse, deren Kehle noch blaulich ist, und nicht die weiße blendende Farbe der alten hat; sie mögen übrigens eine weiße oder schwarze Schwanzspitze haben. Ich kann ebenfalls keine andern, als die Brandfüchse der Jäger annehmen, da ich sehr viele Füchse gesehen habe, deren Schwanzspitze schwarz war, und welche sonst kein Unterscheidungszeichen vor den andern gemeinen Füchsen hatten und wiederum viele, welche obige Kennzeichen des Brandfuchses und eine weiße Schwanzspitze hatten. Ueberhaupt ist die Farbe der Füchse sehr verschieden; alle aber, wie sie auch gezeichnet seyn mögen, begatten sich unter einander. Es werden in Thüringen oft beyde Geschlechter ein

Brandfuchs und Birkfuchs, als Männchen und Weibchen, aus einem Baue ausgegraben.

b) Der Kreuzfuchs (C. V. crucigera).

Er hat weißgelbe Haare und einen schwarzen Streif vom Maul an über den Rücken, bis zum Schwanz, und einen andern queer über die Schultern über die beyden Vorderfüße.

c) Der weiße Fuchs (C. V. alba).

Er ist rein weiß oder gelblichweiß.

d) Der gelbe Fuchs (C. V. lutea).

Er ist hellgelb.

e) Der schwarze Fuchs (C. V. nigra).

Selten ganz schwarz, sondern nur stark mit schwarzen Haaren vermischt, daß sie von weitem ganz schwarz aussehen. Auch die dunkelbraunen sind hierher zu rechnen.

f) Der graue Fuchs (C. V. cinera).

Er ist Silbergrau oder Wolfsgrau.

Eine schöne aber sehr seltene Varietät.

Im v. Wildungischen Neujahrsgeschenk a. a. O. wird auch ein Fuchs abgebildet, der zwey Schwänze oder Ruthen hat. Es ist dieß mehr eine Mißgeburt als Varietät *).

Zergliederung.

Die Geruchsnervenhaut der Nase ist vorzüglich groß. Der Magen ist häutig, aber so wie die Därme,

die

*) s. v. Wildungen a. a. O.

die fast ohne alles Fett sind, fest und derb. Die Lunge ist groß und lang. Die Gallenblase ist klein. Eingeweidewürmer, besonders Bandwürmer findet man in Menge.

Merkwürdige Eigenschaften.

Die Stimme der Füchse ist kurz kleffend, doch schreyen sie auch, wie ein Pfau, und zwar, wie man sagt, wenn sich das Wetter ändert, und heulen und knurren, wenn sie böse oder in Gefahr sind. Sonst lassen sich die Alten zur Zeit ihrer Begattung hören, und die Jungen, wenn sie hungrig sind, und jene mit der Nahrung zu lange zögern. Noch ist zu bemerken, daß am Obertheil des Schwanzes ohngefähr 2 1/2 Zoll von der Wurzel sich eine Drüse (Viole, Fuchsblume) in Gestalt eines Leichtdorns mit einer kleinen Oeffnung befindet, welche eine geronnene Fettigkeit enthält, die so angenehm, wie Viole riecht, und die borstenartigen Haare, welche um dieselbe stehen, hochgelb färbt. Der Fuchs beißt nach dieser Drüse, wenn er verwundet wird; es sey, daß der Geruch und Geschmack dieser Fettigkeit schmerzlindernd ist, oder daß er durch diesen Balsam seine Wunde heilen will.

Er soll vierzehn Jahre alt werden; so lange hat man nämlich gezähmte am Leben erhalten.

Verbreitunng und Aufenthalt.

Der Fuchs ist in allen Weltgegenden verbreitet. In Europa geht er bis Island hinauf; in Asien von

Kamtschatka bis China und Japan hinunter; in Afrika bewohnt er die Barbarey, Goldküste, Aegypten und Aethiopien; in Amerika alle nördlichen Gegenden, auch Mexiko und Peru. Da, wo man in Deutschland noch nicht ernstlich auf seine Austilgung bedacht gewesen, ist er noch häufig anzutreffen.

Der Füchse gewöhnlicher Aufenthalt sind Höhlen in der Erde, die sie sich entweder selbst graben, oder den Dachsen abjagen. Eine solche Wohnung nennt der Jäger einen Bau. Der Umfang desselben hält bisweilen 50 Fuß, die Tiefe 3 bis 6 Fuß, und hat gewöhnlich folgende Einrichtung. Alle äußern Oeffnungen gehen in langen Gängen (Röhren) fort, die sich innerhalb vielmal durchkreuzen, und auf diese Art Gemeinschaft mit einander haben. In diesen Gängen aber sucht das Thier seine Sicherheit und Bequemlichkeit nicht, sondern dazu hat es besondere unterirdische Wohnungen und Verschanzungen angelegt, die man Kammern und Kessel nennt, wo es bey Ungewittern, Stürmen, bey den Angriffen seiner Feinde hinflüchtet, sich daselbst mit der größten Heftigkeit vertheidiget, und wo die Mutter ihre Jungen gebiert. Die Kammern, deren Anzahl, je nachdem der Bau groß oder klein ist, verschieden ist, liegen vor den Kesseln, und jede hat mehrentheils 3 Fuß im Durchmesser, ist mehr oval als rund, und hat wiederum durch eine Röhre, welche mitten durchgeht, mit der nächsten Kammer Gemeinschafft. In einer solchen bereitet sich gewöhnlich die Mutter ihr Wochenbett. An der letzten Kammer befindet sich dann eine überaus enge Röhre, welche etwa drey

bis

bis viertehalb Fuß lang ist, meist erst senkrecht in die Erde geht und dann wieder in einem Bogen aufwärts steigt, und zum Kessel führt. Es befinden sich in einem Bau höchstens zwey solcher runden Plätze, welche etwa drittehalb Fuß Höhe und drey Fuß Breite haben, und ohne fernern Ausgang sind. Sie sind die letzten Zufluchtsörter und die Schlafgemächer des Fuchses. Zuweilen findet man auch nur eine Röhre, welche vom Eingange bis zum Ausgange, ohne eine besondere erweiterte Wohnung inwendig zu enthalten, gerade durchläuft (eine Fluchtröhre.)

Diese Wohnungen nun trifft man mehrentheils in dicken Hölzern, selten in platten Felde, wo Feldhölzer in der Nähe sind, und welche von Jägern Nothbaue genannt werden, an, und die Füchse machen in Ansehung des Bodens, wenn er nur nicht gar zu steinig ist, keine Auswahl.

Außer der Begattungszeit, und wenn sie Junge haben, halten sie sich nicht gern in ihrem Bau auf, sondern verbergen sich lieber in dickem Gebüsche und im Schilfe trockener und gefrorner Teiche. Die Sonnenwärme lieben sie gar sehr, und man findet sie oft vor ihrem Bau auf einem alten Stocke oder auf einem Steine sich sönnen. Sie retiriren sich auch im Nothfall, wenn sie in der Verfolgung ihren Bau nicht erreichen können, auf die Bäume, wenn sie schief genug sind, um Anlauf nehmen zu können.

Im Winter halten sie sich ihrer Nahrung halber gern um die Dörfer auf, weil im hohen Walde der Schnee zu tief liegt. Doch gehen sie bey mittelmäßigen Schnee von den höchsten Bergen des Thüringerwaldes täglich zwey Stunden weit herab ins Feld auf die Mäusejagd, und auch wieder zurück, machen also alle Nacht eine Reise von vier Stunden, und wenn nicht Thauwetter eintritt, das ihnen das Gehen beschwerlich machen muß, (denn sonst sehe ich keine Ursach ein), so bleiben sie (stekken sie sich) selten in einem dicken Gebüsche auf den untern Bergen.

Nahrung.

Die vorzüglichsten Nahrungsmittel des Fuchses sind lebendige Thiere. Im Sommer schleicht er bey Tage um die Dörfer in dem Getraide herum, und stiehlt dem armen Landmann sein Hühnchen vor seinen Augen weg. Im Winter ist er zwar nicht so dreiste; aber wenn er sich des Nachts in einen Hof schleichen kann, so würgt er alles Hausgeflügel, wie es ihm aufstößt, und wie es scheint, in der Meynung, daß es ihm, wenn es nur erst todt wäre, doch zu Theil werden müßte. Er trägt auch wirklich, wenn er nicht gestört wird, ein Stück seiner gemachten Beute nach dem andern in einen nahen Busch, oder verbirgt es im Getraide, Grase und unter dem Moose, und trägt es von da alsdann in seinen Bau. Noch begieriger aber ist er auf das wilde Geflügel und junge kleine Wildpret. Er sucht die Nester der Vögel auf der Erde und in niedrigem Gebüsche auf, raubt die jungen

Vö-

Vögel und Eyer aus demselben, geht, wie der Vogelsteller, durch die ganze Schneuß, die er entdeckt hat, und nimmt die Vögel aus. Er fängt fast den ganzen Sommer hindurch junge Rehe, Hasen, Auerhühner, Birkhühner, Haselhühner, Feldhühner, Wachteln, Lerchen u. d. gl. und beschleicht auch von diesen Vögeln die alten. Er hat einen außerordentlich feinen Geruch, und versteht geschickter, als eine Katze, dem Winde entgegen, auf dem Bauche an ein Thier zu kriechen, und dasselbe durch einen schnellen geschickten Sprung zu fangen, so daß das flüchtige Rebhuhn oft noch in der Luft von ihm ergriffen wird. Gelingt ihm zuweilen ein solcher Sprung nicht, so soll er, wie die Jäger sagen, langsam und beschämt auf seiner Spur zurück gehen, und gleichsam alle Schritte zählen, um zu sehen, um wie viel er sich versprungen habe. Das meiste Wildpret fängt er auf der Lauer und durch List. Sieht er z. B. einen Hasen längs einer Hecke herkommen, so legt er sich dicht an dieselbe auf die Erde nieder, und verfehlt selten, wenn ihm dieser zum Sprung kommt, seinen Fang. Er kennt die Stellen ganz genau, wo sich das Wild seiner Natur nach hinlagert, und durchschleicht ganz langsam und bedächtlich jene Gegend aus Besorgniß ein Stück zu übergehen oder aufzujagen, so daß auf diese Art ihm nach und nach alle im Lager sitzenden Hasen und alle brütenden Feld- und Waldhühner zu Theil werden. Merkwürdig ist dabey, daß er aus Furcht entdeckt zu werden, niemals in dem nahen Bezirke seines Aufenthalts raubt, daher das Sprichwort entstanden ist: Der Fuchs jagt niemals auf seinem Bau. Im harten Winter fängt

er auch in Gesellschaft alte Rehe, wenn diese nämlich bey tiefliegendem Schnee, der durch Thauwetter oder die Sonnenwärme eine harte Rinde bekommen hat, in ihrem schnellen Laufe aufgehalten werden. Der Fuchs frißt auch Bienennester aus, gräbt den Erdhummeln des Honigs wegen und den Wespen der Maden wegen nach. Er bedient sich dabey seines Schwanzes zu Wegtreibung und Wegtragung der Bienen, Wespen und Hummeln, und diejenigen, welche sich an seinen Körper setzen, sucht er durch Reiben an Steinen und Bäumen und Wälzen auf der Erde zu tödten. Den Igel, sein herrlichstes Gericht, sucht er, wenn sich dieser in sein stachliges Gewand gehüllet hat, durch Bepissen zur Aufwickelung zu bewegen, und dadurch betäubt muß dieser wirklich seinem Mörder zur Beute werden. Er geht in Waldbächen auch den Krebsen nach. Hierbey mag sich vielleicht einmal ein Krebs an seinen zottigen Schwanz gehängt haben, woraus man ihn hat beschuldigen wollen, daß er um Krebse zu fangen, seinen Schwanz bloß ins Wasser hienge, in welchen sich dann alle Krebse in der Gegend anklemmten, und ihn dieses Leckermahl bereiteten. Er muß übrigens, wenn es an kleinem Wildpret in seinem Reviere mangelt, sich auf die Mäuse- Wasserratten- Maulwurfs- Frosch- und Krötenjagd legen, oder mit Aas vorlieb nehmen (ludern). Er zieht den Feldmäusen ordentlich nach, und man trifft ihn, wenn sich dieselben in Jahren, wo es viele Eicheln, Bucheckern und Tannensaamen giebt, in die Wälder begeben, auch in Wäldern, und wenn sie im Felde bleiben, auch im Felde, an. Er frißt im Nothfall auch Schnecken, Heuschrecken, Ringelnattern, Feld- und

Gar-

Gartenfrüchte, und im Winter Menschenkoth. Ich habe auch einmal beym Oeffnen gefunden, daß er in seinem vollen Magen nichts als zwey Hände voll großer Regenwürmer, die er des Nachts auf dem Rasen, wenn sie sich begatten, auffucht, hatte. Die Weintrauben liebt er auch gar sehr.

Vor seinem Baue und in demselben findet man gewöhnlich die Spuren seiner Raubbegierde in den Skeletten und Knochen der erwürgten Thiere; denn seinen Raub verzehrt er, wenn er nicht ganz sicher ist, mehrentheils in demselben. Die Zeit über, da er sich nicht im Bau aufhält, vergräbt er auch den Ueberfluß von seinen Nahrungsmitteln, indem er mit Hülfe seiner Pfoten und Schnauze ein Loch in die Erde macht, die Beute hineinlegt, und sie sorgfältig mit Erde und Moos bedeckt. Hierbey verfährt er so behutsam, daß er, um sicher zu seyn, allezeit erst, ehe er den Raub vergräbt, nach allen Gegenden wittert und sich umsieht, dieß nach Endigung seiner Arbeit abermals, und in einiger Entfernung zum letztenmahl thut.

Bittere Mandeln sind dem Fuchse Gift.

Fortpflanzung.

Der Fuchs und die Füchsinn, die sich einmal genau kennen, bleiben da, wo sie ungestöhrt leben können, mehrentheils das ganze Jahr beysammen. Die Zeit der Begattung (Ranzzeit, Rollzeit) ist im Februar, und die Füchsin wird nur einmal des Jahres läufisch. Sie ruft alsdann ihren Gatten mit einer heisern Stimme, womit sie auch ihre Jungen um sich zu

lok-

locken pfleget, zum Genuß der Liebe. Zuweilen antworten ihr in eben der Sprache noch ein oder zwey andere Männchen statt ihres eigentlichen Mannes, den sie rufte, und kriechen mit ihr, wenn sie der Tag bey ihren Liebesangelegenheiten übereilt, in den Bau, in welchem man daher zuweilen den Gatten nebst zweyen Nebenbuhlern bey ihr ruhig antrifft. Ueberhaupt laufen die männlichen Füchse zur Ranzzeit weit und breit herum, vornämlich die einjährigen. Sie hängen in der Vermischung wegen der wulstigen Ruthe zusammen. Das Weibchen ist 60 Tage oder 9 Wochen schwanger, und gebiert (wirft) gewöhnlich zu Anfange des Mayes in der Kammer eines frischangelegten oder neu aufgegrabenen tiefen Baues auf ein von Moos und zuweilen von ihrer eigenen Wolle zubereitetes Bett drey bis neun Junge. Diese kommen blind zur Welt, und bleiben in diesem Zustande vierzehn Tage. Wenn sie einen Monat alt sind, so führt sie die Mutter vor den Eingang des Baues und säugt sie an der Sonne. Um diese Zeit fangen auch Vater und Mutter an für ihre Jungen auf den Raub auszugehen, und tragen ihnen junges Wildpret und Federvieh zu. Unterdessen lagern sich bey schönem Wetter die jungen Füchse vor dem Bau, sönnen sich, und spielen mit einander oder mit der lebendigen Beute, die ihnen von ihren Eltern ist herbey gebracht worden. Haben sie sich lange genug mit einem solchen lebendigen Thiere, z. B. einem Rebhuhn, vergnüget, so tödten sie es, und ein jeder reißt ein Stück ab, trägt es in einen Winkel, und läßt es sich von den andern unter beständigen Knurren, wie die Hunde, nicht nehmen. Die Füchsin liebt ihre

Jun-

Jungen zärtlicher als der Fuchs, denn sie bringt ihnen weit mehr Nahrung, und trägt sie auch, wenn sie Menschen oder Hunde, die bey ihrem Bau gewesen sind, wittert, am Halse fort, entweder in einen andern leeren Bau, oder in dickes Gebüsche oder ins Getraide. Doch ist es ungegründet, wenn einige behaupten, der Fuchs bekümmere sich gar nicht um seine Jungen, da ich selbst weiß, daß er vor dem Baue mit einem jungen Hasen im Rachen erschossen wurde, auch selbst zugegen gewesen bin, daß Fuchs und Füchsin im Bau neben ihren Jungen liegend zugleich ausgegraben wurden.

Die Jungen sind, wenn sie im Junius ausgegraben werden, dick, plump, wollig, wie junge Hunde, anfangs dunkelaschgrau, und werden nach und nach weißgelb. Im dritten Monate, (um Jacobi) laufen sie schon mit den alten zu Felde, machen lustige Sprünge nach den Heuschrecken, schnellen die erhaschten Feldmäuse in die Luft, und fangen sie mit dem Munde wieder auf. Im Herbste, wenn sie die Alten abjagen, müssen sie sich eigene Baue aufsuchen oder graben. Sie sind im funfzehnten Monate völlig ausgewachsen, begatten sich aber nicht immer schon im ersten Jahre.

Sie lassen sich einigermaasen zähmen, verliehren aber ihre Wildheit selten ganz. Man feilt ihnen, um Schaden zu verhüten, die Zähne aus, und sie machen in Gesellschaft der Katzen und Hunde lächerliche Possen.

Ich habe zwey Füchse gekannt, die hinter ihren Herrn herliefen, wohin er gieng. Der eine war ein Arzt, der immer in andere Häuser kam, und ihn sogar mit auf die Dörfer nahm. Er war gerade wie ein Hund.

Es

Es ist auch versucht worden, alte Füchse zahm zu machen, allein diese behalten stets ihre Fuchstücke an sich.

Nicht leicht paaren sich die zahmen Füchse mit den Hunden; doch hat man Beyspiele, daß sie sogar fruchtbare Bastarten mit ihnen gezeugt haben *). Spitzhunde schicken sich zu einer solchen Bastarterzeugung am besten.

Krankheiten.

Die Füchse sind vielen Krankheiten ausgesetzt, mit denen die Hunde befallen werden.

Auch sie bekommen die Wuth, und das Weibchen wird besonders zur Heckzeit raudig und behält gewöhnlich dieß Uebel bis im October. Man hat Beyspiele, daß die Räude epidemisch geworden ist, und die Füchse einer ganzen Gegend angesteckt worden sind **).

Die Auszehrung oder Darrsucht, wie man diese Krankheit nennt, hauset auch zuweilen unter ihnen und es sterben viele daran. Man schreibt dieß Uebel den zu häufig genossenen Spitzmäusen zu ***).

Feinde.

Die größte Verfolgung haben sie von den Hunden auszustehen, und die größte Plage von den Flöhen. Die

*) Pallas nordische Beyträge I. 154.
**) Journal für Forst- und Jagdwesen I. 1. S. 95.
***) A. a. O.

Die Jäger behaupten für gewiß, daß sie, um sich der letztern Feinde zu entledigen, den Mund voll Moos nähmen, rücklings ins Wasser giengen, nach und nach den ganzen Leib bis zur Mundspitze in dasselbe tauchten, und wenn sich dann die Flöhe alle in das Moos geflüchtet hätten, dasselbe den Fluthen Preis gäben.

Die Krähen und Raben verrathen sie durch ein beständig wiederholtes Geschrey, wobey sie über ihnen herumfliegen, und warnen dadurch auch andere Thiere, sich vor ihnen zu retten. Der Bandwurm, Blasenwurm, Spulwurm, sind ihnen oft peinlich. Er ist sogar in den Nieren der Spul- oder Rundwurm gefunden worden *).

Jagd.

Es wird dem Fuchse wegen seines großen Schadens, den er als Raubthier der Wildbahn verursacht, von den Jägern Sommer und Winter nachgestellt; sie müssen aber wegen seiner List und seinen Sinneswerkzeugen sehr behutsam zu Werke gehen. Die Redensart: Schlau wie ein Fuchs, ist jedermann bekannt, aber niemand kann die Wahrheit desselben besser einsehen, als die Jäger, die ihn in allen seinen Handlungen beobachten. Alle seine Schritte sind mit der größten Vorsicht und Behutsamkeit gezählt. Er ist stets auf der Lauer, und äugelt und horchet ohne Unterlaß, wittert alle Fallstricke, die ihm gelegt werden, und nimmt mit einem Worte alle nur mögliche

*) Goezes Fauna I. 168.

liche Maaßregeln zu seiner Sicherheit. Wenn man ihm im dickſten Gebüſche im Walde glaubt, ſo liegt er in einer Hecke am Dorfe und lauert auf die Hühner, und wenn man ihn kaum im Felde ſpürt, ſo liegt er bey näherer Unterſuchung ſchon wieder im Walde verborgen.

Im Junius beſucht der Jäger die Baue, die er in ſeinem angewieſenen Reviere weiß, alle, und ſieht ob die Fährten von alten, oder von jungen Füchſen, die vor denſelben ſpielen, zu ſpüren ſind.

Die Fährte des Fuchſes iſt einer Hundefährte (Taf. XXI. Fig. 2.) nicht unähnlich. Der Fuß iſt länglich, die Klauen ſind vorne hinaus zuſammen gezwungen, und man ſpürt beynahe gar keine Ballen. Wenn er gelaſſen trabet, ſo ſchnürt er ganz gerade, d. h. er ſetzt den Hinterfuß, (Lauft) der kleiner iſt, als der vordere, allezeit gerade in die vordere Fährte, und die Spuren gehen in einer geraden Linie fort. Nur in der Flucht greift er aus einander. Er iſt alſo in ſeinem Gange dem Wolfe ähnlich.

Wenn die friſchen Fährten in einen Bau führen, ſo wird der Fuchs entweder in Netzen gefangen oder gegraben. Um ihn zu fangen, belegt man die gangbaren Röhren mit kleinen viereckigen Decknetzen, die im Quadrat etwa drey Ellen halten, von dünnen feſten Bindfaden ſind, und an jeder Ecke eine Bleykugel haben. Wenn ein Dachshund den Fuchs ſtark treibt, ſo fährt derſelbe ſchnell zur Röhre heraus, das Netz giebt nach, die Kugeln umſchlagen ſich, und er verwickelt ſich

dar-

darinnen. Wenn er auf diese Art sich nicht fangen läßt, so wird er in unfelsigen Boden gegraben. Man schickt nämlich zwey oder mehrere Dachshunde in den Bau, verstopft einige Röhren, wenn er mehrere hat, und bedeckt die andern mit einem Garne, oder stellt einen Jagdhund oder Schützen mit einer Flinte davor. So bald der Fuchs die Hunde wittert, so begiebt er sich sogleich in eine Kammer und erwartet den Angriff. Bemerkt ihn hier der erste Dachshund, so zeigt er es durch Bellen an, und der Fuchs muß sich bald, indem die andern Hunde herbey eilen, in eine andere Kammer zurückziehen. Erheben die Hunde ein allgemeines Bellen, so ist er besetzt, und hat dann keinen andern Zufluchtsort mehr, als den Kessel, in welchen er sich auch durch die enge Röhre begeben muß. Zu diesem können ihm die Hunde nicht leicht wegen des engen und krummen Weges, der zu demselben führt, folgen, der Jäger muß sich also mit dem Ohr auf die Erde legen, den Ort genau bemerken, wo die Hunde liegen und bellen, und ihnen durch Aufgraben zu Hülfe kommen. Ist erst die Röhre abgestochen, so suchen sie die Hunde durch Wühlen zu erweitern und zu dem Kessel zu gelangen, unterdessen er mehrentheils so stille liegt, daß Jäger und Hunde nichts von ihm bemerken. Die Hunde würgen ihn dann entweder selbst ab, oder der Jäger ergreift ihn mit einer eisernen Zange und schlägt ihn todt. Sonst behielt man sie lebendig und veranstaltete die grausame Lust des Fuchsprellens, wo in einem eingeschlossenen Bezirke Herren und Damen die Füchse mit langen Netzen, (Prellnetzen) oder mit einem starken Tuche, welches die Prelle hieß, und wo-

über sie passiren mußten, in die Höhe schleuderten, und wieder auffiengen, bis sie starben.

Noch auf eine andere etwas grausamere Art kann man sich des Fuchses im Baue bemächtigen. Man verstopft nämlich alle Röhren bis auf eine einzige, die dem Winde entgegen liegt, sehr fest. In diese steckt man einen Fuß tief ein Stückchen Tuch, das mit Schwefel überzogen ist, zündet es an, wirft Blätter und anderes Genist darauf, damit ein großer Dampf entsteht, welchen der Wind in den Bau treibt. Ist der Bau voller Dampf, welches man daran erkennt, wenn derselbe ungeachtet des entgegengesetzten Windes wieder herausquillt, so verstopft man auch diese Röhre. Den folgenden Tag wird man den erstickten Fuchs bey der Oeffnung des Baues dicht am Eingange einer Röhre hingestreckt finden.

Im Winter wird er, wenn ihn die Kreiser, die bey einem frischgelegten Schnee jederzeit das Revier, bey welchem sie angestellt sind, umgehen müssen, an der Fährte in einer gewissen Gegend gespürt haben, entweder eingelappt, oder geklappert, (s. oben S. 160. 161.) oder im freyen Felde mit Hunden gejagt, wobey er sich oft glücklich der Verfolgung seiner Feinde mit Lassung seines übelriechenden Harns entledigt, welchen Geruch die meisten Hunde verabscheuen, sich zurückziehen und den Fuchs nicht packen; erhaschen sie ihn aber, so wehrt er sich tapfer. Der Jäger kann ihn auch auf dem Anstande schießen, wenn er sich unter dem Winde an diejenigen Wege (Wechsel) hinstellt, die

der

der Fuchs gewöhnlich nimmt, wenn er sie eine zeitlang sicher gegangen ist. Wiederum legt man ihm auch zu dieser Jahreszeit Aas, oder eine andere Lockspeise, z. B. eine gebratene Katze hin, und erschießt ihn dabey aus einer Hütte. Er wird auch mit eisernen Fallen, den sogenannten Schwanenhälsen, und Tellerfallen, die man bedeckt, und mit einer Witterung belegt, gefangen. Eine vortrefliche Witterung, mit welcher man den Fuchs auf dem Anstande schießen oder in das Fuchseisen locken kann, ist folgende. Man nehme ein Pfund frisches Schweinefett, und lasse solches in einem neuen Topfe schmelzen. Alsdann werfe man drey zerschnittene Zwiebeln hinein, und, wenn diese braun gebraten sind, ein Stückchen Campher eines kleinen Fingers lang. Sobald der Campher zergangen ist, lege man kleine Stückchen Brod in der Größe der Haselnüsse in diese Masse, und wenn diese röthlich werden, thue man endlich zwey Löffel Honig hinzu. Wenn alles dieß zusammen einigemal aufgekocht hat, so nehme man die Stückchen Brod heraus, und bediene sich derselben folgendermaßen. Man nehme ein Hammelgekröße, tunke es in diese Mischung und bestreiche es damit, und schleppe es hinter sich her bis zum Anstande, oder dem gelegten Eisen, und lasse von Zeit zu Zeit ein Stückchen von dem gebratenen Brod fallen. An das Eisen muß die Witterung gut befestigt werden, sonst weiß sie der schlaue Fuchs geschickt wegzubringen, ohne sich zu fangen. Diese Masse kann man lange in einem wohlverwahrten Topfe aufbehalten. In den Fallen beißt er sich oft das Bein, oder den Schwanz, mit welchem er sich gefangen hat, los, und

entgeht so verstümmelt den Nachstellungen des Jägers und seinem Tode. Wenn man ihn wegen felsigen Bodens nicht ausgraben kann, und eine Falle vor die Röhre legt, um ihn zu fangen, so bleibt er sechs bis neun Tage in derselben und hungert, ehe er sich der Gefahr aussetzt, gefangen zu werden. Weswegen man ihn alsdann allezeit wie scheletirt bekommt. Auch niedrige Netze stellt man ihm auf und jagt ihn in dieselbe; und reizt ihn nicht nur durch das ungewöhnliche Geschrey eines Hasen, sondern auch einer Drossel und Maus. (s. Jagd.)

Nutzen.

Der nützliche Beytrag, den die Füchse zur Erhaltung des Gleichgewichts in der Natur thun, besteht in Ausrottung der oft so sehr sich vermehrenden schädlichen Feldmäusearten, die nicht bloß im Felde, sondern auch im Walde an der Aussaat Schaden thun.

Das Fleisch benutzt der Jäger bey der Abrichtung der Hunde, welche Füchse jagen und fangen sollen. Von den Ostjacken, Grönländern, Tunguſen, Kalmucken und Tschuwaschen wird es ohne Ekel genossen, und wer es nicht weiß, wird auch von uns ohne Bedenken, einen gut zubereiteten Fuchsbraten für Hasenbraten verzehren *).

Vom ersten May bis ersten September braucht nur der Hutmacher die Fuchshaare, die übrigen Monate aber und besonders im Winter, verarbeitet der Kirschner den Balg zu Pelzen, Aufschlagen, Müffen und Mützen.

Die

*) Pallas Reise II. 138. 430. III. 127. 138.

Die Fuchsbälge der alten Füchse mit schönen weißen Kehlen sind dem Kirschner sehr angenehm, und er bezahlt sie theuer, weil er diese Kehlen zu Verbremungen und Pelzfutter verbraucht, besonders werden sie zu Aufschlägen für Husarenofficiere ausgeschnitten. Der Schwanz wird im Winter zur Erwärmung des Halses getragen, und bey Verfertigung der rauhen Handschuhe genutzt; auch bestreicht man den Elektrophor, aus welchem man Funken locken will, mit demselben. Von den Russen kaufen nach Pallas die Chinesen viel Fuchsbälge, auch einzelne Theile, als Hälse, Bäuche, Pfoten.

In der Apotheke hat man die Lunge, die Zunge und das Fett desselben; und die Jäger und Waldleute sind immer mit getrockneter Fuchslunge versehen, mit welcher sie sich und ihren Nebenmenschen in der Schwindsucht und andern Brustkrankheiten helfen wollen. Das Fell soll auch in Umschlägen oder in Stiefeln gefüttert beym Podagra schmerzlindernd seyn.

Die Perser bestreichen die Hände mit Fuchsfett, damit sie ihnen nicht erfrieren.

Schaden.

Der Schaden, den dieses Thier stiftet, ergiebt sich aus seiner Nahrung. Wo viele Füchse sind, findet man in kurzer Zeit keine Hasen und Feldhühner mehr.

Irthümer und Vorurtheile.

1) Das Entledigen der Flöhe s. oben.

2) Er soll sich nach Aussage mancher Jäger, an die Fahrwege legen, todtstellen, die Zunge ausstrecken, und die Krähen, die ihn als Aas behandeln wollen, wegschnappen.

3) Es will auch einmal jemand gesehen haben, daß ein Fuchs eine Reihe Dorschköpfe vor sich hingestellt, und die darnach fliegenden Krähen weggefangen habe. Er frißt aber wohl die Dorschköpfe lieber als das Krähenfleisch.

4) Den Krebsfang mit dem Schwanze s. oben.

5) Alte Aerzte und Jäger kurirten sonst mit Fett, Lunge, Zunge, und Koth.

Die neunte Gattung.

Katze. Felis.

Kennzeichen.

In beyden Kinnladen befinden sich sechs gleiche spitzige Vorderzähne.

Die Eckzähne sind einzeln, lang und kegelförmig.

Auf jeder Seite stehen drey zackige Backenzähne.

An den Vorderfüßen befinden sich fünf, an den Hinterfüßen vier Zehen, welche mit krummen spitzigen, zu ihrem Raube dienlichen Krallen bewaffnet sind, die in häutigen Scheiden liegen, um durch das beständige Gehen nicht abgenutzt werden; ihre Fährte ist daher rund, und bey ihrem natürlichen Gange geschränkt, d. h. die Fußtapfen liegen in einer krummen Linie, wie ein Zickzack hinter einander; der Hinterfuß tritt aber allzeit in die Vorderspur.

Der Kopf ist rund, die Schnauze kurz und die Zunge rauh, mit rückwärts gekehrten Spitzen. Die Nasenlöcher sind klein. Die untere Lippe kürzer als die obere. Der Mund ist mit steifen Barthaaren

besetzt *). Die Augen blitzen im Dunkeln und haben einzelne lange Haare zur Seite. Die Ohren sind zugespitzt. Der Schwanz ist bey den meisten lang, bey wenigen kurz.

Die Thiere dieser Gattung sind meist alle grausame fleischfressende Raubthiere, die vorzüglich vom Fang des lebendigen Raubes leben.

Die Weibchen haben acht Säugewarzen, bringen mehrere Junge, welche sich erst im zweyten Jahre wieder fortpflanzen.

Es giebt bey uns nur zwey Arten.

*) Mit langen Schwanz.

(12) 16. Die gemeine Katze.

Felis Catus. *Gmelin Linn.* I. 1. p. 80. n. 6.

Kenn

*) An diese endigen sich die Nerven von den Unteraugenhöhlen und die Thiere welche diese Knurr- oder Schnurrbartshaare haben, erhalten dadurch ein sehr feines Gefühl. An Thieren, welchen diese Haare fehlen, die aber eine lange Schnauze haben, geht der Nerve bloß zu den Hautwarzen des Rüssels. D. Wiedemann in Voigts Magazin der Naturkunde. I. 3. 1798. S. 19.

Kennzeichen der Art.

Mit langen geringelten Schwanze, der Länge nach gestreiften Rücken, der Queere nach gestreiften Seiten und kurzen etwas zugespitzten Ohren. Die zahme Katze hat einen gegen die Spitze zu verdünnten Schwanz, und kürzere Haare, als die wilde, welche einen fast gleich dicken, schwarzgeringelten Schwanz, eine grauliche Grundfarbe, schwarze Streifen und dergleichen Unterfüße hat.

Gestalt und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Kopf dieser Thiere ist rund, das Gesicht platt, die Schnauze kurz und abgerundet; das Maul klein; die Nase vorne, wo sie kahl ist, dreyeckig, in der Mitte durch eine senkrechte Furche getheilt. Um die Lippen stehen fünf Reihen Baarthaare, um das Maul empfindlich zu machen, es vor Verletzung zu bewahren, wenn sie auf ihren Raub zufahren, oder durch enge Löcher schlüpfen, und um die Bisse der Ratten und Wiesel abzuhalten. In jeder Kinnlade sind sechs spitzige Vorderzähne, wovon die untern kleiner als die obern sind, auf jeder Seite in beyden Kinnladen ein spitziger Eckzahn, und drey spitzige fast kegelförmige Backenzähne. Die Ohren sind zugespitzt, inwendig kahl, aufgerichtet, gerade vorwärts geöffnet, und vor- und rückwärts beweglich. Die Augen stehen weit vor; der Augenstern ist grünlichgelb; die Pupille steht perpendikulär, schmälert sich in der Hellung sehr, und erweitert sich, ihren Bedürfnissen gemäß, nur in

der Dunkelheit, wo er wie Feuer blitzt und ihnen bey ihrem Rauben vielleicht den Weg erhellet. Wahrscheinlicherweise verursacht dieß eine elektrische Materie die im Auge befindlich ist. Die Backen sind dick. Der Hals stark und rund. Der Körper lang und etwas gewölbt, wird aber im Springen, so wie der lange Schwanz ausgestreckt. Der Schwanz ist kürzer als der Leib, gegen die Spitze hin etwas dünner, mit großer Federkraft zum Springen versehen, und steht gewöhnlich aufwärts. Die Füße sind kurz und stark.

Der Balg hat verschiedene Haarnäthe: eine von dem innern Winkel jedes Auges nach der äußern Spitze der Nase; eine ungepaarte queer über die Nase hinüber; eine ungepaarte über die Mitte der Brust und den Bauch längs hinunter, welche von einer andern zwischen den Vorderbeinen übers Kreuz durchschnitten wird; eine auf jedem Vorderbeine vom Ellbogen bis an den Fuß, und eine von der Ferse an bis zum Auftritte. In ihren Handlungen zeigen sie Klugheit und verrichten sie alle mit einer besondern Leichtigkeit. Sie unterscheiden sich in ihrem natürlichen und freyen Zustande durch ihren dicken Schwanz und durch die langen Streifen, die ihnen queer über den Rücken gerade, und nach den Seiten zu gewunden, laufen.

Das Weibchen ist allzeit schlanker, hat eine spitzigere Schnauze und nicht die dicken Backen des Männchens.

Diese

Diese Thiere haben die Gewohnheit ihren stinkenden Koth einzuscharren. Ihr Mauen, Schnurren, Schreyen und Ziſchen kennt jedermann. Sie mauen, wenn sie etwas verlangen, schnurren *), wenn sie ruhen, ziſchen, wenn sie zornig sind, und die Affekten, welche bey der Brunst abwechseln, drücken sie durch alle die obigen und noch andere übellautende Töne aus. Sie können ein Alter von 10 bis 18 Jahren erreichen. Wir kennen zwey Raſſen:

a) Die zahme Katze.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Hauskatze; Männchen, Kater; Weibchen, Kitze.

Felis Catus domesticus. *Gmelin Lin.* l. c. β.

Le Chat domestique. *Buffon* hist. nat. VI. p. 1. T. 2. Ed. de Deuxp. I. T. 16. f. 2. Ueberſ. von Martini 233. II. Taf. 38.

The domestic Cat. Pennant. hist. of Quadr. I. 295. Meine Ueberſ. I. 304.

v. Schrebers Säugeth. III. 397. Taf. 107. β. F. 1.

v. Zim-

*) Dieß Schnurren oder Spinnen, welches zu ihren Eigenheiten gehört, wird durch ein Paar beſondere, zarte, gespannte Häutchen in ihrem Kehlknopfe bewirkt.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 193.

Goeze's Fauna I. 197.

Donndorfs zool. Beytr. I. 233.

Versuch einer Katzengeschichte. Frankf. u. Leipzig 1772.

Die Hauskatze stammt aus der Wildniß, und ist, wie der Hund, durch die häusliche Erziehung, den gewohnten Umgang mit Menschen zahm und ein Hausthier geworden. Sie ist jetzt beynahe auf der ganzen Erde, die kältesten Zonen ausgenommen, verbreitet*).

Ihre Größe ist verschieden, je nachdem ihre Nahrung und Wartung verschieden ist. Gewöhnlich ist ihre ganze Größe, 1 3/4 Fuß, ihr Schwanz 1 1/2 Fuß lang ihre Höhe fast ein Fuß **).

Die Farbe ist, wie bey den meisten Hausthieren, verschieden. Es giebt weiße, schwarze, braune, aschgraue, gelbe, graugestreifte und schäckige Katzen. Diejenigen, welche auf hellgrauem Grunde schwarze Seiten und Rückenstreifen haben sehen den wilden am ähnlichsten und sind die gewöhnlichsten; sind die Seitenstreifen abgebrochen, so sehen sie vorzüglich schön aus. Derjenige Kater, der drey verschiedene Farben hat, wird für vor-

*) Noch Amerika wurde sie erst durch die Spanier gebracht.

**) Par. Ms. Körper 1 1/2 Fuß; Schwanz 1 Fuß 3 Zoll; Höhe 9 Zoll 6 Linien.

vorzüglich schön gehalten, und ist eine Seltenheit, so wie der ganz blaue.

Bey uns sind folgende Nationals und Farbenvarietäten merkwürdig:

a) Die Angorische Hauskatze. F. C. Angorensis.

v. Schrebers Säugethiere a. a. O. Taf. 107. β. F. 2.

Sie hat lange, seidenartige, glänzende, weiße, gelbliche oder graue Haare. Um den Hals herum ist das Haar vorzüglich lang und bildet eine Art von Halskrause. Sie kömmt wie mehrere weich und langhaarige zahme Thiere aus Angora in Syrien, wird in Persien häufig, in Europa aber nur selten als Hausthier gefunden. Sie weicht in ihren Sitten etwas von der gemeinen Hauskatze ab, indem sie oft in der Stellung der Hunde ruht, sich gern leckt u. s. w. Bey uns artet sie sich gern aus.

b) Die Spanische Hauskatze. F. C. hispanicus.

Büffons Uebers. von Martini II. 234. Taf. 39. F. 2.

Sie hat einen weichen, gewöhnlich orangerothen, mit weißen und schwarzen Flecken besetzten Balg.

c) Die

c) Die Kartheuser-Hauskatze. F. C. coeruleus.

Büffons Uebers. von Martini II. 236. Taf. 40. F. 1.

Sie ist dunkelaschgrau, oder graulichschwarz mit feinen wellenförmigen Haaren.

d) Die Cyper-Hauskatze. F. C. striatus.

v. Schrebers Säugeth. III. 399.

Mit schwarzen Streifen auf hellem Grunde, die auf dem Rücken gerade, auf den Schenkeln aber gekrümmt sind.

Zergliederung.

Magen und Gedärme sind dünnhäutig. Merkwürdig ist der Uterus, in welchen die Jungen liegen. Er besteht aus vier bis fünf häutigen Kugeln, die durch einen Kanal mit einander verbunden sind, aber an einem gemeinschaftlichen Strange sitzen, so daß das zweyte und dritte Junge durch eben den Kanal zur Welt gelangen kann, durch welche das erstere in denselben eingetreten ist. Je mehr die jungen Kätzchen wachsen, desto stärker werden diese Kugeln äußerlich gespannt, daß man sie öfters nicht eindrücken kann. Die Eingeweide sind auch mit viel Würmern besetzt.

Merk-

Merkwürdige Eigenschaften.

Ihrer Bestimmung nach sollte die Katze des Tages schlafen, und des Nachts wachen, allein in der menschlichen Gesellschaft wird ihr diese Ordnung gestöhrt. Sie ruhet sitzend auf den Hinterfüßen, und schlägt den Schwanz um die vordern, oder liegend auf allen vieren, und biegt die Vorderfüße ein. Ihr Schlaf ist leise und kurz. Gesicht und Gehör, ist, wie bekannt, an ihr sehr fein, und sie mußte diese Eigenschaften haben, wenn sie den Endzweck des Schöpfers erfüllen, und in den dunkelsten Winkeln, unsere und ihre Feinde, die Mäuse und Ratten ausspähen und vertilgen sollte. Desto schlechter aber ist ihr Geruch, durch welchen sie ihren Raub nicht, wie andere Raubthiere, ausspüren kann. Ihr Gang ist sehr leise, und geschieht mit eingezogenen Krallen. Flieht sie vor etwas, so kehrt sie die Augen herabwärts. Im Laufen und Springen ist sie schnell und leicht, worzu ihr der lange Schwanz sehr dienlich ist; kann aber nicht lange ausdauern. Sie kann sehr geschickt klettern, springt von einem Baume zum andern, und geht über die schmälsten Latten und Stangen. Stürzt sie, indem sie unvorsichtig einen Raub erhaschen will, von einem hohen Baum oder Haus, oder wird sie leichtfertig von hohen Orten herabgeschleudert, so fällt sie sich selten tod, sondern steht, da sie während dem Fallen mit gebogenem Rücken beständig einen halben Cirkel in der Luft beschreibt, wenn sie auf die Erde kömmt, auf allen vier vorgehaltenen Beinen, schüttelt sich einigemal, und läuft mehrentheils unbeschädigt davon. Der Schwanz

kömmt

kömmt ihr hierbey sehr zu statten, steht gerade in die Höhe und vertritt die Stelle des Ruders.

Ihre schöne Gestalt, Reinlichkeit und schmeichelndes Wesen macht, daß man sie als Hausthier liebt, ob sie gleich die Treuherzigkeit und Gelehrigkeit des Hundes nicht besitzt. Ihr Naturell, das sich oft in Falschheit, Tücke und Genäschigkeit äußert, bleibt immer dasselbe, und zeigt sich, wenn sie von ohngefähr in die Wildniß kommt, wieder in seiner ganzen Stärke.

Mit dem Hunde lebt sie in angebohrner, zum Sprüchwort gewordener, Antipathie, und nur Gewöhnung und Erziehung ist im Stande, diese Feindschaft zu verhindern; woher es denn freylich kommt, daß man Stubenhunde und Stubenkatzen zuweilen mit einander aus einer Schüssel fressen sieht. Wenn die Katze gut ist, so widersteht sie mit ihren scharfen Krallen dem größten Fleischer- und Jagdhunde.

Ein merkwürdiges Phänomen zeigt sich bey ihr mehr, als an andern Säugethieren. Wenn man ihr im Dunkeln mit der trocknen Hand vom Schwanz nach dem Kopfe zu über den Rücken hinfährt, so fahren viele Funken mit einem Knistern aus ihren Haaren *). Sie

pflegt

*) Aus diesen elektrischen Ausdünstungen läßt sich auch wohl die Antipathie mancher Personen mit diesen Thieren erklären, die oft, wenn sie ihnen nahe sind, Aengstlichkeit und Ohnmacht bekommen, ohne sie zu sehen.

Man

pflegt sich auch, wenn sie sich verunreinigt hat, mit ihren Vorderpfoten zu kämmen und zu waschen, welches von manchen Personen für ein Zeichen der Veränderung des Wetters gehalten wird.

Aufenthalt.

Ob die zahmen Katzen gleich zu den Hausthieren gezählt werden, so sind sie es im Grunde nur halb. Denn sie halten sich nur zu denjenigen Herren, und in denjenigen Häusern auf, wo es ihnen am besten gefällt, und die meisten gewöhnen sich mehr an ein oder mehrere Häuser, als an die Bewohner derselben. Zu bewundern ist, daß man diese Thiere eine bis zwey Meilen weit von sich entfernen kann, und demohnerachtet finden sie ihren alten Wohnort wieder auf, wo sie sich wohl befanden.

Nah-

Man hat in neuern Zeiten sogar eine entgegengesetzte Elektricität an den Katzen bemerkt, von denen der Hauptsitz der einen am Kopfe, der andern hinten auf dem Bürzel ist. Sie zeigt sich vorzüglich, wenn das Thier auf einen mit Haaren gepolsterten und mit wollenem Zeuch überzogenen Stuhl liegt, wodurch es ziemlich gut isolirt ist. Man kann daher abwechselnd aus der Nase und dem Bürzel Funken entlocken, allein nie geschieht es bey wiederholter Berührung desselben Theils, bis der entgegengesetzte berührt worden ist. s. Voigts Magazin der Naturkunde. 1798. I. 3. S. 80.

Nahrung.

Da es fleischfressende Thiere sind, so ist ihre liebste Nahrung Fleisch, doch genießen sie auch sonstige Menschenkost. Wegen ihrer kurzen und schlecht geordneten Zähne suchen sie gerne die zarteste Fleischnahrung auf. Zu ihrem Tranke mögen sie gern Milch, und saufen sehr oft, mit der Zunge leckend, wie die Hunde. Wegen ihrer großen Feindschaft, die sie gegen das Mäusegeschlecht haben, kann man sie beynahe in keiner Haushaltung entbehren. Den Gärten werden sie nützlich, weil sie den großen und kleinen Feldmäusen und Maulwürfen auflauern. Da sie aber die Natur mit Leichtigkeit und scharfen Klauen versehen hat, so können sie auch die Bäume besteigen, nehmen da den unschuldigen Vögeln die Nester aus, und die Taubenschläge müssen vor ihnen wohl verwahrt werden. Den Schneidenweg (Schneußweg), den sie einmal mit Vortheil gegangen sind, verlernen sie so leicht nicht wieder.

Sie jagen auch junge Hasen; daher an manchen Orten das Jagdgesetz noch gültig ist, daß den Katzen die Ohren entweder gestutzt oder geschlitzt werden müssen, weil sie die Nässe des Grases und Gebüsches, welche ihnen ihre empfindliche Ohren befeuchtet, und ein Kitzeln darinn verursacht, von dieser Jagd zurückhält. So sehr sie auch das Wasser scheuen, so gehen sie doch den Fischen und Fröschen an seichten Bächen nach. Ihren Raub festzuhalten, kommt ihnen ihre rauhe Zunge sehr zu statten. Bey großem Hunger (hiervon hat man

Bey-

Beyspiele) fallen sie unwehrsame Kinder und Leichen an.

Die Art, ihre Beute zu erlangen, ist bekannt genug; sie schleichen nämlich an dieselbe mit niedergebogenem, gestrecktem Leibe, liegen dann still, wedeln mit dem Schwanze, zielen und suchen sie durch einen Sprung mit ihren Klauen zu erhaschen. Gelingt der Sprung nicht, so ist die Maus oder das verfolgte Thier von ihrem Verfolgen befreyet.

Sie kauen langsam und schwer, und schütteln den Kopf, so oft sie etwas feuchtes nehmen.

Den Geruch einiger Kräuter, als der Katzenminze (Nepeta Calaria), des Baldrians Valeriana officinalis), und vorzüglich des Marumverums (Teucrium Marum) lieben sie so sehr, daß sie sich vor Vergnügen auf denselben wälzen, sie zerbeißen und ausscharren. Hingegen verabscheuen sie den Geruch der Raute (Ruta graveolens) so sehr, daß sie nichts fressen, was damit bestrichen ist, und auch dadurch von Taubenschlägen und andern Orten, wo sie Schaden verursachen, abgehalten werden können.

Sie fressen auch zur Reinigung ihres Magens, wie die Hunde Gras, welches ich mehrmals bemerkt habe.

Fortpflanzung.

Bey der Begattung (dem Rammeln), welches höchst selten vor menschlichen Augen geschieht *), sind sie sehr hitzig, und verrichten sie in verschiedener Lage auf dem Rücken und Bauch, wobey der Kater die Kitze oft in den Nacken beißt. Den Anfang machen sie zu Ende des Hornungs und beyde Geschlechter geben ihre Begierden durch ein fürchterliches, dem Weinen der kleinen Kinder ähnliches, Geschrey zu erkennen. Ein Kater belegt oft mehrere Kitzen. Diese versammeln sich alle in einen Kreis um ihn herum, wedeln mit ihren Schwänzen und stimmen das unangenehme Concert an, das man in Winternächten so oft hört. Er dirigirt mit seiner gröbern Stimme das Concert, wird aber, wenn er ihnen nach Endigung dieser Musik nicht immer zu Willen ist, mit fürchterlichen Bissen fortgejagt. Er ist zu dieser Zeit, welche bey der ersten Begattung zwey bis drey Wochen dauert, halb wüthend, und schweift weit umher seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen, kömmt aber auch oft in Kämpfen mit seines Gleichen stark verwundet nach Hause. Die zahmen Katzen begatten sich des Jahrs gewöhnlich zweymal, und wo sie Gelegenheit haben, auch mit

*) Ich habe sie nur ein einzigesmal gesehen, und zwar bey solchen Lieblingskatzen, die fast nicht aus der Stube kamen und wo Männchen und Weichen zusammen aufgezogen waren. Es geschah wie bey andern Thieren, der Kater hielt die Kitze mit seinen Vorderfüßen vorzuglich in dem dünnen Leibe sehr fest.

mit den wilden. Die Mutter trägt neunthalb Wochen oder gewöhnlich 55 Tage, und wählt, wenn sie werfen will, den ersten besten Platz, wo sie weich liegen kann, legt da drey bis zwölf blinde Junge hin, trägt sie, wenn sie Menschen und Thiere bey ihnen bemerkt, und besonders vor ihrem Gatten, der zuweilen den grausamen Appetit bekommt, seine Kinder zu fressen, am Halse von einem Orte zum andern, säugt sie eine lange aber unbestimmte Zeit, und vertheidigt sie mit Heldenmuth gegen die größten Feinde, die sich ihrem Lager nähern. Der größte Hund wagt sich dann nicht an sie. Wenn sie Mißgeburten zur Welt bringt, so frißt sie sie gewöhnlich gleich auf. Die jungen sind neun Tage blind, und in ihrer Jugend possierliche und lustige Thierchen, lernen allerhand Künste, als aufwarten, tanzen, durch den Reif springen u. s. w. und können im ersten Jahre schon wieder ihres Gleichen zeugen. Sie werden von der Mutter durch Vortragung lebendiger Mäuse in diesem Fang unterrichtet. Zur Zucht wählt man gern die Maykatzen, weil sie einen schönen großen Wuchs erhalten, und diejenigen, welche schwarze Pfoten haben. Sie sind ohngefähr im achtzehnten Monate ausgewachsen.

Krankheiten.

Da die Katzen als Hausthiere nicht allemal die Speisen genießen, die ihrer Natur angemessen sind, so sind sie auch vielerley Krankheiten ausgesetzt.

Im Winter 1797 bis 1798 und im Sommer 1798 war in Sachsen, dem nördlichen Deutschland, auch in

Schweden, Dänemark, der Lombardey u. s. w. eine Seuche unter den Katzen, daß fast alle starben. Man nennt sie die Katzenpest. Sie hat die größte Aehnlichkeit mit der Staupe der Hunde, fängt mit Ekel, Erbrechen und Traurigkeit an, und endigt mit der Auszehrung. Die Katzen entledigen sich ihres Unraths mit großen Schmerzen und man findet, wie bey der Staupe, in Magen und Därmen eine gelbe Feuchtigkeit, und entzündete Stellen. Vielleicht daß man sie wie die Staupe heilen kann. Auch soll gegebenes Schießpulver helfen. Man hat diese Krankheit der merkwürdigen starken Bewegung und Wirkung der elektrischen Kraft in jenen Jahren zugeschrieben *). Andere nennen diese Krankheit ein mit Dumpfsinn verbundenes Nervenfieber, und haben sie dadurch geheilt, daß sie den kranken Katzen täglich viermal eine halbe Unze Ciperwein, zumal in Verbindung mit einem Scrupel gepülverter Baldrianwurzel eingossen. Sie brauchten auch Aloe und Knoblauchssaft in einem günstigen Vehikel und außerdem auch Essigdämpfe.

Sie bekommen auch die Krätze. Diese zieht sich gern nach den Augen, wovon sie blind werden. Man laxirt sie dabey, wie die Hunde.

Auch

*) Schwedische Annalen der Medicin und Naturgeschichte von Rudolphi. Berlin und Stralsund 1799. I. 1. Abh. XVI.

Auch an der Mundfäule sterben sie und diese Krankheit wird epidemisch. Man wäscht ihnen den Mund mit Salpeter aus. Wird die Zungenspitze brandig oder krebsartig, so schneidet man das Stückchen ab.

Ihre fürchterliche Krankheit ist aber die Tollheit, mit welcher sie eben so, wie die Hunde, zuweilen befallen werden, vielleicht aber bloß durch Ansteckung.

Feinde.

Die Feinde der Katzen sind die Hunde, die Flöhe, und ketten- und zackengliedrige, kugelgliedrige und liniirte Bandwürmer, welche sie sehr plagen.

Nutzen.

Aus der Nahrung der Katzen sieht man, daß eine gute Mausekatze ein vorzüglich nützliches Thier in einer Haushaltung ist *). Sie tödten aber nicht allein

*) Wie nothwendig die Katze in der Oekonomie, und zur Erhaltung des Gleichgewichts in der Natur ist, ergiebt sich aus folgender Anekdote. Vor ohngefähr vierzig Jahren gab der König von Neapel auf der Insel Placida den Befehl, daß alle Katzen abgeschafft würden, um die Fasanerey in bessern und sichern Stand zu erhalten. Zwey Jahre lang bemerkte man keinen großen Nachtheil dieses Befehls; allein nach dieser Zeit nahmen die Mäuse von aller Art so überhand, daß sich die Einwohner ihrer gar nicht erwehren konnten, indem sie ihnen alle Nahrungsmittel aufzehrten, die Orgeln zernagten, und die Leichen und Kinder in den Wiegen nicht sicher liegen konnten. Der Befehl mußte also wieder zurückgenommen werden.

Hausmäuse und Ratten, sondern auch Wieseln, Feldmäuse, Wasserratten und Maulwürfe, und sind besonders auf den Schiffen ganz unentbehrlich. In Amerika giebt es am Oronocofluß die großen blutsaugenden Fledermäuse, Vampirs (Vespertilio Spectrum), welche Menschen und Thieren das Blut bis zum Sterben aussaugen. Auf diese richtet man die Katzen ab, daß sie von einem Stück Vieh aufs andere springen, und sie wegfangen. Sie fressen auch schädliche Raupen und Schmetterlinge.

Bey den Aegyptiern, Römern und Muhamedanern waren die Katzen ihres Nutzens halber in hohem Werth. Die erstern verehrten sie göttlich und beteten sie in ihrer natürlichen Gestalt, oder auch unter der Figur eines Menschen mit einem Katzenkopfe an. s. Krünitz Encyclop. XXXVI. Fig. 2004. a. b.

Bey den Muhamedanern stehen sie so in Ehren, daß ein Hausvater beym Brennen des Hauses erst nach seiner Katze greift, ehe er etwas anderes rettet. Es giebt sogar Hospitäler für diese Thiere. Wahrscheinlich hat diese Verehrung ihren Grund in der Fabel, daß sich Mohamed, um die Nützlichkeit der Katzen zu empfehlen, den Ermel, auf welchen seine Katze schlief, abschneiden ließ, um sie nicht zu stöhren, da er plötzlich von seinem Studierstuhl aufsteigen und in den Tempel gehen mußte.

Zu Rom, wo man sehr viele Katzen hält, füttert man sie auf folgende sonderbare Art. Gewisse Leute

kaufen

kaufen das Fleisch verstorbener Thiere und tragen die Stücken an Stangen in der Stadt herum. Auf ein gegebenes Zeichen kommen die Katzen alle aus den Häusern und jede bekommt ihre Portion. Es wird monatlich dafür ein gewisses Futtergeld bezahlt.

Das Katzenfleisch ist eßbar, und soll so süß wie Kaninchenfleisch schmecken, nur darf das Gehirn nicht gegessen werden, welches giftig ist. In Spanien, Frankreich, Holland, Irland, China und auf der Goldküste soll das Katzenfleisch als schmackhaft gegessen werden. Man hängt es erst an die Luft, daß es mürbe wird.

Der Balg ist gut zu Unterlagen, bey Geschwülsten, und man braucht ihn auch, besonders schwarz, zu Aufschlägen der Kleider, sonst als Futter, zu Wintermützen für die Landleute und zu Müffen. Bey den Chinesern ist er ein vorzügliches Pelzwerk, welches sie von den Russen kaufen.

Die elektrische Kraft der Katzenbälge hat man in neuern Zeiten sehr gut anzuwenden gewußt, indem man dieselben cylinderförmig aufspannt, und an der Elektrisirmaschine statt des Glascylinders oder der Glasscheibe braucht, oder auch einen Cylinder von Flanell damit reiben läßt.

Das Fett wird von den Wundärzten als zertheilend gerühmt, sonst braucht man eben nichts mehr von ihnen in der Medicin.

Ihre Därme geben Saiten zu musikalischen Instrumenten.

Schaden.

So nützlich die Katzen in einem Hause sind, so schädlich werden sie, wenn man sie verwöhnt oder ihrer zu viel hält. Sie verunreinigen mit ihrem übelriechenden Harn das ganze Haus und zerkratzen mit ihren scharfen Krallen, wenn sie sich dehnen, oder dieselben schärfen wollen, die Stühle und anderes weiches Hausgeräthe. Sie legen sich, da sie die Wärme lieben, gern auf den Feuerheerd und in den Ofen, hängen leicht glühende Kohlen an sich, und tragen sie an feuerfangende Oerter; ja sie gehen sogar nach brennenden Talglichtern. Wenn man sie einsperrt, so fangen sie nicht nur keine Mäuse, sondern werden auch oft, wenn sich kleine schlafende Kinder an solchen Orten befinden, dadurch Mörder, daß sie sich denselben auf den warmen Hals legen und sie ersticken *), oder sie durch ihren Biß tödten, wenigstens ihnen die Augen leicht auskratzen, und sie so, wie auch alte schlafende Personen, übel zurichten können. Aus den Schlafzimmern wären sie also vorzüglich zu verbannen, und wenn sie auch nur zur Trägheit und Nachläßigkeit im Mäusefangen verwöhnt würden. Sie blos zum Zeitvertreib und Spielen zu gebrau-

*) Wochenblatt für den gemeinen Mann. Leipzig 1777. 2ter Jahrg. S. 47.
Deutsche Zeitung. 1786. Erstes Quart. S. 46.

brauchen, ist auch gefährlich, da man Beyspiele hat, daß sie auch beym Scherz so erzürnt wurden, daß sie die bekanntesten Personen bissen, und durch ihren, in der Wuth zu Gift werdenden, Speichel tödtlich verwundeten *). Sie werden auch wie die Hunde toll, und sind dann so sehr als diese zu fürchten. Sie mit zu Bette zu nehmen, ist nicht nur aus obigen Gründen nachtheilig, sondern auch deswegen, weil ihr Athem und ihre Ausdünstung der Lunge so schädlich seyn soll, daß man sagt, die Schwindsucht entstünde daraus.

Man hat auch Ursache, sie bey schweren Gewittern von sich zu entfernen, weil sie in einem Hause, welches der Blitzstrahl trifft, sehr leicht durch Anziehung der Blitzmaterie schädlich werden können, daher ihre Unruhe und Aengstlichkeit bey starken und nahen Gewittern.

Man

*) In der Kirche zu Rom, S. Maria del Popolo findet sich beym Eingange an der dritten Säule linker Hand das Grab eines Spaniers, der vom Biß seiner Katze starb, mit der Inschrift auf Marmor: Hospes! disce novum mortis genus. Improba felis, dum trahitur, digitum mordet, et intereo. Franciscus Tovar Valisoletanus. I. U D. Filio dilecto. „Wanderer! lerne hier eine neue Todesart kennen. Die untreue Katze beißt mich im Finger, da ich mit ihr spiele, und ich muß sterben.“ Mehr Beyspiele siehe in Goeze's Fauna a. a. O. S. 234. u. s. w.

Man beschuldigt sie auch, daß sie die Pest aus einem Hause ins andere trügen. In der Dresdner Pestverordnung 1711 wurde daher bey funfzig Thaler Strafe verboten, keine Katze auf die Straße zu jagen.

Daß man die Speisekammern und Küchen vor diesen näschigen Thieren, so wie die Kaninchenställe, Taubenschläge und Fischbehälter, sehr wohl verwahren muß, versteht sich von selbst.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Die Alten hatten den medicinischen Nutzen der Katzen in ein Verschen gebracht:

Von schwarzen ist die Nachgeburt,
das Blut,
Das Fell, das Fett, der Kopf und
Koth zu vielen gut.

Aufgelegtes Katzenfleisch zieht Pfeile und Splitter aus dem Leibe.

Weißer Katzenkoth mit Wein eingenommen vertreibt die Kolik. Diese letztere Kur habe ich selbst einmal ausüben sehen, und das von einem Manne, dem ich bessere Einsicht zugetrauet hätte. So fest halten Vorurtheile!

Milch,

Milch, worinn eine Katze gewaschen und wovon sie getrunken hat, vertreibt das Tertianfieber.

2) Ein Preußischer Wundarzt will die Fortpflanzung mit einem Kater und Häsinnen bewirkt haben. Die eine blieb beym Werfen und da er sie aufschnitt, fand er bey ihr zwey Kätzchen und ein Häschen!

3) In einer Mühle soll eine Katze neun Enten ausgebrütet haben, indem sie sich darauf setzte, da die Alte einmal von den Eyern gieng; diese jungen Entchen hatten dann ganz natürlich das Naturell der Stiefmutter erhalten, und jagten Mäuse wie die Katzen; letztere führte sie auch, und wenn sie ins Wasser giengen, so that sie am Ufer so ängstlich, wie eine Henne, die Enten führt.

4) Wenn der Kater während der Trächtigkeit der Kitze getödtet wird, so verwirft letztere.

5) In den alten Hexengeschichten spielen bekanntlich die Katzen die wichtigsten Rollen. Nicht bloß zur Brockenreise, sondern auch zu allen teufelischen Verrichtungen verwandeln sich alle rothäugige Damen in schwarze Katzen. In den aufgeklärtesten Gegenden Deutschlands giebt es noch Leute (gewöhnlich haben sie aber einen schlechten Pfarrer, und noch einen schlechtern Schulmeister), die die schwarzen Katzen als Hexen fürchten. Auf einem Kreuzwege darf man ein solches Mütterchen

terchen vollends gar nicht antreffen, da ist es ohne Zweifel eine Hexe.

6) Bey den vielen Spuckgeschichten, mit den Erzählungen, womit man sich in den Winterabenden auf den Dörfern noch unterhält, liegt auch oft die Katze zum Grunde. Wer kann in der Mitternachtsstunde leichter an ein Fenster klopfen, wer die Menschenstimme natürlicher nachmachen u. s. w.

b) Die wilde Katze.

Literatur und Abbildungen.

Felis Catus ferus. *Gmelin Lin.* l. c. α).

Le Chat sauvage. *Buffon* l. c. tab. 1. Uebers. Taf. 39.

The wild Cat. *Pennant* l. c.

Goze's Fauna. a. a. O. 247.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 107. A. u. Aa.

Ridingers wilde Thiere. Taf. 24.

Gestalt,

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Im Thüringerwalde trifft man diese Art Raubthiere einzeln an, sonst bewohnen sie ganz Europa (die kältesten Gegenden ausgenommen) und das nördliche Asien und Afrika. Charakter und Naturell haben sie völlig mit den zahmen Katzen, da sie die Stammeltern derselben sind, gemein, und lassen sich daher auch leicht, und wenn sie auch alt sind, zähmen.

Ein etwas weniger plattgedrückter Kopf, längerer Hals, überall gleich dicker Schwanz, sehr feines langes Haar mit einzelnen steifen Haaren vermischt, steifere Ohren, um ein Drittheil kürzere Gedärme, und vorzüglich Größe und Farbe machen zwischen beyden Rassen den auffallendsten Unterschied. Sie sind oft noch einmal so groß und drüber, als jene. Ich sah eine sehr große, die folgendes Maas hatte. Die Länge von der Spitze des Mauls bis hinter die Ohren betrug 6 1/2 Zoll, von den Ohren bis zu den Schulterblättern 3 1/2 Zoll, von da bis zum Schwanze 2 Fuß, und die Länge des Schwanzes war 1 Fuß 1 1/2 Zoll. Folglich enthielt die Länge derselben ohngefähr 3 Fuß, ihre Höhe 1 1/4 Fuß*) und ihre Schwere 16 Pfund.

Um das Maul herum war eine schwärzliche Einfassung, die Barthaare waren gelbröthlich. Ueber der Nase

*) Par. Ms. Körper 2 1/2 Fuß; Schwanz fast 1 Fuß; Höhe 1 Fuß 2 Zoll.

Nase bis zur Hälfte der Stirn war sie bräunlich, der Kopf grau, mit zwey schwarzen Streifen, einem vor und einem hinter den Ohren. Eben so der Hals. Der Rücken hatte gelbgrauen Grund mit schwarzen Streifen, die an den Seiten blässer wurden, und sich nach und nach am Unterleibe schlängelnd verlohren. Auf dem Halse und Rücken flossen die schwarzen Streifen zusammen, so daß über dem Oberleib ein schwarzes Band hin zu laufen schien. Zwischen Brust und Hals war ein schmuzig weißer Flecken. Die Seitenhaare waren weißlich mit gelblichen Spitzen, so wie der Bauch. Der dicke stumpfe röthlichgraue Schwanz hatte drey scharf ausgezeichnete, schwarze Ringe und eine schwärzliche Spitze. Die Beine waren gelblichgrau, mit schwarz melirt und endigten sich in schwärzliche Pfoten.

Alle Männchen und besonders die Weibchen haben nicht die nämliche Größe. Und auch die Farbe ist verschieden, so daß einige statt röthlichen Grund, graulichen haben und statt der schwarzen Streifen, schwarze Flecken; sonderlich sind die Weibchen mehrentheils von Farbe grau; doch scheinen mir die hellgrauen und die bloß schwarz gefleckten mehr verwilderte, als wilde Katzen.

Dadurch unterscheiden sie sich von den zahmen auch merklich, daß die Haare zwey bis drey Zoll lang und die Pfoten inwendig allezeit ganz schwarz sind.

Am Schwanze haben sie in einer Drüse eine stinkende öhlige Feuchtigkeit.

Gesicht

Gesicht und Gehör sind vorzüglich scharf.

Bey der Zergliederung ist bloß merkwürdig, die oben angegebene Kürze ihrer Därme, und daß man in denselben eine Menge Mittelrundwürmer und den liniirten Bandwurm antrifft.

Aufenthalt.

Sie bewohnen gern die dicken Wälder, Felsenritzen, hohlen Eichen und suchen die leeren Dachs- und Fuchsbaue zu ihren Winterquartieren auf. Man findet sie auch nicht selten im Winter in Teichen, die zugefroren sind, im Rohr, oder in Löchern unter dem Ufer.

Nahrung.

An dem Federwildpret thun diese Katzen in einem Forste großen Schaden. Junge und alte Vögel, sonderlich Fasanen, Auerhühner, Birkhühner, Haselhühner, Rebhühner müssen unter ihren Krallen sterben, ja sie wissen die Vögel sogar aus den Baumhöhlen zu ziehen. Von einem Baume herab, welchen sie mit der größten Leichtigkeit und Geschwindigkeit besteigen, erhaschen sie durch einen Sprung eine vorbeywandernde Maus. Sie erlegen junge Rehe, Hasen, Kaninchen, und sind in dieser Rücksicht allemal schädlicher als die Füchse. In morastigen Orten, an großen Seen, Teichen und Flüssen gehen sie im Schilfe nicht allein der Brut der Wasservögel, Enten und Taucher nach, sondern suchen auch die Fische auf, die bey Ablassung solcher Gewässer sich

verschlagen. Sie fangen mit großer Behendigkeit Hamster, Maulwürfe und Feldmäuse. Im Winter besuchen sie die Dörfer, um Hühner, Tauben und dergl. zu rauben.

Fortpflanzung.

Ihre Begattung (Rammeln) geschieht zu Ende des Jänners und im Februar mit eben dem Mauen und auf die nämliche Weise, wie von den zahmen Katzen; aber an ihnen will man vorzüglich bemerkt haben, daß der Kater (Baumrutter) die Katze in dem Nacken mit den Zähnen festpacke, diese sich dann unter ihm herum mit dem Rücken auf die Erde drehe und so befruchten lasse. Merkwürdig ist, daß sie ihm beym Loslassen mit einer Pfote ins Gesicht schlägt *). Sie geht neun Wochen dick, und bringt vier, fünf bis sechs blinde Jungen in hohlen Bäumen, Felsenklüften, oder wo es seyn kann, in alten Fuchs- und Dachshöhlen zur Welt. So lange die Jungen noch nicht geschwind genug die Bäume erklettern können, werden sie von der Mutter mit Vögeln, Mäusen und Maulwürfen sorgfältig ernährt, wovon die Spuren in Skeletten vor den Höhlen, worinn sie liegen, gefunden werden. Wenn sie auslaufen können, so spielen sie zusammen auf den Bäumen herum, und machen allerley possierliche Sprünge, und hören sie alsdann nur das

*) Solche Auftritte sieht man auch bey sehr vielen Vögeln.

das geringste Geräusch, gleich liegen sie auf den Aesten der Länge nach hingestreckt, lauschen und glauben sich so verborgen genug. Eben so die Alten.

Es verwildern auch zuweilen zahme Katzen wieder, und begatten sich in Wäldern mit den wilden, daher sich die Verschiedenheit in der Farbe der wilden Katzen erklären läßt, da man nicht allein röthliche, sondern auch schwarzgraue und graugesprengte antrifft.

Jagd.

Ihre Fährte (Taf. XXI. Fig. 3.) ist der zahmen Katzenfährte gleich, nur etwas größer und ein weitlaufiges Zickzack (geschränkt), wenn sie nicht springen. Vom Fuchstritt ist sie durch ihre Runde zu unterscheiden. Wenn sie auf einem Baum bemerkt werden, so sind sie leicht herab zu schießen. Die Hunde, wenn sie auf die Fährte kommen, verbellen sie unter dem Baum. Sie liegen gewöhnlich auf einem Ast hingestreckt stille. Doch muß der Jäger gut schießen können, weil man Beyspiele hat, daß sie ihm bey einem Fehlschuß oder einer leichten Verwundung auf den Kopf gesprungen sind und ihn schändlich zugerichtet haben.

Eben so kömmt beym Hetzen kein Hund ohne blutenden Kopf oder hinkende Beine von ihnen weg, und auch nur gute Hunde gehen sie an.

Befinden sie sich in hohlen Bäumen, so haut man sie entweder aus, oder bestellt die Oeffnung und den Absprung, wo möglich, mit Eisen. Auch vor andern Höhlen, in denen sie sich aufhalten, legt man Tellereisen, oder stellt Hasennetze auf, und räuchert sie heraus.

Wenn sie sich in Erdhöhlen befinden, so läßt man sie durch einen Dachshund herausjagen, und da sie sich sogleich auf die Bäume begeben (baumen), so kann man sie leicht schießen.

Im Winter kann man sie auch bey hingelegtem frischen Aas, nach welchem sie bey hohem Schnee und großer Kälte gehen, erlegen.

Nutzen.

Auch als Raubthiere haben die wilden Katzen einigen Nutzen, da sie die Mäuse und Maulwürfe, Schlangen und andere schädlichen Thiere vermindern, denn sie finden ein Vergnügen daran, alle schwachen Thiere zu tödten, ob sie sie gleich nicht genießen.

Ihr dicker Balg giebt gutes Unterfutter, Mützengebräme, schwarz gefärbt auch Müffe, und nutzt wegen seiner großen Elektricität beym Elektrophor und der Elektrisirmaschine. Als Unterfutter zu Brusttüchern von feisten Personen getragen, soll er zehren, und in gichterischen Zufällen, bey Geschwulst und Flüssen angelegt, heilend seyn. Er kömmt besonders aus Polen, Frankreich, Moskau, Spanien und Holland.

Ihr

Ihr Fett, das roh einen unangenehmen und durchdringenden Geruch hat, soll eine zertheilende Kraft in der Gicht, bey Verrenkungen und Stockungen in den Junkturen bey Menschen und Vieh besitzen, auch zur Heilung der Wunden dienen. Am besten benutzt man es, wenn man es schmilzt, und als Oehl in Lampen verbrennt, da es alsdann keinen übeln Geruch mehr hat, länger und heller als Lein- oder Rüböhl brennt. Eine einzige Katze giebt oft drey Kannen Fett.

Das Fleisch soll auch gesund und wohlschmeckend seyn, und wird besonders in Asien und Afrika gegessen.

Aus den Knochen der Beine (Läufte) macht man Wachtelpfeifen.

Schaden.

Dieß Thier schadet der Wildbahn gar sehr, indem es die jungen Rehe, Hasen, und alles Federwildpret erschleicht, tödtet und verzehrt.

** Mit kurzem Schwanze.

(13) 17. Der Rothluchs.

Namen, Literatur und Abbildungen.

Dieser Luchs heißt auch in Deutschland, gemeiner Luchs, Luchskatze, Hirschluchs, Hirschwolf, weil er der Hirsche größter Feind ist, und die Jäger nehmen zwey Abänderungen an: 1) Katzenluchse oder Luchskatzen. Diese sollen einen weichen, gelinden, lichtgelben Balg mit rothen Flecken und weißem Bauche haben, niedriger, kurz und dick seyn, und sich in gebirgigen und felsenreichen Gegenden aufhalten. 2) Kälberluchse. Diese sollen nicht schön, und reichhaarig, sondern wie neugebohrne Kälber falbig, ziegelroth, mit weißen Flecken, groß, schlank und hochbeinig seyn, und sich in ebenen Wäldern aufhalten. Die Kürschner hingegen nennen unsern Luchs, Kalbluchs, zum Unterschiede von dem Persischen, den sie Katzenluchs heißen, weil er kleiner und schöner ist, indem er einen weißen Balg mit schwarzen Flecken hat.

Felis rufa. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 82. n. 19.

Bay Lynx or Bay-Cat. *Pennant* hist. of Quadrup. I. 303. Tab. LX. Meine Uebers. I. 313. Taf. 54. fig. 2.

v. Schre-

v. Schrebers Säugeth. III. 412. Taf. 109. B. (Pennants Figur.)

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 286.

Goeze's Fauna. I. 252.

Büffons Ueberf. von Martini. VI. 317.

Donndorfs zool. Beytr. I. 244. n. 19.

Ridingers jagdbare Thiere. Taf. 10. Deffen kleine Thiere. Taf. 65. 66. Deffen wilde Thiere. Taf. 22.

Folgende Schriften geben die Naturgeschichte des Thiers gehörig an, allein ob auch der, der Gestalt und Farbe nach beschriebene gemeine Luchs (Felis Lynx), daffelbe Thier sey, ist mir noch nicht gewiß:

Felis Lynx. *Gmelin Lin.* l. c. p. 83. n. 7.

Lynx. *Buffon* hist. nat. IX. 231. T. 21. Ed. de Deuxp. III. T. 8. f. 2. T. 9. f. 4. 2.

Lynx *Pennant* hist. of Quadr. I. 301. Meine Ueberf. I. 311.

v. Schrebers Säugeth. III. 408. Taf. 109.

v. Wildungens Taschenb. für Forst- und Jagdfreunde aufs Jahr 1800. S. 1. Taf. 1.

Donndorfs zool. Beytr. I. 245. n. 7.

(Taf. VI. Fig. 2.)

Kennzeichen der Art.

Mit kurzen schwarzgestreiften Schwanze, gebüschelten Ohren, hellrothbrauner Grundfarbe, die undeutliche schwarze Flecken, etliche krumme Queerstreifen auf den Backen, und zwey schwarze Queerstreifen auf der inwendigen Seite der Vorderbeine hat.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß fürchterliche kühne und einzige getiegerte Säugethier, das in der kalten Zone aller drey Welttheile lebt, pflanzt sich itzo nur noch selten in Deutschland fort *), sondern streicht vielmehr wie ein Zugthier zur Zeit seiner Begattung herum und kömmt aus benachbarten südlichen und nördlichen Wildnissen in die großen und dichten Wälder Böhmens im Berauner, Keurimer, Rakonitzer

*) Man trifft sie noch am häufigsten in den Oberschlesischen Wäldern, in Niederösterreich und Steyermark an. Im Winter 1789 wurden zwey Luchse auf dem Thüringerwalde Gothaischen Antheils geschossen und verfolgt, und die Jäger vermutheten nicht unwahrscheinlich aus dem großen Wildmangel, gefundenen Wildaase und den häufigen Fährten, daß sich ein Paar das ganze Jahr hindurch in einer Felsenkluft aufgehalten, und Junge daselbst gebracht habe. Im Winter 1793 und 1796 sind abermals daselbst zwey erlegt, noch mehrere aber gespürt und in andern Gegenden des Thüringerwaldes geschossen worden.

nitzer und Budweiser Kreise, nach dem Harze und Thüringerwalde, und verweilet hier des guten Raubes halber so lange, als es vor den Nachstellungen der Jäger sicher ist.

Sein äußerliches Ansehen hat mit der Katze sehr vieles gemein, nur daß es größer, stärker, hochbeiniger und kurzschwänziger ist. Die Größe vom Kopfe bis zum Schwanze beträgt drey und einen halben Fuß; der Schwanz hat neuntehalb Zoll; die Höhe ist drittehalb Fuß *).

Der Kopf, der auf dem Halse breit aufsitzt, ist einem Katzenkopfe sehr ähnlich; nur ist die Schnauze, die sonst dick, schwarz mit einem Schnurbarte versehen ist, gestreckter, welches auch besonders der nähere Stand der Augen nach den Ohren zu verursacht. Er ist 7 Zoll lang. Die Zunge ist stachlich. In beyden Kinnladen befinden sich sechs kleine Vorderzähne, wovon die vier innern Paarweise stehen, und kleiner sind, als die beyden äußersten; einzelne anderthalb Zoll lange Eckzähne (Fänge), und auf jeder Seite drey große so scharf gezackte und ausgeschnittene Backenzähne, daß die Zacken und Einschnitte oben und unten genau in einander passen. Die Augen sind rund, enthalten beynahe einen Zoll im Durchschnitt, und haben eine hochgewölbte grüngelbe Hornhaut, der rothe Folie untergelegt zu seyn scheint, und zur Seiten an den Schläfen, und statt der Augenbraunen einige größere und kleinere weiße Borstenhaare. Des Nachts blizzen

*) Par. Ms.: Körper 3 Fuß 2 Zoll; Schwanz 7 Zoll; Höhe 2 Fuß 2 Zoll.

zen sie wie Feuer, und ihr Blick überhaupt ist sehr scharf und schalkhaft freundlich, so wie die ganze Gesichtsbildung. Die Ohren sind weit, mittelmäßig lang, dreyeckig, zugespitzt, wie Sammt glänzend, und an den Spitzen mit einem, in die Höhe stehenden, zwey Zoll langen Büschel steifer Haare besetzt, die das Thier von allen andern unterscheiden. Der Hals ist stark; der Leib dick und läuft gerade aus; der Schwanz (Ruthe) kurz, abgestumpft, gleich dick, und wird etwas in die Höhe gekrümmt getragen. Die Beine (Läufte) sind hoch, stark; die Pfoten plump, viertehalb Zoll breit, mit großen anderthalb Zoll langen, scharfen, weißen Krallen (Waffen) bewaffnet.

Der ganze Balg überhaupt ist langhaarig, dicht, gelinde, und seidenartig anzufühlen; doch hat der Unterleib besonders feine Haare, die zwey und einen halben Zoll lang sind. Das Haar ist im Gesichte braun, und nach dem Halse laufen auf dem Oberkopfe kaum merkliche schwarzbraune Streifen hin. Die Backen sind hellkastanienbraun. Die Schnauze ist schwarz, und die langen starken Barthaare, welche an der Oberlippe hin auf drey Reihen schwarzer Wärzchen sitzen, sind weiß. Das untere Augenlied ist weiß, so wie das obere nach dem großen Augenwinkel zu, und beyde sind schwarz geändert. Drey glänzend schwarze Streifen, wovon der obere vom äußern Augenwinkel und der untere vom Winkel der Oberlippe anfängt, laufen in schräger Richtung, wie ein flaches lateinisches S über die Backen bis unter die Ohren, wo sie sich in einem großen schwarzen Flecken vereinigen,

nigen, und mit den über ihm stehenden braunen und den unter ihm stehenden weißgelben langen Haaren einen großen Backenbart bilden, der bis zum Kinn reicht, und dem Thiere, da er das ganze Gesicht in horizontaler Lage einfaßt, ein ganz eignes Ansehen giebt. Die Ohren sind in der Mitte weißgrau, mit einem breiten glänzend schwarzen Rande, der hochbraun kantirt ist, und die anderthalb Zoll langen Haarbüschel derselben bestehen aus schwarzen Stachelhaaren, die mit einigen weißen vermischt sind, und sich oben etwas spreitzen. Vom Kopfe bis zur Hälfte des Schwanzes ist der ganze Oberleib hell rothbraun, der obere Rückenstreif am dunkelsten, weil hier der Länge nach abgebrochene, schmale, schwärzliche Streifen laufen. Die Stachelhaare, die auf dem ganzen Oberleibe ausgestreut sind, haben weiße oder schwarze Spitzen. Nach den Seiten herab verlauft sich die rothbräunliche Rückenfarbe in Weiß, und Braun und Weiß bilden undeutliche Flecken und Streifen, die sich nach dem Unterleibe schlängeln, wie bey den wilden Katzen. Die gleichgefärbten Weichen und Hinterschenkel haben reihenweise schwarzbraune Punkte; das übrige Hinterbein aber ist roth mit weiß überlaufen. Die Vorderbeine sind fuchsröthlich ebenfalls mit weiß überlaufen, und haben undeutliche gestellte schwarzbraune Punkte, die nach den Zehen zu immer kleiner werden. Die Kehle ist weißgelb. Die Brust und Unterbeine sind weiß und gelb, gewässert, mit schwarzen Flecken, welche sich an den Vorderbeinen in der Gegend des Ellenbogens und der Kniekehle in glänzend schwarze Streifen verwandeln. Der übrige Unterleib ist weiß mit großen schwarzbraunen Flecken.

Der

Der Schwanz mit rothgelblichem Grunde, hat undeutliche rothbraune Ringel, und die viertehalb Zoll lange Schwanzspitze ist glänzend schwarz *). Die Räthe des

Bal-

*) Nach dieser Beschreibung eines Deutschen Luchses ist, deucht mir, bis zur größten Wahrscheinlichkeit, klar, daß der Rothluchs (Felis rufa) des sel. Professor Güldenstedts in Petersburg, (s. Nov. Comment. Acad. Petrop. XX. p. 449.) und des Herrn Pennants Baycat a. a. O. welcher in dem Innern der Provinz Neujork in Amerika wohnt, dieselbe Luchsart sey. Wir finden hier an unserm Exemplare das Hauptunterscheidungsmerkmal, das diese Männer angegeben, die schwarzen Backenstreifen, und die Binden an den Vorderbeinen, und die ganze Beschreibung paßt fast wörtlich auf die des Rothluchses, wenn wir die kleine Verschiedenheit in der Farbe des Schwanzes annehmen, wo sich am Rothluchs dieser Theil nur in einer breiten schwarzen Binde endigt. Wer aber weiß, wie viel Clima und besonders das Alter ꝛc. zur Farbe der Thiere beyträgt, (s. Beschreibung des Fuchses, der wilden Katze, des Dachses), der wird deshalb gewiß diese beyden Thiere nicht als Arten trennen. Unsere Beschreibung ist von einem alten Luchse genommen, der im Jahre 1773 im Gothaischen Antheile des Thüringerwaldes auf dem Tambacher Forste geschossen wurde, wo er sich ein ganzes Jahr hindurch aufhielte, und seine Wohnung in einer Felsenkluft aufgeschlagen hatte. Zwey andere, die im December 1788 und 1796 in ebenderselben Gegend eingekreißt wurden, hatten ebendieselbe Bildung und Zeichnung, und derjenige, der im Februar 1789 erlegt wurde, wich nur darin, weil er noch jung war, von obiger Beschreibung ab, daß die unordentlich zerstreueten braunen Flecken in der Seite deutlicher, die schwarzen Backenstreifen undeutlicher, und das Braune und Weiße in den Seiten nicht so schön vertrieben war. Von Jägern, die mehrere gesehen haben, bin ich versichert worden, daß

der

Balges sind: Eine von dem hintern Ohrenwinkel nach der Schulter, eine andere von dem After nach der Ferse, und eine doppelte von da nach der Fußsohle hinunter.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch einen schmälern Kopf, kleinern Körper, weniger schalkhaftes Gesicht, weniger schönen und bleichern Balg, indem die weißen Stachelhaare nicht so sichtbar und die Flecken und Streifen nicht so ausgezeichnet, sondern mehr ver-

der Oberleib zuweilen auch ganz braunroth und der Unterleib röthlichgelb sey ohne alle Flecken, nur finde man an der inwendigen Seite der Vorderfüße die deutlichen oder undeutlichen schwarzen Streifen, eben so auf den Backen.

Gewöhnlich wird die Farbe des gemeinen Luchses (Felis Lynx) so beschrieben, daß sein sanfter und langhaariger Pelz eine aschgrau bräunlichgelbe oder aschgrau röthlich überzogene Farbe habe, und mit dunkeln Flecken gezeichnet sey, die mehr oder weniger bey den verschiedenen Individuen sichtbar wären. In Siberien, westlich von Irbisch giebts weiße Lüchse, die mit feinen schwarzen Flecken geziert sind. Sie heißen Irtis und ihr Pelzwerk ist kostbar.

Aus dem Allen erhellet, daß wir in Thüringen entweder den von Pennant beschriebenen Amerkanischen Rothluchs ebenfalls haben, oder daß beyde, der gemeine oder der Rothluchs eine und ebendieselbe Art ausmachen, und nur als Varietäten verschieden sind. Ich kann hier nicht völlig entscheiden, da ich noch keinen lebendigen gemeinen Luchs von der Schreberschen und Büffonschen Abbildung gesehen habe, um aus den ganzen Ansehen (Habitus) beurtheilen zu können, ob sie zu trennen, oder zu vereinigen sind. Meine Behauptung bestätigen noch Ridingers Abbildungen und Herrn v. Schrebers Beschreibung des Kopfs (III. S. 409).

vertrieben sind, und in einander laufen, endlich noch durch die acht Säugwarzen.

Die Stimme dieser Thiere ist scharfklingend und heulend, wie ein Hund.

Ihr scharfes Gesicht ist zum Sprichwort geworden: Augen wie ein Luchs. Auch ihr Geruch zeichnet sich vor den andern zur Katzengattung gehörigen Thieren aus.

Ihr unverkürztes Lebensziel soll bis funfzehn Jahre dauern.

Aufenthalt.

Ihren Aufenthalt (Lager) haben der Luchs und die Luchsin, die in ihrer Heimath beständig zusammen leben, in den dicksten einsamsten Wäldern. Sie suchen gern die Steinklüfte und Felsenritzen, noch lieber aber die Brüche, die hohes Gras und Schilf haben, zu ihrer Wohnung auf. Am Tage setzen sie sich, wo sie sicher sind, auf die Felsenspitzen oder abgestumpfte Baumstamme hin und können sich. Nur bey der heftigsten Verfolgung und bey ihren Spielen besteigen sie rauhe und schiefstehende Bäume, und können sich der Länge nach, wie die Katzen, auf einen Ast hinlegen, daß man sie kaum bemerkt. Zu uns kommen sie in den letzten Wintermonaten, durchstreifen von Osten nach Westen zu unsere düstern waldigen Gegenden, und wohnen in Felsenritzen, alten Bergwerksstollen, und Fuchs- und Dachsbauen. Nur selten kön-

können sie des Sommers, wegen den allgemeinen Verfolgungen, denen sie ausgesetzt sind, über mehr bey uns bleiben.

Nahrung.

Der Wildbahn thun diese grausamen Thiere großen Schaden. Ihre eigentliche Nahrung besteht aus dem Raube (Riß) des Rothwildprets. Sie gehen des Abends und Morgens in der Dämmerung demselben nach, und der Fang geschieht gerade, wie bey der Katze. Sie lauschen entweder auf dem niedrigen Strunke eines Baumes, oder hinter einem Busche, oder in Röhrig und hohem Grase auf dem Bauche liegend, wie schlafend, unter dem Winde an den Wildgängen (Wechseln) *), die sie genau ausspüren, und springen, wenn sie sich einem jungen Hirsche, Elenthiere, oder Rehe, das vorbeygeht, nahe genug glauben, durch drey bis vier Sprünge, deren jeder 12 bis 14 Fuß mißt, nach demselben hin, fassen es im Genicke, halten sich mit den tief eingeschlagenen Krallen in dem Rücken fest, und zerbeißen ihm mit ihren scharfen Zähnen die Halsflechsen, daß das Thier in einigen Minuten todt zur Erde niederstürzt. Erreichen sie ihren Raub mit diesen Paar Sprüngen nicht, so verfolgen sie ihn nicht weiter, sondern legen sich abermals auf die Lauer, oder schleichen still an den Wildwechseln herum, und suchen mit dem Fange eines andern Thieres glück-

*) Sonst sagte man, daß der Luchs von einem Baume herab, auf das vorübergehende Wild setze, allein dieß widerlegen die neuern sichern Beobachtungen. Wenigstens thut dieß unser Rothluchs nicht.

glücklicher zu seyn. Haben sie ihn aber glücklich ergriffen und getödtet, so tragen sie ihn entweder an einen sichern Ort, oder saugen ihm, wenn ihnen die Mordstätte sicher genug scheint, auf der Stelle das Blut aus, fressen ohngefähr 3 bis 4 Pfund zu ihrer Sättigung von den edlern Eingeweiden *), dem Halse, Dünnen und den Keulen, als den schmackhaftesten Theilen, und bedecken oder verscharren das übrige Aas. Wenn der Luchs den folgenden Tag kein neues Thier erlauern kann, so kehrt er wieder zurück, und zehrt von dem, was er übrig gelassen hat. Allein selten ist ihm dieses Fleisch länger, als drey Tage, frisch genug, es müßte denn in den härtesten Wintermonaten, und beym größten Mangel an Wild seyn; sonst thut er lieber weite Reisen, um neue Beute zu machen. Im Thüringerwalde kennt er, so weit als man ihn hat beobachten können, kein anderes Nahrungsmittel unter den wilden Thieren, als Rothwildpret, Hasen, Birkhühner, Auerhühner und Haselhühner; an andern Orten soll er aber auch wilde Schweine fangen, und letztere sollen sich zuweilen ihres Mörders dadurch entledigen, daß sie mit ihm durch dichte Gebüsche rennen, und ihn vom Rücken abstreifen. Im Nothfall muß er auch mit Eichhörnchen und Mäusen vorlieb nehmen. Er fällt auch zuweilen die Heerden an, und raubt Schafe **), Zie-

*) Daß sie den Hirnschädel öffneten, und das Gehirn ausfräßen, ist ungegründet.

**) Der Luchs, welcher sich im Jahr 1772 auf dem Thüringerwalde aufhielt, soll einmal in einer Nacht etliche 30 Stücke Scha-

Ziegen und Kälber. Im Winter soll er oft gar so dreiste seyn, daß er in Walddörfern die Ställe untergräbt, und das kleinere Hausvieh erwürget. — Es folgen ihm gern die kleinen Raubthiere, als Füchse, Marder u. d. gl. nach, weil sie immer von seinem Raube noch etwas finden.

Fortpflanzung.

Die Begattung (Ranzen, Brunsten, Begehren) dieser Raubthiere geschieht zu Ende des Jänners und Anfang des Hornungs. Die Lüchsin bringt dann nach drittehalb Monaten zu Ende des Aprils oder Anfang des Mayes am liebsten in einer Felsenkluft, sonst auch in einer selbstgegrabenen oder gefundenen Höhle, oder hinter einem dicken mit Moos und hohem Heidegras bewachsenen Gebüsche auf einem, mit Laub, Moos und Geniste, weichgemachtem Lager ihre zwey bis drey, selten vier Junge. Diese sind 9 Tage blind und anfangs weiß von Farbe. Sie spielen, wie die jungen Katzen vor dem Lager, und die Mutter lehrt sie am lebendigen Raube, der itzo meist aus Geflügel besteht, rauben und tödten.

In der Tatarey zieht man die Jungen des schönen weißen und schwarzgefleckten Luchses mit Milch und Fleisch auf, und richtet sie zur Jagd ab, wie die Hunde.

Jagd.

Schaafe in einer Heerde gewürgt haben. Der Schäfer gab diese That einem großen Hunde Schuld, wofür er des Nachts den Luchs angesehen hatte; allein die Jäger wollen den Mörder bald hernach ausgespürt haben.

Jagd.

Der Luchs verräth dem Jäger sein Daseyn auf verschiedene Art. Wenn Schnee liegt, so spürt er ihn an seiner Fährte (Taf. XXI. Fig. 4.), die ohne sichtbare Krallen (Waffen), der Katzenfährte ähnlich, nur von dickern Ballen, runder und größer ist, indem sie gewöhnlich viertehalb Zoll Breite, oder die Größe einer Jagdhundsfährte hat. Er setzt sie im Gehen (Trabe) in Zickzack (schränkt), in der Flucht aber auseinander, wie alles Wild. Weiter kann er ihn dadurch vermuthen, wenn das Rothwild auf seinem Forste ganz scheu ist, daß es etliche hundert Schritte vor ihm flüchtig wird, und immer unstätt ist. Endlich verrathen ihn auch die Jagdhunde, wenn sie vergrabenes Rothwildpret finden. Wenn er sich einmal an einem bestimmten Orte aufhält (steckt), so ist er auch besser zu kreisen, d. i. zu umziehen, als der Wolf, weil er eher und fester hält, und wird mit dem kleinen Jagdzeuche, als halben Tüchern, Wolfs- und Rehgarnen eingestellt. Er läßt sich alsdann entweder, wenn die Treiber mit Geschrey und Trommeln Lerm machen, in die aufgestellten Netze treiben, oder besteigt, wenn ihm die Hunde zu nahe kommen, einen Baum (bäumt), von welchem er leicht geschossen worden kann. Die Hunde, die ihm angehetzet werden, richtet er oft schändlich zu, und die Wunden von seinen Zähnen und Krallen heilen schwer.

Man legt ihm auch etliche verdeckte, an Ketten befestigte, Tellereisen ohne Körrung und Witterung, denn er achtet keine, da er besser sieht als riecht, um den frisch-

ge-

gefangenen Raub, den er vergraben hat, herum, weil er mehrentheils den folgenden Tag diese Ueberbleibsel noch einmal besucht, und etwas davon genießet.

Der Fang in der großen Luchsfalle, welches eine Art von hölzerner Schnellfalle ist, an deren Zunge ein Stück frisches Fleisch gebunden wird, ist trüglich. Eben so wenig darf ihn der Jäger mit der Flinte wegen seines scharfen Gesichts und seiner Schlauigkeit zu hinterschleichen hoffen.

Daß er dem Pfeifen der Droßeln, oder dem Schreyen des Hasen, welche Töne der Jäger nachahmet, (dem Reizen) nachgienge, wodurch er leicht geschossen werden könnte, davon hat man in Thüringen keine Erfahrung machen können.

Oft hat er in der Wuth den Jäger, der ihn nicht stark verwundet hatte, angegriffen.

Nutzen.

Das Fleisch des Luchses wird in einigen nördlichen Gegenden gegessen. Nach Fischer (Naturgeschichte von Livland. 52.) von den Letten.

Der Balg gehört unter die vorzüglich schönen und kostbaren Pelzwerke. Er kömmt aus Natolien, Spanien, Polen, Schweden, Grönland, und vorzüglich aus Archangel und wird zu Müffen, Kleiderfutter, und Verbrämungen der Winterkleider gebraucht. Das

Stück kostet 10 bis 15 Rthlr.; er ist besonders sehr weich, und warm, hat aber den Fehler, daß die Haare spröde und brüchig sind. In der Türkey kostet eine, mit diesem Pelzwerke gefütterte, Weste oft 300 Rthlr.

Er soll auch Eichhörnchen, Wieseln, Mardern, und wilde Katzen tödten.

Schaden.

Der Luchs ist das schädlichste Thier für die Wildbahn des Rothwilds, und fängt auch Hasen, Schweine, und Federwildpret. Die Schafe fällt er auf dem Felde in den Horden an, und der Hunger soll ihn oft so dreiste machen, daß er die Hühner und Gänse von den Bauerhöfen wegholt, und sich, wie der Wolf, durch Graben einen Weg in die Ställe nach den Ziegen, Kälbern und Schafen zu verschaffen sucht.

Im Preußischen und Polen, wo die Kühe im Walde weiden, schleicht er sich an dieselben und reißt ihnen den Euter, seinen Leckerbissen, ab.

Irrthümer und Vorurtheile.

1. Die Alten brauchten die Krallen in der Medicin gegen die fallende Sucht, ließen sie in Gold und Silber einfassen, und hiengen sie gegen den Krampf an den Hals, und glaubten sogar, sein Urin, den er sorgfältig verscharre, verwandle sich in einen Stein, den sie Lynkur nannten *), und sey das beste Mittel wider die Steinkrankheit

*) Plinii hist. nat. VIII. c. 38. XXVIII. c. VIII.
Ovidii Metamorph. XV. 413.
Victa racemifero Lyncas dedit India Bacho:

E qui-

heit, gegen welche sie auch noch das Fett und die steinartige Masse, die man zuweilen in seiner Blase findet, brauchten.

2. Der Luchs soll deswegen seinen vergrabenen Raub nie zum zweytenmale aufscharren, weil er wegen seines unter allen Thieren kürzesten Gedächtnisses gleich vergesse, wo er ihn hingegraben habe.

3. Mit seinem scharfen Gesichte soll er undurchsichtige Dinge durchschauen.

E quibus (ut memorant) quicquid vesica remisit
Vertitur in Lapides et congelat aëre tacto.

Zu Deutsch:

Indien, von Lyäus besiegt, erzeugte die Luchse.
Was der Blase entquillt, so lautet die Sage,
Wandelt in Steine sich um, und härtet an äußerer Luft sich

Die zehnte Gattung.

Bär. Ursus.

Kennzeichen.

In beyden Kinnladen sind sechs Vorderzähne, wovon die beyden äußersten größer sind als die mittlern; in der untern liegen die beyden mittlern mit der Wurzel mehr einwärts, als die mittelsten und äußersten.

Die Eckzähne sind kegelförmig und stehen einzeln.

Der Backenzähne sind oben und unten vier und sie sind stumpf gezackt; oben sind noch zwey und unten noch drey sehr kleine beygefügt.

Die Vorder- und Hinterfüße haben fünf Zehen, und die Daumenzehe ist nicht abgesondert. Beym Gehen treten sie mit den Hinterfüßen auf die ganze Ferse auf, daher die Fährte dem Jäger sehr kenntlich wird.

Die Augen haben eine Nickhaut und die Zunge ist glatt.

Die Thiere dieser Gattung wohnen im Trocknen, und nähren sich aus dem Thier- und Pflanzenreiche zugleich. Sie haben einen einfachen Magen.

Sie

Sie pflanzen sich erst im dritten Jahre fort, und bringen wenig, eins bis drey Junge. An jeder Seite des Leibes stehen drey Säugwarzen.

18. Der Landbär.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Bär, gemeiner Bär, Europäischer Bär, gemeiner Europäischer Bär; Steinbär, Schlagbär, Hauptbär, Fischbär, Immenbär, Bienenbär, Obstbär; Ringelbär, wenn er die jugendlichen weißen Ringe behält; Zeidelbär, wenn er noch klein ist; der schwarze Bär heißt auch Gras- und Ameisenbär, und der braune Pferde- und Honigbär.

Ursus Arctos. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 100. n. 1.

Ours. *Buffon* hist. nat. VIII. 248. T. 31. XIII. 258. T. 32. Ed. de Deuxp. III. T. 2. f. 1. 2. Ueberf. von Martini V. 91. 94.

Brown Bear. *Pennant.* hist. of Quadr. II. 1. Meine Ueberf. II. p. 323.

v. Schrebers Säugeth. III. 502. 505. Taf. 139. 140.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 209.

Goeze's Fauna. I. 345.

D. Borkhausens Deutsche Fauna. I. 44.

Donndorfs zool. Beytr. I. 316. n. 1.

Ridingers wilde Thiere Taf. 32. Dessen Bären. Taf. 1. 2. 4.

Kennzeichen der Art.

Mit dickem Kopfe; abgestumpfter Schnauze; kurzem Halse und Schwanze, und gleich hohen Beinen.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Größe ist nach den Gegenden und der Lebensart verschieden; die mittlern ohngefähr sechs Fuß *) und die Schwere derselben von 200 bis 250 Pfund. Vor etlichen zwanzig Jahren wurde zu Insterburg in Preußen ein Bär von 10 Fuß Länge getödtet, und der Bär in dem Bärenzimmer zu Brandenburg, den Churfürst Johann Siegismund 1601 im Dingerwalde schoß, wog 1024 Pfund **).

Der Kopf hat in seiner Bildung und in der schrägen Lage der kleinen Augen etwas Aehnlichkeit mit dem Kopf des Wolfes, ist länglich und hinten dick. Der Scheitel ist platt, zwischen den Augen etwas abhängig, wo sich die kegelförmige, vorne aufgeworfene, Schnauze anfängt. Die Ohren sind klein und zugerundet. Die untere

*) Par. Maas ohngefähr 5 1/2 Fuß lang.

**) Bocks Naturgesch. von Preussen IV. 52.

tere Kinnlade ist kürzer als die obere; die Unterlippe mit Zacken befranzt, an der Zahl 18. Die 6 Vorderzähne oben und unten haben alle der Länge nach eine flache Furche. Von den starken und langen Seitenzähnen sind die untern ein wenig hinterwärts gebogen. In jeder Kinnlade stehen fünf Paar Backenzähne. Die hintern drey breiten haben eine Krone von verschiedenen Höckern, und alle werden nach vorne zu kleiner, so daß der vordere sehr klein ist. Die vordern kleinen fallen den alten Thieren aus, so daß man gewöhnlich, statt 36 Zähnen nur 30 findet. Der Hals ist kurz und dick. Der Leib dick mit gewölbtem gegen die Schultern zu gesenkten Rükken. Der Schwanz kurz. Die Beine mittelmäßig, die vordern etwas einwärts gebogen und wenig kürzer als die hintern, mit fünf parallelstehenden Zehen, woran die Krallen der vordern länger sind.

Die Grundwolle sowohl als das Zottenhaar ist lang, und letzteres hart und glänzend, so weit es über jenes vorragt. Um Gesicht, Bauch und hinten an den Beinen ist das Haar länger, auf der Schnauze hingegen kürzer, als an andern Stellen.

Die Farbe ist schwarz, braun und fuchsroth mit noch einigen farbigen Abänderungen.

Da man in neuern Zeiten diese Bären der Farbe und Lebensart nach als besondere Arten betrachtet *), so will ich wenigstens ihre Beschreibung ganz getrennt liefern, und es dem weitern Nachforschen der Naturforscher in Bärengegenden überlassen, ob wirklich die verschiedenen Charaktere der Art haltbar sind. Merk-

*) s. D. Borkhausens Deutsche Fauna. a. a. O.

würdig ist freylich, daß diese Bären oft an ein und eben demselben Orte wohnen, und doch so verschieden sind.

A. Der schwarze Landbär oder der Ameisenbär.

Ursus Arctos niger. *Gmelin Lin.* l. c. a)

v. Schrebers Säugeth. III. 505. Taf. 140.

Mit dickem Kopfe, abgestumpfter Schnauze, kurzem Halse und Schwanze und schwarzer Farbe.

Er hält sich nur in nördlichen Ländern und in den rauhen und großen Waldungen der Schweiz auf. Der längere Kopf, die längern Ohren, das längere, zärtere, tiefschwarze und seidenartig glänzende Haar und die kleinere Gestalt unterscheiden ihn äußerlich von dem gemeinen braunen Bäre, von dem er auch im Naturell, in der Lebensart und der Begattungszeit abweicht. Sein Naturell ist sanfter; seine Nahrung nimmt er vorzüglich aus dem Pflanzenreiche, und es besteht solche vorzüglich in Beeren von mancherley Stauden und Sträuchern, Wurzeln, jungem Grase und andern Vegetabilien. Nur selten frißt er Fische und Insecten, und nur dann, wann er so ohne Mühe dazu kommt, Fleisch. Er begattet sich zu Ende Septembers und Anfang Octobers, und das Weibchen bringt seine Jungen im März oder zu Anfange Aprils, wo der Bär, in nordischen Gegenden sowohl als den Alpen, noch nicht aus der Winterruhe hervorgegangen ist, und säugt sie, ob er gleich zu dieser Zeit keine Nahrung zu sich nimmt.

Von dieser Art ist folgende Varietät:

a) Der

a) Der kleine weiße oder der Silber-Bär.

U. A. albus. *Gmelin Lin.* l. c. γ).

Ours blanc terrestre. *Buffon.* XIII. 258. T. 32.

Dieser findet sich in Rußland, in dem daran gränzenden Polen, in Schweden und Norwegen, desgleichen auf Island. Seine schwarzen Haare haben alle schneeweiße Spitzen, welches, je nachdem die Spitzen in größerer oder geringerer Länge weiß sind, eine weiße oder mehr ins Graulichte fallende Silberfarbe hervorbringt.

B. Der braune Landbär oder Honigbär.

Ursus Arctos fuscus. *Gmelin Lin. l. c. β).*

Ours brun des Alpes. *Buffon.* l. c. T. 31.

v. Schrebers Säugethiere a. a. O. S. 502. Taf. 139.

Mit dickem Kopfe, abgestumpfter oder dickerer Schnauze als am vorhergehenden, kurzem Halse und Schwanze, und braunen braungrauen, nicht selten schwarzbraunen Körper.

Dieser geht uns eigentlich an. Es ist die gemeinste Art, welche sich noch jetzt in Deutschland und zwar in Niederösterreich, Tyrol, Steyermark, Kärnthen, Crain, in den großen Wäldern des Herzogthums Krumau *), in

*) Der Fürst von Schwarzenberg, dem diese Wälder gehören, hält daher noch jährlich eine Bärenjagd und die Tatzen der gehetzten Bären kommen auf kaiserliche Tafel. Ueberhaupt ist der Bär in dem Gefilde, dem höchsten Theil des Böhmerwaldes nicht selten.

in Pommern und höchst selten in Schlesien **) in einsamen Waldungen, desgleichen in den schweizerischen Alpen findet. Sein Naturell ist sanfter, als bey der folgenden Art. Er nährt sich von jungem Korn, Gras, allerhand Beeren, besonders Erdbeeren und andern Stauden- und Strauchfrüchten, Haidekorn, Kastanien, Trauben, Insecten, besonders Ameisen, denen er sehr begierig nachgeht, und, wenn er es ohne Mühe haben kann, von Fleisch, macht aber nicht so ordentliche Jagd auf Thiere, wie die folgende Art. Er lebt in Monogamie, begattet sich zu Ende des Junius und Anfang des Julius, und bringt seine Jungen nach 9 Monaten, während der andern Bären eigenen Winterruhe.

C. Der rothe Landbär.

U. A. rufus.

Mit abgestumpfter, aber nebst dem Kopfe schmälerer Schnauze, als bey den beyden vorhergehenden Arten, mit kurzem Halse und Schwanze und braun oder fuchsrothem Körper.

Höpfners Magazin für die Naturkunde Helvetiens II. 134.

Er

**) Herr Börner in seinem Prodromus des Schlesischen Fauna führt den Bären noch als einen Bewohner Schlesiens auf; allein gültige Beobachter in jener Gegend haben mich vom Gegentheil versichert und geben kaum zu, daß er von Polen aus noch nach der Schlesischen Gränze streife.

Er findet sich in den Schweizerischen und Tyrolischen Alpen, wahrscheinlich auch in mehreren Gegenden, wo der braune Bär wohnt. Er ist kleiner als jener, hat ein wilderes Naturell, raubt Vieh, welchem beständig nachzustellen und aufzulauren, sein tägliches Geschäfte ist; ja er ist so muthig, daß er in Gegenwart von Menschen ein Stück Vieh anfällt, und zerreißt. Auch jagt er das Vieh, bis es ermattet und ihm leichter zur Beute wird, welches jener nie thut.

Dieses ganz besondere Naturell, und der eigene Bau des Kopfes, welcher nach den Bemerkungen des Herrn von Salis einem Schweinskopfe ziemlich ähnlich ist, charakterisiren ihn offenbar als eine besondere Art. Er geht auch dem Honig gerne nach. Er begattet sich im August oder September, und das Weibchen trägt 6 Monate.

Sind diese dreyerley Bären wirklich verschiedene Arten, so kann ich nicht mit Gewißheit bestimmen, zu welcher eigentlich folgende Varietäten gehören.

a. Der weiße Landbär.

Er ist ganz weiß oder gelblichweiß, und hält sich in der Chinesischen Tatarey und in Persien auf.

b. Der schwarz und weißgeschäckte Landbär.

U. A. variegatus. *Gmelin Lin.* l. c. *)

Pallas Reise durch Rußland. II. 691.

In

In Sibirien um Abakans, auch in Island.

Vielleicht beydes Varietäten vom braunen Landbär.

c. Der Bastartbär.

Der Bär war das Männchen und der Hund das Weibchen. Er wurde in Livland aufgezogen. Er hatte einen Bärenkopf, keinen Schwanz, war sehr zottig und bellte und brummte zugleich. Dieser Bastart belief sich mit einer Hündin, welche sich aber wahrscheinlich mit noch mehrern Hunden belaufen hatte, denn sie bekam 16 Junge, von welchen aber nur sechs dem Bastartbären ähnlich sahen *).

Das Weibchen der Bären soll einen etwas schmälern Kopf und Rücken haben; an der Brust stehen vier und am Bauche zwey Säugewarzen.

Zergliederung.

1. Der Hirnschädel (Cranium) ist kleiner und schwächer als am Löwen, daher kann er auch nicht viel am Kopfe vertragen und verwahrt ihn sorgfältig beym Herabfallen von den Bäumen.

2. Seinen feinen Geruch zu befördern ist die innere Nasenfläche ungemein ausgedehnt. Man zählt vier Reihen knöcherner Schichten an denselben, welche durch drey senkrechte Blättchen von einander geschieden sind

und

*) Fischers Naturgeschichte von Livland. S. 55.

und wodurch die Fläche bis zum Erstaunen vervielfältigt wird, um desto größern und stärkern Eindruck von riechbaren Dingen aufzufassen.

3. Das Bären-Gerippe ist dem menschlichen ähnlich, Kopf und Brustbein ausgenommen; daher sie auch so leicht aufrecht stehen können.

4. Der Magen ist klein und in zwey Kammern getheilt, inwendig mit einigen Erhöhungen wie bey den wiederkäuenden Thieren. Wie beym Vielfraß so machen auch hier die Därme nur einen einzigen Canal, aber von 40 Fuß Länge aus *).

Merkwürdige Eigenschaften.

Gesicht, Gehör, und Gefühl ist beym Bären sehr vollkommen und sein Geruch ist vielleicht feiner, als bey irgend einem andern Thiere, weil die innere Nasenfläche weit ausgedehnt ist. Ohngeachtet seines plumpen Ansehens ist er nichts weniger als träge. Er geht geschickt und aufrecht auf den Hinterbeinen (macht Männchen), läuft schnell in Ebenen und bergan, steiget behend den Bäumen hinauf und rückwärts wieder herunter, und kann über ein Wasser sehr leicht schwimmen, wenn es nicht lange dauert. Seine Waffen sind die vordern Füße, (Tazzen, Branten), mit welchen er seinen Feind, wie eine Katze schlägt, oder mit Umarmungen tödtet. Den Menschen fällt er nur an, wenn er gereizt wird. Er ist jäh-

*) Perrault, Charras und Doddart Abhandl. zur Naturgesch. I, 95. Anatomie von zwey Bären. Taf. XI.

jähzornig, eigensinnig und im Alter keines Zwanges noch Zucht mehr fähig.

Sein Laut ist ein Brummen, Schnauben und grobes Murmeln, welches, wenn er in Zorn geräth, mit Zähnknirschen begleitet ist.

Er lebt zwanzig bis mehrere Jahre, pflegt aber im Alter gern blind zu werden.

Verbreitung und Aufenthalt.

Der Landbär ist in ganz Europa ausgebreitet, und wohnt noch in alle den Wäldern, wo man ihn nicht des Schadens halber ausgerottet hat. Man findet ihn hauptsächlich noch in Norden von Europa und Asien, doch geht er in letztern auch bis Ceylon herab. Auch in der Barbarey soll er seyn. Der schwarze Bär in Amerika aber soll eine eigene Art auswachen *).

Der wilde Bär führt ein einsames Leben, und meidet alle Gesellschaft. Er hält sich gern in und um Brücher, Sümpfe, Steinhaufen und Felsenklippen auf, wohin er auf besondern Steigen zu gehen pflegt. Im Herbst wird er, ehe er sein Winterquartier bezieht, überaus fett. Den Winter bringt er zwar nicht schlafend oder erstarrt, aber doch in einer ununterbrochenen Ruhe zu. Große und alte Bären bleiben unter freyem Himmel,

*) Pennant a. a. O.

mel, junge hingegen begeben sich unter den Schutz einer hervorragenden Klippe, oder suchen sich Höhlen in den Bergen aus, oder graben Löcher unter Baumwurzeln, worinn sie sich ihr Winterlager machen. Dieses bereiten sie aus Schwarzholz, das sie abbrechen, Laub, Grasstengeln und Moos. Diese Materialien tragen sie zwischen den Vordertatzen, indem sie aufgerichtet auf den beyden Hinterbeinen gehen, nach ihrer Wohnung. Das Lager (Loch, Lug) bauen sie rund, wie eine Mulde, unten mit Reisig, oben drauf das Moos, und der Eingang wird mit Reisig, soviel als möglich, verwahrt. Mit einfallendem Schnee legen sie sich nieder, und bleiben so lange liegen, bis der Schnee wieder gänzlich geschmolzen ist, so daß nach verschiedenen Zonen ihre Winterruhe kurz oder lange dauert. Sie nehmen alsdann weder Nahrung zu sich, noch leeren sie den Leib aus, und sollen bloß zum Zeitvertreib an ihren Tatzen saugen. Werden sie aufgejagt, so tanzen sie hurtig hervor. Um Matthiä häuten sich ihre Fußsohlen; dann können sie kaum etliche Schritte gehen, ohne sich blutrünstig zu machen. Wenn sie aus dem Lager gehen, so genießen sie zuerst Ameisen oder die Wurzeln der Calle (Calla palustris, Lin.), um den Leib zu öffnen, alsdann junges hervorsprossendes Espenlaub.

Nahrung.

Der braune Bär nährt sich vornehmlich vom Fleische allerhand großer Thiere, als Pferden, Rind-, Schaf- und andern Vieh, auch Rothwild, und verachtet auch das Aas nicht. Er vergräbt, wie der Fuchs, sei-

nen Raub. Ameisen, Honig von Bienen und Hummeln, und Forellen *) sind seine Leckerbissen. Erstere läßt er auf die Zunge kriechen und verschluckt sie. Er nimmt aber auch Nahrung aus dem Pflanzenreiche zu sich, frißt vorzüglich gern Erdbeeren, thut in Frankreich und der Schweiz jährlich vielen Schaden an den Kastanien und Weinbergen, und läßt sich auch in der Gefangenschaft mit bloßem Brod und Früchten unterhalten.

Die schwarzen Bären hingegen nähren sich fast bloß allein von allerley Wurzeln und Beeren, Heidelbeeren, Preißelbeeren, Himbeeren, Ebereschen, wildem Obste, reifem Getraide, Baumblättern, Gras, Pflanzen **) u. s. w. und beißen bloß den Fischen die Köpfe ab.

Im Frühjahre nähren sich beyde fast allein von der Saat und fettem Grase. Im Sommer ziehen sie sich in die Höhe, und nähren sich aus dem Pflanzen- und Thierreiche, und im Herbste gehen sie den Früchten in den

*) Man weiß in Thüringen, daß in den forellenreichen Waldbächen zur Zeit, da diese Thiere noch daselbst wohnten, fast keine Forelle zu finden war, und daß die Bären in der Dämmerung und hellen Nächten bis in die Dörfer auf diesen Fischfang ausgiengen.

**) Unter letztern sollen sie vorzüglich lieben, die blaue Saudistel (Sonchus alpinus), die gemeine Engelwurz (Angelica archangelica) und die breitblättrige Glockenblume (Campanula latifolia).

den Thälern nach. Mais und Weinbeeren genießen sie alsdann vorzüglich gern, wo sie es haben können.

Um Beute aus dem Thierreich zu erlangen, sind sie vorsichtig genug. Sie spähen zuerst von einer Anhöhe oder Baum das Land aus, wobey ihnen aber ihr Geruch und Gehör mehr, als ihr Gesicht, nützlich ist. Bey Anbruch der Nacht treten sie ihre Streifereyen an, und warten, wenn sie nicht des Nachts an das Vieh kommen können, in einem Hinterhalte ab, bis es ausgetrieben wird. Sie befallen das Vieh von hinten, springen ihm auf den Rücken, schlagen ihre Krallen tief ein, so daß das Thier bald entkräftet zur Erde sinkt. Ist es ihnen zu stark, so jagen sie es entweder müde, oder auf einen gefährlichen Paß, wo es sich todt oder wund fällt.

Besonders ist die Schnelligkeit merkwürdig, mit welcher sie, nach dem Berichte der Kamtschadalen, das sehr schnelle Rennthier fangen. Die Rennthiere halten sich in zahlreichen Haufen beysammen, weiden insgemein in den niedern Gegenden, und nähren sich von dem Grase, das am Fuße der Felsen und steilen Anhöhen wächst. Wenn der Bär sie erblickt, wählt er sich einen Platz, der höher liegt, als der Ort, wo sie grasen, nähert sich ihnen mit Vorsicht, und versteckt sich, je näher er kommt, zwischen den Felsen. Wenn er nun gerade über ihnen ist, und nahe genug sein Verfahren auszuführen, so fängt er an mit seinen Tatzen Felsenstücke loszureißen und sie auf die Rennthiere herab zu wälzen. Gleich darauf verfolgt er sie nicht, sondern wartet so

lange, bis er eins von der Heerde getroffen hat, dann fällt er über seine Beute her, und ist bey seinem Angriffe glücklich oder nicht glücklich, je nachdem das Rennthier mehr oder weniger verwundet ist.

Die Ziegen und Schafe lieben sie vorzüglich; die Pferde aber widerstehen ihnen oft. Doch hat der Bär seine Zeit, wenn er muthiger und wenn er furchtsamer ist. Das Männchen ist z. B. zu Ende des Sommers und Anfang des Herbstes am furchtbarsten, hingegen am Ende des Herbstes ohne Muth. Das Weibchen ist im Frühjahr furchtbar, und bleibt es, so lange es Junge hat.

Im Trinken haben die Bären dieß besondere, daß sie das Wasser bissenweise zu sich nehmen, fast wie die Hunde.

Fortpflanzung.

Die Bären leben in der Monogamie; Männchen und Weibchen bekümmern sich aber demohngeachtet nicht eher um einander, als bis sie hitzig werden (bären).

Aller Wahrscheinlichkeit nach begatten sich die braunen Bären um Johanni, und die schwarzen erst um Bartholomäi, und fast den ganzen September hindurch.

Das Weibchen soll sich bey der Begattung auf den Rücken legen, trägt sechs Monate, und wirft auf ihrem ver-

borgenen Winterlager, wenn sie jung ist, eins, und wenn sie älter wird, bis drey Junge. Diese kommen nicht so unförmlich, wie die Alten dichteten, zur Welt, sondern die neugebohrnen Braunen sind bräunlichgelb und acht Zoll lang. Sie liegen sechs bis neun Tage *) blind. Die Mutter säugt sie sechs Monate lang. Sie ist sehr sorgsam für sie, und behält sie, wenn sie nicht trächtig wird, zwey bis drey Sommer immer bey sich, und nimmt sie mit in ihr Winterlager. So lange sie die Jungen säugt, ist sie am schrecklichsten, unerschrockensten und blutdürstigsten. Sie läßt sie, wenn sie Nahrung sucht, in der Höhle. Führt sie sie zum Spiel ins Grüne, so ist sie immer nahe, und ist Gefahr da, so hat sie sie schon gelehrt auf die Bäume zu flüchten. Wenn sie aber unterdessen trächtig wird, so müssen die Jungen im Winter weichen, begleiten sie aber im Sommer wieder. Daher trifft man nicht selten vier bis fünf Bären bey einander an. Im zweyten Jahre verwachsen die Bären die weissen Ringe, und nur selten behalten sie sie immer. Jetzt fangen sie auch an die Zähne zu verwechseln. Sie wachsen bis ins zwanzigste Jahr, und in dem vierten fangen sie an sich zu begatten.

Die jungen Bären werden bey ausgebackenem Brod und Wasser mit Honig oder Bier vermischt groß gezogen und gezähmt. Man lehrt sie in Polen tanzen, Trommelschlagen, Allmosen mit dem Hute einsammeln, sich überschlagen und dergleichen Künste mehr. Wenn man

*) Einige behaupten vier Wochen.

glaubt, daß sie den Klang der Instrumente und den Tact der Musik unterscheiden könnten, so traut man ihnen zu viel Kenntnisse zu.

Feinde.

Man findet Blasenwürmer in ihnen. Sie werden auch zuweilen von einer Gesellschaft hungriger Wölfe und vom Vielfraß angefallen und die Hermeline sollen sich ihnen in die Ohren beißen, daß sie wüthend werden und sich todt laufen.

Krankheiten.

Sie sollen leicht blind werden, besonders wenn sie lange in tiefen Höhlen liegen, und nach der langen Finsterniß nachher besonders in das blendende Schneelicht kommen. Sie sollen sich aber damit curiren, daß sie sich an den Bienenstöcken von den Bienen den Rüssel so zerstechen lassen, daß er stark blutet.

Jagd und Fang.

Der Jäger spürt den Bären leicht an seiner Fährte (Taf. XXIII. Fig. 3.), die den Fußstapfen eines Menschen, der mit bloßen Füßen geht, ähnlich ist.

Er gehört zur hohen Jagd und wird theils auf dem Anstande, theils im Treibjagen geschossen, theils mit Selbstschüssen erlegt, und theils mit Fallen und mit andern Vorrichtungen gefangen.

Gewöhn-

Gewöhnlich wird er in Gruben, die glatt ausgeschält, und leicht bedeckt sind, gefangen. Oben stellt man einen Topf mit Honig hin, der ihn verführt. Will man ihn lebendig haben, so läßt man ihn in einen Kasten gehen, den man auf die Grube applicirt, und den Bärenkasten nennt.

Die am wenigsten gefährliche Art, sich seiner zu bemächtigen, ist, ihn durch Brandewein, den man auf Honig in den Baumstämmen gießt, zu berauschen. Er läßt sich dann leicht durch einen Schlag auf seinen sehr empfindlichen Kopf tödten.

Die Bauern an der Lena, und dem Ilim in Siberien legen an einer Anhöhe an seinen Weg (Wechsel) Schlingen, davon jede mit einem Stricke an einem sehr schweren Klotze hängt. Sobald der Bär die Schlinge um den Hals hat, und im Fortgehen bemerkt, daß ihn der Klotz hindert und zurückhält, ergrimmt er über denselben, hebt ihn auf, und wirft ihn mit der größten Gewalt den Berg hinunter, wird aber zugleich durch das andere Ende, welches an seinem Halse befestiget ist, mit herunter gerissen, und fällt sich todt. Geschieht dieß nicht gleich zum erstenmal, so trägt er den Klotz so lange auf den Berg und wirft ihn herab, bis er liegen bleibt.

In Kamtschatka befestiget man viele und mit Widerhaken versehene Eisen in ein dickes, starkes, zwey Fuß breites Bret, und legt es dem Bären so in den Weg, daß er drein treten muß. Sobald er mit dem

einen Fuß in den Angeln hängen bleibt, sucht er sich mit den übrigen loszuhelfen, macht sich aber auch dadurch mit diesen fest, und ist so gefangen.

Die Tatarischen Einwohner des Uralischen Gebürges hängen auf den Bäumen, wo sie ihre Bienenstöcke haben, an den von diesen am meisten entfernten Zweigen mit langen Stricken ein Brett wagerecht so auf, daß es vor das Honiggehäuse gebracht und mit einem Baststricke fest an den Stamm gebunden werden kann. Der Bär findet diesen Sitz bequem, um den Bienenstock öffnen zu können. Seine erste Arbeit ist, den Baststrick, welcher das Bret an den Stamm hält, loszureißen; alsbald aber entfernt sich dieses, und schwebt mit dem Bären in der Luft. Fällt der Bär nicht in der ersten Bestürzung herab, so muß er entweder einen gefährlichen Sprung machen, oder geduldig auf dem Brette sitzen bleiben. Auf beyde erstern Fälle sind unter den Bäumen spitzige Pfähle angebracht, im letztern aber wird er mit Pfeilen oder Kugeln erlegt.

Die Lappländer, welche, so wie manche Schweizer, ein Mährchen erzählen, daß ein Bär eine Frau entführt und eine Zeitlang, bis er getödtet worden, zu seiner Gattin gehabt habe*), schießen ihn mit gezogenen Büchsen, und verstopfen auch seine Winterhöhle, daß er

*) In Jägerbüchern, z. B. Flemmings vollkommnen deutschen Jäger finden sich auch solcher Fabeln, die sich in Sachsen zugetragen haben sollen.

er nur mit dem Kopf herausgucken kann, auf welchen er mit einer Axt geschlagen wird, daß er todt in der Höhle hinstürzt. Sie halten den Sieg über einen Bären für eine ihrer größten Heldenthaten *). — Sonst lauert man auch auf die Bären von den Bäumen herab, bey einbrechender Kälte, entweder bey den Viehheerden, die sie beunruhigen, oder bey einem Aas, oder man hetzt sie mit großen Hunden, Bullen- und Bärenbeißern, und erlegt sie mit Spießen oder Geschoß.

Das Pfeifen soll sie auch aufmerksam und bestürzt machen, so daß sie sich auf die Hinterbeine still hinsetzen, und so geschossen werden können.

Durch Trommeln und das Fahren mit einer Schiebkarre soll man sie vertreiben können.

Nutzen.

1) Das Fleisch des Bären wird ohngeachtet seines unangenehmen Geruchs, von den Lappen, Polen, Schweizern, Russen, Nordamerikanern, und den Siberischen Nationen gegessen; die Schinken, Zunge und der

*) Die Lappen halten den Bären aus Aberglauben so hoch, daß sie ihn den Hund Gottes nennen; denn sie trauen ihm die Stärke von zehn Menschen und den Verstand von zwölfen zu. Sie wagen es nie, ihn bey seinen rechten Namen, Gnouzhia, zu nennen, aus Furcht vor seiner Rache gegen ihre Heerden, sondern sie nennen ihn allezeit Monda-aigia oder der alte Mann im Pelzkleide.

Kopf aber werden allenthalben geschätzt und die Tatzen werden auf den Tafeln der Großen von Europa für eine Delikatesse gehalten. Das Fleisch gleicht dem Rindfleisch, wenn ihm durch ein zwey Tage langes Einwässern in kaltes Bergwasser der wildsüßliche Geschmack genommen ist *).

2) Das Bärenfett (Feist), dessen sie sehr viel haben, ist weiß, angenehm und gesund, und hat außerdem den Vorzug, daß es nicht leicht ranzig wird. Es wird theils an Speisen, theils als Arzeney gebraucht. Die Kamtschadalen und Neugeorgier brauchen es statt des Oehls beym Salat; die Louisianer ziehen es in der Küche dem Schweineschmalz vor; die Finnmärkischen Bauern bewahren es in Bärendärmen und beschmieren sich schmerzhafte Theile ihres Körpers damit, und die Wilden in Nordamerika salben sich damit, und verdanken demselben ihre Geschmeidigkeit. Es soll auch das Wachsthum der Haare befördern.

3) Die Bärenhaut ist in den nördlichen Gegenden eines der vorzüglichsten Pelzwerke. Die Soldaten brauchen sie im Felde zu Matrazen und Satteldecken; die Kürschner und Sattler häufig zu Mützen, Husarenmützen, Müffen, Pelzen, Fußböden in Kutschen, Pferdedecken, Handschuhen und dergleichen, wenn sie rauhgar gemacht ist. Sie dient auch zu Ueberzügen über die Koffer und in Polen, Moskau und fast in ganz Nordamerika

*) Krünitz Encyclopäd. III. 431.

amerika als Bett. Die alten Deutschen kannten ihren letztern Gebrauch auch, und man vermuthet, daß daher der Name Bärenhäuter, für faule unthätige Menschen, entstanden sey.

4) Die Bärenhaare geben, mit pulverisirter Kreide und etwas starkem Bier vermischt, eine sehr gute Ofenkitte.

5) Aus den Därmen machen die Kosaken Fenster, die fast so hell wie Glas sind, und die Kamtschadalinnen schälen sie ab, und bekleistern sich in den Monaten, wenn ihnen die von Schnee stark zurückprallende Sonne das Gesicht schwärzt, damit, wodurch sie dasselbe weiß und fein erhalten.

6) Die Bären befreyen die Norweger von den schädlichen Lemmings, einer Mäuseart, die daselbst eine große Plage ist.

7) Viele Polaken ernähren sich von gezähmten Bären, deren Künste sie sehen lassen.

Schaden.

Nur in der äußersten Hungersnoth, und wenn er gereizt wird, fällt der Bär Menschen an. Sonst aber ist er der Vieh- und Fischzucht schädlich, und ist ein großer Liebhaber von Weintrauben, Kastanien, wilden Honig u. s. w.

Irthümer und Vorurtheile.

1) Der Bär soll so gesellig leben, daß man Heerden von achtzig Stück beysammen antreffe *). Dieß ist nach den meisten Erfahrungen ungegründet, und selbst der sonstigen Natur großer Raubthiere zuwider. Doch behauptet man, der schwarze Bär in Kamtschatka mache darinn eine Ausnahme, und schweife heerdenweise in den Feldern herum **).

2) Er soll das Fett den Winter über aus den Tatzen saugen, und sich so erhalten. Büffon fand sogar die kleinen warzigen Drüschen darzu. Da er die Tatzen immer leckt, so mag daraus jene Behauptung entstanden seyn.

3) Die Kamtschadalischen Bären, so wie die Norwegischen sollen vorzüglich artig gegen die Frauenzimmer seyn und ihnen nie etwas zu Leide thun. In Norwegen darf ihnen eine Dame nur den entblößten Hintern zeigen, so laufen sie so weit sie können, und in Kamtschatka essen sie mit ihnen gepflückte Beeren aus einem Körbchen ***).

4) In

*) Hallens Thiere S. 545.

**) Stellers Kamtschatka. 113.

***) Pontoppidans N. G. von Norwegen. II. 26. Krascheninikow Beschr. von Kamtsch. S. 121.

4) In andern Gegenden sind sie desto grausamer, stellen vorzüglich so lange die Fütterung ihrer Jungen dauert den schwangern Weibern nach, und die männliche Frucht ist ihr größter Leckerbissen.

5) Der Bär soll allezeit aus der Heerde die Kuh aussuchen, welche die Klocke trägt, und sie breit drücken, daß sie nicht lerme — den Jäger die Flinte nehmen und sie abfeuern — wenn mehrere Jäger beysammen sind, einen fangen und vor sich halten, damit die andern nicht nach ihn schießen können. Er soll sogar die Heerde viele Jahre begleitet, den Wolf verjagt, und sich allezeit beym Ende des Sommers eine Ziege oder Schaf zur Belohnung ausgebeten haben *).

6) Daß sie unförmliche Fleischklumpen zur Welt brächten, sie dann zur ordentlichen Gestalt leckten, ist schon erwähnt.

7) Zu den medicinischen Vorurtheilen gehört, das Blut, die Galle, das Oehl, das rechte Auge und mehrere Theile dieses Thieres, welche man sonst als heilend brauchte.

*) Pontoppidan a. a. O.

19. Der Vielfraß.

Namen, Literatur und Nachweisung der Abbildung.

Vielfreßbär, Vielfreßmarder, Rosomack und Järf.

Ursus Gulo. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 104. n. 8.

Glutton. *Buffon.* hist. nat. XIII. 278. Suppl. III. 240. t 48. Ed. de Deuxp. IX. T. 7. fig. 1. Ueberf. v. Otto XV. 120. mit 2 Fig.

Glutton. *Pennant* hist. of Quadr. II. 10. Meine Ueberf. II. p. 333.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 280.

v. Schrebers Säugeth. III. 525. Taf. 144 *).

Schwedische Abhandl. XXXV. 1773. S. 201 — 220.

Goezes Fauna. I. 371.

(Taf. VIII.)

Kennzeichen der Art.

Mit dickem Kopfe, stumpfer Nase, starken Gliedmasen, kurzem geraden Schwanze, fünf Zehen an jedem Fuße, und einem glänzenden Rückenflecke.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses Raubthier wird jetzt gar selten in Deutschland, und zwar nur in Ober- und Niedersachsen angetroffen, wohin es noch zuweilen aus Litthauen kömmt. Man hat ein solches bey Frauenstein in Sachsen, und ein anderes bey Helmstädt geschossen, welches letztere noch im dasigen Naturalienkabinette aufbewahrt wird. Am Größe gleicht es einem mittelmäßigen Hunde. Die Länge seines Körpers beträgt zwey Fuß, vier bis sechs Zoll*), und der Schwanz noch acht Zoll; am letztern reichen oft die Haare sechs Zoll über das Schwanzende.

Der ganze Bau des Thiers ist eine sonderbare Mischung vom Bär, Hunde und Dachse, doch hat es mit dem Bären die größte Aehnlichkeit, weshalb es auch im Systeme die schicklichste Stelle hier hat. Der Kopf ist rund und dick; die Schnauze etwas gestreckt, allein nicht so lang und schmal als am Hunde; die Nase klein; die Backen etwas eingedrückt; die Oberlippe mit vier Reihen langer schwarzer Bartborsten besetzt. Von den Vorderzähnen der obern Kinnlade sind die äußersten größer, als die übrigen; die in der untern aber alle gleich lang. Oben stehen auf jeder Seite vier Backenzähne, wovon zwey größer sind, als die übrigen; unten eben so viel, wovon einer viel größer ist, als die andern; die vordern sind spitzig, die hintern zackig. Die Augen sind klein, und der Stern blau; die Ohren kurz und abgerundet, von

*) Par. Ms: Körper etwas über 2 Fuß; Schwanz 6 1/2 Zoll;

von den Kopfhaaren fast bedeckt, gewöhnlich aufgerichtet, seltener vorwärts gekehrt. Ueber den Augen stehen fünf starke Borsten und eine auf den Backen. Der Hals ist kurz; der Leib dick; der Rücken breit und sehr gewölbt, wenn das Thier in Bewegung ist. Die Beine sind kurz, zehn Zoll hoch, stark und stämmig; die hintern etwas länger als die vordern; die Füße in fünf Zehen getheilt, welche mit langen krummen Klauen bewaffnet sind *), und deren vordere sich im Gehen weit auseinander begeben. Die beyden nächsten Klauen an den innersten sind größer, als die übrigen. Der Schwanz ist kurz, steht gerade aus und ist buschig.

Das Haar der Schnauze, und des Kopfs bis zu den Augen ist kurz und glänzend schwarzbraun. Hinter den Augen bis an die Ohren ist es weißlich mit braun vermischt; auf den Ohren kurz und grau. Von da an wird es nach und nach länger und kastanienbraun; an den Seiten und Schultern heller, zwischen welchen letztern die dunklere Farbe einen schmälern Raum einnimmt. Mitten auf dem Rücken ist ein schwarzbrauner, fast herzförmiger Fleck (Spiegel), der vorne am breitesten ist, und gegen den Schwanz hin sich zuspitzt. Von den Schultern geht an jeder Seite ein gelblicher oder rother, in die angränzende Farbe vertriebener, Streif hin, der sich auf der Mitte des Schwanzes verliert. Brust, Bauch, und die inwendige Seite der Schenkel sind schwarzbraun.

Un-

*) In den Schwedischen Abhandl. wird gesagt: hinten an den Tatzen befinde sich keine Klaue, sondern statt deren ein kleiner horniger Knoten.

Unter dem Kinne und zwischen den Vorderbeinen befinden sich kleine weiße Flecken. Die Schenkel sind sehr langhaarig, und mit den Beinen, Füßen, und der letzten Hälfte des Schwanzes von dunkel schwarzbrauner Farbe. Das Haar hat überhaupt einen schönen Glanz, und bisweilen stehen einzelne silberfarbene Haare, besonders auf dem Spiegel, hervor, wodurch der Balg, wie gewässert aussieht. Es ist so elektrisch, daß es die Elektricität mittheilt.

Das Thier muß in Hinsicht der Farbe sehr variiren, denn

a) das in den Schwedischen Abhandlungen beschriebene ist ganz mit steifen schwarzen Haaren bedeckt, die in der Mitte des Rückens schwärzer sind, und wo sich unter denselben einige silberweiße befinden.

b) Das Pennantsch a. a. O. hat auf dem Rükken der Länge nach einen gelbbraunen Streifen, und ist übrigens schwarz, sehr schön gewässert und wie Seide glänzend.

c) In Kamtschatka giebt es eine weiße und gelbliche Varietät.

Wenn Pavius nach Bartholins Bericht (Hist. Cent. IV. 30.) nicht eine Hyäne, sondern wirklich einen Vielfraß zergliedert hat. (Er sagt von seinem Thiere, daß es die Leichen aus den Gräbern hole), so wird er vorzüglich durch dreyerley merkwürdig. 1) Es ist keine Nabelschnur da. 2) Die Leber ist

wie beym Menschen durch ein starkes Ligament mit dem Diophragma verbunden. 3) Der Blinddarm fehlt. Das Thier kann sich also durch bloßes Zusammenpressen des Unterleibes ausleeren. Nach Herrn Pallas (Büffons N. G. von Otto XV. 175.) hat das Weibchen 4) sechs Säugwarzen, zwey zwischen den Lenden und vier am Bauche. 5) Der Magen nimmt beynahe den ganzen linken Theil der Bauchhöhle ein, da die Leber sich kaum über den Magenmund erstreckt. 6) Die Gallenblase ist von mittlerer Größe. 7) Die Gedärme haben keine Abtheilung vom Pförtner bis zum After. 8) Die Nieren sind den Hundenieren ähnlich, und nicht wie beym Bären und dem Flußotter gelappt. 9) Man findet 16 Paar Rippen. 10) Die Schlüsselbeine sind klein. 11) Die Zunge ist sehr stumpf, mit kleinen spitzigen rückwärts übereinander liegenden Wärzchen, die kaum rauh anzufühlen sind, besetzt.

Merkwürdigkeiten.

Der Vielfraß ist eins der gefräßigsten Raubthiere, ausserordentlich wild und stark. Man sagt, er sey selbst ein Schrecken des Bären und des Wolfs, und daher läßt letzterer selbst den todten Vielfraß unberührt, da er doch fast alles Aas frißt. Er hängt den Kopf nieder wie ein Bär, und tritt im Gehen auf die Fersen auf, kommt also im Laufen andern Raubthieren nicht gleich; klettert aber desto geschickter. Sein Auswurf ist dünn und übelriechend; er selbst aber giebt keinen unangenehmen Geruch von sich, und hält sich reinlich. Er geht auch ins Wasser. Im Zorn giebt er eine knurrende Stimme, wie die Katzen

ken, von sich, und hat, in Verhältniß seiner Größe, eine erstaunende Stärke, womit er seinen Gegnern ernstlich Trotz bietet.

Aufenthalt.

Der Vielfraß hat seine Heimath in Sibirien, Schweden, Norwegen, Lappland, selten in Pohlen und Curland und bewohnt also vorzüglich die nördlichen Länder von Europa und Asien, und zwar die gebirgigen Gegenden, welche große Waldungen und Wildnisse haben. Er wohnt in Felsenklüften, hohlen Bäumen, verlassenen Dachshöhlen; baut aber niemals eine eigene Höhle oder irgend eine Art von beständiger Wohnung.

Da er nicht so schnell wie andere Raubthiere laufen kann, und wie der Bär etwas tölpisches und plumpes in seinem Gange hat, so rettet es sich bey Verfolgungen auf die höchsten Klippen, wohin ihm seine Feinde nicht folgen können.

Nahrung.

Seine Nahrung besteht in frischem Fleische und in Aas von Rennthieren, Elennen, Hasen, Mäusen, großen und kleinen Vögeln, und im Sommer auch in allerhand Beeren. Er frißt des Nachts und macht auf alle Thiere, die er bezwingen kann, Jagd; doch schränkt er sich bloß auf eine gewisse Gegend ein und streift nicht weit umher seiner Nahrung nach. Dem schnellen Renn-

thiere lauert er im Sommer auf den Bäumen auf; im Winter aber, wenn es seine Mahlzeit unter dem Schnee hervorsucht, oder schläft, springt er auf den Rücken und tödtet es im Nacken. Er fängt die Schneehüner unter dem Schnee; spürt die Vögel von weitem und erwischt sie nicht selten. Er geht in Gesellschaft des Fuchses zu den Fallen und Gruben, die den Elennen aufgestellt sind, und nimmt die Beute aus. Was er von seinem Raube nicht verzehrt, vergräbt er, oder verbirgt es in Klippen und Höhlen. Er geht auch andern Raubthieren nach und frißt, was diese liegen lassen. Den Lappen plündert er oft die Vorrathskammern von Fleisch, Butter, Käse, Fischen u. d. gl. aus, und bahnt sich den Weg dazu mit seinen Klauen und Zähnen durch Dächer und Thüren, wo diese Werkzeuge nur haften.

Daß er gefräßiger, als andere Raubthiere, sey, den größten Raub auf einmal aufzehre, und dann seinem ausgespannten Leib dadurch Luft verschaffe, daß er sich zwischen zwey nahe stehende Bäume durchdränge, gehört zu den Fabeln.

Im Alter soll er die Zähne verlieren, und sich daher meist von rothen Ameisen, deren Haufen er aufgräbt, erhalten müssen, wovon sein Balg schlecht wird.

Er leckt das Wasser wie ein Hund.

Fortpflanzung.

Er begattet sich im Jänner und wirft im May in den einsamsten, dicksten Wäldern oder in tiefen unzugänglichen

chen Höhlen zwey bis vier Junge. Diese werden auch deswegen sehr selten gefunden; sollen bald nach der Geburt gräulich, und schon im ersten Jahre ausgewachsen seyn. Sie vermischen sich nicht mit den Füchsen, wie man vorgiebt.

Wenn man einen Vielfraß jung fängt, und aufzieht, so wird er leicht zahm, und man kann ihn mit allerhand rohen Fleischwerk, Fischen, Knochen, auch gekochten, nur nicht gern mit Speisen aus dem Pflanzenreiche unterhalten. Er schläft auch in der Gefangenschaft mehr am Tage als bey der Nacht, legt sich dabey wie eine Kugel zusammen, und bedeckt den Kopf mit dem Schwanze, oder streckt die Beine von sich. Er ist fast in steter Bewegung, klettert, gräbt, kratzt, wälzt sich, und läuft bekannten Leuten wie ein Hund nach. Bey bevorstehender schlechter Witterung wird er mürrisch und launisch. In zunehmenden Alter wird er wiederum wild, sehnt sich nach der Freyheit und muß an die Kette gelegt werden, weil er oft, wenn er ein wenig hungern muß, ganz unbändig wird. Mit einem Stocke gereizt, knurrt er, wie ein böser Hund, haut mit den Pfoten geschwind zu, und packt den Stock zwischen die Vorderbeine. Hunde, ob sie ihn gleich an Größe weit übertreffen, fällt er an, und bedient sich im Kampfe des Gebisses und der scharfen Klauen zugleich. Wenn er aber zu verlieren glaubt, so verscheucht er seine Feinde durch einen Strahl von übelriechenden Unrathe, den er von sich sprützet, womit er sich auch Luft verschafft, wenn man ihn allzu böse macht.

Feinde.

Die Bären und Wölfe wagen sich zuweilen an ihn.

Die Madenwürmer und Blasenwürmer machen ihm einige Beschwerden.

Jagd.

Die Fährte dieser Thiere ist wegen ihrer langen Hinterfüße, den ausgesperrten Zehen der Vorderfüße, und da sie mit den Ferſen den Boden berühren, kenntlich genug. Im nördlichen Schweden verfolgt man sie mit Schneeschuhen, und erlegt sie mit Spießen, oder legt ihnen starke Tellereisen.

Um ihren schönen Balg zu schonen, schießt man sie auch mit hölzernen Pflöcken und Pfeilen.

Die Ostjacken fangen sie in Fangklammern, und selbst schießenden Bogen; sonst werden sie wie anderes Wild geschossen.

Nutzen.

Ihr brauner, oder schwarzer, wie Atlas glänzender, Balg giebt ein kostbares Pelzwerk, welches die Kürschner zu Müffen für Mannspersonen verarbeiten, ob es gleich einen etwas unangenehmen Geruch hat. Die Chineser kaufen es von den Russen, das Stück für drey bis vier Rubel. Die Kamtschadalen schätzen

es

es vor allen hoch, kennen keine prächtigere Kleidung und sagen sogar Gott im Himmel trage lauter solche Kleider.

Sie fressen auch, ausser andern Thieren, Mäuse.

Schaden.

Sie schaden durch ihre Nahrung fast durchgängig der Wildbahn, und sollen sogar bey den Samojeden die Leichname ausscharren, und an der Lena die Pferde angreifen. Den Lappen leeren sie die Vorrathskammern und jagen ihnen ihre kostbaren Rennthiere.

Irrthümer und Vorurtheile.

1. Der Name Vielfraß kommt nicht von viel fressen her, wonach er sich zwischen Bäumen gedrängt ausleeren soll, sondern von Fiällfraß, welches Bergfraß heißt.

2. An eine Mauer gebunden soll er Kalk und Steine fressen. Dieß thut er wohl um sich loszufressen.

3. In Norwegen glaubt der gemeine Mann, daß der Bär von drey Jungen nur zwey auffüttere, daß dritte würde ein Vielfraß.

4. Er soll seinen Raub mit den Füchsen gemeinschaftlich und recht verträglich verzehren *).

---

*) Berchs Schwedisches Magazin. I. 242.

Die eilfte Gattung.

Dachs. Meles.

Die Vorder- und Eckzähne sind wie beym Bären.

Backenzähne sind oben fünf, unten sechs, die vordern sehr klein.

Vorn und hinten befinden sich an den Füßen fünf Zehen; und an den vordern sind lange grade Klauen. Es wird auf der ganzen Sohle gegangen.

Die Augen haben eine Nickhaut und die Zunge ist glatt.

Zwischen dem Schwanze und After ist eine Queeröffnung, welche eine schmierige Feuchtigkeit absondert.

Der Kopf ist bärenartig; allein die Schnauze spitziger. Der Körper ist schwer, plump, sehnig und mit lockerer um ihn herum hängender Haut bekleidet.

Sie leben in Höhlen, die sie sich selbst graben; nehmen ihre Nahrung aus dem Thier- und Gewächsreiche und pflanzen sich im ersten Jahre noch fort. Das Weibchen hat acht Säugwarzen.

(14) 20. Der gemeine Dachs.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Dachs, Tachs, Dachsbär, Gräving, Greſing und Halbfuchs mit dem kurzen Schwanze.

Meles Taxus.

Ursus Meles. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 102. n. 2.

Hier wird er, wie von mehrern Schriftſtellern unter die Bären gerechnet.

Blaireau. *Buffon* hist. nat. VII. 104. T. 7. 8. Ed. de Deuxp. II. T. 5. f. 3. Ueberſ. von Martini. IV. 59. 123.

Common Badger. *Pennant* hist. of Quadr. II. 14. Meine Ueberſ. II. p. 338.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 293.

v. Schrebers Säugeth. III. 516. Taf. 143.

Goeze's Fauna I, 393.

Donndorfs zool. Beytr. I. 327. n. 2.

Ridingers jagdb. Thiere. Taf. 17.

Kennzeichen der Art.

Mit oben schmutzig weißen und schwarz melirten und unten schwarzen Haaren, am Kopfe wechselsweis schwarz und weißen der Länge nach hin laufenden breiten Streifen, und schwarzen Füßen.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Dachs kann dem äußerlichen Ansehen nach mit verschiedenen Thieren verglichen werden. Sein langes borstenartiges Haar, sein dicker und stark in einander gedrungener Körper giebt ihm beynahe die Gestalt eines kleinen Bären, Schweines oder Igels; sein Kopf ist dem Fuchskopfe, und seine Schnauze der Hundeschnauze ähnlich.

Die Länge seines Körpers vom Kopfe bis zum Schwanze beträgt zwey Fuß, acht bis zehn Zoll, des Schwanzes (Ruthe) sechs Zoll und die Höhe ist ein Fuß vier Zoll *). Sein Kopf ist oben breit, und läuft wie ein gleichschenkliches Dreyeck, in eine dünne Schnauze aus. Die Nase, sein schwächstes Glied, aber sein schärfstes Sinneswerkzeug, ist schwarz, feucht und etwas eingebogen. Sein Gebiß besteht aus sechs Vorderzähnen oben und unten, wovon die obern merklich größer und

*) Par. Ms. Körper über 2 Fuß; Schwanz 5 Zoll 4 Linien Höhe 1 Fuß 1 Zoll.

und breiter sind, und in gerader Linie stehen. Von den untern stehen die zwey zunächst an den mittelsten befindlichen etwas weiter hinauswärts, sind auch etwas größer als diese, und die äußersten sind schief abgestutzt. Alle Vorderzähne haben auswendig der Länge nach eine flache Furche. Die zwey obern Eckzähne (Fänge) sind grade und die untern hinterwärts gebogen. Auf jeder Seite befinden sich oben fünf und unten sechs zackige Backenzähne. Von den obern ist der erste äußerst klein, und geht im Alter oft verlohren, die folgenden werden stufenweise größer und der hinterste ist der größte, breit und flach, doch uneben. Von den untern ist der erste wiederum überaus klein, und fällt oft im Alter aus, die drey folgenden spitzig und die beyden letzten breit und flach; doch ist der vorletzte länger, schmäler und zackiger, als der allerletzte, welcher kleiner und flächer ist. Zusammen 34 Zähne. An dem Gerippe eines Dachskopfs bemerkt man, daß die Köpfe der untern Kinnlade so in die Ränder der Pfannen eingeschlossen sind, daß sich dieselbe nur auf und nieder und zu beyden Seiten, aber nie vorwärts bewegen, oder herausziehen kann. Die Zunge ist lang und glatt. Die Augen, welche eine große fast zuschließende Nickhaut haben, sind klein, tiefliegend und schwarzbraun; die Ohren kurz, unter den Haaren fast ganz versteckt und länglich rund. Er hat einen kurzen Hals, welcher mit dem Kopf einerley Dicke hat, einen etwas erhabenen Rücken, dicken Leib und besonders starke Keulen, so daß er von der Spitze der Schnauze bis zu Ende des Hinterleibs immer breiter und dicker wird. Der Schwanz (die

Ruthe)

Ruthe) ist kurz, dick, stumpf, unten platt, und mit straubigen Haaren besetzt. Die Beine (Läufte) sind kurz, und wegen der langen Haare am Leibe, die sie verbergen, scheint der Bauch fast auf der Erde aufzuliegen. Seine Füße überhaupt sind mit fünf Fingern versehen, die eben deshalb zum Graben sehr geschickte Vorderbeine aber besonders stark und an den breiten Füßen mit sehr langen krummen Nägeln (Klauen) bewaffnet.

Seine dicke Haut (Schwarte) ist mit borstenartigen, fettigen, unsaubern Haaren besetzt. Die Grundfarbe des Kopfs ist weiß. An jeder Seite der Schnauze fängt hinter der Nase ein schwarzer Streifen an, welcher gleich beym Anfang sich etwas nach dem Munde zu einbiegt, alsdann durch Augen und Ohren wegläuft, und sich am obern Theil des Halses verliert. Um die Nase, Lippen, Spitzen der Ohren und den Hals ist er gelblich. Die Farbe des Rückens ist grau, weiß oder gelblich und schwarz melirt, weil jedes Borstenhaar im Grunde gelblich, in der Mitte schwarz und an der Spitze weißgrau ist, doch sticht die schwarze Farbe am meisten vor, und es ziehen sich nur drey weißliche Streifen auf demselben hin. Kinn, Kehle, Brust und Bauch sind mehrentheils schwarz, und nur an den Seiten des Leibes verliert sich die Farbe ins bräunliche. Der Schwanz, die wollige Gegend des Afters und die Beine sind gelblich, die Pfoten aber schwarz. Gleich über dem After (Weideloch) hat er einen großen, 1 Zoll tiefen, inwendig haarigen queergeöffneten Beutel, welcher eine weißliche, schmierige, übelriechende Feuchtigkeit in sich

enthält,

enthält, und auswendig dicht mit kleinen Drüschen besetzt ist.

Das Weibchen ist kleiner, schmäler, und heller von Farbe, indem nämlich die untersten Wollenhaare weißlich, und nicht, wie bey dem Männchen, röthlich durchschimmern, und hat acht Säugwarzen, vier an der Brust und vier am Bauche.

Varietäten: 1) Der weiße Dachs. M.T. albus.

Er ist oben weiß und unten weißgelblich. Eine in Deutschland seltene Varietät.

2) Der bunte Dachs. M.T. maculatus.

Er ist weiß, röthlich und kastanienbraun gefleckt.

Ridingers allerley Thiere. Taf. 24.

Ferner werden die Dachse von Jägern und Schriftstellern in zwey verschiedenen Rassen oder gar Arten getheilt:

3) In Hundedachse, die auch Halbfüchse, weißgraue Füchse heißen, und

4) in Schweinedachse.

Allein ich halte diese Eintheilung nach vielen Erfahrungen für eine bloße Grille.

In Thüringen sollen besonders beyde Arten häufig angetroffen werden; allein weder in Thüringen noch Franken, noch Sachsen, noch am Rheinstrohm, ist mir mehr als eine Art bekannt, die der Hundedachs genannt wird.

Schon die Verschiedenheit der Angabe der Merkmale und Kennzeichen, wodurch sich beyde Arten von einander unterscheiden sollen, erregt Verdacht gegen diese Behauptung. Sie kamen aus dem Munde und den Büchern solcher Jäger, die nicht wußten, welche Kennzeichen und Merkmale an den Thieren reell und welche zufällig waren, in die Lehrbücher der Naturgeschichte. Wir wollen hier einige solcher Merkmale und Widersprüche anführen.

Einige Jäger sagen, die Hundedachse wären mit spitzigern Schnauzen versehen, und die Schweinedachse mit stümpfern; andere kehren es um.

Wiederum wollen einige behaupten, die Schweinedachse wären größer, als die Hundedachse, und andere, sie wären kleiner.

Dann geben einige als Kennzeichen des Schweinedachses hohe Beine, andere sehr niedrige an; einige die schwärzere Farbe des Rückens; andere die weiße Farbe der Wangen; wieder andere gelbliche statt weißer Kopfstreifen mit einer gelblichen Kehle, und noch andere einen schwarzen Flecken in der Mitte des Kopfs.

Ferner

Ferner nennen einige sehr feiste Dachse, die 30 bis 40 Pfund wiegen müssen, Schweinedachse.

Weiter suchen andere die Verschiedenheiten in den Zähnen, und behaupten, der Schweinedachs habe krumme, den Keulern ähnliche, Fangzähne, da hingegen der Hundedachs grade Hundezähne habe.

Noch andere finden sogar den Unterschied in der Verfertigung der Baue, und andern unbedeutenden und lächerlichen Dingen. Der Schweinedachs soll nach diesen frostiger seyn, und daher seinen Bau nur in sandigen Boden und zwar so flach graben, daß er die Sonnenwärme in demselben empfinden kann. Dabey soll er seine Losung niemals anders, als in Löcher, die er mit der Schnauze aufwühle, werfen, und nicht weit von seiner Wohnung auf den Raub ausgehen. Da hingegen der Hundedachs bloß in harten und felsigem Erdreich sich anbauen, seine Losung weit von seiner Wohnung unverscharrt hinlegen, und dabey bösartiger, übelriechender und den Hunden mehr zuwider seyn soll, als jener.

Auch setzen andere verschiedene dieser angeführten Merkmale, z. B. krumme Zähne, gelbliche Kehle; stumpfe Schnauze und großen Körper, zusammen, und machen sich daraus einen Schweinedachs.

Endlich so behaupten einige Jäger, es gäbe mehr Schweinedachse, als Hundedachse, andere im Gegentheil, es würden mehr Hundedachse als Schweinedachse

nedachse angetroffen, und letztere wären nur höchst selten.

Aus dieser Verwirrung der Kennzeichen und ihrer Unzulänglichkeit läßt sich nun schon zum voraus schließen, daß es unter den Dächsen nicht einmal verschiedene Rassen, geschweige denn verschiedene Arten gebe. Doch wir wollen auch einige dieser angegebenen Kennzeichen durchgehen und zeigen, daß sie alle vom Hundedachse gelten, und daß sie nur in einigen zufälligen Abweichungen bestehen, die nicht nur bey dem Dachse, sondern bey jeder wilden Thierart statt haben.

So viel geben die einsichtsvollesten Jäger in Thüringen zu, daß Hunde- und Schweinedachse in einem Bau angetroffen werden, und daß sie sich zusammen begatten. Dieß beweißt bey ihnen und überhaupt bey Thieren, die in der Freyheit leben, schon hinlänglich, daß sie nicht als Arten zu trennen sind.

Uebrigens meynen diejenigen, welche sagen, der Schweinedachs habe schwärzere Haare, als der Hundedachs, entweder einen jungen Hundedachs, der oft eine schwärzere und mehr ins blaue fallende Farbe hat, als ein alter; oder einen alten, dessen dunkelere Farbe einmal aus verborgenen Ursachen, die in der ursprünglichen Anlage des Thiers in Mutterleibe, in besondern Nahrungsmitteln und dem Aufenthalte zu suchen sind, eine Ausnahme macht.

Diejenigen, welche große, an der Kehle gelblich gezeichnete, stumpfnasige Dachse für Schweinedachse ansehen, halten sehr alte Dachse dafür, die diese Bildung des Kopfs und diese Farbe durchs Alter erlangen.

Andere, welche sagen, das Gebiß des Schweinedachses enthalte krümmere Eckzähne, haben entweder nicht bemerkt, daß bey allen Dachsen, die untern Eckzähne etwas gekrümmt sind, oder daß das Alter zuweilen dergleichen bildet.

Wiederum andere, welche die hervorstechende weiße Farbe, oder den schwarzen Flecken auf dem Kopfe für Unterscheidungszeichen annehmen, machen im ersten Fall das Weibchen, und im zweyten einen Hundedachs, an welchem die Natur gespielt hat, zu einem Schweinedachse. Es giebt ja, wie wir wissen, sogar gefleckte, die eine weiße Grundfarbe und gelbe und braune Flecken haben.

Daß diejenigen, welche den Unterschied sogar in Anlegung des Baues und Verscharrung der Exkrementen finden, keiner Wiederlegung bedürfen, versteht sich wohl von selbst; denn der Dachs macht seinen Bau in allerhand Boden, und allenthalben hin, wo er genug Nahrungsmittel zu finden, und sich sicher genug glaubt; und die Losung verscharrt auch der Hundedachs zuweilen, wie die meisten Thiere dieser ganzen Classe.

Aus dem allen ergiebt sich, deucht mir, klar, daß wenigstens in Thüringen, das doch nebst Alten-

burg *) das eigentliche Vaterland der Schweinedachse seyn soll, und wo die Jäger immer Dachse jagen und fangen, die sie für Schweinedachse nach ihren angenommenen Kennzeichen, ausgeben, diese Art nicht zu finden ist. Ich glaube, die Veranlassung zu diesem Unterschiede hat der bloße Zufall, wie beym Igel, gegeben. Es sahe jemand, daß der Dachs in Ansehung seines Körperbaues viel Aehnlichkeit mit einem Schweine hatte, und nennte seinen, zum Unterschiede von einem Dachse, den ein anderer gesehen, und vorzüglich die Hundeschnauze an ihm bemerkt hatte, einen Schweinedachs. Solche zufällige Dinge können sich dann Jahrhunderte hindurch in den Büchern fortpflanzen, und vorzüglich in der Naturgeschichte, wenn sie nur auf der Stube studirt und vom bloßen Hörensagen bearbeitet wird. Plinius ließ seinen Hirsch schon die Nase durch eine Schlange reinigen, und dieß lassen ihn dann auch noch zu unsern Zeiten manche Jäger und Naturkundige thun.

Zergliederung.

Unter der Schwarte ist der Dachs fast wie ein Schwein mit einer Fettschicht besetzt. Das Netz ist ein bloßes Gewebe von Fettstriemen, und die Därme sind ganz in Fett gewickelt. Der Magen gleicht dem menschlichen. Die Därme sind sehr dünn und der Blinddarm fehlt. Die Leber hat sechs Lappen. Die Mutter

*) Hier soll es, wie die Jäger sagen, beynahe lauter Schweinedachse geben; es sind aber, wie ich gewiß weiß, nichts als Hundedachse.

tertompeten bey dem Weibchen reichen bis an die Nieren. Goeze a. a. O.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Der Dachs ist ein einsiedlerisches, träges, frostiges, boshaftes, mißtrauisches und furchtsames Thier, das bey hellem Mondschein vor seinem eignen Schatten flieht. Er giebt einen süßlichwidrigen Geruch von sich, den auch die Hunde verabscheuen.

Seine Stimme ist hell, und dem lauten Schweinegeschrey ähnlich.

Er lebt über zwölf Jahre, und soll, nach vielen Erfahrungen im Alter blind werden.

Das Gesicht ist sein schwächster Sinn, das Gehör aber sein schärfster. Fein ist auch sein Geruch.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Dachse bewohnen ganz Europa bis Norwegen hinauf, und das ganze nördliche Asien bis nach China hinab. Sie sind aber allenthalben nur einzeln.

Ihren Aufenthalt haben sie in Wäldern unter der Erde, und bewohnen gern die Vorhölzer, von denen die Feldfluren nicht weit entfernt sind. Sie graben mit vieler Geschicklichkeit und Leichtigkeit mit ihren stark bewaffneten Vorderpfoten, vermittelst welchen sie kreuzweiß den Boden aufscharren, und den Schutt hinter sich auswerfen,

wie die Füchse, Höhlen (Baue) in die Erde und zwar, wo möglich, gegen die Mittagsseite zu, damit die Sonne die Eingänge (Geschleife, Einfahrten, Röhren) desto länger bescheinen könne. Diese Eingänge, deren wenigstens zwey sind, und die oft dreyßig Schritte von einander entfernt liegen, führen zu einem geräumigen Orte, welchen man den Kessel nennt, der nach Beschaffenheit des Bodens, vier, auch fünf Fuß tief unter der Erde befindlich, und mit langem Grase, Farrenkraut, Blättern und Moos ausgefüttert ist. Die Jäger sagen, das Weibchen trage diese Materialien zwischen den Hinterfüßen zu einer Röhre, und schiebe, wenn es einen gewissen Vorrath davon zusammen gebracht habe, dieselben mit angestemmten Kopfe und Vorderfüßen in die Höhle bis zum Kessel. Dieser so zubereitete Platz im Dachsbau ist nun die gewöhnliche Schlafstätte dieses trägen und frostigen Thieres, und sonderlich das Wochenbett der Dachsin. In einem kleinen Bezirke legen oft mehrere Paare ihre Wohnungen an, doch so, daß jedes einzelne Paar, ja jedes einzelne Thier wenigstens seinen eignen Kessel hat. Uebrigens ist dieser ganze Bau dem Fuchsbaue ähnlich, nur daß er nicht so weitläuftig ist und so viele Abtheilungen enthält. Der schlaue Fuchs, der daher eine solche mit Fleiß gemachte Wohnung für sich gar bequem findet, soll diesen künstlichen Baumeister durch List, da er sich zu ohnmächtig fühlt, diese Eroberung mit Gewalt durchzusetzen, aus derselben zu vertreiben suchen, indem er ihm, wenn dieser seiner Nahrung halber ausgegangen ist, allerhand Unordnungen in derselben macht, ihn stets darin beunruhiget und necket, und den Eingang mit seinem stinkenden Harn

und

und Koth besudelt, deren Geruch er nicht leiden kann. Seine Baukunst soll daher in Gegenden, wo er viele Füchse zu Nachbaren hat, stets geübt werden. In einer mir sehr nahen Gegend im Thüringerwalde finde ich aber dieß allgemeine Vorgeben nicht bestätigt. Hier wohnen Füchse und Dachse, ohne sich zu stöhren, nahe beysammen, und da es eine steinige Gegend ist, wo sich schwer graben läßt, so wohnen in einem Baue, so gar, daß seit vielen Jahren her ein Fuchs durch eine gemeinschaftliche Röhre mit dem Dachse eingeht, und nur der Fuchs den rechten und der Dachs den linken Kessel bewohnt. Wenn man vor diese Röhre ein Tellereisen legt, so fängt man wohl einen Dachs, aber nie einen Fuchs, der entweder das Eisen zu überspringen sucht, oder so lange in der Röhre hungert, bis es weggenommen ist. Diese Beobachtung habe ich nicht etwa vom Hörensagen, sondern als Augenzeuge gemacht, da ich nicht nur die Fuchs- und Dachsfährte in vorgeschüttetem Sande bemerkt, sondern auch auf dem Anstande selbst des Morgens den Fuchs und eine Weile nach ihm den Dachs in ihre Wohnungen durch diesen gemeinschaftlichen Eingang habe nach Hause kehren sehen.

So unreinlich der Dachs sonst ist, so reinlich hält er seinen Bau, und hat daher in demselbtn seitwärts vom Kessel einen Abtritt, wo er alle Excremente hinverscharret. Ja in großen oder Hauptbauen findet man sogar eigene Röhren die gerade aufgehen und eigentliche Luftzüge sind, damit im heißen Sommer die bösen Dünste verfliegen, und die frische Luft in demselben cirkuliren könne.

Nahrung.

Da der Dachs nicht flüchtig genug ist, um den Nachstellungen der Menschen und seiner Feinde zu entgehen, so entfernt er sich auch, bey Aufsuchung seiner Nahrung, nicht weit von seiner Wohnung. Die größte Reise darnach ist eine halbe Stunde. Er ist ein nächtliches Thier, und schleicht (trabet), wenn er sich nicht des Sommers im hohen Getraide verbergen kann, nur erst des Abends in dieser Absicht aus derselben hervor. Den ganzen Tag, und auch noch einen Theil der Nacht bringt er schlafend zu. Seine Nahrung (Weide) besteht im Frühling und Sommer vorzüglich aus Wurzeln, als Kümmel- Tormentill- und Birkenwurzeln, sonst in Eicheln und Bucheckern, die unter dem alten Laube verborgen liegen, in Trüffeln, in allerhand Insekten, als Roß- und Maykäfern und Heuschrecken, in Gewürmen, als Schnecken, und Regenwürmern, und wie man aus der Raubsucht der gezähmten Dachse muthmaßt, aus Vogeleyern und jungen Vögeln, die auf der Erde liegen, aus jungen Hasen, aus Feldmäusen, Fröschen, Schlangen und Eidechsen. Im Herbste mästet er sich von Feld- und Gartenobst, Aepfeln, Birnen, Pflaumen u. s. w. von Bucheckern, Eicheln, Weinbeeren, weißen und gelben Rüben. Liegen gelbe Möhrenäcker in dem Gebiete, das er seiner Nahrung halber umkraiset, so erndtet er die Früchte derselben in kurzer Zeit alle in seine Wohnung ein.

Er geht auch in Hungersnoth nach dem Aas *), besonders von Schweinen.

Auch dem Honig der Erdhummeln soll er nachgraben, und die Weintrauben lieben.

In Walddörfern beschuldigt man den dummen und furchtsamen Dachs sogar, daß er es wage, wie der kühne und listige Fuchs, auf die Höfe zu schleichen, um das junge Hausgeflügel, Gänse und Enten zu rauben.

Wenn er nach Wurzeln gräbt (sticht), so hat es das Ansehen, als wenn ein Mensch mit einem spitzigen Holze Furchen in die Erde gemacht hätte.

Im Herbste, um Martini, ist er am vollkommensten, und wie ein Speckschwein mit Fett überzogen.

Für den Winter braucht er keinen Vorrath einzutragen, da er, sobald es zugewintert ist, mit der Schlafsucht befallen wird. Er zehrt alsdann auf eine bewun-

*) Aas fressen alle Thiere in der äußersten Noth, auch sogar Hirsche und Rehe Vor etlichen Jahren wurde in unserer Gegend ein Dachs im Winter, in einem Eisen, das für einen Fuchs mit Aas belegt war, auf dem Schnee gefangen. In eben dem Jahre wurde im späten Herbste des Abends ein Fuchs angeschossen, der sich in einen Dachsbau flüchtete. Den folgenden Tag, als man ihn ausgraben wollte, fand man ihn von dem Dachse, der den Bau bewohnte, über die Hälfte verzehrt.

dernswürdige Weise den dick angesetzten Speck wieder vom Leibe ab, indem er zu dieser Absicht seine Schnauze bis zu den Augen, mit dem Kopfe zwischen den Hinterbeinen weg, in seinen Afterbeutel steckt, und schlafend durch das Fett, das sich hier sammelt, seine Lebenskräfte erhält. Schon um Martini herum geht er nicht alle Nachte mehr aus, aber sobald es gänzlich zugefroren ist, gar nicht mehr. Doch liegt er nicht, wie der Hamster, die ganzen Wintermonate hindurch in einer stäten festen Betäubung vergraben, sondern er geht zuweilen des Nachts, besonders bey Thauwetter und minder kalten Nächten, zum Wasser, um zu trinken *), ja er sticht sogar im Jänner und Hornung, bey warmer anhaltender Witterung nach Wurzeln, und sucht Eicheln und Bucheckern, die unter dem abgefallenem Laube verborgen liegen, hervor.

Fortpflanzung.

Außer der Begattungszeit (Ranzzeit, Rollzeit) findet man das Männchen selten in Gesellschaft des Weibchens. Jeder Dachs liebt nur eine Dachsin. Zu Ausgange des Novembers und Anfang des Decembers aber, wenn er am fettesten ist, regt sich der Zeugungstrieb in ihm, und er besucht alsdann die Wohnung seiner Gattin, und wenn er sie einige Tage besucht hat, so geschieht die Begattung des Nachts vor ihrer Wohnung.

Die

*) Diese Bemerkung kann man fast alle Winter machen. Man findet nämlich im Schnee die Fährte, welche vom Bau aus zum Wasser, und von da wieder zurück führt.

Die Mutter gebiert nach zehn bis zwölf Wochen, gewöhnlich im Februar in dem Kessel ihres Baues, den sie besonders dazu eingerichtet hat, drey bis fünf blinde Junge*). Sie säugt sie, und trägt ihnen so lange Vogeleyer, Insekten, Gewürme und Wurzeln herbey, bis sie ihre Nahrung selbst suchen können. Wenn die jungen Dachse drey Wochen alt, und an sichern Orten gebohren sind, so legen sie sich mit ihrer Mutter im Sonnenschein vor ihren Bau und spielen. Sie bleiben bey derselben bis im Herbst, alsdann muß sich entweder jedes einen eignen Bau graben, oder wenn sie sich in einem Hauptbau be-

 finden,

*) Einige Jäger und Naturforscher behaupten, die Dachse begatteten sich, wie die Füchse, erst im Februar; allein ich bin durch eigene und vieler glaubhaften Jäger Erfahrungen vom Gegentheil unterrichtet worden. Noch kürzlich holte ein Dachshund vier lebendige junge, noch blinde, Dachse, welche durch einen Zufall von der Mutter verlassen worden waren, und erst etliche Tage alt seyn konnten, im Hornung aus ihrer Höhle. Daß sich nicht bey jungen Dachsen, die bey aufbrechender Witterung noch unter dem Laube gute Eichel- und Büchelnahrung finden, einmal der Geschlechtstrieb zu einer ungewöhnlichen Zeit, z. B. im Februar und März zeigen sollte, kann wohl nicht geleugnet werden, da dergleichen Anomalien bey allen wilden Thieren Statt haben. So sahe ich vor etlichen Jahren im November eine Hirschkuh öffnen, die ein Kalb trug, das um Weyhnachten zeitig seyn mußte. Man findet auch oft gelte Dachsinnen, denen es vielleicht der in unserm rauhen Thüringen zu bald eingetretene Winter unmöglich machte, sich befruchten zu lassen; auch bey diesen kann zuweilen dieser Trieb noch nach Endigung ihres Winterschlafs erwachen.

finden, einen eignen Kessel verfertigen, wenn nicht verlassene da sind.

Im zweyten Jahre haben sie ihre gehörige Größe und Vollkommenheit erlangt. Man kann sie zähmen, und sie verlieren wirklich in menschlicher Gesellschaft mehr von ihrer Wildheit, als die gezähmten Füchse. Sie fressen rohes Fleisch, Eyer, Käse, Butter, Fische, Brod, Rüben, Wurzeln, Nüsse und zubereitete Speisen. Sie spielen mit den kleinen Hunden, mit den Katzen, und folgen denjenigen Personen, die sie füttern, und sich mit ihnen abgeben, wie die Hunde nach. Sie lieben die Wärme so sehr, daß sie sich auf den Feuerstädten oft der Gefahr aussetzen, die Pfoten zu verbrennen. Man sagt, sie reinigten die Häuser von Mäusen, giengen aber auch, wenn ihnen nicht hinlänglich Nahrung gereicht würde, kleine Ferkel und junges Federvieh an; und nach dieser Bemerkung hat man sich denn berechtigt geglaubt, die Dachse unter die Raubthiere rechnen zu dürfen. Sehr selten fallen weiße Dachse aus.

Krankheiten.

Die Dachse, sonderlich die Weibchen, werden im Frühling und Sommer gern räudig; doch glauben die Jäger fälschlich, daß sie der räudige Fuchs, welcher, wenn sie des Nachts ausgegangen wären, in ihren Bau krieche, mit dieser Krankheit anstecke.

Sie werden auch toll. Im Jahr 1795 wurde bey Dresden eine Holzfrau von einem Dachse gebissen, und

wurde

wurde in etlichen Tagen mit der Wuth befallen. Vielleicht war der Dachs von einem tollen Hunde erst gebissen worden.

Feinde.

Ihre natürlichen Feinde sind die Hunde, sonderlich die Schäfer- und Dachshunde. Außerdem werden sie von einer Art Läuse (Acarus), wie die Schafzecken, von bräunlichen Erdmilben, von den Palisadenwürmern (Strongylus), Egelwürmern und Rundwürmern (Ascaris) gar sehr geplagt.

Jagd.

Die Fährte des Dachses ist der Dachshundsfährte fast gleich, nur stehen die vier Zehen mit ihren langen Nägeln hervor. Gehend formt (schränkt) er ein Zickzack, flüchtig aber fast ein Dreyeck. (Taf. XXIII. Fig. 10.)

Der Dachs, der blos in seinem Bau der Gefahr, die seinem Leben drohet, Trotz bieten, und außer demselben sich weder durch die Flucht, noch große Tapferkeit beschützen kann, ist leicht zu jagen und zu fangen. Man hat davon verschiedene Arten.

Man bemächtigt sich seiner entweder des Nachts, wenn man den Ort, wo er seiner Nahrung nachgeht, bemerkt hat, und ihn daselbst mit abgerichteten Schäfer- und Jagdhunden anhetzt, und diesen mit Gabeln und Prügeln zu Hülfe eilt; oder man treibt ihn mit Dachshunden aus seinem Bau in eine Schlinge von geglühetem

hetem Drathe, die man vor eine Röhre aufgestellt hat, oder in einen daselbst befestigten von starken Bindfaden gestrickten Sack, Dachshaube genannt, welchen man an einen Pflock auf diese Art fest schlingt, daß er sich an einer Leine, wenn der Dachs hinein ist, von selbst zuziehet.

Oder man gräbt ihn (s. Fuchs), indem man durch das Anschlagen der Dachshunde den Ort, wo er sich in seinem Bau hin verfügt, genau bemerkt hat, wie den Fuchs aus. Er sucht sich hier, wenn er die nahe Gefahr bemerkt, durch Verschanzungen zu retten, (er verklüftet, verliert sich) und liegt dabey so still, daß ihn Jäger und Hunde oft mit Mühe wieder aufspüren können. Man faßt ihn mit einer darzu dienlichen Zange an und tödtet ihn entweder durch einen Schlag an seiner empfindlichen Nase, oder legt ihn, wenn er lebendig bleiben soll, einen Maulkorb an, und verwahrt ihn in einem Sacke. An manchen Orten hat man auch die grausame Gewohnheit, daß er mit einem Krätzer, den man ihn in den Leib schraubt, aus seiner Verschanzung herausgezogen wird.

Man fängt ihn auch, indem man die oben beschriebene Haube in die Röhre legt, und an den Eingang der Röhre solchergestalt befestiget, daß man sie mit einer Leine, die sich bis hinter einen Busch oder Baum erstreckt, wenn der Dachs hinein ist, zuziehen kann. Dieser Fang kann nur bey düstern Nächten statt haben, wenn man gewiß weiß, daß der Dachs seiner Nahrung halber ausgegangen ist. Man läßt ihn alsdann durch

Hunde

Hunde aufstöbern, wo er sich über Hals und Kopf nach seinem Bau begiebt, und gefangen wird. In das Ende der Haube näht man gewöhnlich einen Ring von Eisen, in welchen der Kopf des Dachses bis zu den Augen paßt, damit er nicht in der Hitze das Netz durchreiße, wenn er sich gefangen fühlt.

Außer diesem werden die Dachse durch Schlagbäume oder Schneller (Wipperbalken), wie die Marder und Wieseln, gefangen. Man stellt sie dergestalt vor den Eingang des Baues, daß, wenn der Dachs heraus gehet, er den Schneller berühren muß, da denn der Schlagbaum auf ihn fällt, und ihn zu Boden drückt. Ein solcher Schlagbaum wird stufenweise vor dem Eingang angebracht, damit das Thier denselben allmählich kennen lerne, und sich deswegen nicht scheue aus- und einzugehen.

Sie werden auch, und zwar am gewöhnlichsten, mit Tellereisen gefangen. Es werden nämlich, wenn der Jäger durch die Anzeige der Fährten weiß, daß der Dachs im Bau liegt, alle Eingänge eines Baues bis auf einen verstopft, vor welchen man die Falle der Erde gleich eingräbt, an einer Kette befestiget, und mit blosem Hasellaub oder Tannenreißern abreibt. Er geräth gemeiniglich den ersten Tag gleich beym Aus- oder Eingehen in dieselbe.

Endlich schießt man sie auch, und zwar auf folgende Art. Der Jäger setzt sich ein oder zwey Stunden vor

vor Tages Anbruch auf einen Baum in der Gegend des Baues und wartet bis der Dachs vom Felde nach Hause kömmt. Er muß aber um die Zeit, da er kommt, welche man bestimmt wissen kann, z. B. im September um 5 Uhr, fertig seyn, denn so wie er zwanzig bis dreyßig Schritte vom Bau ist, fängt er scharf an zu laufen, so langsam er auch bis dahin gegangen war. So bemächtigt man sich der meisten in Thüringen.

Mit den lebendig gefangenen Dachsen werden auch oft grausame Lusthetzen auf ebenen Wiesen angestellt. Man hetzt ihnen nämlich Dachs- und Jagdhunde an, gegen welche sie sich mit wunderbaren Wendungen (über welche gelacht wird) auf den Rücken liegend mit ihrem scharfen Gebiß, mit welchen sie ihrem Feinde immer nach der empfindlichen Nase fahren, und mit ihren scharfen Klauen bis in ihren Tod, als Helden tapfer wehren.

Nutzen.

1) Das Dachsfleisch hat einen süßern Geschmack als das Schweinefleisch. Dieser ekelhafte süße Geschmack wird ihm durch Salz und gute Gewürze benommen. In Frankreich wird eine Dachskeule mit Blumenkohl, und in der Schweiz mit gekochten Birnen für eine besondere Delikatesse gehalten. Die Steindachse, welche auf hohen Gebirgen wohnen, sollen vor den andern im Geschmack einen Vorzug haben. Die Metzger in China bringen sie oft in die Fleischbude, da sie die Chinesen gern essen *).

2) Dachs-

*) Bell's travels. II, 83.

2) Dachsfett, oder Schmalz, welches ihnen im Herbst oft drey Finger hoch über den ganzen Rücken liegt, und fünf bis sieben Pfund wiegt, wird von den Aerzten und Wundärzten zu Heilung innerlicher und äußerlicher Schäden gebraucht. Die Heilung der Beinbrüche soll es außerordentlich befördern. Aeußerlich warm aufgestrichen, oder in einem Klystier beygebracht, wird es wider den Stein gerühmt. Es dient auch den Lahmen, Schwachen und Podagristen, sonderlich mit Fuchs- oder wilden Katzenschmalz vermischt, ingleichen für geschrundene Brüste und im hitzigen Fieber. Eben so soll es in Nervenkrankheiten, mit Schweinefett versetzt, von außerordentlicher Wirkung seyn. Ingleichen soll es gleich dem Bärenschmalze die Haare der Thiere und Menschen wachsend machen. Auch wird es als eine Pferdeschminke gebraucht; indem man nämlich den Pferden die Haare ausrauft, und diese unbehaarten Stellen mit halb Dachsfett und halb ungeläuterten Honig bestreicht, so wachsen weiße Haare darnach. Die Jäger, welche es nicht in den Apotheken verkaufen können, brennen es in den Lampen, wo es so schön und ohne Rauch brennt, wie das Baumöhl, aber beym Auslöschen der Lampe eine üblen Geruch verursacht.

3) Die Haut (Schwarte), die nicht, wie einige Naturforscher behaupten, zu allen Jahrszeiten *), sondern

*) Man glaubt fälschlich, daß sich die Dachse nicht häreten. Sie verliehren beynahe den ganzen Sommer hindurch Haare, eben deshalb, und wegen der Räude und des

dern erst nach Michaeli gut ist, gehört unter das gemeine Pelzwerk, und ist so fest und dauerhaft, daß weder Nässe noch Regen durchdringen kann. Die Sattler machen daher, rauhgahr, Ranzen, Fußsäcke, Jägertaschen, Hundehalsbinden und Ueberzüge über Koffer, Kumte und Gewehrschlösser daraus, und die Jäger schätzen eine Jagdtasche von einem jungen Dachse, dessen Haare statt der schwarzen Farbe eines alten, ins bläuliche fallen, sehr hoch.

4) Die Haare werden zu Mahler- und Vergolderpinseln und zu Bürsten verarbeitet. Die ausländischen Dachsfelle kommen vorzüglich aus Polen.

5) Der Dachs vertilgt auch manche schädlichen Insekten und Gewürme, als Maykäfer und Schnekken, und soll sogar Feldmäuse fressen.

Schaden.

Der Dachs schadet den Waldwiesen, sowohl durch seine Nahrung, die aus den besten Kräuterwurzeln, z. B. von Kümmel und Tormentill besteht, als auch durch sein Graben nach diesen Wurzeln. Er besucht auch die weißen und gelben Rübenäcker, raubt den Vögeln,

des Ungeziefers, womit ihre Schwarte mehrentheils zu dieser Jahrszeit behaftet, und wodurch sie unbrauchbar gemacht wird, fängt und jagt man sie auch erst nach Michaeli.

Vögeln, die auf die Erde nisten, ihre Eyer, und soll junge Vögel, junge Hasen, ja sogar auf den Bauerhöfen am Walde junge Gänse und Enten stehlen.

Irrthümer und Vorurtheile.

Erstere sind schon meist gerügt worden, daß es nämlich verschiedene Arten von Hunde- und Schweinedachsen gebe, der Dachs vom räudigen Fuchs im Bau angesteckt werde, sich nicht häare u. s. w. Die alten Aerzte brauchten den zu Asche gebrannten Dachs, sein Blut, Fett, Gehirn, Leber und Galle in der Medicin, und manche Jäger wissen noch immer mit manchen Theilen desselben, besonders mit dem Fette, Wunderkuren zu verrichten.

Die zwölfte Gattung.

Wiesel. Mustela.

Kennzeichen

In der obern Kinnlade stehen sechs aufrechte, spitzige, abgesonderte Vorderzähne; in der untern aber sechs stumpfe, dicht an einander stehende, von welchen zwey einwärts gekehrt sind.

Eckzähne an jeder Seite einer, inwendig eckig.

Backenzähne oben vier bis fünf, unten fünf bis sechs.

Zehen an jedem Fuße fünf, mit unbeweglichen spitzigen Klauen, und ohne Schwimmhaut.

Die Zunge ist glatt, bey manchen warzig.

Die Thiere dieser Gattung haben einen kleinen, platten Kopf, leben im Trocknen, klettern gut, schlüpfen durch enge Wege, wohnen in Höhlen, nähren sich von frischen Fleische, Eyern und Obstfrüchten, die sie des Nachts aufsuchen, pflanzen sich jährlich gewöhnlich nur einmal fort und haben auf jeder Seite vier bis fünf Säugwarzen. Die Jungen sind noch im ersten Jahre mannbar.

(15) 21. Der Steinmarder.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Marder oder Marte schlechthin, Haus- und Dachmarder, fälschlich Feld- und Buchmarder.

Mustela Foina. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 95. n. 14.

Fouine. *Buffon.* hist. nat. VII. 161. T. 18. Ed. de Deuxp. II. T. 6. f. 2. Uebers. von Martini IV. 146. Taf. 61. a.

Martin. *Pennant* hist. of Quadr. II. 41. Meine Uebers. II. p. 365.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 267.

v. Schrebers Säugeth. III. 475. Taf. 129.

Goezes Fauna I. 263.

v. Wildungens Taschenbuch fürs Jahr 1800. S. 24. Taf. 3.

Donndorfs zool. Beytr. I. 288. Nr. 14.

Ridingers kleine Thiere. Taf. 85.

Kennzeichen der Art.

Mit dunkelbraunem Körper, auf welchem die röthlich-aschgraue Grundfarbe stark durchschimmert, und weißer Kehle, Unterhalse und Brust.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Man könnte den Steinmarder in Ansehung seiner Zeichnung an der Kehle und Halse, seines sittlichen Betragens, Nahrung, Aufenthalts, und seines üblen Geruchs halber, den seine Bisamdrüschen und Ausdünstungen verursachen, mit Recht das größte Wiesel nennen. An Größe gleicht er einer mittelmäßigen Katze. Seine gewöhnliche Länge von der Schnauze bis zum Schwanze ist nämlich ein Fuß und acht bis neun Zoll; der Schwanz hält zehn bis zwölf Zoll; die Höhe ist neun Zoll *), und die Schwere fünf bis sieben Pfund.

Der Kopf ist hinten rund, oben etwas platt, kurz, kegelförmig zugespitzt, dem Kopfe eines kurzschnauzigen Spitzhundes ähnlich. Die schwarze feuchte Nase ragt etwas über der Lippe hervor. Er hat ein scharfes Hundegebiß. In der obern Kinnlade befinden sich sechs zugerundete Vorderzähne, wovon der erste auf jeder Seite etwas länger ist; dann folgt, nach einem kleinen Zwischenraume, ein langer etwas gekrümmter, inwendig eckiger Eckzahn, und zuletzt fünf Backenzähne, wovon der erste sehr klein

und

*) Par. Ms.: Körper 1 Fuß 7 Zoll; Schwanz 10 Zoll; Höhe 8 Zoll.

und stumpf ist, die zwey folgenden größer und dreyeckig sind, der dritte drey Zacken hat, und der letzte ein eigentlicher runder, eingekerbter Backenzahn ist. In der untern Kinnlade stehen vorne sechs kleinere, breite, oben eingekerbte Vorderzähne, von welchen der zwischen den äußersten und mittelsten sich befindliche etwas einwärts liegt, dann ein Eckzahn, der kleiner ist, als die obern, und zuletzt sechs Backenzähne auf jeder Seite, von welchen die zwey letztern wahre Backenzähne sind, der vorletzte als der größte drey Zacken und einen runden Ansatz hat, der erste sehr klein und stumpf und die andern dreyeckig und spitzig sind. Die Zunge ist lang und mit glatten zurückstehenden Warzen besetzt. Das Maul hat von steifen schwarzen Haaren einen Bart, wie die Katzen. Die blaulichen Augen stehen weit von einander, schief, näher nach der Schnauze als nach den Ohren zu, blitzen im Finstern und haben etliche steife schwarze Haare am obern Augenliede. Die Ohren sind kurz, breit, zugerundet. Sein Hals ist im Verhältniß des langen Leibes kurz und beynahe von der Dicke des Kopfs. Der Leib ist schmäler als an einer Katze, schlank und mit doppelten Haaren, kürzern, wolligen, und längern steifen überzogen. Der Schwanz ist zottig und gerade ausgestreckt. Die Beine sind niedrig und die vordern Füße länger und größer als die hintern. Sie enthalten fünf Zehen, welche mit einer behaarten Haut halb verwachsen und mit kurzen scharfen Klauen besetzt sind. An jeder Seite des äußersten Mastdarms, am Rande des Afters, öffnen sich zwey eyrunde Bläschen oder Drüschen, die eine übelriechende, gelbliche

schmierige, mit einem weißen Häutchen umgebene Feuchtigkeit in sich enthalten.

Was seine Farbe betrifft, so ist er überhaupt grauröthlich ins schwarze auslaufend, und weiß an Kehle, Unterhalse und Oberbrust. Sonst sind, die Theile einzeln betrachtet, die steifen, kurzen Haare am Kopfe röthlich aschrau, die Grundwolle und die Wurzeln der Stachelhaare am Halse, auf dem Rücken und an den Seiten weißlich, die Mitte der letztern aber röthlich aschgrau, und die Spitze ins aschgraue sich ziehend, schwarzbraun oder schwärzlich. Das Ende des Rückens, der Schwanz und die Beine sind völlig schwarzbraun oder schwärzlich, da auf dem Rücken, wegen der dünner stehenden steifen Haare, die weißliche Farbe der Wolle stark durchschimmert. Der Bauch hat eine hell aschgraue Grundfarbe, aber die Spitzen der Haare sind mehr braun als schwarz. Die weiße Kehle ist nicht immer rein, sondern zuweilen mit einem oder einem doppelten röthlichen Flecken gezeichnet.

Im Sommer ist die Farbe im allgemeinen heller, daher röthlichbraun, im Winter aber dunkler, mehr dunkelbraun.

Eine deutliche Nath liegt in der Haut von dem Schaambeine an, vorwärts, und ein weniger deutliche befindet sich hinten an jedem Vorderbeine.

Das Weibchen ist schlanker und niedriger gebaut, als das Männchen, und hat vier Säugwarzen, die am Bauche liegen.

Varie-

Varietät. Der weiße Steinmarder. M. F. alba.

Er ist entweder rein weiß, oder graulich weiß. Sie sind selten.

Erstere sollen sogar rothe Augen, wie die weißen Kaninchen haben. Allein alsdann glaube ich kaum, daß sie sich selbst nähren können. Man muß sie also bloß im Neste entdeckt haben.

Zergliederung.

1) Die Hirnschaale dieses Thiers hat viel ähnliches mit der eines Fuchses; eben so der Gehörgang.

2) Die Schulterblätter sind ziemlich breit.

3) Die Gedärme sind gleichweit, aber ohne Blinddarm.

4) Die Milz ist sehr klein.

5) Die linke Niere steht niedriger als die rechte.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Der Marder ist ein munteres, listiges, geschicktes und sehr flüchtiges Thier. Sein Gang ist beynahe ein beständiges leichtes Springen mit erhabenem Rükken und Schwanze. Er schlüpft, vermöge seiner biegsamen Gliedmaasen und seines schlanken Körpers, durch die engsten Löcher, geht über die schmälsten Stangen und Hölzer, erklettert die steilsten Dächer, ja ist ver-

mögend an einer geraden Wand, wenn sie nur ein wenig rauh ist, wie an einem Baume in die Höhe zu laufen. Seine halbverwachsenen Zehen machen ihn zu einem sehr geschickten Schwimmer. Die Nase und die Augen sind seine vorzüglichsten Sinneswerkzeuge, daher er auch in einer großen Entfernung schon seinen Raub bemerkt. Wenn er aus Furcht oder Verfolgung genöthigt ist, von einer großen Anhöhe herabzuspringen, so stürzt er sich niemals todt, sondern steht wie eine Katze, gleich auf allen vier Beinen, schüttelt sich, als wenn er dadurch seine erschütterten Glieder wieder in vorigen Stand setzen wollte, und läuft unbeschädigt davon. Die elektrische Materie hat bey starken Gewittern einen so mächtigen Einfluß auf ihn, daß er wie rasend herum läuft, und sich an solchen Orten, wo er häufig ist, aus Angst in Gesellschaft zusammen zieht, und ein großes Lermen verursacht.

Durch seine wohlriechenden Excremente (Losung) wird er nicht bloß sein eigner Verräther, sondern er wittert dadurch seinen eignen Gang wieder, und geht nicht wieder dahin, wo er findet, daß sie weggeschafft ist. Deswegen sagen die Jäger, ein rechter schlauer Marder, nehme das erstemal das Ey nicht von der ihm aufgestellten Falle, sondern lege seine Losung daneben, finde er diese des andern Abends noch unberührt dabey liegen, so gehe er erst, weil er sich sicher glaube, daran, und fange sich dann gewöhnlich.

Seine Stimme, die er in der Noth, oder im Spiel mit seines Gleichen, hören läßt, ist ein helles, kurz abgebrochenes Geschrey, und zur Begattungszeit darneben noch ein dumpfes Murksen oder Mauen: Au, Au, Gäck, Gäck!

Seine Lebenszeit soll sich nicht über zwölf Jahre erstrecken.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Heymath der Steinmarder sind die meisten Gegenden von Europa, die kältesten Zonen ausgenommen, die wärmern Gegenden von Rußland, auch Persien. In Deutschland überhaupt, so wie in Thüringen sind sie bekannt genug.

Sie wählen zu ihrem Aufenthalte Höhlen, und sonst verborgene Oerter. Sie wohnen daher in Felsenklüften, Steinritzen, und besonders in alten Stadtmauern, woher auch ihr Name entsprungen, in alten Thürmen, alten Kirchen und alten steinernen Gebäuden, unter den Dächern, in Holzstößen, in Winkeln und Klüften, auf den Heuböden, in den Ställen und Scheunen, zwischen Häusern und andern Gebäuden. Am Tage lauschen sie kaum aus ihrem düstern Hinterhalte hervor, weil sie das Licht, und wie ihrer bösen Thaten bewußt, das Angesicht der Menschen scheuen. Wenn sie schlafen, so bedecken sie ihre kostbaren Augen mit ihrem dicken Schwanze. Sie gehen im Winter gewöhnlich von 9

bis 10 und von 1 bis 4 Uhr des Nachts auf ihren Raub aus.

Nahrung.

Der Hausmarder ist ein grausames und besonders ein blutdürstiges Raubthier. Er richtet in den Tauben- und Hühnerhäusern, in welche er des Nachts sehr listig zu kommen weiß, die größten Niederlagen an, erwürgt alles, was er findet, und verursacht durch seine stinkenden Ausdünstungen und bisamartig riechenden Excrementen, die er allzeit zurückläßt, daß, ohne eine besondere Reinigung und Ausräucherung, keine Taube und Henne ihre Wohnung wieder bezieht. Das junge Hausgeflügel, Enten, Gänse, Hühner u. s. f. trägt er allzeit fort in einem Winkel, rupft es und zehrt es gänzlich auf, dem alten aber beißt er im Sommer, wenn er Nahrung im Ueberfluß hat, gemeiniglich nur die Köpfe ab, frißt diese, saugt dem übrigen Körper blos das Blut aus, und läßt ihn liegen; im Winter und Frühjahr aber nimmt er auch die ganzen Vögel mit sich in seine Höhle. Er raubt auch den Hühnern und Vögeln die Eyer weg. In Gärten sucht er auf den Bäumen und in den Hecken die Vogelnester auf, nimmt sie aus und erlauscht die alten Vögel im Schlaf. Auch die jungen Enten, die sich mitten auf einem Teiche in ihrem Häuschen sicher glauben, schützt ihr flüssiges Element, daß fast jedem andern vierfüßigen Raubthiere den Weg zu dieser ruhigen Wohnung abschneidet, für seiner Raubsucht nicht. Sobald ihm sein guter Geruch dieselben verräth, so rudert er

bey

bey Mondenschein mit vieler Geschicklichkeit dahin, mezzelt alles, was Leben hat, darnieder und trägt es einzeln durch das Wasser im Munde nach seiner Höhle.

Allein nicht immer kann er sich mit solchen köstlichen Nahrungsmitteln sättigen, sondern muß sich im Sommer mit Hamstern, Feldmäusen und Heckenfröschen, und im Winter vorzüglich mit Feld- und Hausmäusen und Ratten, die er in Häusern und Gärten fängt, begnügen lassen *).

Sauerkirschen, Herzkirschen, Pflaumen und Vogelbeeren sind seine Leckerbissen.

Fortpflanzung.

Zur Zeit der Begattung, welche in den Hornung fällt, pflegen sie durch ihr Kämpfen und Schreyen, in der Gegend, wo sie sich aufhalten, sehr viel Geräusch zu machen. Man sieht daher in diesem Monate oft mehrere Männchen auf einem Dachforste oder einer Mauer beym Mondenschein mit gräßlichen Schreyen und Beißen hinter einem Weibchen herjagen. Die Mutter gebiert nach neun Wochen, gewöhnlich im April drey, vier, und nur höchst selten fünf Junge, wozu sie in eine Kluft ein Lager von Heu, Federn und ihren eignen Haaren verfertigt hat. Sie wirft auch des Jahrs zweymal, wenn sie früh ihre ersten Jungen einbüßet. Da man zu allen Zeiten im Sommer Junge antrifft, so scheint ihr Begattungstrieb

*) Er geht sogar im Winter in Dörfern, wie ein Hund, unter die Fenster und trägt die weggeworfenen Knochen zusammen.

trieb auf keine eigne Zeit eingeschränkt. Die Jungen sind 14 Tage blind, und werden von ihr so lange gesäuget und ernähret, bis sie sich ihren Unterhalt selbst verschaffen können. Dieß letztere geschieht gewöhnlich erst nach drey Monaten. Wenn sie aber einen Monat alt sind, so gehen sie schon aus ihrem Lager hervor und machen, wo sie sicher sind, im Sonnenscheine, solche possirliche Sprünge, Wendungen und Gebeerden, als kein anderes junges wildes Thier thut. Die Mutter bettet sich auch mit ihren Jungen, wenn sie sich unsicher glaubt, weiter.

Die jungen Marder lassen sich zähmen, und man ernährt sie anfangs mit Milch und Brod, dann mit Brod und Fleisch, und bricht ihnen zur Verhütung des Schadens die Zähne aus. Sie lernen fast alles fressen, was man ihnen vorlegt; nur verabscheuen sie Sallat und andere Kräuter. Honig fressen sie, so wie den Hanfsaamen, sehr gern. Sie sind im zweyten Jahre vollkommen ausgewachsen.

Feinde.

Die Hunde sind ihre Erbfeinde. Sonst findet man in den Nieren zuweilen Spulwürmer, wie beym Wolfe, und in den Eingeweiden Bandwürmer, Zwirnwürmer (Gordii), und Madenwürmer (Ascaris.)

Jagd.

Die Spur (Taf. XXII. Fig. 6.) des Marders hat die Größe der Katzenspur, nur ist sie wegen der länglichen Ballen, und längern Mittelzehen etwas länger. Da der Marder fast jederzeit hüpft, so findet man sie nur selten gangmäßig hinter einander, sondern das meistemal zwey und zwey zusammen gesetzt, so daß nur die Spur des rechten Vorder- und Hinterfußes etwas vorsteht. Er setzt nämlich hinten, wie vorne auf, und da er mit den Hinterfüßen allzeit in die Vorderfährte tritt, so scheinen auch alle vier Füße nur die Spur von zweyen auszudrücken.

Seinen Aufenthalt und den Weg, auf welchem er einmal sicher und glücklich Beute gemacht hat, ändert er nicht leicht. Daher findet er auch hier mehrentheils seinen Tod. Der Jäger stellt nämlich auf diesem bekannten Wege, den das Thier durch seine Fährte, die es im Winter im Schnee macht, selbst verräth, und zwar, wenn es seyn kann, an den Ausgang oder unter den Absprung eines Winkels, den es durchwandern muß, eine Tellerfalle, die sorgfältig durch Kräuter von aller Menschenwitterung gereinigt ist, auf, und es kommt hier mehrentheils, wenn es nicht so lange Zeit hat, seine gefangene Pfote abzubeißen, in seine Hände. Wenn er aber sein Daseyn nur durch sein Rauben bemerkt, und seinen gewöhnlichen Weg nicht weiß, so belegt er diese Falle mit gebackenem Obst, das in Honig abgekocht ist, oder mit einer Witterung, die aus ungesalzener Butter, oder Gänsefett, Allfrankenschaalen,

Fenchel, Marumverum, Baldriankraut und Campher besteht; und der Geruch dieser Lockspeisen treibt ihn blindlings in die Falle.

Oder man nehme folgende Witterung: 1 Loth Hühnerfett, über gelindem Feuer in einem Löffel ausgelassen; und wenn es abgekühlt ist, wird ein halb Loth Anisöhl, 8 Gran Umbra, 8 Gran Bisam, 8 Gran Bibergeil und 4 Gran Campher, klein gemacht, hinzugethan. Diese Masse erhält sich in einer steinernen Büchse mit Blase verbunden etliche Jahre gut. An einen bequemen Platz schüttet man eine Hand hoch Sand, damit das Eisen bedeckt werden kann; dazu ein Papierchen unten auf dem Boden mit etwas Witterung bestrichen, und ein Ey das ebenfalls etwas bestrichen ist, steckt man halb hinein; der Marder wird das Ey gleich wegnehmen; alsdann nehme man einen Schwanenhals, befestige ein Ey daran und lege es hin. Es schlägt nicht fehl. Ein Tellereisen ist wegen des Katzenfangen nicht gut, diese gehen aber nicht an den Schwanenhals, weil das Ey abgezogen werden muß. Mit Papier muß man Schloß und Gewerbe belegen, damit kein Sand ins Eisen kommt *).

Sonst wird er auch durch Jagdhunde, durch Klopfen und Lärmen mit Trommeln und Stöcken aus den Gebäuden, wo er gespürt worden ist, getrieben, und entweder auf den Dächern oder auf nahe stehenden Bäumen, wo er hinflüchtet, erschossen. Der Jäger stellt ihm, seines vortreflichen Balges halber, besonders im Winter nach.

Nuz-

*) Reichsanzeiger 1797. Nr. 210.

Nutzen.

Durch diesen Balg, der ein kostbares Pelzwerk ist, zu Mannsmüffen, Mützen und Kleiderbesatz, kastanienbraun gefärbt oder schwarz gebaizt, angewendet wird, und häufig und gut vorzüglich aus Schweden und Rußland kommt, wird er den Menschen auch nützlich; denn sein Fleisch, das an manchen Orten gegessen wird, wird in Thüringen, als Aas, weggeworfen.

Der nach Bisam riechende Koth, der seinen Geruch von der, in den zwey Afterdrüsen sich absondernden Feuchtigkeit, erhält, wird zur Verfälschung des Bisams und als Räucherwerk gebraucht. Der seelige Pastor Goeze hat ihn 12 Jahre und drüber in einer Serpentinbüchse aufbewahrt, und er hatte noch immer seinen Bisamgeruch.

Der Nutzen, den diese Marder in der Schöpfung stiften sollen, besteht wohl in der Verminderung des Ueberflusses der so stark sich vermehrenden schädlichen Mäusearten. Sie vertilgen nicht nur Feldmäuse, sondern auch Hausratten *).

Schaden.

Der Hausmarder stellt vorzüglich dem zahmen Federviehe, und dessen Eyern nach. Dem kleinen wilden Geflügel ist er ebenfalls nachtheilig, und leeret auch manche

*) Schriften der Berlin. Gesellsch. naturforschender Freunde. VI. S. 427.

che Obstbäume ab. Es sollte daher jedem Hausvater erlaubt seyn, sich dieser Thiere, so wie der Iltisse und Wieseln durch Fallen-Legen zu bemächtigen. Was verlangt werden könnte, wäre dieß, daß er den Balg an den Revierförster ausliefern müßte.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Der Galle schreiben die alten Aerzte, in Fenchelwasser aufgelößt, besondere Heilkräfte zu, die Augenflecken zu vertreiben u. s. w.

2) Die wohlriechende Losung wurde ebenfalls in der Medicin zur Erweichung verhärteter Drüsen und zu Auflösung stockender Säfte gebraucht.

3) Die auf dem Dachforste wandernden oder gar sich beißenden Marder hat der Aberglaube schon oft für Hexen oder gar für Teufel ausgeschrieen.

(16) 22. Der Baummarder.

Namen, Literatur und Abbildungen.

Edelmarder, wegen seines guten Balges, sonst: Gold- Wald- Buch- Büchen- Busch- Fichten- Kiefer- Tannen- Birken- Espen- Vieh- Licht- und Feldmarder.

Mit dieser letzten Benennung wollen einige Jäger noch eine besondere Art bezeichnen, die sie auch den Wildmarder nennen. Er soll merklich größer, dunkelbrauner am Körper und gelber an der Brust seyn. Dabey soll er ganz allein und abgesondert in den Feldhölzern leben, sehr wild und scheu seyn, sich in hohlen Bäumen und Höhlen in der Erde aufhalten, und einen ganz vorzüglich schönen Balg haben. Es ist klar, daß hier ein alter Baummarder beschrieben wird, dem sein sicherer und ungewöhnlicher Aufenthalt diese Eigenschaften verschafft hat.

Mustela Martes. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 95. n. 6.

Marte. *Buffon* hist. nat. VII. 186. T. 22. Ed. de Deuxp. II. T. 6. f. 3. Uebers. von Martini IV. 156. Taf. 61. b.

Pine. *Pennant* hist. of Quadr. II. 42. Meine Uebers. II. pag. 366.

v. Schrebers Säugeth. III. 475. Taf. 130.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 267.

Goeze's Fauna. I. 179.

Doundorfs zool. Beytr. I. 287.

Wildungens Taschenbuch fürs Jahr 1800. S. 24. Taf. 3.

Ridingers kleine Thiere. Taf. 86.

Meine getreue Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. Nürnberg 1793. 1s Hundert. Taf. 61.

Kennzeichen der Art.

Mit gelber Kehle und untern Theil des Halses, und glänzendem schön kastanienbraunem Haare.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Baummarder ist dem Steinmarder beynahe vollkommen gleich; doch unterscheidet er sich vorzüglich in folgenden Stücken:

1) Er ist merklich größer. Die Länge seines Körpers beträgt nämlich zwey, und des Schwanzes ein Fuß *).

2) Sein

*) Par. Ms.: Körper 1 Fuß 8 Zoll; Schwanz 11 Zoll.

2) Sein Kopf ist kürzer und stärker. Daher er auch ein wilderes Ansehen hat, als der Steinmarder. Dabey sind die Ohren sehr kurz und abgerundet, die Augen funkelnd und weit hervorstehend.

3) Die Beine sind höher. Seine Höhe beträgt daher zehn Zoll.

4) Die Kehle ist dottergelb, und der übrige Körper, außer den schwarzen Beinen und Schwanze, von schön kastanienbrauner Farbe. Die Haare sind auch glänzender, länger, feiner, weicher, zärter und dichter, und fallen nicht so leicht aus, als am Hausmarder, und der Schwanz ist viel zottiger. Sonst ist die nähere Beschreibung der Farbe folgende: Der Kopf ist an der Schnauze dunkelbraun, wird um die Nase herum fahler, und verliert sich gegen die Stirn und Backen hin ins bräunliche. Ein gleichfarbiger schmaler Streif läuft unter den Ohren weg, die auswendig braun, inwendig weiß, so wie auch weiß eingesäumt sind. Auf der Oberlippe unter dem Mundwinkel, vor und über den Augen, stehen viele dunkele lange Barthaare. Die Kehle und der Unterhals bis zwischen die Vorderbeine ist gelb, bey den alten matt, bey den jungen hoch. Die Wollhaare des Rückens haben vorn eine weißgraue, hinten und an den Seiten eine gelbliche Farbe, die Stachelhaare aber machen ihn schön kastanienbraun. Der Bauch ist etwas matter, als der Rücken, und zwischen den Hinterbeinen steht beym Männchen ein brandgelber mit dunkelbraun umgebener Fleck. Ich habe auch einen gesehen, der von der dotter-

gelben Kehle an einen schmutziggelben mit den kastanienbraunen Stachelhaaren, braungemischten Streif bis zum After hatte; an diesem waren auch nur die Vorderfüße schwärzlich, die Hinterfüße und der Schwanz aber mit dem Rücken einfarbig. Der Schwanz und die Beine sind bey dem gewöhnlichen Baummarder fast dunkelbraun ins schwarze auslaufend. Der schön tief kastanienbraune Rücken des Männchens, ist beym Weibchen bläßer. Endlich

5) so ist er auch in Ansehung seiner Triebe von jenem unterschieden. Er lebt bloß im dichten Walde auf den Bäumen und geht fast gar nicht in die Häuser. Er beläuft sich beynahe einen Monat früher, ob er gleich mehr der üblen Witterung ausgesetzt ist, als der Steinmarder, und sucht sich freye Wohnungen auf den Bäumen auf, da hingegen jener sich bloß in finstern Winkeln aufhält, und das Tageslicht scheuet. Zuletzt ist er auch wilder, flüchtiger und grausamer in Verfolgung seines Raubes.

Dieß sind die Kennzeichen, die diese beyden Thiere von einander unterscheiden *). Sonst kommen sie in

Ans

*) Nach diesen so unbedeutend scheinenden Unterscheidungsmerkmalen möchte man vielleicht diese beyden Thiere, nicht als Arten, sondern als bloße Rassen unterscheiden wollen. Allein zu geschweigen, daß nur bloß die Zähmung und das verschiedene Klima von einerley bestimmten Thierarten eigentliche Rassen bildet, so ist es wohl so gut, als ausgemacht, daß sich diese beyden Thierarten niemals unter einander begatten, ob sie gleich noch so nahe zusammen leben. Erfahrungen müßten hier entscheiden, allein diese entscheiden noch bis jetzt für unsere Meynung. Nach vieljährigen Beobachtungen, die an Orten gemacht werden, wo in einem Bezirke von 1000 Schritten, Stein- und

Baum-

Ansehung ihres äußern und innern Körperbaues, in der Anzahl und Figur der Zähne, in ihren Gebeerden, Stellungen und Gang, in der Natur des Haares, und in dem Geruch der Exkremente völlig mit einander überein.

Verbreitung und Aufenthalt.

Das Vaterland dieser Marder ist ganz Europa, doch nicht bis zu den allernördlichsten Theilen herauf, der Norden von Asien und Amerika. Auf Kamtschatka und in Nordamerika wird er sehr häufig angetroffen, einzelner in Deutschland, wo man seinen guten Balg so sehr nachstrebt, und ihm den Schaden, den er am Waldgeflügel thut, so hoch anrechnet.

Sie halten sich in Eichen- Buchen- und in finstern Tannen- und Fichtenwäldern auf. Da am häufigsten, wo es viele hohle Bäume giebt. Sie bewohnen immer die hohlen Bäume, oder die wilden Tauben- Raben- Raubvögel- und Eichhörnchensnester, welche sie erweitern, oder die Ritzen in felsigen Bergen. Sie bereiten sich mehr als eine Wohnung und wechseln mit derselben, sobald sie sich nur im geringsten unsicher glauben.

Nahrung.

Die vorzüglichste Nahrung des Baummarders ist, wie bey dem Hausmarder, ebenfalls Mäuse, als Wasserratten

Baummarder zusammen wohnen, hat man noch nicht einmal bemerkt, daß in der Begattungszeit, da doch diese Thiere sehr geil sind, und zu dieser Zeit die ganze Marderrepublik in Aufruhr und Krieg geräth, sie sich einander nur nachgelaufen wären, viel weniger Junge mit einander gezeugt hätten.

ratten und andere schädliche Feldmäuse, welchen letztern er auch, wie der Iltis am Wasser, wenn sie trinken, nachgeht. Außerdem ist er ein geschworner Feind der Eichhörnchen. Diese verfolgt er, wie im Fluge, von einem Baum zum andern, bis sie ermüdet sich ihm ergeben müssen. Eben dieser Verfolgung ist die listige und schnelle Haselmaus von ihm ausgesetzt. Sonst sucht er die großen und kleinen Vogelnester auf den Bäumen und Erdboden im Walde auf und trägt Eyer und Junge davon. Er erschleicht auch die alten Auerhühner, Birkhühner, Haselhühner, Rebhühner, Fasanen und andere große und kleine Vögel auf der Erde und auf den Bäumen, wenn sie schlafen. Eben so erlauscht er junge Hasen im Schlaf. Wenn er den Weg zur Schneide (Schneuß) erst einmal ausgemacht und sie glücklich ausgeplündert hat, so plündert er sie täglich. Einen Vogelbeerbaum können etliche in kurzer Zeit ableeren, und wenn sie diese Nahrung haben, vergessen sie ganz, daß sie Raubthiere sind, so gut schmeckt sie ihnen. Sie trachten auch dem Honig sehr nach, und graben daher die Hummelnester auf. Von dem häufigen Genuß desselben soll ihr Balg Flecken bekommen, die vom Jäger und Kürschner mit den Namen der Honigflecken belegt werden. Außerdem soll auch Hanfsaamen eine Delikatesse für sie seyn.

Fortpflanzung.

Die Mutter gebiert mehrentheils in einem hohlen Baume, selten in einem erweiterten und mit Moos weich ausgefüttertem Eichhörnchens- oder wilden Taubennester,

oder

oder in Felsenritzen ihre drey bis vier Junge. Sie wird in der letzten Hälfte des Jänners oder der ersten Hälfte des Hornungs belegt, und trägt neun Wochen, also bis zu Ende des Märzes oder Anfang des Aprils. Mütterlich-sorgt sie für ihre Jungen, und raubt, aus Besorgniß entdeckt zu werden, wie der Fuchs, nicht leicht nahe in der Gegend, wo sie liegen. Diese machen sich nach sechs Wochen schon durch possierliche Sprünge und Neckereyen auf den Bäumen lustig, und sind vorzüglich diejenigen Marder, welche die Jäger wegen ihres muntern Temperaments zähmen. Sie sind auch leichter zu erziehen, als die Hausmarder, da ihnen das Kriechen in den Winkeln der Häuser nicht wie jenen angebohren ist. Sie sind unermüdet in Spielen mit Hunden und Katzen, werden nicht leicht böse, wenn man sie nur ruhig fressen und schlafen läßt, und sind unter allen wilden Thieren, die man zum Vergnügen zähmt, die artigsten und angenehmsten. Sie sind im Stande zuweilen einen ganzen Tag hindurch zu schlafen, und ein andermal auch wieder eben so lange zu wachen. Im Schlafe legen sie sich, wie die Hunde, kugelrund zusammen. In Sardinien werden viele zahm gemachte Baummarder als angenehme Geschenke verschenkt *).

Jagd.

Diesen Thieren wird wegen ihres kostbaren Balges besonders im Winter von den Jägern nachgestellt, und

*) Cetti Naturgeschichte von Sardinien.

sie verrathen sich durch ihre Fährte im Schnee, und durch die mit den Klauen beym Klettern abgekratzten Flechten, auf welchem Baume, oder in welcher Gegend sie sich aufhalten. Sie liegen dann meistentheils in einem Neste auf einem Baume, und wenn der Jäger, ohne daß sie ihn von weiten gewahr werden, nahe zu ihnen kömmt, so bleiben sie in demselben ganz ruhig liegen. Wenn er keine Flinte bey sich hat, und nur ein Kleidungsstück auf einen Stock neben den Baum stellt, so kann er sicher nach Hause gehen, das Gewehr holen, und bey seiner Rückkunft werden sie noch eben so stille, mit unverwendetem Blicke nach dem Stocke mit der Kleidung sehend, liegen, und erschossen werden können. Wenn man sie mit einer kleinen Kugel erlegen kann, so schießt man sie nicht gern mit Schroten, die den vortrefflichen Balg zerlöchern. Wenn sie Hunde hören, die ihnen nachsetzen, wenn sie sich auf der Erde befinden, so gehen sie ungestöhrt weiter fort, und fliehen nicht eher, bis diese ihnen ganz nahe sind, da sie dann erst auf einen Baum springen, sich auf einen Ast legen, und sie vorüber laufen sehen.

Außerdem werden sie mit Schwanenhälsen *) und Tellerfallen, die man mit gebackenen Pflaumen, oder

*) Die Schwanenhälse legt man in einen hohlen Baum oder unter einen mit der Wurzel ausgerissenen Windbruch und bestreicht das Eisen mit der oben beym Steinmarder angegebenen Witterung. Schlagbäume aber fangen noch besser, wenn

oder einem Stück Fleisch von einer gebratenen Katze, das sie von weitem herbeylockt, belegt, oder in Schlagbäumen, die man in ihre Gänge, entweder in die Höhe zwischen Bäume, oder auf den Erdboden aufstellt, und an deren Stellholz man einen Vogel bindet, gefangen. Sie in ein Garn, womit man eine Gegend umstellt, zu jagen, ist mißlich, und macht zu viel Mühe.

Nutzen.

Der Balg dieses Marders ist eines der schönsten Rauchwerke, das gefärbt und ungefärbt zu Frauenzimmermüffen, Palatinen, und andern Gebrämen gebraucht wird; Schade, daß er zuweilen blose Flecken hat, welche die Jäger, wie schon oben erwähnt worden ist, dem Honiglecken zuschreiben. Der kleinste Theil des Felles, welcher sich längs dem Rücken bis zum Schwanzende erstreckt, wird für sehr kostbar gehalten.

Auf den Gebirgen um Zobelberg in Mittelkrain giebt es sehr viele Marder, deren Felle man dem Zobel gleich hält.

Im Brittischen Amerika werden oft jährlich 4000 Bälge ausgeführt.

wenn man dabey sich dieser Witterung bedient, und den untern Baum, den Vogel an der Stellzunge und das Geschleppe damit bestreicht.

Die schönsten Marder soll es bey Ufa und in den Gebirgen des Caucasus geben.

Nach Hr. Pallas (Reise II. 20. III. 139.) verhandeln die Russen diese Bälge, so wie die Pfoten, Säcke aus zusammengenäheten Marderkehlen und Schwänze an die Chinesen.

In Nordamerika und Frankreich soll man auch das Fleisch essen.

Der Baummarder wird ferner den Wäldern nützlich, daß er die dem Saamen und jungen Holzungen so schädlichen Eichhörnchen, Haselmäuse, und große und kleine Feldmäuse in Menge vertilgt. Weiter s. Nutzen des Steinmarders.

Schaden.

Er tödtet Auerhühner, Birkhühner und andere nützliche Vögel, plündert ihre Nester, und erschleicht die jungen Waldhasen. Besonders wird er den Schneußen schädlich, die man nicht anders vor ihm sichern kann, wenn er einmal den Weg weiß, als daß man auf seinen Gang in die Höhe zwischen etlichen Bäumen einen Schlagbaum oder eine Schnellfalle mit einem angebundenen Vogel aufstellt.

Vorurtheile.

Wie beym Steinmarder schreibt man der Galle des Baummarders mit Fenchelwasser vermischt,

mischt, die besondere Wirkung zu, daß sie auf die Augen gelegt, die Flecken derselben vertreibe.

(17) 23. Der gemeine Iltis.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Iltis, Iltniß, Eltis, Ilk, Eyer-Ilk, Ulk, Elske, Ellthier, Ellenkatze, Stinkthier, Ratz, Stänkerratz, Stinkwiesel, Teufelskind, Hausunke, Illing, Buntsing, Nölling, Iltismarder und Iltiswiesel.

Mustela Putorius. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 96. n. 7.

Putois. *Buffon* hist. nat. VII. 199. T. 23. Ed. de Deuxp. II. T. 6. f. 4. Uebers. von Martini IV. 169. Taf. 63.

Fitchet. *Pennant* hist. of Quadr. II. 37. Meine Uebers. II. p. 362.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 304.

v. Schrebers Säugeth. III. 385. Taf. 131.

Goeze's Fauna. I. 285.

Donndorfs zool. Beytr. I. 297. n. 7.

Ridingers kleine Thiere. Taf. 87.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist länger als am Baummarder; die Grundwolle des Balges hellgelb; das längere Haar kastanienbraun; der Mund und der Rand der Ohren sind weiß.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses Raubthier, welches in Thüringen nicht selten ist, ist hier unter dem Namen Ratze bekannt. In seinen Sitten und in seiner Bildung ist es dem Marder ähnlich, nur kleiner, hat einen proportionirtern Kopf mit einer spitzigen Schnauze, einen kürzern Schwanz, dünnere, dunkelkastanienbraune Stachelhaare mit gelblichem Grund, und ganz gespaltene Füße. Seine Länge ist bis zum Schwanze 1 Fuß und 6 bis 8 Zoll; der Schwanz mißt 7 Zoll und die Höhe beträgt 5 Zoll *). Der Kopf hat fast die Gestalt des Fuchskopfes, und die Breite desselben zwischen den Ohren bildet mit der Schnauzenspitze ein regelmäßiges gleichseitiges Dreyeck Die schwärzliche und trockene Nase und die Nasenlöcher sind vom Fuchs, so wie sein Gesicht ganz das listige Ansehen desselben hat. Der Mund hat äußerlich einen schwarzbraunen Katzenbart, und innerlich ein scharfes Hundegebiß. In der obern Kinnlade befinden sich sechs rund und kurz zugespitzte Vorderzähne, von welchen der vordere auf jeder Seite der

*) Par. Ms. Körper 1 Fuß 5 Zoll; Schwanz 6 Zoll.

der größte ist; dann folgt ein großer gekrümmter und abgestumpfter Eckzahn, und zuletzt vier Backenzähne, davon der vordere kaum merklich, und einzackig, der zweyte gröser und einzackig, der dritte der größte, breit und zweyzackig und der vierte ein geriefter wahrer Backenzahn ist. In der untern Kinnlade findet man sechs stumpfe vorwärtsliegende Vorderzähne, einen kürzern und krümmern Eckzahn, als oben, und fünf Backenzähne, wovon der vordere sehr klein und stumpf, die zwey folgenden dreyeckig und einspitzig, der vierte zweyspitzig mit einem stumpfen Ansatze, und der fünfte sehr klein und rund ist. Zusammen 34; also zwey Zähne weniger, als der Steinmarder. Die Zunge ist lang mit hinterwärts gekehrten Wärzchen. Die Augen sind groß, hervorstehend, dunkelbraun, und scharfsehend, und die Ohren kurz, breit und abgerundet. Der Hals ist stark und lang, und der Rücken breit und etwas eingedruckt. Es hat kurze Füße und getrennte Zehen, die mit scharfen weißen Nägeln bewaffnet sind. Der Schwanz ist dickbehaart, büschlich, und gerade ausgestreckt.

Der ganze Leib ist mit einem feinen Pelz von doppelten Haaren überzogen. Die kurzen Haare sind dicht, wollig und weiß- oder lichtgelb, und die einzelnen längern an der Wurzel graulich, und an der Spitze aus dem kastanienbraunen ins glänzendschwarze auslaufend. Von weitem scheint er also im Winter auf dem ganzen Rücken schwarz zu seyn, im Sommer aber, wenn die längern Haare abgestoßen sind und ausfallen, und der

gelbliche

gelbliche Grund mehr vorschimmert, einen gefleckten Balg zu haben. Sonst ist — die Theile einzeln betrachtet — der Mund, das Kinn, und der Rand der Ohren weiß oder weißgelb, und über den Augen bis zum Ohren läuft, der Breite nach, bis zum Backen herab ein weißer Streif. Der übrige Kopf hat bis zum Schenkel borstenartige Haare und ist rothgrau. Am Oberhals scheinen die gelblichen Wollhaare mehr durch, als auf dem Rükken, wo die stachlichen dunkel kastanienbraunen Haare nach dem Schwanze zu immer dichter stehen. Der Unterhals, die Brust, die Füße und der Schwanz sind ganz schwarz und unter dem Bauch läuft ein rostbräunlicher undeutlicher Streifen nach dem After hin. Unter dem Schwanze hat das Thier zwey Drüschen, welche eine Feuchtigkeit in sich enthalten, die einen ekelsüßen Honiggeruch von sich giebt.

Das Weibchen sieht dem Männchen völlig gleich, ausgenommen, daß Mund und Ohren ganz weiß sind, und hat am Bauche vier Säugwarzen.

Varietäten: Es fallen auch zuweilen weißliche Spielarten aus. (M. P. albus.)

Zergliederung.

Im Ganzen wie bey den Mardern und Wieseln. Doch ist das Fell weit dicker und dehnbarer, schlottert gleichsam nur auf dem Körper herum, und ist mit starken ziehbaren muskulösen Theilen auf der Oberfläche des Körpers verwachsen. Daher beißen und

zerren

zerren die Hunde so sehr an den Iltis, ohne ihn etwas anzuhaben.

Die Gedärme sind dicht und drüsig.

Merkwürdige Eigenschaften.

Sein gewöhnlicher Gang ist springend; er ist sehr behende, immer in Bewegung und durchsucht alles. Sein Geruch und Gesicht ist sehr fein, und in Aufsuchung und Erschleichung seines Raubes ist er listig. Gegen alles Geklirre und Wetzen mit eisernen Instrumenten hat er einen natürlichen Abscheu.

In der Begattungszeit ist sein Laut ein Knurren, und in der Gefangenschaft und zum Zorn gereizt ein Kneffen, wie ein junger Hund.

Er soll zehn Jahre leben.

Verbreitung und Aufenthalt.

In Europa geht der Iltis nicht höher als Schweden hinauf, sonst bewohnt er das gemäßigte asiatische Rußland. In Deutschland gehört er unter die gemeinen Raubthiere, ohngeachtet ihn immer nachgestellt wird.

Er wohnt in Wäldern, Feldern und Häusern. In Häusern hat er seinen Aufenthalt auf niedrigen Böden, in Scheunen, und besonders gern in Holzhaufen. In den Wäldern wohnt er in hohlen Bäumen, und in der

Erde

Erde in alten Fuchsbauen, unter den Wurzeln der Bäume, in Löchern, die er findet, oder sich selbst gräbt, oder unter zusammengefallenen Holzhaufen. In Feldern sucht er an Teichen und Flüssen die hölzernen Verschläge der Ufer auf und verbirgt sich dahinter, oder gräbt selbst Höhlen in die Dämme, und hier hält er sich seiner Nahrung halber vorzüglich gern auf. Sonst trifft man ihn auch in dicken Hecken und Dornbüschen zwischen den Wurzeln und alten Stöcken eingegraben, und in verlassenen und solchen Hamsterbauen an, die er den Hamstern abjagt. Er untergräbt auch oftmals die Scheunen, Ställe und Keller, und wirft große Haufen, wie ein Hamster auf, wovon sein Name Hausunk herrührt. An solchen Orten verräth er sein Daseyn durch den üblen Geruch, den sein Harn und seine Exkremente von sich geben. Im Winter zieht er sich meist nach den Städten und Dörfern und besonders nach den Feldmühlen. Er klettert nicht mit so viel Geschick und Geschwindigkeit auf die Gebäude, wie der Marder, und besteigt nur selten die Bäume (bäumt).

Nahrung.

Der Iltis ist beynahe eben so gefräßig und räuberisch, aber nicht so kühn, wie der Marder. Er geht eben so, wie dieser, vorzüglich des Nachts auf den Raub aus, und würgt junge Gänse, alte und junge Enten, Hühner und Tauben, trägt sie fort und verzehrt sie ganz. Kömmt er in ein Hühner- oder Taubenhaus, so mordet er nicht, wie der grausamere Marder, alles darnieder sondern ergreift den ersten besten Einwohner, würgt ihn,

packt

packt ihn im Genicke an, und eilt mit ihm nach seinem Schlupfwinkel hin. Hühner- und andere Vogeleyer trägt er unbeschädigt zu ganzen Haufen in seine Wohnung zusammen. Mäusefleisch ist sein Hauptnahrungsmittel und er macht daher Sommer und Winter Jagd auf Maulwürfe, Hamster, Hausratten, Wanderratten, Wasserratten, Feld- und Hausmäuse; hascht auch Frösche, und sammelt sich davon einen großen Vorrath in seiner Höhle, wie man beym Nachgraben findet. Er frißt auch Gartenschnecken und Heuschrecken. Im Sommer streift er in den Feldern und Hölzern umher, um die Nester der Vögel, die auf der Erde nisten, als der Lerchen, wilden Enten, Wachteln, Fasanen, Auerhühner, Birkhühner, Haselhühner und Rebhühner aufzusuchen und zu plündern. Er gräbt sich auch in die Ställe und erwürgt die Kaninchen, durchnagt die Bienenstöcke oder wirft sie um, um den Honig zu genießen. Er geht auch fischen, besonders im Winter. Oft entfernt er sich dabey eine halbe Stunde weit von seiner Wohnung, und erlauert an den Bächen auf dem Eise und unter dem Eise, wie der Fischotter, die Fische, sonderlich die Forellen. Gewöhnlich aber muß er mit bloßen Mäusen, die unter dem Ufer wohnen, oder dahin kommen, um zu trinken, vorlieb nehmen.

Fortpflanzung.

Der Trieb zur Begattung tritt bey diesen Thieren in der zweyten Hälfte des Februars ein, und bricht bey den Männchen, deren zuweilen etliche bey einem Weibchen zusammentreffen, in einem fürchterlichen Schreyen

und Beißen aus. Das Weibchen trägt zwey Monate und wirft im April in seiner Höhle, am liebsten aber in Holz- und Reißighaufen in einem Neste von Stroh, Heu, oder Moos gewöhnlich vier, höchst selten sechs blinde Junge, die es sorgfältig säugt, ernährt und beschützt. Es ist oft dreiste genug bey einem ungewöhnlichen Geräusch vor seinem Schlupfwinkel, wo die Jungen liegen, hervorzugehen, und sich gegen seinen Feind zur Wehre zu stellen.

Um nicht entdeckt zu werden, trägt die Mutter die Losung ihrer Jungen weit von ihrem Lager weg, so wie auch die Alten selbst, wo möglich, sich ihres gräulich stinkenden Unraths nicht in der Nähe ihres gewöhnlichen Aufenthalts entledigen.

Die Jungen lassen sich zahm machen, und wenn man ihnen die Eckzähne raubt, und immer hinlängliche Nahrung reicht, thun sie am Hausgeflügel keinen Schaden *).

Feinde.

*) Ein Frauenzimmer in unserer Gegend, durch die schöne Farbe und das artige Betragen der kleinen jungen Iltisse gereizt, deren sie vier in einem Reißighaufen fand, nahm zwey Junge von denselben, und legte sie ihrer säugenden Katze an. Diese säugte und ernährte sie sorgfältig. Sie wuchsen und liefen mit ihrer Pflegemutter lange Zeit, ohne Schaden zu thun, umher. Nach Verfluß eines halben Jahres aber wirkte ihr mörderischer Naturtrieb auf einmal so stark in ihnen, daß sie in einer Nacht aus Scherz das

ganze

Feinde.

Man findet Bandwürmer, Blasenwürmer und Egelwürmer (Fasciola) in ihnen.

Die Hunde sind sehr auf sie erpicht.

Fang.

Man fängt die Iltisse in Tellerfallen, die man in ihre Gänge legt, und da sie nicht so vorsichtig, wie die Marder sind, nicht den feinen Geruch haben und durch alle Löcher und Ritzen kriechen, so fängt man sie auch um desto leichter. Hierinn beißen sie sich gern das gefangene Bein ab, und zwar ohngescheut, daß man zusehen kann, oder verscharren sich, wo sie können, mit der ganzen Falle, unter die Erde.

In Feldern und Wäldern geht man ihrer Fährte nach (Taf. XXII. Fig. 7.), welche sich entweder in zwey Paar Spuren neben einander ausdrückt, oder in einem Paar, das vorne und neben einander steht, und zwey einzelne Nachtritte von den Hinterfüßen hat, und eine ähnliche Figur mit der Hasenfährte macht. Diese Fahrte führt gewöhnlich zu ihrem Aufenthalte, aus welchem

ganze Hühnerhaus schlachteten. Die unschuldigen Iltisse (denn man hätte ihnen nur die Zähne ausbrechen und sie nicht so frey herumlaufen lassen sollen) wurden gleich den andern Morgen, da ihr Verbrechen bekannt wurde, beym Frühstücke zum Tode verurtheilt und ersäuft.

man sie, wenn er erhaben ist, jagt und erschießt, oder, wenn er in der Erde ist, gräbt. Hier trifft man sie oft, mit einem Kranze von todten Fröschen umlegt, an, welches einen sonderbaren Anblick gewähret.

Die gewöhnlichen Iltisfallen werden aus Bretern gemacht. Man schlägt drey Breter, wie einen Kasten viereckig zusammen, so daß eins der Boden wird und die zwey übrigen die Seitenbreter abgeben. Höhe und Breite derselben ist ein Fuß. Oben wird eine Leiste, drey Zoll breit, quer herüber genagelt, welche die Seitenbreter zusammenhält, und woran die Deckbreter stoßen, die auf beyden Seiten, so lang, als der Kasten ist, reichen müssen. Diese sind entweder oben auf der Leiste durch Riemen befestiget, oder an den Seitenbretern mit Zapfen so eingepaßt, daß sie sich leicht auf und nieder bewegen, und vorne sind die Vorfallbreter winkelrecht an ihnen befestiget, die den Kasten schließen, wenn inwendig die Zunge, welche mit Hühnereingeweiden, einem Eye, oder Vogel belegt, und mit zwey Leinen, die durch die Falldeckel gezogen und am Stellholze befestiget sind, wie eine Mäusefalle aufgestellt ist, berührt wird. Eine solche Falle setzt man auf ihre gewöhnlichen Gänge hin.

Sie werden auch in Schlagbäumen, wie die Marder, und in Drathschleifen, zwischen welchen an einem Gäbelchen ein Vogel hängt, gefangen.

Man umstellt auch ihre Höhlen, die man durch die Fährte im Schnee bemerkt, mit einem Iltisgarne,

das

das die Gestalt des Hasennetzes mit engern Maschen hat. Man sucht sie alsdenn durch verschiedene Mittel, durch Hunde und dergleichen aus diesen Höhlen in das Garn zu stöbern, und todt zu schlagen.

Endlich, da man bemerkt hat, daß diese Raubthiere einen natürlichen Abscheu gegen das Wetzen eiserner Instrumente auf Steinen haben, und auf solche Personen, die in der Gegend ihres Aufenthalts eine solche Handlung vornehmen, mit einem Katzenbuckel, funkelnden Augen, fletschenden Zähnen und gräßlichen Zischen und Knurren in voller Wuth losgehen, so kann man sich derselben auch auf diese Art bemächtigen, daß man sie durch Wetzen eines Messers auf einem Steine aus ihren Winkeln herauslockt, und erschießet oder todtschläget.

Wenn sie von Hunden angefallen werden, so suchen sie sich gegen diese Feinde nicht nur durch heftiges Beißen mit gräßlichem Geschrey, sondern auch durch Bepissen ins Gesicht zu vertheidigen.

Nutzen.

1) Als nützliche Raubthiere vertilgen sie die häufigen Feld- Haus- und Wassermäuse, Schnecken und Heuschrecken.

2) Ihr Fleisch, ob es gleich den Geschmack des Schwarzwildprets haben soll, und von dem Tschuwaschen gegessen wird, ist nur für den Liebhaber eßbar, und die Hunde verachten es sogar.

3) Der Balg verschafft, vier Wochen vor und nach Weihnachten, ein gutes Pelzwerk, indem sich die Haare nicht so leicht abtragen, wie der Füchse und Marder ihre, und auch sein Leder dicker ist. Doch wird er wegen seines üblen Geruchs, den er lange behält, wenn das Thier erzürnt oder in der Begattungszeit geschossen oder gefangen wird, seiner Güte ohngeachtet, nur als schlechtes Gebräme an die Mützen, Handschuhe und Müffe der Landleute, und selten als Zobel schwarz gefärbt zu Palatinen und Kleiderfutter gebraucht. Ein Hasenbalg ist jetzt theurer, als ein Iltisbalg.

4) Die schwarzen langen Haare, sonderlich des Schwanzes geben die besten Mahlerpinsel.

5) Der gezähmte Iltis wird, wie das Frettchen, auch gebraucht, die Kaninchen aus ihren Bauen zu jagen.

Schaden.

Der Schaden, den dieß Thier anrichtet, ist oben angegeben. Es ist ein gefährlicher Feind des Hausgeflügels. Die Kaninchen tödtet es, die Bienenstöcke ruinirt es, und in den Forellenbächen fischt es.

Aus den Wohnungen der Menschen ist es also zu verbannen; nicht so aus der freyen Natur, da es im Haushalte derselben durch Vertilgung so vieler schädlichen Säugethiere für den Landmann so vortheilhaft wirkt.

Vorurtheile.

In der Medicin brauchte man sonst das pulverisirte Blut, als ein schweißtreibendes Mittel, das Fett in gichterischen Anfallen und Steinschmerzen, und das Fleisch wider den Schlangenbiß.

(18) 24. Das Frett oder der Kaninchen-Iltis.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Furett, Frettele, Frettchen, wildes Wiesel, weißes Wiesel, Kaninchenwiesel, Kaninchenjäger, Frettmarder, Waldwiesel, gelbes Wiesel, wildes Iltiswiesel.

Mustela Furo. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 97. n. 8.

Furet ou Furet-putois *Buffon.* hist. nat. VII. 209. T. 25. 26. Ed. de Deuxp. II. t. 7. f. 1. 2. Ueberf. v. Martini IV. 178. 180. Taf. 64. 65.

Ferret. *Pennant* hist. of Quadr. II. 40. Meine Ueberf. II. S. 364.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 305.

v. Schrebers Säugeth. III. 488. Taf. 133.

Goeze's Fauna. I. 298.

Donndorfs zool. Beytr. I. 301. n. 8.

(Taf. V.)

Kennzeichen der Art.

Der Kopf ist schmal und läuft spitzig zu; der Leib ist lang und schlank; die Haare sind weißlichgelb, und der Stern im Auge roth.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses Thier wird in Deutschland, und auch in Thüringen wegen seines Nutzens, als ein zahmes Hausthier, erzogen. Seine Größe beträgt einen Fuß, vier Zoll, und der Schwanz ist etwas über die Hälfte des Leibes lang *). Die größte Aehnlichkeit hat es mit dem Iltis, außer daß der Leib etwas gestreckter, schlanker, der Kopf etwas schmäler, und die Schnauze etwas spitziger ist. Mir scheint es daher nach Gestalt, Verhältniß aller Theile, Bewegung des Körpers, Fortpflanzung u. d. gl. zu urtheilen, mehr eine weißliche Varietät des gemeinen Iltis zu seyn, die sich in ihren gezähmten Zustande und Farbe so fortpflanzt, wie die weißen zahmen Kaninchen mit rothen Augen. Der so lange unterhaltene gezähmte Zustand haben die kleinen Abweichungen in Gestalt, Farbe und Betragen zuwege gebracht. Wenn freylich Daubentons Beobachtung gegründet wäre, daß der Iltis nur vierzehn Rippen, das Frett aber funfzehn habe, welches auch der seelige Goeze so gefunden haben will, und daß im Brustbeine des letztern auch ein Knochen mehr sey, so wären dieß wesentliche Verschiedenheiten, die die Wahrscheinlichkeit meiner obigen Behauptung gar sehr einschränkten.

Er hat, wie der Iltis, 34 Zähne. Die Augen sind groß, trübe, und blaß- oder hellroth; die Ohren weit, und aufrecht; die Füße niedrig, und mit weißen Krallen versehen.

Die

*) Par. Ms.: Körper 1 Fuß 2 Zoll; Schwanz 7 Zoll.

Die Farbe ist im Grunde blaßgelb, und oben mit weiß überlaufen; doch leidet sie auch Abänderungen, so wie bey den andern Hausthieren, und es soll auch

1) Frette, besonders männliche geben, deren längere Rückenhaare, wie am Iltis, an den Spitzen kastanienbraun sind, und die am Kopfe weiße Zeichnung haben, auch

2) schäckige.

Das Weibchen ist merklich kleiner, als das Männchen.

Merkwürdige Eigenschaften.

Es ist ein gelehriges, aber zorniges Thier, hat ein feuriges Auge, große Leichtigkeit in seinen Bewegungen, viele Stärke, lernt aber seinen Herrn schwer kennen, schläft oft und tief, und riecht, besonders im Affecte, stark nach Bisam, und murrt.

Wo sich diese Thiere nicht viel Bewegung machen können, da sind sie schläfrig und träge; wo sie aber einen größern Spielraum haben, da sind sie munter, necken sich, beißen und zanken um einen lebendig hingeworfenen Raub, und da zeigen denn ihre Sitten, daß sie mit dem gemeinen Iltis sehr nahe verwandt sind.

Wenn sie gut gewartet werden, so leben sie 12 bis 14 Jahre.

Aufenthalt.

Ihr ursprüngliches Vaterland soll Afrika seyn, wo man sie Nimse heißt *). Von da sind sie nach Spanien und dann in das übrige Europa gebracht worden; denn sie werden jetzt in allen gemäßigten Ländern desselben, wo es wilde Kaninchen giebt, gefunden. Man hält sie paarweise in Tonnen, Kisten und Gittern, worin man ihnen ein Lager von Heu, Stroh oder Werch bereitet. Hat man mehrere, so giebt man ihnen ein Zimmer ein, in welches man einzelne kleine Verschläge macht, worin die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen. Da sie bloße Hausthiere sind, so können sie im Winter nicht in der freyen Luft aushalten und müssen daher in gemäßigt gewärmte Stuben gebracht werden.

Nahrung.

Man füttert dieß zahme Thier gewöhnlich mit Semmel, Brod, Kleye und Milch, und es frißt sehr viel; denn es schläft entweder oder frißt. Von dieser Fütterungsart aber sollen die häufigen Klagen kommen, daß sie so schwer fortzubringen sind, denn sie bekommen sehr oft den Durchfall und sterben. Um dieß zu vermeiden und sie besonders raubbegieriger zu machen, giebt man ihnen denn lieber Fleisch von Tauben, und andern Vögeln, von Kaninchen und auch Kalbfleisch. Um die Jagdlust bey denselben zu unterhalten, läßt man zuweilen ein Kaninchen oder einen Vogel zu ihnen, welchen sie jagen, fangen und dem sie das Blut aussaugen. Merkwürdig ist, daß sie

auf

*) Shaws Reisen. S. 173.

auf den Guß von Blut gleich sehr böse werden, und man sich alsdann vor ihnen in Acht zu nehmen hat. Wie erpicht sie auf Kaninchen sind, kann man daraus sehen, daß sie sich, wenn man sie im Schlafe aufweckt, gar nicht nach einen vorgehaltenen Vogel umsehen, dahingegen nach einem Kaninchen mit halbverschlossenen Augen greifen und dasselbe gleich würgen.

In der Wildniß sollen sie kleine vierfüßige Thiere, Fische, Vögel, Schlangen und Honig, verzehren. Im gezähmten Zustande schadet ihnen der Honig, und sie sterben sogar davon. Sie fassen ihren Raub, besonders die Kaninchen, gewöhnlich beym Halse, seltener bey der Nase, und wissen ihnen das Blut sehr geschickt auszusaugen.

Fortpflanzung.

Das Frett begattet sich bey uns zweymal im Jahre. Das Weibchen sucht in der Brunst sehr begierig die Gesellschafft des Männchens, trägt 6 Wochen, und bringt gewöhnlich 5 und 6, doch auch 7 bis 9 blinde Junge zur Welt, die es zuweilen gleich wieder verzehrt.

Das trächtige Weibchen wird von den andern so wie zur Setzzeit von dem Männchen abgesondert, und in einen der oben erwähnten Verschläge gesteckt, der mit Heu ausgefüttert ist. Die Jungen öffnen die Augen nach 14 Tagen, auch wohl erst nach 3 bis 6 Wochen. Man kann sie vier Wochen bey der Mutter lassen, alsdann aber wegnehmen mit Semmeln und Milch auffüttern

tern, und sie dann von der sechsten Woche an Fleischnahrung gewöhnen. Hat man mehrere, so läßt man sie sechs Wochen lang bey der Mutter im Verschlage, alsdann thut man sie wieder heraus zur andern Gesellschaft, wo sie sich von selbst an der Alten gewöhnliches Futter gewöhnen.

Es soll sich auch mit dem Iltis vermischen, und eine braunhäärige Bastartart hervorbringen, die besonders die Engländer sehr lieben. In Deutschland liebt man diese Bastartzucht nicht; denn sie werden nicht so zahm und frettiren nicht so gut. Vielleicht liegt der Grund von beyden in der verschiedenen Behandlungsart.

Krankheiten.

Sie bekommen den Durchfall oft so stark, daß er in eine Art von Ruhr ausartet. Ich weiß keine Curart dafür. Vielleicht daß die Mittel, welche ich oben beym Durchfall der Hunde angegeben habe, helfen. Nur muß man, wie es sich von selbst versteht, eine geringere Portion nehmen.

Sie sterben auch zuweilen an der Auszehrung.

Feinde.

Auf dem Balge findet man zuweilen gelbe Erd-Milben (Acarus.)

Nutzen.

Bey uns schränkt sich der Nutzen dieser Thiere bloß auf die Kaninchenjagd oder auf das Frettiren ein,

da

da man sie in den Bau dieser unterirrdischen Bewohner mit einem Schellchen am Halse, um diesen eine desto grössere Furcht einzujagen, schicket, und letztere in vorgestellte Netze, die man Hauben nennt, laufen läßt. Sie sind die natürlichen Feinde derselben, und diese werden daher auch bey ihrem nahen Anblicke mit einer solchen Furcht befallen, daß sie sich gleich, ohne auf Rettung zu denken, ergeben.

Man versieht auch diejenigen, von welchen man weiß, daß sie die Kaninchen gern in ihren Höhlen fressen, mit Maulkörben, die vorn eine scharfe Spitze haben, durch deren Berührung jene Thiere vor ihnen hinfliehen.

Den Gebrauch mit diesen Thieren zu frettiren, war schon den Alten bekannt *).

In Frankreich hat man sie gewöhnt, die Vogelnester mit ihnen ausnehmen zu können.

Schaden.

Sie fangen allerhand nützliche Thiere und saugen ihnen das Blut aus.

*) Plinius hist. nat. Lib. VIII. §. 81. (Uebers. von Grosse II. 343.)

(19) 25. Das große Wiesel.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Rothes, braunes, graues, Feld- und Waldwiesel, Wiesel mit schwarzer Schwanzspitze; in seiner nördlichen Winterkleidung: Hermelin, Hermelinwiesel, Königswiesel, und weißes Wiesel mit schwarzer Schwanzspitze.

Mustela Erminea. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 98. n. 10.

Rosalet et Hermine. *Buffon* hist. nat. VII. 240. t. 31. f. 1. t. 29. f. 2. Ed. de Deuxp. II. T. 8. f. 3. T. 7. f. 4. Ueberf. von Martini IV. 196. Taf. 67.

Stoat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 35. Meine Ueberf. II. p. 559.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 243. 245.

v. Schrebers Säugeth. III. 496. Taf. 137. A. B.

Goeze's Fauna. I. 306.

Donndorfs zool. Beytr. I. 305.

Ridingers jagdb. Thiere. Taf. 19.

Kennzeichen der Art.

Die Farbe ist braunroth; in kalten Gegenden im Winter weiß; die Schwanzspitze aber jederzeit schwarz.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Bau dieses schädlichen Thieres ist geschmeidig und schlank; der dicke Kopf und lange Hals verunstaltet aber seine übrige Schönheit. Sein Gesicht hat außerordentlich muntere Züge, so wie sein ganzes Betragen munter und keck ist. Die größte Größe des Körpers beträgt 1 Fuß und 2 Zoll, des Schwanzes 6 Zoll, und die Höhe 2 1/2 Zoll *).

Der zwey Zoll lange Kopf ist so dick, als der Leib, und läuft erst kurz vor dem Mund spitzig zu. Der obere Kiefer ragt über den untern hervor. Die Nase ist stumpf und gefurcht; der Mund weit offen und mit einem nach der Seite herabhängenden Knebelbarte besetzt. In beyden Kinnladen stehen vorne sechs Vorderzähne, wovon die obern keilförmig, die untern aber breite Schneidezähne sind, deren zweyter ganz inwendig außer der Reihe liegt. Vier Eckzähne, wovon die untern zwey besonders sehr lang und eingekrümmt sind. Oben vier Backenzähne auf jeder Seite. Die vordern zwey sind sehr klein, einspitzig und dreyeckig, der zweyte ist groß und

*) Par. Maas: Länge des Körpers etwas über 1 Fuß; Schwanz 5 Zoll.

und bildet eine lange scharfe Wand, und der vierte ist ein kleiner runder wahrer Backenzahn. In der untern Kinnlade stehen fünf Backenzähne, wovon die zwey vordern klein sind und vorwärts liegen, der dritte gerade und spitzig, der vierte lang und scharfkantig, und der fünfte ein wahrer Backenzahn ist. Die Zunge ist glatt und gefurcht. Die Augen sind klein, schwarz, funkelnd, stehen weit vorne im Gesicht, und sind sowohl vor dem innern Augenwinkel, als über dem obern Augenliede mit langen Bartborsten versehen. Die fast glatten Ohrlappen sind kurz, breit, abgerundet, durch eine auswärtsliegende Falte gleichsam verdoppelt und fest am Kopf anliegend. Die Ohren, deren innere Höhle sehr weit, und mit einigen sehr merklichen Hervorragungen versehen ist, stehen weit von den Augen ab und etwas niedriger. Der Hals ist lang, proportionirter im Verhältniß gegen den Körper, als am Marder, kaum dünner, als der Kopf und Leib, und erhebt sich vorwärts unmerklich. Der Leib ist von einerley Dicke, läuft gerade aus, und steht nur bey den Hinterschenkeln etwas erhabener. Durch dieß Verhältniß des Körpers gegen den Kopf ist das Thier im Stande durch alle Klüfte und Ritzen zu schlüpfen, durch welche es den Kopf durchpressen kann. Den abgestumpften Schwanz trägt es, wenn es ruhig geht, gerade aus, in der Flucht aber auswärts gewölbt. Die Beine sind kurz, die Füße fünfzehig, scharfnägelig, und der Daumen an den Hinterfüßen ist kurz und versteckt. Die unter dem After liegende Bisamdrüschen verbreiten ihren unangenehmen Geruch sehr weit.

Die Haare des Körpers sind kürzer, als beym Marder und Iltis, und nur der Schwanz endigt sich in einen langen Haarbüschel.

Die Farbe ist bey diesem Wiesel sehr verschieden.

Die gewöhnlichste der obern Fläche des Körpers bis zu den Füßen ist die dunkel gelbbraune, graubraune, leberfarbene oder karmelete, die sich in den drey Sommermonaten, wenn sich die Stachelhaare verlieren, und die Haarspitzen abgestoßen sind, ins schmutzig gelbrothe oder fuchsrothe verwandelt. Der Grund ist immer röthlichweiß. Der Unterleib ist gelb oder weiß; die vordern Fußzehen und das Kinn sind allezeit weiß; die Ohrkanten und Hinterfüße aber nicht immer. Beynahe die ganze äußerste Hälfte des Schwanzes ist schwarz. Der Kopf hat immer eine dunklere Farbe, als der Rükken, die Schnauze ist schwärzlich, und der Bart gelb, weiß und schwarz.

Eine andere große Verschiedenheit in der Farbe macht das weiße große Wiesel. Es wird Sommer und Winter ohne merkliche Veränderung, wenn wir nicht das gelbliche des abgenutzten Balges in den heißesten Sommertagen so nennen wollen, schneeweiß gefunden, hat nur die schwarze Schwanzspitze und ist zuweilen am Kopfe, Brust und Schnauze mit einem schwärzlichen Strich oder Punkt gezeichnet.

Diese beyden Hauptvarietäten, welche in nichts, als in der Farbe, von einander abweichen, begat-

ten sich nun unter einander, und daher entsteht dann die große Mannichfaltigkeit in Rücksicht der Farbe der Wiesel. Man findet nämlich Wiesel, die außer einem braunen Streifen über dem Rücken und der schwarzen Schwanzspitze ganz weiß sind (s. Taf. VI.); andere, deren Rücken hellfuchsroth, und der ganze Unterleib, die Kehle zuweilen ausgenommen, hochschwefelgelb ist; wieder andere, deren dunkler Oberleib von dem hellen Unterleibe durch einen schwefelgelben Streifen geschieden ist; noch andere, welche am Kopfe etliche schwärzliche oder braune Striche in Gestalt eines Kreuzes, und am Ende des Rückens einen Streifen von eben der Farbe haben, und sonst weiß sind; und zuletzt auch geschäckte *).

Man

*) Die Farbe ist wie bey unsern Eichhorn verschieden. Man merke hier wohl, daß dieß Sommer- und Winterfarbe des Wiesels ist, und daß wenigstens in Thüringen die große Verwandelung der Farbe aus dem braunen ins weiße, wenn man sie in Norden gewahr wird, so wie bey allen hiesigen Thieren, also auch bey den Wieseln im Winter der Regel nach nicht statt findet. Die schwarzen Eichhörnchen sind Sommer und Winter schwarz, und die fuchsrothen Sommer und Winter fuchsroth, und eben so sind zu allen Jahrszeiten die braunen Wiesel braun und die weißen weiß, wenn man die kleinen Abweichungen, die in der Häärung vor sich gehen, abrechnet. Da diese Thiere vor dem Thüringerwalde nicht selten sind, so kann man diese Beobachtungen beständig machen. Es ist bey uns nichts ungewöhnliches, daß die Ackerleute im Frühjahr und Sommer ganze Nester von weißen jungen Wieseln, wenn sie weiße Eltern haben, und von gemischter

Far-

Man hat auch ein aschgraues auf der Elbingischen Höhe in Preußen entdeckt. Auch Hallen (Naturgeschichte 1r Thl. S. 462.) beschreibt ein verkehrtes Hermelin. Es ist durchgehends schwarz mit einem weißen Schwanze. Gerade umgekehrt, als beym Hermelin.

Die Weibchen scheinen einen etwas schlankern Körperbau, dünnern, spitzigern Kopf zu haben, und sind auf jeder Seite des Bauches mit fünf Säugwarzen versehen.

Zergliederung.

Die Leber ist blaß, mit sieben Lappen. Die Gallenblase sehr klein. Die Gebärmutter fast wie bey einer Katze. An beyden Seiten vierzehn Rippen. Das Rückgrad hat 16 Wirbel, daher die große Gelenkigkeit und Biegsamkeit.

Merkwürdige Eigenschaften.

Das Naturel dieser Thiere ist munter, furchtsam und grausam. Alle ihre Handlungen verrichten sie mit

Farbe, wenn die Eltern von verschiedener Couleur sind, ausackern, und es begegnen dem, der im Thüringerwalde an den Waldbächen, die sich durch Wiesen schlängeln, hingeht, Sommer und Winter rothe, braune, weiße und nach den oben angegebenen Farben gezeichnete Wieseln.

ungemeiner Schnelligkeit und Gewandtheit. Sie ersteigen die Bäume so geschickt, wie die Eichhörnchen, und können an geraden Wänden hinauf laufen. Durch alle Ritzen, welche ihrem Kopfe nicht zu enge sind, können sie kriechen. Sie schwimmen mit großer Leichtigkeit über Bäche und Flüsse, die ihnen auf ihren Wegen aufstoßen. Sie spielen gern entweder allein mit lebendigem Raube, indem sie ihn loslassen und wieder fangen, oder mit ihres Gleichen, indem sie sich aus einer Höhle in die andere, oder von einem niedrigen Baume, z. B. Weidenbaume, zum andern jagen, und machen Männchen, wie die Hasen. Mit den Raben leben sie in Antipathie, und werden von ihnen, wenn sie sich sehen lassen, mit großem Geschrey verfolgt. Sie quicksen fast wie die Spitzmäuse.

Ihr Leben soll nicht länger als sechs Jahre dauern.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Wieseln halten sich in Wäldern und Feldern auf. In Wäldern findet man sie ohne Unterschied der Holzart in den Gegenden, wo Flüsse und Bäche durchlaufen, und Wiesen oder leere Haiden in der Nähe sind *). Sie wohnen da in den trocknen Ufern, in hohlen Bäumen, in Felsen- Stein- und Erdklüften, und auf den Wiesen und Haiden in Maulwurfsbauen. Im Felde findet man sie ebenfalls mehr an den Ufern der Flüsse. Sie lieben vorzüglich die Ufer, welche mit hohlen

*) Doch vorzüglich in Birkenwäldern.

len Weidenbäumen besetzt sind, und schlagen in jenen sowohl, als in diesen ihre Wohnung auf. Doch findet man sie auch in den Wiesen und Rainen der Aecker, wo sie die Maulwürfe und Erdwölfe aus ihren Höhlen vertreiben, und sich dieselben nach ihrer Bequemlichkeit erweitern und einrichten. Eine solche Wohnung hat denn wenigstens vier Eingänge, die in der Mitte zu einem erweiterten Platze führen, der mit Moos, Gras und anderm Geniste ausgefüttert, und das Schlafgemach ist. Man trifft sie auch in alten Mauern, Steinhaufen, und in den hohlen Stämmen und Aesten der einzelnen Feldobstbäume an.

Im Winter besuchen sie zuweilen die Wohnungen der Menschen, und halten sich in Scheunen, Ställen und Kellern auf, seltner aber im Sommer, die Gebäude müßten denn alt seyn und einzeln im Felde und Walde liegen.

Wenn sie in Hühner- und andern Ställen, in Kellern u. s. w. zuweilen Haufen Erde aufwerfen, so hält sie der abergläubische Landmann für Hausunken. Sie gehen aber alsdann gewöhnlich den Hühnern und dergl. nach.

Nahrung.

Diese Thiere nähren sich vorzüglich von den verschiedenen großen und kleinen Mäusearten. Die Wasserratten, der Maulwurf und die Wanderratte haben einen großen Feind an ihnen; sie suchen nicht allein ihre Ne-

ster auf und verzehren die Jungen, sondern fangen auch die Alten. Sie sind große Liebhaber von Eyern, und saufen sie daher den Haus- Auer- Birk- Hasel- und Rebhühnern, Fasanen, Tauben und vielen andern Vögeln aus. Sie erklettern in dieser Absicht die Vogelnester auf den Bäumen und Sträuchern und können sehr geschickt von einen zum andern springen. Die Eyer tragen sie unter dem Kinne weg. Allein sie begnügen sich nicht allein mit den Eyern, sondern rauben auch die Jungen; ja sie erschleichen die alten Vögel, als Hühner, Tauben, Rebhühner, Wachteln, Lerchen, Auerhühner, Birkhühner u. dgl. im Schlaf, fassen und tödten sie im Genicke und saugen ihnen das Blut aus. Junge und alte Hasen und Kaninchen, ja sogar junge Rehe werden von ihnen im Schlaf angefallen. Sie beißen sich im Genicke ein, das Thier läuft wie wüthend mit ihnen davon, bis es ermüdet hinsinken muß; der kleine Feind durchfrißt ihm die Halsflechsen und tödtet es auf diese Art *). Die Beute, die ihnen nicht zu schwer ist, tragen sie in ihre Wohnung. Sie fressen auch Fische und Pilze, aber keine andern Gewächse.

An stillen einsamen Orten gehen sie am Tage, so wie des Nachts ihrem Raube nach; an unsichern aber vorzüglich in der Abend- und Morgendämmerung, und bey Mondenschein die ganze Nacht hindurch.

Fort-

*) Vor etlichen Jahren sahe ein Förster auf dem Thüringerwalde einen solchen besondern Auftritt mit einem jungen Rehe.

Fortpflanzung.

Es scheint, als wenn sie, wider die Gewohnheit der Raubthiere, paarweise lebten, denn man findet in einem gewissen Distrikte fast nur immer ein Männchen und ein Weibchen. Die Zeit der Begattung (Ranzen, Laufen) ist im März. Die Mutter trägt ohngefähr fünf Wochen, und bringt im April und Anfang des Mayes drey bis acht Junge zur Welt. Sie bereitet sich in einem hohlen Baume, in einer leeren Maulwurfs- oder Wasserrattenwohnung, oder in einer andern Kluft ein Wochenbett von Wolle, Federn, Moos und Gras. Die Jungen sind neun Tage blind und die Mutter verläßt sie unter vier Monaten nicht. Sie trägt dieselben bey bemerkter Gefahr von einem Orte zum andern, und lehrt sie an lebendigen kleinen Thieren, welches mehrentheils Mäuse sind, ihren Raub fangen und tödten. Die Jungen vertreiben sich lange die Zeit mit einer lebendigen Maus, die ihnen ihre Mutter gebracht hat, ehe sie ihr den tödtlichen Biß versetzen, und man findet fast immer eine oder etliche Mäuse, wenn man ein Nest mit jungen Wieseln zerstöhrt, welche noch leben und ihre Freyheit wieder erlangen. Wenn sie den Stöhrungen der Menschen, Hunde oder Katzen nicht ausgesetzt sind, und z. B. in den hohlen Aesten eines alten Baumes liegen, so lassen sie sich die Wartung ihrer Mutter so lange gefallen, bis sie ihr fast an Größe gleich sind, und nehmen nur zuweilen kleine Spatziergänge und Spiele auf ihrem Baume oder in ihrer Nachbarschaft vor.

Sie lassen sich zähmen. Mein Freund, der Hr. D. Vognetz zu Waltershausen, zähmte einmal ein weißes Wiesel auf folgende Art. Er sperrte es anfangs in eine Kammer ein, allein es fraß nicht nur nichts, sondern blieb auch so wild wie vorher. Er versuchte allerhand Mittel, allein keins wollte anschlagen; bis er endlich auf den Einfall kam, ihm die Zahnspitzen abzufeilen, so daß es gar nicht beißen konnte. Sobald dieß geschehen war, verließ es seine Wildheit, fraß, und fraß sogar zuletzt bloß Weizenkleyen und Milch, womit auch eine Ringelnatter gefüttert wurde. Es war so zahm, daß er es mit in den Garten und spatzieren nahm und laufen ließ. Sobald er es rief, kam es wieder zu ihm, ließ sich nehmen, er steckte es in die Tasche und es versuchte nie wieder herauszugehen. Gegen Fremde aber bezeigte es sich eben so wild, wie sonst. Es blieb Sommer und Winter weiß, härte sich aber, wie gewöhnlich.

Feinde.

Ihre größten Verfolger sind die wilde und zahme Katze und unter den Hunden vorzüglich der Spitz.

Fang.

Ein Hauswirth kann diese unangenehmen Gäste, die zuweilen im Winter seinen Taubenschlag und Hühnerhaus besuchen, an der Fährte spüren (Taf. XXII. Fig. 5. a.), welche sich in der Flucht in zwey und zwey Fußstapfen neben einander, wie beym Marder, oder in ihrem springenden Gange in drey sichtbaren Spuren

aus-

ausdrückt, wovon eine fast in der Mitte nachstehet, und mit den vordern zweyen gleichsam ein Dreyeck bildet.

Die Hunde entdecken ihren Aufenthalt leicht wegen ihres und ihrer Exkremente Bisamgeruch. Man hetzt ihnen auch dieselben an; allein es müssen gute Hunde seyn, die sie angehen sollen, so heftig beißen sie um sich.

Vor ihre Schlupfwinkel legt man ihnen Fallen und Schlingen. Die Tellerfallen körnt man mit gewelktem Obst, das in Honig gekocht ist, und die Schnellfallen mit einem Ey oder Vogel. Wenn man den Ort ihres Aufenthalts weiß, so können sie auch mit der Flinte, besonders zur Zeit der Begattung, wo sie beständig vor ihren Höhlen spielen, erlegt werden.

Wenn man ihnen wie eine Maus vor der Höhle pfeift, so kommen sie eiligst hervor, und man kann sie so am leichtesten erlegen.

Will man ihre Vertilgung blos ihrer Schädlichkeit halber, so darf man nur ein Ey nehmen, dasselbe mit Gift, als Queckſilbersublimat füllen, und an den Ort legen, wo man sie gespürt hat, oder man verstopft auch, wenn man ihren Erdbau weiß, alle Ein- und Ausgänge außer einen, der am höchsten liegt, und ersäuft sie mit Wasser, das man hineinschüttet.

Nutzen.

1) In der Natur tragen sie als Raubthiere sehr vieles bey, das Gleichgewicht unter den Mäusen und Maulwürfen, die eine so starke Vermehrung haben, zu erhalten.

In Norwegen sollen sie den schlafenden Bären in die Ohren kriechen, und sich so fest einbeißen, daß sie nicht abgeworfen werden können; diese fangen alsdann an, wie wüthend herum zu laufen, und stürzen zuletzt abgemattet und schwach zur Erde hin, und sterben.

2) Der Balg der rothbraunen wird kaum zu Unterfutter benutzt, desto kostbarer aber ist der Balg der weißen. Allein von den Thüringischen und Deutschen weißen Wieseln bekommt ihn der Kürschner nur selten zu seiner Bearbeitung als Pelzwerk, indem er von den Landsleuten zur Vertreibung des Geschwulstes, besonders an den Eutern der Kühe, und bey schwindenden Gliedern, wie man sagt, mit dem besten Erfolg gebraucht wird. Die mehresten und besten Hermelinfelle kommen aus Rußland, Sibirien, Norwegen, Lappland, und dem hintersten Litthauen, und der Zimmer kostet 24 bis 30 Thaler. Je größer, weißer, dichter von Haaren und stärker von Leder sie sind, desto höher ist ihr Werth. Die Engländer und Holländer treiben in Europa den stärksten Handel damit. Sie werden zu Unterfutter, Palatins, Handschuhen, Müffen, Aufschlägen und Pelzen verarbeitet, und unter letztern sind die kostbarsten diejenigen, welche aus Hermelinschwänzen zusammengesetzt

setzt sind. Es ist dieß eine fürstliche Tracht. Schade, daß dieß Pelzwerk mit der Zeit ins gelbliche verschießt.

3) Das Fett gebrauchen die Thüringer Waldbewohner zur Erweichung der Geschwüre und Vertreibung des Geschwulstes.

Schaden.

Dieser ergiebt sich aus ihrer Nahrung.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Die Alten glaubten nach Plinius Erzählung, daß dieß Wiesel täglich sein Nest verändere und die Jungen weiter trage.

2) Das Anhauchen der Wieseln soll für Menschen und Thiere giftig seyn und Entzündungen, Geschwulst und andere böße Zufälle verursachen.

3) Ein sonderbares sympathetisches Arzeneymittel sind diese weißen Felle den Tataren um Ust-Kemtschuk wider alle Krankheiten. Der Kam oder Priester trägt ein solches Fell, das metallene Augen hat, bey dem Kranken um den Hals und trommelt dabey beständig sehr heftig. Dieß allein hält man schon für hinlänglich den Kranken zu heilen.

(20) 26. Das kleine Wiesel.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Gemeines Wiesel, kleines gemeines Wiesel, Haus- und Speicherwiesel, lichtbraunes, röthliches Wiesel, Heermännchen und Wieselmarder; im Norden, wo es im Winter weiß wird: Schneewiesel, kleines weißes Wiesel, Hermelinchen und Härmlein.

Mustela vulgaris. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 99. n. 11.

Belette. *Buffon* hist. nat. VII. 225. T. 29. f. 1. Ed. de Deuxp. II. T. 8. f. 2. Ueberf. von Martini IV. 186. Taf. 66.

Commón Weesel. *Pennant* hist. of Quadr. 33. Meine Ueberf. II. p. 357.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 243.

v. Schrebers Säugeth. III. 498. Taf. 138.

Goeze's Fauna I. 316.

Donndorfs zool. Beytr. I. 308. Nr. 11.

Ridingers kleine Thiere. Taf. 89.

Meine getreuen Abbildung. naturh. Gegenst. 38 Hundert. Taf. 42.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist mit dem gelbröthlich braunen Oberleibe, der im Winter im kalten Norden weiß wird, einfarbig und ohne Haarbüschel.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses Thier unterscheidet sich von jenem bloß in Ansehung der Größe, und in der Form und Kürze des Schwanzes merklich. Seine Länge beträgt sieben Zoll. Der Schwanz hält einen und drey Viertel Zoll und die Höhe anderthalb Zoll *).

Der halbe Zoll lange Kopf hat mit dem Halse und Leibe fast einerley Dicke und ist etwas platt gedruckt. Der Mund hat dasselbe scharfe Gebiß, wie das vorhergehende Wiesel. Die Ohren, welche kurz, breit, abgerundet, nach außen zu am Rande umgebogen, und nach unten zu mit einer vertieften Falte versehen sind, stehen tief, in der Mitte des Kopfes und weit entfernt von den kleinen schiefliegenden schwarzbraunen glänzenden Augen. Der Hals ist lang und dick, und steht mehr in die Höhe, als bey dem großen Wiesel. Der Leib läuft gerade aus. Der Schwanz ist kurz, und wird von der Wurzel an immer spizziger ohne einen merklichen Haarbüschel. Die Beine sind sehr kurz, dünne, und die Füßchen zart mit scharfen Nägeln bewaffnet. Unter dem Aster befinden sich zwey Drüschen,

*) Par. Ms. Körper 6 Zoll 3 Linien; Schwanz 1 Zoll 7 Linien; Höhe 1 Zoll 5 Linien.

chen, die keinen so unangenehmen, aber einen viel stärkern Bisamgeruch von sich geben, als bey dem großen Wiesel.

Der ganze Oberleib mit den Beinen und Füßen hat eine gelbrothbraune Farbe, manchmal etwas dunkler, ins Graue sich ziehend, manchmal etwas heller; im Sommer ist sie allezeit heller, schmutzig fuchsroth, zuweilen rothgelb. Der Grund ist röthlich aschgrau. Vom Rande des Oberkiefers an bis zu den Hinterschenkeln ist der Unterleib schneeweiß, und zwar an dem Halse und der Brust breiter, als am Bauche. Hinter jedem Mundwinkel steht ein kleiner eyrunder Flecken im weißen, der die Farbe des Rükkens hat, und dergleichen Punkte finden sich auch oft am Bauche. Die Barthaare, die am Rande der obern Kinnlade und vor und über den Augen stehen, sind gemischt weiß und braun *).

Das Weibchen scheint durch nichts merklich vom Männchen unterschieden zu seyn. Es hat acht Säugwarzen.

Besondere Eigenschaften.

Diese Thierchen sind sehr munter und flüchtig. Bey ihrem schnellen Laufe ist der Kopf beständig in Bewegung nach allen Seiten hin. Sie klettern so geschickt wie die Eichhörner und schwimmen auch gut, durchkriechen und durchsuchen alles, alle Winkel und Löcher, die ihnen aufstoßen.

*) Ganz weiße Heermännchen sind meines Wissens niemals in Thüringen angetroffen worden. Im Norden wird dieß Wiesel im Winter schneeweiß, daher der Name Schneewiesel (Mustela nivalis, Lin.)

ßen. In der Angst lassen sie einen heisern, quickſenden Ton von sich hören.

Sie sollen das Alter der vorhergehenden Art erreichen.

Verbreitung und Aufenthalt.

Sie bewohnen die meisten Theile von Europa, gehen in Asien bis nach Kamtschatka hinauf und bis nach Persien herab, in Amerika trifft man sie bis Hudsonsbay an, und auch in der Barbarey sind sie zu Hause.

Sie halten sich mehr und lieber in Gebäuden auf, als die großen Wieseln. Man findet sie daher mehrentheils in den Klüften der alten Mauern, auf den Böden zwischen den Wälden, in Kellern, Scheunen und Ställen. Doch werden sie auch nahe an Dörfern und Städten in Hecken, Steinhaufen, Steinbrüchen, unter hohlen Ufern, unter hohlliegenden Baumwurzeln, in hohlen Baumstämmen, und in den Maulwurfshöhlen angetroffen.

Im Winter begeben sie sich mehrentheils alle nach den Wohnungen der Menschen, und es ist merkwürdig, daß sie alsdann gern die Abzüge der Häuser beziehen, vielleicht, weil sie sich hier am sichersten fühlen.

Nahrung.

Dieses kleine Wiesel ist fast eben so raubsüchtig, als das große. Es ist ein vorzüglich gefährlicher Feind für die alten und jungen Tauben und die Küchlein. Die jungen

gen Tauben, Hühner und andere Vögel trägt es mit sich fort, wenn es dieselben todtgebissen hat, den alten saugt es mehrentheils nur bloß das Blut aus, und läßt sie alsdann liegen.

Es scheint, als wenn dieß Raubthier die große Halsschlagader sehr genau zu treffen wüßte, denn man findet an einer von ihm getödteten Taube weder Quetschung noch Wunde, außer den vier Löchelchen von den Eckzähnen, die kaum merklich sind. Es säuft nicht allein den Hühnern und Tauben, sondern auch allen Vögeln, zu deren Neste es gelangen kann, die Eyer aus. Die kleinern trägt es einzeln unter dem Kinne fort in seine Höhle, und von den größern sättiget es sich auf der Stelle. Haus- Wald- und Feldmäuse, Wasserratten, Maulwürfe, Wander- und Hausrattenköpfe sind seine vorzüglichsten Speisen. Die Maulwürfe und Wasserratten sucht es, vermöge seines feinen Geruchs, in ihren Löchern auf und tödtet sie; daher es auch oft in den aufgestellten Maulwurfsfallen gefangen wird. Es soll auch die Bruchschlangen (Blindschleichen), Eidechsen und Frösche gern fressen. Es geht mehr des Nachts als am Tage seinem Raube nach, und fängt daher die kleinen Vögel, die sich sicher auf ihrem Aste glauben, im Schlafe.

Fortpflanzung.

Sie begatten sich in der letzten Hälfte des Märzmonates. Die Wieselmutter trägt ohngefähr 5 Wochen, und bringt auf einem Bette, das sie sich aus Heu, Laub, Moos und andern weichen Materialien verfertiget, in einem jun-

zu-

zugänglichen Winkel *), in einem hohlen Baume u. s. w. ihre blinden Jungen zur Welt, deren mehrentheils fünfe sind. Sie trägt dieselben am Halse, wenn sie Gefahr ahndet, aus einem Winkel in den andern, säugt sie lange, und ernährt sie alsdann noch etliche Monate mit Haus- Wald- und Feldmäusen, die sie ihnen lebendig bringt. Sie sehen mehr grau, als roth aus, und können gezähmt werden.

Feinde.

Die Katzen und Hunde verfolgen diese Thiere; auch mehrere Raubvögel und die weißen Störche gehören zu ihren Feinden.

Fang.

Ihre Fährte (Taf. XXII. Fig. 5. b.) machen sie der vorhergehenden Art vollkommen gleich, nur kleiner.

Man fängt sie in den kleinen eisernen Mäusefallen mit Biegeln, an welche man eine Maus, einen Vogel, oder eine abgekochte gewelkte Pflaume heftet. Sie sind auf ihren Raub so erbittert, daß man sie oft mit einer Maus im Munde fängt, welche sie ohngeachtet ihres Schmerzes nicht fahren lassen, sondern bis in Todt festhalten.

Da

*) Ein Bauer fand einmal drey Junge in den hohlen Wanste eines an einem Baume aufgehangenen Wolfes, der schon in Fäulniß übergegangen war.

Da sie außer ihrer Fortpflanzungszeit selten am Tage ausgehen, so kann man sie auch nur während derselben mit der Flinte erlauern.

Nützen.

Den größten Nutzen leisten sie in Vertilgung der verschiedenen Mäusearten und der Maulwürfe. Außerdem wird nur ihr Fleisch von den Mexicanern genossen, und den Balg benutzt kaum der Kürschner bey uns zu Unterfutter, die Russen aber verkaufen ihn an die Chinesen; sonst wird nichts von ihnen gebraucht.

Schaden.

Den Schaden, welchen sie stiften, sieht man aus ihren Nahrungsmitteln, die sie brauchen; doch überwiegt ihn ihr Nutzen, der eben daraus erkannt wird, sehr weit. So viel ist gewiß, daß sie bloß in Häusern, wo sie am Federviehe Schaden thun, sollten getödtet, im Felde und Walde aber gehegt werden. Wenn wir alle diejenigen Thiere ausrotten, welche zur Vertilgung der schädlichen Nagethiere bestimmt sind, so dürfen wir uns auch nicht über den Schaden, den diese thun, beklagen, oder müssen ernstlicher auf Mittel denken, wodurch wir das Gleichgewicht, das jene erhalten sollen, selbst wieder herstellen können *).

Um

*) Ich will hier noch mit wenig Worten die Sardinische Wiesel, welche Boccomele heißt, einschalten, weil ich in Gotha einmal eine Wiesel auf einem Weidenbaume geschossen

Um sie von den Hühnernestern und den Eyern abzuhalten, empfiehlt man Raute um dieselben zu legen.

sen habe, die in allen Stücken mit ihr übereinkommt, äußer daß die schwarze Schwanzspitze kaum merklich, und das Haar auf dem Oberleibe hell fuchsroth war. Ich hielt sie damals für eine Bastardart vom großen und kleinen Wiesel nach der Größe und den vermischten Kennzeichen zu urtheilen. Aufmerksame Jäger wollen sie in ebenen Gegenden mehr bemerkt haben.

Die Boccamele.

Mustela Boccomela. M. cauda mediocri apice nigra linea dorsali nigra.

Cetti Naturgeschichte von Sardinien. I. 211. Taf. 5.

Der Körperbau ist wie beym großen und kleinen Wiesel, nur sind die Hinterbeine etwas höher; von beyden Thieren hat sie auch die gemischten Kennzeichen, obgleich mit letztern mehr Aehnlichkeit als mit erstern. Der Oberleib ist rothbraun mit einem schmalen schwarzen Streifen über den Rücken hin; der Unterleib weiß, mit zwey braunen Punkten an jedem Mundwinkel; die Schwanzspitze schwarz; das Haar an allen Theilen länger als am kleinen Wiesel; die Länge vom Kopfe bis zum Schwanze eilftehalb Zoll; des Schwanzes drey und drey Viertel Zoll.

In seinen Sitten ist dieß Thier von jenen beyden sehr verschieden. Es wird gleich, wenn man es fängt, so zahm wie ein Schooßhündchen, läuft nach und läßt sich herumtragen. Er geht dem Honig sehr nach; stinkt nicht, verabscheuet stinkendes Fleisch u. s. w. In der Wildniß, wo es sich in Sardinien vorzüglich in Mauern aufhält, lebt es von Vögeln und vorzüglich von Mäusen.

Sie sollen auch die Kühe in die Euter beißen, und dadurch einen giftigen Geschwulst an diesen Theilen verursachen.

Irthümer und Vorurtheile.

1) Die Alten sagten, die Mütter gebährten die Jungen aus dem Munde, weil man sie zur Heckzeit am Tage gewöhnlich mit einem Jungen oder einer Maus herumlaufen sieht.

2) Sie sollen Pferde, Hühner und Küchlein anhauchen und dadurch aufschwellend machen.

3) Sie sollen bloß vom Schrecken liegen bleiben, wenn man auch bloß mit Pulver schießt.

4) Manche Hauswirthe rechnen sie zu den glückbringenden Thieren. Man darf aber dann keine Eyer und Tauben haben.

Die dreyzehnte Gattung.

Otter. Lutra.

Kennzeichen.

Oben und unten sechs Vorderzähne, die obern länger als die untern, wovon zwey etwas hinterwärts gebogen sind.

Eckzähne an jeder Seite einen, gekrümmt und inwendig eckig.

Backenzähne oben und unten fünf, spitzig und zackig.

Die Zunge mit weichen Stacheln besetzt.

Füße mit fünf Zehen, die mit einer Schwimmhaut verbunden sind, und unbewegliche Krallen haben.

Ueberhaupt unterscheiden die Lebensart, Nahrung, welche aus Fischen besteht, besonders die Schwimmfüße und Falte des Weibchens unter dem Geschlechtsgliede, die Arten dieser Gattung hinlänglich von den Thieren der vorhergehenden, ob sie gleich einerley Gebiß mit ihnen haben. Sie leben am Wasser, schwimmen auch unter demselben, können aber nur kurze Zeit des Athems halber darinn aushalten. Ihre Fährten werden wegen der Schwimmhaut zwischen den Zehen sehr merklich.

(21) 27. Der Flußotter.

Lutra vulgaris.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Otter, Fischotter, gemeiner Fischotter, Landotter, großer Otter, Fischdieb und Fischottermarder.

Mustela Lutra. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 93. n. 2.

Hier wird er, wie von mehrern Schriftstellern, wegen seines ähnlichen Gebisses unter die Wieselgattung gezählt.

Loutre. *Buffon* hist. nat. VII. 134. T. 11. XIII. 323. T. 45. Ed. de Deuxp. II. T. 6. f. 1.

Greater Otter. *Pennant* hist. of Quadr. II. 77. Meine Uebers. II. p. 401.

Fischotter. v. Schrebers Säugeth. III. 457. Taf. 126. A. B.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 276.

Goeze's Fauna. I. 325.

v. Wildungens Neujahrsgeschenk aufs Jahr 1798. S. 40. Taf. 2.

Donndorfs zool. Beytr. I. 280.

Ridingers wilde Thiere. Taf. 28.

Kenn

Kennzeichen der Art.

Mit unbehaarten Zehen der Vorderfüße, spitzig zulaufendem Schwanze, der um die Hälfte kürzer als der Leib ist, dunkelbraunem Oberleibe und graulichem Unterleibe.

Gestalt, und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die ganze Größe des Flußotters beträgt zwey Fuß acht Zoll, des Schwanzes ein Fuß vier Zoll und die Höhe ein Fuß zwey Zoll *). Der Kopf ist klein, breit und flach. Die Schnauze breit und kurz; die Oeffnung des Mauls klein; die Lippen dick, mit starken Muskeln, bestimmt, das Maul beym Untertauchen fest zu verschließen; der untere Kinnbacken schmäler und kürzer, als der obere; die Nase stumpf, breit, nicht an die Spitze der Schnauze reichend, und das Gebiß dem Marder ähnlich. Es befinden sich nämlich sechs Vorderzähne in beyden Kinnbacken, wovon derjenige, der zwischen dem mittelsten und äußersten auf jeder Seite in der untern Kinnlade steht, weiter einwärts liegt; dann folgen zwey längere gekrümmte und nach innen zu eckige Eckzähne und fünf spitzige Backenzähne in beyden Kinnladen auf jeder Seite, von denen die vordern drey in der obern Kinnlade einfach und klein sind, der lange und breite vierte an der auswendigen Seite ungleiche Zacken hat, und der fünfte etwas

*) Par. Ms.: Körper 2 Fuß 3 Zoll; Schwanz Hälfte des Körpers; Höhe 1 Fuß 1½ Zoll.

was kleiner, breit, in der Mitte vertieft und mit vier Ecken versehen ist. Die drey vordern in der untern Kinnlade sind ebenfalls einfach, aber größer als die, welche ihnen in der obern entsprechen; der vierte ist lang, breit, in drey äußere und eine innere Zacke getheilt, und der letztere merklich kleiner und oben fast platt. Es ist merkwürdig, daß die Ränder der Pfannen, in welchen sich die Köpfe der untern Kinnlade bewegen, diese so einschließen, daß sich die Kinnlade nicht vorwärts herausbewegt, und als Skelet herausfallen, sondern nur auf und nieder und nach den Seiten bewegt werden kann. Der Mund ist mit starken drey Zoll langen grauen Bartborsten besetzt. Die Augen sind klein, kastanienbraun und nahe an die Ecken des Mundes gestellt, auch mit einzelnen Fühlhaaren versehen. Die Ohren sind kurz, zugerundet und stehen niedriger, als die Augen. Den Kopf trägt es niedergesenkt. Der Hals ist kurz und so stark, daß er einen Theil des Kopfes auszumachen scheint; der Leib langgestreckt und dick, wie bey einem Dachse und der Schwanz, (Ruthe) welchen es schief nach sich zieht, ist am Leibe dick und läuft allmählich spitziger aus. Die dicken, kurzen Beine haben fünf scharf bewaffnete, mit einer Schwimmhaut eingefaßte, gleiche Zehen ohne Daumen, von denen die an den Vorderfüßen unbehaart sind. Die Klauen sind an den Vorderfüßen länger und spitziger, an den Hinterfüßen aber kürzer und stumpfer. Die Beine sind locker mit dem Körper verbunden, so daß sie sehr leicht mit demselben in eine Linie gebracht werden können und die Stelle der Flossen bey Fischen vertreten.

Die

Die Haare sind theils kurz und so weich, wie Seide, theils lang und harsch. Sie sind im Grunde grau, und weiß, und auf dem Oberleibe an den Spitzen kastanien- oder dunkelbraun, an den Beinen lichtkaffeebraun, an dem Unterleibe oder an der Kehle, Brust und Bauche bleiben sie graulich. Im Winter wird die Farbe dunkler als sie im Sommer ist, und im Alter gelblicher und der Kopf grau. An jeder Seite der Nase befindet sich ein kleiner lichter, zuweilen weißer Flecken, so wie ein anderer unter dem Kinne. Außerdem stehen die Haare dichte, glänzen, nehmen nur bey Verwundungen und dem Tode des Thieres Wasser an, und sitzen in einer Haut, die so fest ist, daß auch kein Hund, wenn er gleich das Fleisch und die Knochen des Thieres mit seinen Zähnen zermalmet hat, einen Riß in dieselbe zu beißen im Stande ist. Der Balg ist ohne besondere Nähte, außer daß von dem Haarwirbel auf der Spitze der Nase eine Theilung nach der Mitte der Stirn, und eine auf jeder Seite von da nach den Augen hinläuft.

Seine Electricität ist außerordentlich, und übertrifft fast den Balg der Katze. Daher auch die Jäger das Thier, wenn es des Nachts durch das Wasser schwimmt, an seinem leuchtenden Körper entdecken können. Es ist nicht anders, als wenn ein feuriger Streifen durchs Wasser fahre *).

*) Lichtenberg und Voigts Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. IV. 4. S. 157.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch den schlankern Bau und die hellere Farbe, hat vier Brüste am Unterleibe und unter dem Geschlechtsgliede eine Falte, welche die Gestalt eines Sacks bildet.

Ich habe auch eine weißliche und eine hell gelbröthliche Varietät (Lutra vulgaris alba et fulva) gesehen. Eben so sagen andere, daß es eine größere und kleinere Spielart gebe. Es scheint aber, als wenn dieß bloß Altersverschiedenheiten wären.

Zergliederung.

Außer dem schon oben angegebenen eigenem Baue der Kinnbackenknochen und der Dicke und Festigkeit des Fells ist der Magen von Gestalt und Form dem menschlichen ähnlich und aus starken Fiebern gebaut.

2) Die Nieren bestehen aus zwölf bis dreyzehn abgesonderten Stücken, in deren jedes ein Ast der ausführenden Gefäße eingerändet ist. Die Nebennieren sind so groß und roth wie Erdbeeren.

3) Am Ende des Mastdarms befinden sich zwey längliche Bläschen mit einer stinkenden öhligen Feuchtigkeit, die anfangs wie fauler Käse riecht, aber an der Luft getrocknet einen Bisamgeruch annimmt, woher einige glauben, daß dadurch die Fische herbeygelockt würden. Vielleicht werden die Haare gegen die Nässe damit geschützt.

4) Daß

4) Daß sie so lange unter dem Wasser aushalten können, davon liegt der Grund in den vier kleinen ovalen Oeffnungen des Herzens *), die aber sowohl geschlossen sind, daß man sie nicht eher zu Gesicht bekommt, als bis man aus der rechten Herzkammer die linke aufbläßt, da sich die erste kleine zeigt. Zwey andere liegen am Ende der obern Hohlader, und die vierte am Oberrande des rechten Herzens, dicht am Ende der untern Hohlader. Es ist dieß der Anfang einer Höhle, die einen Viertel Zoll weit ist, worin sich alle Kronadern der rechten Herzkammer ausleeren. Denn wenn diese Höhle aufgeblasen wird, so dringt die Luft in das linke Ohr. Dadurch erklärt sichs, warum die Flußottern so lange unter dem Wasser aushalten.

Merk-

*) Nicht bloß die Amphibien haben die ovale Oeffnung des Herzens (Foramen ovale) da das Blut, wenn es nicht mehr durch die Lungen gehen kann, aus der linken Herzkammer in die rechte übertritt, und das Thier deshalb doch ohne durch die Lungen Athem zu schöpfen, unter dem Wasser leben kann, sondern auch der Mensch im Mutterleibe, weil kein Fötus durch die Lungen Athem holt. Diese Oeffnung verwächst aber gewöhnlich, da die mehrsten Menschen nicht ans Untertauchen gewöhnt werden. Hallorenund Taucher aber, die gleich ans Untertauchen gewöhnt werden, behalten sie als eine Wohlthat gegen das Ersaufen. Es setzt sich eine Wulst um dieselbe herum, der sie verschließt, und sich öffnet, so oft ein solcher Mensch genöthigt ist, unter dem Wasser zu bleiben.

Goeze a. a. O. S. 529. Perrault, Charas und Dodarts Abhandl. aus der Naturgesch. I. 180. Hier wird dem Flußotter das eyrunde Loch abgesprochen. Man hat aber wohl die Herzkammern nicht aufgeblasen.

Merkwürdigkeiten.

Der Flußotter ist vor allen andern Thieren sehr menschenscheu, indem er schon in einer Entfernung von tausend Schritten, wenn er jemanden mit seinem scharfen Gesicht und Geruch bemerkt, mit der größten Schnelligkeit in seine Höhle schlüpft; übrigens ist er wild, boshaft und listig und es vertheidigt sich kein Thier mit mehr Herzhaftigkeit, es hat aber auch keins einen schärfern und schädlichern Biß, als der Flußotter. Er kann auch außerhalb des Wassers schnell genug laufen.

Sechszehn Jahre soll sein höchstes Alter seyn.

Verbreitung und Aufenthalt.

Ganz Europa, das nördliche und nordöstliche Asien und Nordamerika sind das Vaterland dieser Thiere. In Deutschland, auch in Thüringen, trifft man sie allenthalben, aber nicht häufig an, da ihnen so sehr, wie den Mardern, nachgestellt wird.

Ihre Wohnungen schlagen die Fischottern unter der Erde an den Ufern der Flüsse und zwar gern an Forellenbächen in felsigen Gegenden auf. Sie graben sich ihre Höhlen (Bau, Burg) nicht selbst, sondern erweitern und bauen nur natürliche, vom Wasser ausgeschwemmte Löcher unter den Ufern oder unter den Wurzeln der Bäume aus. Besonders halten sie sich gern unter den ausgemauerten Fluthbetten auf. Diese Wohnung machen sie sich durch Wühlen und Abbeißen der Wurzeln, wo es nöthig ist, unter dem Wasser nach der Oberfläche der

Erde

Erde zu, um trocken liegen zu können, mit, oder ohne Luftloch, bequem. Ein solcher Bau ist niemals über vier bis fünf Fuß tief, und da sie sich bald in dieser, bald in jener Gegend aufhalten, je nachdem sie einen großen oder kleinen Vorrath von Fischen antreffen, so haben sie auch allenthalben Wohnungen, wo sie schlafen können. An Teichen wohnen sie, wenn sie nicht einen weiten Umfang haben, selten, um nicht entdeckt zu werden, und in kleinen Gewässern halten sie sich nicht lange auf, weil sie bald aufgezehrt haben. Leben sie in Gegenden, wo es leere Dachs- und Fuchshöhlen giebt, so suchen und wählen sie dieselben zu ihrem Aufenthalte, und sollten sie 600 Schritte weit vom Wasser entfernt seyn. Der Ort ihres Aufenthalts riecht widrig nach den Ueberbleibseln von Fischen, die sie nicht verzehren können.

Wenn im Frühjahre die Eisschollen gehen, so retiriren sie sich auf die nahe stehenden Bäume, da ihnen unter dem Wasser so lange zu bleiben die Luft fehlen würde.

Nahrung.

Die Flußottern nähren sich vom Wasserraube, von Fischen, Krebsen, Fröschen und Wassermäusen, und man behauptet wohl ohne Grund, daß sie auch im Nothfall Baumrinde und Gras fräßen. Vielleicht fressen sie letzteres, wie mehrere Raubthiere, blos aus Muthwillen oder als Arzneymittel zur Reinigung ihres Magens und

um

um die mit verschluckten Gräten in dasselbe einzuwickeln, damit dieselben die Gedärme nicht verletzen.

Sie schwimmen (fischen) dem Strom oder Wind entgegen, und bleiben so lange unter dem Wasser, als ihr Athem dauert, worauf sie sich mit dem Kopfe wieder übers Wasser erheben, um neuen Athem zu schöpfen, und die Witterung von Menschen und ihren Feinden, den Hunden zu vernehmen.

Sie durchfischen wohl drey Stunden weit von ihrer Wohnung einen Fluß stromaufwärts, und besuchen in dem Umfang einer Meile alle Flüsse und Teiche, indem sie den Zu- und Abflüssen desselben nachgehen, und haben hier unter den Ufern im Nothfall ihre gewisse Retirade. Einen Teich, sonderlich einen Satzteich, können sie in kurzer Zeit gänzlich ausleeren. Forellen und Krebse sind ihre liebste Speise. Daß die Krebse einen großen Feind an ihnen haben, sieht man an ihrem Unrath (Losung), der immer Krebsschalen enthält. Sie entledigen sich desselben außerhalb des Wassers, weil sich vermuthlich die Fische, durch den Geruch desselben gereizt, vor ihren Feinden verbergen würden, und er wird also von ihnen auf die, aus dem Wasser hervorragende, Stöcke und Steine gelegt. Hier lauern sie auch oft den Fischen auf und tauchen alsdann, wenn sie einen bemerken, so geschwinde, wie die Enten ins Wasser.

Sie können sich auf der Oberfläche des Wassers liegend erhalten, und steigen nur in die Tiefe, wenn sie ihren

ren Raub gewahr werden. Sobald die Fische ihren Feind bemerken, fliehen sie sogleich unter das Ufer oder unter einen Stein, welches sie eben thun sollen; denn wenn sie nicht von selbst dahin fliehen, wenn sie diese Raubthiere erblicken, so nöthigen sie dieselben darzu, indem sie mit ihrem dicken Schwanz etlichemal ins Wasser schlagen, daß die Fische diese Zufluchtsörter suchen und ihnen zu Theil werden müssen. Die kleinen Fische verzehren sie im Wasser mit herausgestrecktem Kopfe ganz, die großen aber fassen sie mit ihrem scharfen Gebiß bey der Brust und tragen sie aufs feste Land, fressen nur das Fleisch, und lassen den Kopf und das Rückgrat liegen. Man will bemerkt haben, daß sie die Fische mit verschlossenen Augen fressen, wodurch also der Jäger ihnen am ersten schußrecht beykommen kann. Oeffnen sie die Augen einmal und hören auf zu fressen, so muß er stille stehen und so lange warten, bis sie sie wieder schließen *).

Den Winter über suchen sie auf dem Eiß die aufgeeißten Löcher auf, schwimmen unter demselben ihrer Nahrung nach und wissen sehr gut das folgende Eißloch, wenn es nicht über tausend Schritte weit entfernt ist, oder dasjenige, wo sie hineingegangen sind, wieder zu treffen.

Sie gehen an solche Orte, wo selten Menschen hinkommen, bey Tag und Nacht auf den Fang aus, an andern

*) Leems Nachrichten von den Lappen. S. 112.

andern Orten aber vorzüglich des Nachts beym Mondenschein *).

Fortpflanzung.

Die Begattungszeit (Ranzzeit) fällt gewöhnlich in den Hornung, wo ein Gatte den andern des Nachts durch einen geraden starken anhaltenden Ton, der dem lauten Pfeifen eines Menschen gleicht, zu sich lockt (pfeift). Das Weibchen trägt neun Wochen und bringt im May zwey bis vier Junge, gemeiniglich in einem Bau am Ufer des Wassers unter alten Bäumen oder starken Wurzeln.

Die Jungen sind neun Tage blind, und werden vor acht Wochen nicht zum Fischfang von der Mutter ausgeführt. Sie sind in zwey Jahren völlig ausgewachsen und zur Fortpflanzung tüchtig. Ihre Farbe ist in der Jugend beynahe ganz schwarz, und wird von Jahren zu Jahren heller.

Sie sind nicht leicht aufzubringen, sind aber ihrer Wildheit ohngeachtet einer solchen Zähmung fähig, daß man sie zur Fischjagd abrichten kann; hier kann man ihre wunderbare Wendungen bey ihren Räubereyen in einem großen Kübel oder Wassertroge, worein man etliche Fische setzt, und ihnen die Jagd derselben lehrt, beobachten.

*) Daß sie bey Fischmangel Lämmer auf der Weide angehen solten, gehört vielleicht zu den Naturfabeln.

ten *). Man giebt ihnen Milch und Brod, Zugemüse und Fische zur Speise bey ihrer Zähmung, und sie gewöhnen sich alles zu fressen, was der Mensch genießt. Ich habe gesehen, daß eine arme Dirne einige junge Fischottern an ihren Brüsten mit Muttermilch aufzog. Sie wurden vorzüglich groß, und befanden sich außerordentlich wohl. Ich habe auch die Bemerkung gemacht, daß, wenn man nicht ihren Appetit nach Fischen unterhält, ihnen zuletzt dafür ekelt.

Feinde.

Außer Menschen und Hunden scheint er keine zu haben, da ich keine Insecten auf seinem Balge und keine Würmer in seinen Eingeweiden gefunden habe.

Jagd.

Der Jäger spürt diese Raubthiere im Sommer durch ihre Losung, die gerade wie Fische riecht, und durch das Ueberbleibsel ihres Fraßes am Ufer, und im Winter durch die Losung und Fährte (Taf. XXII. Fig. 8.) zugleich. Letztere ist der Dachsfährte in Ansehung der Größe und Gestalt beynahe völlig gleich, nur daß die Ballen nicht so stark zu sehen sind. Man kann sie sehr leicht von allen andern unterscheiden, da der Fuß wie ein

*) In Schweden ist es nichts ungewöhnliches, sich von Fischottern die Fische fangen und ins Netz treiben zu lassen. Low in den Schwed. Abh. 14. B. S. 147.

ein Gänsefuß gestaltet ist, indem die Klauen mit einer starken Haut verbunden sind. Sie setzen zwey und zwey Tritte etwas schief neben einander und schleppen in etwas tiefen Schnee den Schwanz nach. Sie werden erlauscht und erlegt, wenn sie sich auf Stämme, die übers Wasser hängen, oder auf Stöcke, Steine und Sandbänke, die in demselben stehen, in die Sonne legen, indem sich der Schütze so mit seinem Gewehr anstellt, daß ihm der Wind von ihnen entgegen wehet. Auch werden sie an den Eißlöchern geschossen.

Man fängt sie aber vorzüglich mit starken Tellereisen, welche man vor ihrem Bau, oder an den Orten, wo sie aus- und einsteigen, entweder unter das Wasser oder unter Schnee und Sand verbirgt und an einer Kette befestigt, die an einem Baum gebunden oder mit einem Gewichte von 50 bis 60 Pfund beschwert wird, und ins Wasser reichet, damit sie sich gleich, nachdem sie sich gefangen haben, ins Wasser stürzen und ersaufen, und die Eisen nicht beschädigen oder sich losbeißen. In der letzten Absicht stellt man auch gern zwey Eisen neben einander, damit sie nämlich, wenn sie sich in dem einen fangen und sich losbeißen wollen, darüber in das andere gerathen. Man kann die Eisen mit wilder Katzenmünze, Baldrianwurzel, Bibergeil u. dergl. (als Witterung) bestreichen.

Außerdem bemächtigt man sich derselben noch mit einem, besonders dazu gestreckten, sackförmigen Garn, das man in das Wasser legt, an denjenigen Ort, wo man

weiß,

weiß, daß sich einer befindet. Man stellt dasselbe auf, so daß es eine Person an einer Leine hält. Der Otter wird alsdann durch einen Otterhund aus seinem Bau oder aus dem Wasser hineingetrieben, und wenn er in den Sack kömmt, durch die Leine herausgezogen und todtgeschlagen.

Man umstellt auch ihren Bau mit dem Fischotternetze. s. Einleitung S. 163.

Man gräbt sie auch aus und fängt sie mit Zangen, indem man ihren Eingang im Wasser verstopft.

In kleinen Wassern und Bächen kann man sie leicht todtschlagen und schießen, wenn sie die Hunde aufjagen. Den Hunden machen sie wegen ihres scharfen Gebisses und dicken Balges viel zu schaffen, und ein sehr hitzig verfolgter Fischotter greift sogar Menschen an.

Nutzen.

An großen fischreichen Flüssen überwiegt der Schaden, den sie an Fischen thun, den Nutzen, daß sie zuweilen auch eine Wasserratte fangen, sehr weit. Es ist auch deshalb in einigen Ländern den Besitzern der Teiche erlaubt, selbst Eisen auf sie zu legen, nur müssen sie es beym Forstamte oder dem Revierförster anzeigen, und nach Befinden der Umstände auch den Balg ausliefern. In alten Zeiten, wo der alte Weidspruch

noch galt: Otter und Biber haben keine Heege, durfte jedermann diese Thiere fangen und bekam noch eine Belohnung dazu.

Ihr Fleisch ist unschmackhaft, zähe, und schwer zu verdauen. Man muß es erst durch gute Zubereitung schmackhaft machen, es wird also auch nur in Pasteten und kleingehackt genossen. Dieß geschieht besonders von den Katholiken in der Fastenzeit, wo es, da sich diese Thiere von Fischen nähren, statt Fische gespeist werden darf. Die Carthäusermönche, welche nach ihrem Gelübde gar kein anderes Fleisch, als Fische essen dürfen, bezahlen es sehr theuer, das Pfund für 3 und 4 Groschen. Sie wiegen oft 40 Pfund schwer.

Der Balg, der Sommer und Winter seine Güte behält, da sie sich nur im Herbste unmerklich hären, ist wegen seines schönen Glanzes, der lange dauert, und sich durch keine Witterung wegwischen läßt, ein sehr kostbares Rauchwerk. Die Kürschner machen Schlafdecken, Müffe, Strümpfe und Schuhe daraus und verbrauchen ihn auch zu Mützengebrämen, zu Aufschlägen und sonst zu vielerley Verbrämungen.

Die feinen Haare geben Hüthe, die für besser gehalten werden, als die Castorhüte. Aus den Schwanzhaaren werden Pinsel verfertiget. In Thüringen wird ein gewöhnlicher Balg mit zwölf Reichsthalern und ein großer mit sechzehn Reichsthalern bezahlt. Die Bälge der Fischottern, welche

che an kleinen Flüssen sich aufhalten, sollen einen großen Vorzug vor denjenigen haben, welche an großen Flüssen und Seen wohnen. Aus Virginien und Canada kommen die besten, und heißen wegen ihres schönen Glanzes Spiegelottern.

Sie werden auch zur Fischotterjagd abgerichtet. Ein Polnischer Edelmann hatte einen zahmen Flußotter, der wie ein Hund sein Geräthschaftshaus, Wagen und Pferde bewachte, auf ein gegebenes Zeichen sich ins Wasser begab, seinem Herrn Fische zubrachte, auch mit dem Hunde auf die Jagd zog und die über dem Wasser geschossenen wilden Enten herbeyholte. Goeze a. a. O. S. 337.

Schaden.

Für die Satzteiche und Forellenbäche ist die Flußotter ein schädliches Thier.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Nach Aristoteles (hist. nat. VIII. c. 5.) soll er ein so übernatürliches Gebiß haben, daß „er auch den Menschen beiße und nicht eher ablasse, bis er gehört habe, daß Knochen zerbrochen wären." Dieß nämliche sagt Plinius vom Biber. Beyde beißen aber nicht so fürchterlich. *Plinii* hist. nat. VIII. c. 47. (Uebers. von Große. II. S. 296.)

2) In der Arzeney wird jetzt weder ihr Balg noch ihr Blut, Fett, Lunge, Leber und Testikeln mehr zu Wunderkuren gebraucht, wie sonst.

28. Der Sumpfotter.

Lutra minor.

(Taf. VII.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Nörz, kleine Otter, kleine Flußotter, Krebsotter, Wasserwiesel, Nörzwieselein, Modermarder, Menk, Minx, Schuppotter und Steinhund.

Mustela Lutreola, *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 94. n. 3.

Lesser Otter. *Pennant* hist. of Quadr. II. 80. Taf. 67. Meine Uebers. II. p. 404.

Der Nörz. von Schrebers Säugeth. III. 462. Taf. 127.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 278.

Büffons Thiere durch Otto. XVI. 59. mit e. Figur.

v. Wildungens Neujahrsgesch. 1799. S. 11. Taf. 2.

Goeze's Fauna. I. 341.

Lepechins Tageb. seiner Reis. durch das Russ. Reich. I. 176. Taf. 12.

Donndorfs zool. Beytr. I. 284. *)

Kennzeichen der Art.

Mit gleichlangen, hinten und vorn mit einer rauhen Schwimmhaut verbundenen Zehen, einem rauhhaarigen Schwanze, der halb so lang, als der Leib ist, schwärzlichem Leibe und weißer Schnauze.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses kleine Wasserthier hat ohngefähr die Größe des Iltis und die Gestalt des Flußotters. Die Länge des Körpers beträgt 4 bis 8 Zoll und der Schwanz ist fast halb so lang **).

Der Kopf ist wieselartig; die Stirn flach; die Schnauze länglich, hundsartig, an der Nase nackt, durch einen Streifen getheilt und schwarz; um den Mund herum stehen fünf Reihen schwarzer Barthaare, eben so

*) Der Nordamerikanische Minx, und der Vison scheinen zu eben diesen Thieren zu gehören. vergl. Pennant a. a. O.

**) Par. Maaß: Länge 14 bis 18 Zoll.

stehen fünf solche Haare an den Augenbraunen und zwey am Kinne. Vorderzähne, wie bey der vorigen Art; Backenzähne oben vier, unten fünf auf jeder Seite. Die Augen sind klein, länglichrund, haben einen dunkelgelben Stern und sitzen näher nach der Nase als nach den Ohren zu. Die Ohren sind mondförmig, inwendig grauzottig, stehen kaum mit dem stumpfen Rande vor, liegen am Kopfe an, und sind beynahe von dem Felle bedeckt. Der Hals ist lang und so dick als der Kopf. Der schmale Leib wird nach dem Ende zu immer dicker. Der Schwanz ist hinterwärts zugespitzt. Die Beine (Läufte) sind kurz, dünn, die Schenkel können ganz ins Fell versteckt werden, und die vordern Beine sind länger als die hintern. Die Schwimmfüße sind haarig und breit.

Im Ganzen ist die Farbe der des Flußotters gleich.

Der Umfang des Mauls, das Kinn und die halbe Nase ist weiß; der Scheitel zuweilen mit weißen Haaren untermengt, wie bereift, sonst braungelb; die Ohren sind schwarz; der übrige Leib im Grunde wollig und braungrau, mit längern dunkelbraunen kastanienbraunen oder schwärzlichen Haaren bedeckt, am Unterleibe, wo das Wollhaar am stärksten ist, mehr verloschen; unter dem Halse ein kleiner weißer Strich; die Beine und der Schwanz schwärzer; an letzterm die Haare etwas länger als die übrigen.

Das Weibchen ist kleiner als das Männchen, und seine Säugwarzen sitzen alle am Bauche, drey an der rechten und vier an der linken Seite, die beyden letzten

stehen

stehen einander gegenüber, die übrigen aber abwechselnd. So war das Weibchen, welches Pallas *) beschreibt, wenigstens beschaffen. Es kann aber seyn, daß eine Säugwarze fehlte und das Thier acht derselben hat.

Der Nörz giebt, wenn er gereizt wird, einen unerträglichen Gestank von sich, der wahrscheinlich aus den zwey öhlhaltigen Drüschen am Ende des Mastdarms kommt.

Er ist in stäter Bewegung, durchkriecht alle Löcher und Schlupfwinkel, schwimmt sehr gut, läuft aber schlecht und springt nicht. Er ist so listig und gefräßig, wie der Flußotter. Augen und Geruch scheinen seine vorzüglichsten Sinneswerkzeuge zu seyn.

Hr. Pallas hat die eyrunde Oeffnung in seinem Herzen bemerkt, wodurch ihm das Untertauchen erleichtert wird. Die Leber hat fünf Lappen und in die Gallenblase gieng der Gallengang gleich beym Halse derselben ein. Der Magen ist sehr groß und weit und die Därme sind lang.

Verbreitung und Aufenthalt.

Sein Vaterland ist das nordöstliche Europa, vorzüglich Polen, Finnland, Rußland, das nördliche Asien, und die mittlern Provinzen von Nordamerika. In Deutschland hat man ihn erst seit einigen

*) Spicil. Zoolog. XIV. t. 3. f. 1.

gen Jahren, wo man sich mehr mit Naturgeschichte abgiebt, entdeckt, und ob er gleich immer unter die sparsamen Thiere gehört, so trifft man ihn doch in der Prignitz im Brandenburgischen nicht selten an, und eben so hat man ihn in Schwedisch-Pommern, in Mecklenburg und im Hannöverschen gefunden.

Er wohnt, wie der Flußotter, an den Ufern der Gewässer, unter Baumwurzeln, in selbst gemachten Löchern oder hohlen Bäumen, und liebt besonders schilfreiche, buschreiche und quellenreiche Gegenden, wo das Wasser im Winter nicht gänzlich zufriert. Am häufigsten trifft man ihn an ruhigen Flüssen, an alten stillen Gräben und Morästen an.

Wenn das Eis geht, so steigt er auf die Weidenbäume.

Nahrung.

Er nährt sich von Fischen, Fröschen, Schnecken, Wasserkäfern, Schildkröteneyern, frißt die Krebse vorzüglich gern, und soll in Amerika den Hausratten sehr nachstellen. Auf den Teichen und Flüssen und außer denselben soll er den Enten, Gänsen und andern Vögeln nachgehen, und sich sogar des Nachts in die nahen Hühnerhäuser, wie der gemeine Iltis, schleichen, die Hühner todtbeißen und ihnen bloß das Blut aussaugen.

Fort-

Fortpflanzung.

Wie bey der vorigen Art. Die Begattungszeit (Ranz- oder Rollzeit) ist im Februar und März; im April und May findet man alsdann an erhabenen trokkenen Orten in den Brüchen, unter Baumwurzeln oder in eigenen Röhren sechs bis sieben blindgebohrne Junge. Das nähere ist aber noch nicht bekannt.

Er kann zahm und zu einem Hausthiere gemacht werden.

Jagd.

Wie bey dem andern Fischotter. Sonst fängt man ihn auch unter aufgestellten Fallbalken, an welche man Fische, Krebse, kleine Vögel oder Fleisch zur Aetze anmacht.

Nutzen.

Die Feinheit des Balges ist ein wenig geringer als Zobel, und er wird zu Gebrämen an Mützen, zu Aufschlägen und zu Ueberzügen über Westen gebraucht. Er kömmt vornämlich aus Polen und Virginien und das Zimmer kostet vierzig bis funfzig Thaler. Von den in Deutschland geschossenen kostet der Balg gewöhnlich zwölf Groschen.

Der

Die Hausratten sollen einen großen Feind an ihm haben.

Schaden.

Ergiebt sich aus der Nahrung. Außerdem untergräbt er die Wälle und Dämme der Flüsse.

Zweyter Abschnitt.

Schrotthiere. Rosores.

Diese Thiere nützen im Haushalte der Natur und für den Menschen durch Vertilgung der schädlichen nagenden Insectenlarven und Würmer.

Die vierzehnte Gattung.

Maulwurf. Talpa.

Kennzeichen

Oben sind sechs ungleiche große Vorderzähne, und unten achte.

Auf jeder Seite ist ein langer Eckzahn, auf welchen oben drey und unten zwey kleine spitzige Eckzähne folgen.

Backenzähne sind auf jeder Seite vier, die obern mit drey, die untern mit fünf Spitzen.

Die Vorderfüße sind groß und breit.

Eben diese starken mit langen Krallen bewaffneten Vorderfüße machen die Thiere dieser Gattung, die alle unter der Erde wohnen, zum Graben vorzüglich geschickt,

schickt, worzu ihnen auch der lange bewegliche Rüssel, der Mangel großer hervorliegender Augen, und der äußern Ohren beförderlich ist.

Der Magen ist einfach, und die Nahrung besteht vorzüglich aus Regenwürmern.

Am Weibchen findet man sechs Säugwarzen und die Jungen pflanzen sich noch im ersten Jahre fort. Die Vermehrung ist stark, indem sie mehr als einmal des Jahrs Junge bringen.

(22) 29. Der gemeine Maulwurf.

(Taf. IX. Fig. 2)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Maulwurf, Moll, Europäischer, gemeiner Europäischer, schwarzer Europäischer Maulwurf, schwarzfahler Maulwurf, Scharrmaus, Schär und Schärmaus.

Talpa europaea, *Gmelin. Lin.* I. 1. p. 110. n. 1.

Taupe, *Buffon* hist. nat. VIII. 81. T. 12. Ed. de Deuxp. II. T. 9. f. 6. Ueberf. von Martini V. 33. m. e. Fig.

European Mole. *Pennant.* hist. of Quadr. II. 229. Meine Ueberf. II. p. 544.

De la Faille Versuch über die Naturgeschichte des Maulwurfs. Aus dem Französischen von J. P. E. Frankf. und Leipz. 1778. m. K.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 388.

v. Schrebers Säugeth. III. 558. Taf. 156.

Goeze's Fauna I. 433.

Donndorfs zool. Beytr. I. 357. Nr. 1.

Kennzeichen der Art.

Mit kurzem, den fünften Theil des Körpers langen, schuppigen, und haarigen Schwanze und fünfzehigen Füßen.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der Maulwurf wohnet in Feldern und Wäldern und ist ein nützliches und schädliches Thier nach Beschaffenheit seines Aufenthaltes. Beym ersten Anblicke würde man ihn für eine Mäuseart halten, wenn er nicht bey genauerer Betrachtung durch die Struktur seines kurzen zusammengedrungenen Körpers, seines Gebisses, und durch sein sonstiges Betragen so merklich von jener Thiergattung unterschieden wäre. Seine ganze Länge von der Schnauze bis zum Schwanze beträgt sechstehalb Zoll und die Höhe zwey Zoll *). Der Schwanz ist kurz, rund, schup-

*) Par. Ms.: Körper 5 Zoll; Höhe 1 Zoll 10 Linien; Schwanz 1 Zoll.

schuppig, ein wenig krause und hält einen Zoll und zwey Linien.

Der anderthalb Zoll lange Kopf ist dick, läuft in einer walzenförmigen Schnauze spitzig zu, und ist hinten ohne einen bemerkbaren Hals mit dem Leibe verbunden. Die Nase ist aufgeworfen, und wie der abgestumpfte Rüssel hager. Die obere Lefze ist doppelt. Es sondert sich von derselben in der Gegend der ersten Backenzähne ein häutiges Blättchen ab, welches bis zur untern Lefze herabsteht, sich um die Zähne legt, und das Maul vor dem Einfallen der Erde, wenn das Thier wühlt, bewahrt. Die Bart- und Augenborsten sind kurz und fein. Das Gebiß ist spitzmausartig; nämlich oben befinden sich sechs ungleich große Schneidezähne und unten acht derselben. Hierauf folgen oben zu jeder Seite ein gekrümmter Eckzahn, nebst noch vier kleinern Seitenzähnen, und unten fünf derselben; oben auf jeder Seite vier dreymal gespitzte, und unten drey- viermal gespitzte Backenzähne. Die Augen sind klein, wie Mondkörnchen, schwarz, mit einer wenig merklichen schwarzen Haut umgeben und haben alle Feuchtigkeiten der andern Thieraugen; sie sind übrigens unter einem Haarringe verborgen, und liegen zwischen der Spitze der Nase, und den Ohren in der Mitte. Sie scheinen gar nicht dem übrigen Körpermaasse angemessen zu seyn, lassen sich auch kaum mit den bloßen Augen unter den Haaren vorfinden, und die natürliche Bewegung und Oeffnung derselben kann man nicht eher und besser bemerken, als wenn man ihn durch einen Nadelstich in seinen empfindlichsten Theil, die Nase,

se, (der kürzeste Todt!) tödtet, wo er bey den letzten Zuckungen, die Haare, welche die Augen umgeben, etlichemal wegbewegt, daß man sie in ihrer natürlichen Lage und mit ihrer natürlichen Oeffnung liegen sehen kann. Er scheint seine Augen blos deswegen zu haben, damit er weiß, wenn er sich außer seinem finstern Elemente befindet. Die Gehörgänge sind ohne Ohrlappen, liegen verborgen, und machen sich nur durch einen etwas erhabenen Rand um die fast viereckige Oeffnung derselben merklich; demohngeachtet ist sein Gehör in dem dichten Elemente ganz vortrefflich, so daß ihm das geringste Geräusch nicht entgeht. Weit schärfer aber ist sein Geruch vermöge seiner langen beweglichen Nase, und groß ist sein Gefühl durch dieselbe. Seine Schenkel sind sehr kurz; und die vordern, die unter dem Hals in der Haut verborgen liegen, sind kaum merklich, so dicht stehen die Füße am Leibe an. Die Füße selbst, wovon die vordern groß, stark, fast nackt, die hintern aber schwarz und kleiner sind, haben fünf ungleiche, parallel liegende Finger. Die Sohle der Vorderpfoten, womit er vorzüglich schanzet, ist wie eine flache Menschenhand gestaltet, mit scharfen Nägeln, besonders an den ersten Fingern, bewaffnet, und auswärts gerichtet.

Sein muskulöser Körper ist mit schwärzlichen, im Grunde aschgrauen, dichten, sammtweichen Haaren bekleidet, die beym Streichen einen weißlichen glänzenden Widerschein geben.

Das Weibchen ist etwas schlanker gebaut, und hat sechs Säugwarzen.

Farben-Varietäten: 1) Der weiße gemeine Maulwurf. T. e. alba.

Diese Spielart findet man selten in Thüringen, mehr im Hannöverschen und Holland.

2) Der geschäckte (oder marmorfarbene ostfriesische) gemeine Maulwurf. T. e. variegata.

Dieser ist etwas länger, als der gemeine, blos in Ansehung seines schwarz- und weißschäckigen Felles der Farbe nach von ihm unterschieden, und wohnt in Ostfriesland an den Landstraßen.

3) Der graue gemeine Maulwurf. T. e. cinerea.

Hat einen kürzern Kopf als der gemeine, und eine schöne glänzend graue Farbe, die unter dem Bauch in einen graugelben breiten Streifen abläuft. Er ist sehr selten.

von Hübsch Naturforscher III. 98.

4) Der gelbe gemeine Maulwurf. T. e. flava. (Taf. IX. Fig. 2.)

Er ist bey uns sehr selten, und hat eine hoch- oder blaßerbsgelbe, auch nach dem fuchsrothen sich ziehende gelbe Farbe. Nach dem Tode schießt die Farbe sehr ab.

Der

Zergliederung.

Außerdem, was schon in der Geschichte dieses Thiers erwähnt worden, und gelegentlich noch erwähnt werden wird, ist der Magen nach Verhältniß des Körpers sehr groß. Eben so die Leber, welche den größten Theil der Bauchhöhle füllt. Die Milz gleicht der der Hunde, und die Nieren sehen den menschlichen ähnlich, sind aber sehr klein. Die Lungen sind mit einer schwammigen Materie bedeckt, und das Herz ist vollkommen kegelförmig. In den Därmen finden sich viele Würmer.

Andere Merkwürdigkeiten.

In der Begattungszeit (Ranzzeit), wo diese Thiere beym Mondschein aus ihren Höhlen gehen, und die Männchen hitzig um die Weibchen kämpfen, lassen sie, wie zuweilen, wenn man sie peiniget, einen zischenden und quicksenden Ton von sich hören.

Das Alter ist, da sie so verborgen vor menschlichen Augen leben, unbekannt; doch müssen sie alt werden, da man zuweilen welche findet, die vor Alter grau sind, und Zähne verlohren haben.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Heymath des Maulwurfs ist ganz Europa, das nördliche Asien, Afrika und vielleicht auch das nördliche Amerika.

Er lebt fast immer unter der Erde, und zwar gern an solchen Orten, wo der Boden locker und trocken ist *).

Ob er gleich geschickt schwimmen kann, so verabscheut er doch ohne Noth alle Nässe, den Regen, so wie die starke Luft und das Sonnenlicht, und es kömmt ihm daher selten die Lust an, sich aus seinem Elemente zu begeben. Wenn er in seinem Baue mit seinen Vorderpfoten wühlt, so ist er gewöhnlich mit 5 bis 6 Zoll dicker Erde bedeckt. In Aufsuchung seiner Nahrung dringt er nur mit der Schnauze durch den Boden, und bringt mit den Vorderpfoten die Erde neben sich; wenn er aber einen gehörigen Gang verfertigen will, so wirft er den Schutt mit seiner Schnauze über sich, und treibt ihn bis zu einem Haufen vor die Höhle hin. Zu diesem Geschäffte, das er besonders des Morgens, Mittags und Abends treibt, kommt ihm sein wunderbares Brustbein, das den Vögeln ihren ähnelt, sehr gut zu statten.

Der Ort, wo er seinen eigentlichen Bau hat, ist mit vielen Gängen durchschnitten, die eine so leichte Verbindung mit einander haben, daß er allenthalben Gelegenheit gewinnt, seinen Rückweg zu nehmen, und nach Gefallen die zahlreichen Abwege seines Labyrinths durchwandern kann. Bis zu einer Tiefe von fünf Schuhen senkt er sich, besonders im Winter, ein. Das Aufwerfen der Hügel und sein Wühlen verrichtet er nicht um

*) Die Oekonomen schließen daher richtig vom Aufenthalte des Maulwurfs auf die Güte des Bodens.

um zu athmen, sondern aus Aufforderung des Hungers, der Liebe und der Bequemlichkeit. Er ist auch nicht zu allen Zeiten gleich sehr beschäfftiget in Hügelaufthürmen, sondern nur vorzüglich bey gemäßigter Witterung. Der kalte Winter und der Sommer von der Mitte des Mayes an, wo die Hauptwohnung fertig ist, sind für ihn mehrentheils Zeiten der Unthätigkeit und Ruhe. Dann gräbt er nur der Nothdurft halber. Findet man ihn in heißen Sommertagen thätig, so ist ers nur an kühlen, schattigen Orten, und an Wassergräben, eine kurze Zeit des Morgens und Abends.

Die eigentliche Wohnung, in welcher er mit seinen Weibchen allein lebt, ist ein künstlich tapezirtes rundes Gewölbe von Moos, Mist, Stroh, Laub, Gras und zarten Wurzeln, das ohngefähr 1 bis 1 1/2 Schuh im Durchmesser hält. Es ist mit vieler Kunst und Ordnung gebauet, und mehrentheils in dem Innern eines Hügels angelegt. Die Decke und Seitenwände sind durch die Kunst der Mutter sehr fest zusammengedrückt und geglättet. Diese Wohnung liegt mehrentheils erhaben, und gegen kleine Ueberschwemmungen sicher. In feuchten Gegenden suchen diese Amphibien die Aufwürfe der Gräben auf, bauen sich hier an, und werden dadurch unmerklich. Auf trocknen Wiesen kann man ihre Wohnung leicht entdecken, da sie sich mehrentheils in dem nächsten Bezirk eines großen Maulwurfshügels, der mit mehrern kleinen umgeben ist, die alle durch diesen Bau entstanden sind, befindet. Zu derselben führen etliche, durch den öftern Durchweg sehr glatt und fest gewordene,

Gänge, durch welche sie ihrer Nahrung nachschlüpfen. Ueberschwemmungen, die zu diesem Aufenthalte dringen, ersäufen diese Thiere. Dabey ist man auf die Vermuthung gefallen, daß sie zu gewissen Zeiten meilenweite Reisen unter der Erde anstellen müßten, weil man nach solchen tödtenden Ueberschwemmungen in kurzer Zeit wiederum die abgetrocknete Flur mit neuen Hügeln besetzt sieht; denn daß sie unterdessen auf Bäume flüchten sollten, scheint ungegründet, und daß sie alle Zugänge so fest verdämmen könnten, unwahrscheinlich zu seyn. Ja, was noch mehr, man bemerkt sie auch noch im Frühjahre in einer so außerordentlichen Geschäfftigkeit, daß sie unter tiefen Mauern und Flüssen wegwühlen, und sich aus einer Gegend, die sie vorher ganz verwüstet hatten, plötzlich völlig verliern *).

Daß der Maulwurf, wie der Hamster, den Winter hindurch mit der Schlafsucht befallen würde, widerlegt sich wohl dadurch, daß er bey mäßiger Witterung in Feldern, Gärten und auf den Wiesen, und bey der kältesten in Laubhölzern, wo der Frost die Erde, wegen des dick aufliegenden Laubes, nicht versteinern kann, unter dem Schnee große Hügel aufwirft, und selbst Gänge durch den Schnee macht. Durch einen blinden Trieb gereizt, gräbt er sich vielmehr im Herbste unzählige Kanäle in seinem Reviere, damit er im Winter, wenn er die obere Erdrinde nicht durchzubohren vermag, in der Tiefe den

Pup-

*) Doch kann dieß letztere auch der Begattungstrieb und Mangel an Nahrung verursachen.

Püppen, Larven und Würmern, die sich dahin ziehen, ungehindert nachgraben, und den dadurch entstehenden Schutt einstweilen in diesen Höhlen aufbewahren kann. Im Frühjahr findet man ihn daher immer neuen Schutt aus den alten Maulwurfshügeln aufwerfen. Daraus lassen sich die großen und vielen Hügel von einem einzigen Maulwurf im Herbste, im gelinden Frühwinter und im Frühjahre erklären.

Nahrung.

Die Nahrung des Maulwurfs besteht in Würmern, Insekten, Erdschnecken und Wurzeln. Die Regenwürmer, Maykäfer, Mistkäfer, Maulwurfsgrillen, und die meisten Insektenlarven, die in der Erde sich aufhalten, sind freylich seine eigentliche und liebste Nahrung, allein er muß oft mit bloßen Kräuterwurzeln, ja oft mit Baumwurzeln vorlieb nehmen. Unter den Kräutern schmecken ihm noch die Wurzeln der Hülsenfrüchte und die Selleriewurzeln am besten. Derjenige unter ihnen, welcher an den hohen Ufern und Flüssen wohnt, wo Krebse in seine Höhle flüchten, fängt diese Leckerbissen und verzehrt sie. Er soll auch Kröten und Frösche fressen *).

Da er der natürliche Feind der Regenwürmer ist, so kommen diese schlanken Thierchen, wenn sie sein Wühlen fühlen, mit der größten Schnelligkeit aus der Erde hervorgekrochen, um ihm zu entfliehen. Ja man sieht sie schon diesem Naturtriebe gemäß leben, wenn man

*) Fischers N. G. von Livland. S. 36.

ein in die Erde gestochenes Grabscheid hin und her bewegt, daß der Boden erschüttert wird. Insekten und ihre Larven stoßen ihm nicht allein beym Graben auf, sondern fallen auch in seine Höhlen, oder er fängt sie, wenn er sie an den Wänden seiner vielen Gänge, die vorzüglich der leichtern Fangung seiner Nahrungsmittel halber gegraben sind, sich sehen oder durch Graben merken lassen.

So reinlich das Thier aussieht, so reinlich speist es auch. Erhascht es z. B. einen Regenwurm, so faßt es ihn zwischen die beyden Vorderfüße, zieht ihn mit dem Rüssel durch dieselben, daß der Unrath herausgedruckt wird, und genießt ihn dann erst.

Fortpflanzung.

In einer solchen vorhinbeschriebenen Wohnung, die freylich nicht immer jene Vollkommenheit hat, sondern welche allezeit erst als Wochenbett von der Mutter so schön ausgeputzt wird, begatten sich vermuthlich diese brünstigen unterirdischen Bewohner, und zwar im März oder zu Anfange des Aprils. Zu diesem Geschäffte war dem Männchen vielleicht in seinem niedrigen Schlafzimmer seine außerordentlich lange Ruthe nothwendig. Männchen und Weibchen suchen sich zu dieser Zeit wieder auf, denn alsdann sieht man sie des Abends immer frey außer der Höhle herumlaufen.

Gewöhnlich im May gebiert (wirft) die Mutter drey bis fünf blinde, nackte Junge, und säugt sie sorgfältig. Ihre mütterliche Zärtlichkeit bemerkt der Acker-

mann

mann zuweilen, der ein solches Lager aufpflüget. Sie scheut keine Gefahr, und trägt schleunigst unter den Augen des Zuschauers ihre Jungen in eine Höhle, oder in einen nahen Misthaufen. Die Eltern führen sie einige Zeit an, ihre Nahrung zu suchen, und diese sind sehr geschwind, wenn jene einen Regenwurm gefangen haben, ihn wegzuschleppen *).

Nicht immer ist die Wohnung tief angelegt, sondern zuweilen und zwar da, wo sie in der Tiefe Wasser zu befürchten haben, oder wenn das zweyte Wochenbett gemacht wird, liegt sie oben nur schlechtweg unter der Oberfläche eines großen Hügels, besteht aus sehr klar gebissenem Gras und Wurzeln und ist so groß wie ein Hühnernest, und fein in einander gewirkt. Es gehen von da gewöhnlich zwey Röhren in die Erde zu der Hauptwohnung.

Man bemerkt junge Maulwürfe vom May an bis in August, woraus man schließen muß, daß sich die Alten verschiedenemal, wenigstens zweymal des Jahrs begatten müssen.

Die Jungen sind mehr grau als schwarz, und unterscheiden sich in ihren Verrichtungen gar sehr von den

*) Nach angestellten Versuchen fressen weder Junge noch Alte die Wurzeln der Zeitlosen (Colchicum autumnale, L.) Sie sind also wohl nicht die erste Nahrung der Jungen, und nur das Ohngefähr bringt sie zuweilen in ihre Höhlen, wenn sie sie bey Verfertigung derselben im Wege finden, und abstoßen.

Alten, indem sie ohne alle Ordnung unter der Oberfläche der Erde nur so flach wegstreichen, daß sie kaum von derselben bedeckt werden. Sie spielen, necken und balgen sich gern auf der Oberfläche, und nehmen dabey allerhand lächerliche Stellungen an.

Feinde.

Die Maulwürfe sind bey ihrem Wühlen den Nachstellungen der Füchse, Marder, Igel, Hunde, Katzen und Wieseln, der Eulen, Bussarte, Störche, Kolkraben und Rabenkrähen ausgesetzt; die Ringelnatter holt die Jungen aus den Höhlen, und man richtet Spitzhunde ordentlich auf sie ab. Man findet auch Bandwürmer, Madenwürmer, und Cappenwürmer (Cuculanus) in ihnen.

Vertilgung.

Die Menschen fangen sie mit in ihren Höhlen aufgestellten hölzernen Rattenfallen, oder mit eigenen hölzernen Maulwurfsfallen, die wie ein Cylinder gestaltet sind, 1 Schuh in der Länge und 2 Zoll im Durchschnitt haben, deren Oeffnung vorne weit und hinten enge ist, und die mit einem Deckel, der, wenn der Maulwurf hinein ist, zuschließt, versehen sind.

Man erquetscht sie auch mit eisernen Fangklammern (Maulwurfsscheeren), an deren locker aufgestelltes Blech sie stoßen (s. unten Wasserratte), oder erlauert sie im Graben, und schneidet ihnen durch einen

Spaden

Spaden den Rückweg ab, oder hackt sie im Wühlen aus.

Ein vorzügliches Mittel ist, man gräbt unter einem ihrer Hauptgänge einen glaßurten Topf ein, in welchen sie auf ihren Märschen stürzen, ohne wieder heraussteigen zu können. Einige locken sie mit lebendigen Krebsen dahin.

Man legt ihnen auch süße Giftkugeln, Apfelschnittchen mit Arsenik bestreut, oder das grüne Kraut, oder eine Handvoll des reifen Saamens vom Koriander in ihre Höhlen.

Im April, wenn sie sich begatten, wird ebenfalls mit gutem Erfolg ein großer glaßurter Topf, der oben etwas eng ist, mit Speck ausgeschmiert, so in die Erde gesetzt, daß diese eine Hand breit drüber geht, und die Maulwürfe hineinspringen können. Darein setzt man des Abends einen lebendigen Maulwurf, der des Nachts durch sein Geschrey mehrere zu ihrem Untergange herbeylockt.

Noch ein vorzügliches Mittel ist folgendes: Man nimmt spitzige Glasstückchen von zerbrochenen Fenstierscheiben, oder Abgänge bey den Glasern und steckt sie in ihren Gängen perpendikulär in die Erde. Da sie mit Gewalt die Erde durchwühlen, so ritzen sie sich dadurch die Nase auf und bluten sich todt, weil eine jede Wunde, nach welcher Blut fließt, für sie tödtlich ist. Andere legen Zweige von Dornbüschen, oder andere mit Stacheln

versehene Gewächse an den Ort, wo das Thier Haufen aufgeworfen hat. — Bey allen diesen Vertilgungsarten kömmt es hauptsächlich darauf an, daß man ihre Hauptgänge auffindet. Dieß kann aber leicht geschehen. Man tritt nur ihre Gänge etlichemal zu, oder verstopft sie, und wenn sie dreymal von ihnen wieder geöffnet worden sind, so kann man sicher schließen, daß dieses Hauptwege sind, die die Eigenthümer beständig durchwandern werden.

Das allerprobatste Mittel, das ich kenne, ist aber dieses. Man nimmt gebrannte Lederkalchsteine, legt sie an die Luft und Sonne und läßt sie da, doch ohne der Feuchtigkeit ausgesetzt zu seyn, in Mehl zerfallen. Wenn man alsdann im Frühjahr oder sonst die Maulwurfshaufen zerstreut hat, und bemerkt, wo diese Thiere wieder aufstoßen, da thut man einen kleinen Löffel voll dieses klaren Kalchs in das Loch und tritt es zu. Sobald der Maulwurf aufstößt, so kömmt ihm der Kalch vermuthlich in die Nase oder in den Hals und er stirbt an der Auszehrung. Nach sechs Wochen sieht man keinen Maulwurfshaufen auf einer solchen Wiese mehr. Ich habe ein ganzes Gut so von Maulwürfen reinigen sehen.

Will man sie im Frühjahr mit Wasser vertilgen, so muß man vorher die Hügel umscharren, damit das Wasser desto besser eindringe *).

Nuz-

*) Man hat noch unzählige Vertilgungsmittel erfunden, allein sie bewirken mehrentheils nichts. So soll sie z. B. die

Nutzen.

Ihr Nutzen, den sie den Wiesen, wo sie nicht zu häufig sind, verschaffen, scheint erheblicher zu seyn, wenn nämlich ihre Hügel im Herbst und Frühling gehörig zerstreuet werden, als ihr Schaden. Sie machen den Erdboden durch ihr Wühlen locker, verursachen dadurch, daß der Regen denselben besser durchfeuchten kann, und die aufgeworfene und zerstreute Erde düngt und erfrischet die Wurzeln der Gräser. Sie reinigen dabey die Erde von Regenwürmern und schädlichen Insektenlarven, welche allezeit da, wo sie wühlen, in großer Menge angetroffen werden, und welche sowohl als Raupen die Wurzeln der Gewächse benagen, und auf keine andere Art vertilgt werden können, als auch nach ihrer vollkommnen Entwickelung die Kräuter, Stauden und Bäume entblättern und unfruchtbar machen. Z. B. führe ich nur die so häufige Maykäferlarve an, die sich vier Jahre in der Erde aufhält, und woraus der gemeine Maykäfer (Scarabaeus melolontha, L.) entsteht und die schädliche Maulwurfsgrille (Gryllus gryllotalpa, L.). Denen Wäldern, welche schon erwachsenes Holz haben, leisten sie auch durch ihr Wühlen den größten Nutzen, weil dadurch den festen Boden derselben Lockerheit und Feuchtigkeit verschafft wird.

Ihr Fleisch wird in Europa nicht gegessen, ob es gleich die Araber für eine Delikatesse halten sollen.

Den

die Anpflanzung des Wunderbaums (Ricinus communis, L.), dessen Witterung sie nicht vertragen können, von den Gärten abhalten, und verjagen.

Den Balg könnte man als ein schönes sanftes Pelzwerk zu Futter und Einfassung der Kleider und zu andern Dingen mehr verbrauchen; er wird aber nur bey uns als eine besonders gute Fütterung zu Blasröhren und zu Geld- und Tabacksbeuteln angewendet. Bey den Blasröhren bringt man das vordere Theil des Felles nach der Mündung zu, und dadurch bekömmt die Kugel, welche durchgeschossen wird, einen vorzüglich scharfen Zug. Von Johannistag bis zum Winter kann man sie als Pelzwerk sammeln. Die Chineser kaufen von den Russen genähte Säcke *) von Maulwurfsfellen zu zwey bis drey guten Groschen.

Aus ihrem Wühlen will man das Wetter voraussagen; denn sie sollen kurz vor dem Regen sehr emsig scharren, und bey trockner Witterung tief in die Erde hinabsteigen.

Schaden.

In den Gärten sind sie allemal, und auch auf den Wiesen, wo sie zu häufig sind, sehr schädliche Thiere. Sie erschweren nicht nur das Abmähen des Grases durch ihre Hügel, sondern verringern auch den Wuchs und die Menge desselben merklich, und verursachen, daß die Kräuter, unter welchen sie weggraben, ob sie gleich nur selten die Wurzeln derselben abbeißen, umfallen und verdorren.

Zuwei-

*) Ein Sack hält 60 Stück.

Zuweilen werden sie auch die Ursache von Erdfällen, indem ihre Höhlen dem Wasser den Weg anweisen, die Erde zu unterminiren *).

Irthümer und Vorurtheile.

1) Sie wurden von den Alten für stumm und blind ausgegeben.

2) Wenn man einen lebendigen Maulwurf auf der flachen Hand sterben läßt, so verläßt einem nicht bloß das Fieber, sondern man wird auch ein besonderes Glückskind, das bloß durch Auflegen der Hand Krebsschäden, Brüche und Kröpfe heilen kann.

In dem Dorfe Bankau bey Danzig ist einmal ein Maulwurf einer schlafenden Weibsperson durch den Mund in den Magen gekrochen und hat funfzehn Jahre in ihr herum rumort **).

3) Man that sonst mit Herz, Lunge, Leber, Blut, Fett und Fell Wunderkuren.

*) Plinius und Varro erzählen gar von dem Versinken zweyer von Maulwürfen untergrabenen Städte in Spanien und Thessalien.

**) Miscell. phys. med. 1678. p. 150.

Die funfzehnte Gattung.

Spitzmaus. Sorex.

Kennzeichen.

In der obern Kinnlade befinden sich zwey lange Vorderzähne; in der untern vier oder auch nur zwey, in jenem Fall sind die mittlern kürzer.

An den Seiten stehen mehrere Eckzähne.

Backenzähne sind verschiedene, mit spitzigen Zacken.

An den Vorder- und Hinterfüßen befinden sich fünf Zehen.

Die Thiere dieser Gattung haben einen gestreckten Kopf, der sich in einen spitzigen Rüssel endiget. Die Augen sind klein und die Ohren kurz. Die Gestalt des Körpers ähnelt den Mäusen und die Bildung des Kopfs den Maulwürfen. Sie können vermittelst ihres Rüssels geschickt graben. Das Weibchen hat auf jeder Seite des Bauchs sechs Säugwarzen, und pflanzt sich in einem Jahre mehreremale fort. Die Jungen sind im ersten Jahre mannbar. Der Magen ist einfach und sie nehmen Nahrung aus dem Thier- und Gewächsreich zugleich. Es giebt in Thüringen nur drey Arten.

(23) 30. Die gemeine Spitzmaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Spitzmaus, Bisammaus, Mützer, Müger, Zismaus, Angelmaus, Reutmaus und Haselmaus.

Sorex araneus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 114. n. 5.

Musaraigne. *Buffon* hist. nat. VIII. 57. T. 10. f. 1. Ed. de Deuxp. II. T. 9. f. 4. Uebers. von Martini IV. 263. Taf. 74.

Foetid Shrew-mouse. *Pennant* hist. of Quadrup. II. 224. Meine Uebers. II. p. 538.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 14.

v. Schrebers Säugeth. III. 573. Taf. 160.

Goeze's Fauna. I. 465.

Donndorfs zool. Beytr. I. 375. n. 5.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren ragen kaum etwas unter den Haaren hervor; der Schwanz ist halb so lang als der Leib, und der Unterleib gelblichweiß.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Spitzmaus ist etwas kleiner und schlanker, als die Hausmaus. Sie ist vom Rüssel bis zum Schwanze 3 Zoll lang; letzterer hält nur 1 1/2 Zoll und die Höhe ist 1 Zoll 2 Linien *).

Die Schnauze ist dünn, gestreckt, mit Bartborsten versehen, die rückwärts stehen, und von der Spitze des Rüssels an nach hinten zu nach und nach immer länger werden. Die spitzige Nase, die weit länger als die Kinnlade ist, steht weit über dem Unterkiefer hervor. In jeder Kinnlade befinden sich zwey weiße spitzige Vorderzähne, wovon die in der obern eingekerbt, nach der Seite gekrümmt sind, und weit von einander stehen, damit die untern längern, und etwas vorwärts gebogenen, in diesen Zwischenraum einpassen können. Weiter befinden sich im obern Kiefer auf jeder Seite drey spitzige kurze Eckzähne, und im untern zwey. Zackige Backenzähne stehen oben auf jeder Seite vier, und unten drey. Die Anzahl aller Zähne ist also 28. Die Zunge ist glatt und lang. Die Augen liegen tief, sind sehr klein und schwarz. Die Ohren ragen kaum unter den Haaren hervor, sind kahl und abgerundet und haben wie alle Spitzmäuse, die nicht ins Wasser gehen, keine Ohrklappe, die den Gehörgang verschließt. Der Hals ist kurz, und der Leib gleich dick

*) Par. Maas: 2 1/2 Zoll; Schwanz 1 Zoll 4 Linien; Höhe 1 Zoll.

dick und rund. Die sehr kurzen Vorderfüße sind stärker als die etwas längern Hinterfüße, und haben meist lange Nägel: beydes, weil sie graben müssen. Der Schwanz ist geringelt, im ganzen kurz behaart und nur mit einzeln längern steifen sich ausspreitzenden Haaren hin und wieder besetzt.

Was die Farbe betrifft, so ist gewöhnlich der Oberleib röthlichbraun mit durchscheinendem grau, oder mit einem Worte schmutzig rostbraun. Der ganze Unterleib vom Rande des Oberkiefers ist gelblichweiß, selten schmutzig weiß ins graue fallend. Die kurzen Füßchen sind völlig weiß, und beynahe ganz kahl. Der Schwanz hat oben die Farbe des Oberleibes und unten die Farbe des Unterleibes.

Zwischen Männchen und Weibchen ist kein merklicher Unterschied; außer daß letzteres zwölf Säugwarzen hat.

Farbenverschiedenheiten:

1) Die aschgraue gemeine Spitzmaus mit weißem Unterleibe. S. a. cinereus.

2) Die röthliche gemeine Spitzmaus, mit grauem Unterleibe. Sorex Russulus. *Hermanni.* So werden sie mehrentheils im Alter.

3) Die weiße gemeine Spitzmaus. S. a. candidus. Sie ist entweder rein weiß oder gelblich weiß, und hat rothe Augen. Man findet sie öfterer als die weiße Hausmaus.

Merkwürdige Eigenschaften.

Diese Thiere zeichnen sich besonders durch ihre Geschicklichkeit im Graben, Geschwindigkeit im Laufen und durch ihre Lustigkeit aus. Sie geben vorzüglich zur Zeit der Begattung einen höchstwidrigen Knoblauchs- oder vielmehr Bisamgeruch von sich, und eine einzige, die man einsperrt, kann in etlichen Stunden ein großes Zimmer übelriechend machen. Sie lassen immer einen hellen pfeifenden und zwitschernden Ton von sich hören, und sollen ein Alter von 7 bis 8 Jahren erreichen.

Verbreitung und Aufenthalt.

Diese Thiere haben ganz Europa und das nördliche Asien bis ans Caspische Meer herab zu ihrem Vaterlande.

Sie halten sich im Felde, im Walde, besonders in Laubhölzern, in hohen Felsengebirgen und in Häusern auf. Im Felde suchen sie die Wiesen, Zäune, Dämme und Steinhaufen auf und im Walde die alten Eichstöcke und wurzelreichen Gebüsche, graben sich, da sie die Natur mit einem Graberüssel, wie den Maulwurf, versehen hat, unter denselben und unter dem Moose ihre Wohnung und viele Gänge, halten sich in Gesellschaft zusammen, und vertreiben sich Abends, Morgens und Mittags durch Spielen, indem sie sich zu einer Höhle hinein und zur andern wieder herausjagen, die Zeit. In Gebäuden aber wohnen sie einzeln in Ställen, Scheunen,

Kel-

Kellern, Abtritten, Mistgruben und alten Mauern und allenthalben in Winkeln, wo es feucht ist.

Im Freyen machen sie im späten Herbste unter den Wurzeln der Bäume und Sträucher ein weiches Lager von klargebissenen Grashalmen, und halten sich in demselben in den rauhesten und kältesten Wintertagen auf, ohne in eine Erstarrung, wie der Hamster, zu verfallen. Diejenigen aber von ihnen, die in Häusern an warmen Orten wohnen, sind nicht nur den ganzen Winter hindurch wach, sondern pflanzen sich auch sogar zu dieser Jahrszeit fort. Eben so sieht man diejenigen, die an sumpfigen oder feuchten, schaurig liegenden Stellen, in Hekken, Zäunen und Büschen wohnen, den ganzen Winter unter der Oberfläche die Gras- und Baumdecke aufwühlen und ihre Nahrung suchen.

Nahrung.

Sie suchen in Häusern Getraide, Mehl, Fleisch, Brod und allerhand Eßwaaren zu ihrer Nahrung auf, und lieben besonders alle Fettigkeiten, daß sie sogar das Oehl aus den Lampen trinken. Im Felde und Walde aber gehen sie des Abends und Morgens auf die Regenwürmerjagd, die zur Zeit der Begattung, nach Gewittern und warmen Regen aus der Erde hervorkriechen, graben ihnen, und den Insektenlarven und Puppen auch unter dem Moose, Rasen und alten abgefallenen Laube nach, fangen große und kleine Käfer und andere Insekten, wo sie ihnen aufstoßen, weg, suchen das Aas auf,

und benagen die Wurzeln der Weinstöcke, Eichen, Buchen, Wachholder- und Obstbäume. Im Winter nähren sie sich besonders von den Insecten, die sich unter das Moos oder abgefallene Laub in Winterschlaf begeben haben, daher man an Zäunen, auf moosigen Wiesen und an andern Orten, wenn der Schnee schmilzt, ganze Gegenden umwühlt findet. Daß sie auch im Felde den jungen Vögeln, die auf der Erde ausgebrütet sind, nachgehen, wird dadurch überaus wahrscheinlich, weil sie die Stubenvögel, Rothkehlchen ꝛc. todtbeißen, in ihre Höhlen schleppen und fressen *).

Fortpflanzung.

Sie begatten sich des Jahrs mehrmalen, und zwar an Orten, wo sie der stäten Wärme genießen, ohne Unterschied der Jahrszeiten; im Freyen aber im April oder May das erstemal. Das Weibchen gebiert nach drey Wochen in einer Kluft, in dem Miste, oder im Grase unversteckt auf einem von allerhand klargebissenen Geniste, Stroh und Grashalmen verfertigten runden Neste fünf bis zehn nackende Junge, die sie drey Wochen lang sorgfältig säuget, alsdann aber auf die Insektenjagd um ihre Wohnung herum ausführet. Sie sehen jung röthlichgrau aus.

Feinde und Vertilgung.

Ihre Feinde sind die Katzen, Füchse, Eulen und andere Raubvögel. Sonderbar ist es, daß sie diese

*) Dieß ist eine sichere Erfahrung.

diese nur todt beißen, aber nicht verzehren, und man hat daraus geschlossen, daß sie giftig wären. Allein die Ursache ihres Abscheues mag wohl der starke Bisamgeruch und der ätzende Urin seyn, welches beydes dem Fleische einen unangenehmen Geschmack giebt. Die Füchse, besonders die Jungen, spielen mit ihnen, schnellen sie mit dem Munde in die Höhe und fangen sie wieder auf. In ihrem Balge wohnen eine Menge gelber Erdmilben.

Man fängt sie in Häusern, wie die andern Mäuse, in den so verschiedenen und bekannten Mäusefallen; besonders gehen sie dem Mehle nach, das man also mit Arsenik vermischen kann, um sie gleich zu tödten.

Nutzen.

Man hat noch bis jetzt keinen vorzüglichen Nutzen, den sie im Zusammenhange der Dinge, geschweige denn dem Menschen leisteten, entdeckt, da es gewiß ist, daß ihr Fleisch auch die hungrigsten Raubthiere und Raubvögel verabscheuen; man müßte denn dieses in Anschlag bringen, daß sie wohl manchen schädlichen Käfer und Wurm fressen mögen.

Schaden.

Diese Maus ist für die Scheunen, Kornböden, Mehlkasten, Fleischkammern, Weinstöcke, Frucht- und Waldbäume, und vielleicht für die jungen Vögel, die auf der Erde flück werden, ein schädliches Thier.

Daß sie aber giftig sey, den Pferden in den Bauch krieche, den Kühen in die Euter beiße und sie giftig verwunde, ist Irrthum — und Vorurtheil, wenn die Alten eine zu Asche verbrannte Spitzmaus große Heilkräfte zuschrieben.

(24) 31. Die Wasserspitzmaus.

(Taf. X. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Kleine Wassermaus, schwarze Wassermaus, kleiner Maulwurf und Gräber.

Sorex fodiens. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 113. n. 7.

Musaraigne d'eau. *Buffon.* hist. nat. VIII. 64. t. 11. Ed. de Deuxp. II. T. 9. f. 5. Uebers. von Martini IV. 267. 268. m. c. Fig. *Daubenton* Mem. de l'Academie de Paris 1758. p. 211. T. 5. f. 2.

Water-Shrew mouse. *Pennant* hist. of Quadrup. II. 225. Meine Uebers. II. p. 539.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 15.

v. Schrebers Säugeth. III. 571. Taf. 161.

Goezes Fauna. I. 477.

Donndorfs zool. Beytr. I. 373. Nr. 7.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist fast so lang, als der Leib; die Zehen sind mit Schwimmhaaren versehen, und der Oberleib ist glänzend schwarz.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Spitzmaus, welche in dem gemäßigtern Theile von Europa und in Sibirien wohnet, ist in Thüringen nicht so häufig, als die Wasserratte, doch ziemlich gemein. Sie ist etwas größer, als die gemeine Spitzmaus. Der Körper ist vier, der Schwanz zwey Zoll neun Linien lang, und die Höhe ist ein Zoll sechs Linien *).

Die Schnauze, welche flach ist und spitzig zuläuft, ist bis zu den Augen sieben Zoll lang, alsdann wird der Kopf auf einmal rund, das Thier nimmt bey seinen kurzen Halse immer mehr zu, ist rund und fett. Die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine, welche zur Seite der Brust am Leibe fest ansitzen, und weit über dem Knie auf eine ungewöhnliche Weise fast kahl oder nur kurz behaart. Sie haben fünf Zehen und der erste und fünfte an den Vorder- und Hinterfüßen hat bis an die Ferse äußerlich eine Reihe langer, steifer, wie ein Pfeil zu gespitzter, Häärchen, wie ein Kamm gestaltet; die übrigen Zehen aber haben kürzere. Die Nägel sind scharf und fleischfarben. Der Schwanz ist klar geschuppt und viereckig, und unter demselben läuft ein Streif länger

*) Par. Ms: Körper 3 Zoll 7 Linien; Schwanz 2 Zoll 7 Linien.

gerer Stachelhaare weg, die sich an der Spitze in einen Pinsel endigen. Der Rüssel ist ohne Knorpel, bloß, und hat an der Seite stehende runde Nasenlöcher. Der Mund liegt, zur Bequemlichkeit bey Aufsuchung ihrer Nahrung, weit unten, ist aber am obern Theile bis zur Schnauzenspitze gespalten. Der Oberkiefer ist zur Seite bis zu den Augen mit immer länger werdenden, rückwärts stehenden Barthaaren besetzt. Im Ober- oder Unterkiefer sind, wie bey den Nagethieren, zwey Vorderzähne mit braunen Spitzen, doch sind die obern länger und einwärts gebogen, da die untern vorwärts liegen. Dann folgen oben vier stumpfe, sehr kleine Eckzähne und drey in Zickzack gereihte starke Backenzähne; im Unterkiefer aber zwey vorwärts liegende scharfe Eckzähne, und drey mit spitzigen Zacken versehene Backenzähne *). Die Augen sind äußerlich unsichtbar, liegen sehr tief unter den Haaren in einer Höhle verborgen, sind schwarz und so groß, wie ein Hirsenkorn. Die Ohren sind denen der gemeinen Spitzmaus ähnlich, und ragen nicht unter den Haaren hervor. Die obere Oeffnung bildet einen breiten Ritzen an den Seiten des Kopfs und die vorwärts liegenden Ohrlappen legen sich in zwey Falten, schließen fest an, und decken den tiefer liegenden runden Gehörgang.

Der ganze Oberleib ist von der Spitze der Schnauze an schwarz, wie ein Maulwurf, und schimmert an der

*) Man sieht hieraus, daß dieses Thier eine schickliche Anstellung an die Nagethiere und zwar an die Gattung der Mäuse macht.

der Sonne ins kupferfarbene *), besonders ist der Rücken von den Vorderschenkeln an bis zu den Hinterschenkeln abstechend glänzend schwarz; der Unterleib aber ist außer einem schwarzbraunen Punkt an der Kehle oder einer dergleichen Binde um dieselbe, einem gleichfarbigen Flekken, der zwischen den Vorderfüßen sich anfängt und in der Mitte des Bauchs sich spitzig endiget, und einem schwarzen After, gelblich weiß. Die Füße und der Schwanz sind dunkelaschgrau. Das ganze Thier ist, wie der Maulwurf, mit sammtweichen Haaren bedeckt.

Getödtet nehmen die Haare gleich Wasser an, lebendig aber lassen es die ganz feinen Haarspitzen, wenn sie in ihrer gehörigen Ordnung liegen, nicht zu.

Ihr Fleisch und ihre Eingeweide riechen wie ein aufgebrochener Fisch, welches von ihrer Nahrung herrührt.

Das Weibchen ist etwas starker und kürzer, als das Männchen, hat auf jeder Seite des Bauches sechs Säugwarzen, und ein sehr großes Geburtsglied, das mit dem After in einer Falte eingeschlossen liegt.

Im Sommer 1796 habe ich in meinem Wiesenbache auch eine von einem Raubvogel oder Raubthiere getödtete weiße Varietät entdeckt. Sie war schneeweiß. S. f. albus.

Bey der Begattung und bey ihren Spielen lassen sie beständig ein helles Zischen von sich hören.

Ihr

*) Rothbraune habe ich niemals angetroffen.

Ihr Alter ist noch unbekannt.

Aufenthalt.

Diese Wasserspitzmäuse sind mehr eigentliche Wasserthiere, als die sogenannten Wasserratten (Mus amphibius). Sie leben sonderlich gern in hellen Kieselbächen der Berge und in Quellwassern in Gesellschaft der Forellen. Wenn man sie sucht, so muß man sie überhaupt mehr in Bächen oder Flüssen suchen. Wenigstens ist es in Thüringen so. Der Schöpfer, der ihnen in diesem Elemente die Schwimmhaut versagte, entschädigte sie dafür durch ihre haarigen Füße, (Franzenfüße) mit welchen sie, da sich diese Haare, wie eine Schwimmhaut, ausbreiten, ungemein fertig schwimmen können. Ihre eigentliche Wohnungen sind ausgeschwemmte Höhlen im Ufer unter den Steinen und Gebüschen, die sie sich nach ihrer Bequemlichkeit erweitern und einrichten. Darin halten sie sich die meiste Zeit auf, sonderlich wenn sie den Stöhrungen der Menschen und Thiere ausgesetzt sind. Wo sie dieß aber nicht zu befürchten haben, da rudern sie oft, besonders in den warmen Mittagsstunden über das Wasser, und die ganze Gesellschaft eines Baches kömmt eine Viertelmeile weit an einem gewissen Orte zusammen, und vertreibet sich durch Necken und Jagen aus einer Uferkluft in die andere, und durch Hin- und Herschwimmen über das Wasser unter beständigem Zischen, die Zeit. Sie besuchen aber auch die Ställe und Scheunen, die in der Nähe der Bäche liegen, und halten sich, wenn sie Nahrung haben, lange Zeit daselbst auf *). Nah-

*) Ich habe sie in Ställen angetroffen, die eine ziemliche Strek-

Nahrung.

Ihrer Nahrung gehen sie an unruhigen Orten in der Dämmerung des Abends und Morgens nach; an stillen aber zu allen Zeiten, wenn sie hungert. Sie besteht vorzüglich in Insektenlarven, die sich im Wasser ausbilden, als Mücken- Schnaaken- und Libellenlarven, besonders aber der eingehülseten Frühlingsfliegenlarven (Phryganea L.); doch fressen sie auch kleine Wasserschnecken, Forellen- und andern Fischroggen, und die kleinen weißen und rothen Wasserwürmchen. Man sieht sie daher, wenn sie sich füttern wollen, alle Kieselsteine, die im Wasser liegen, durchsuchen. Im Nothfall nehmen sie auch ihre Nahrung aus dem Pflanzenreiche. Im Winter schlafen sie nicht so lange als die Spitzmaus, sondern gehen ebenfalls unter dem Eise ihrer Nahrung im Wasser nach. Sie gehen auch ans Land wie Wasserratten, schlüpfen an niedrigen Ufern durch das Schilf und Ufergras, laufen in feuchten Wiesen im Grase herum, spielen darin und schnappen Insecten weg, oder fressen Gras oder saftige Kräuter.

Fortpflanzung.

Sie begatten sich im April und zu Anfange des Mays in seichten Wassern, und die Weibchen tragen drey Wochen; alsdann gebähren sie im Ufer an einer trokkenen Stelle auf die bloße Erde, oder auf etwas weniges Gras und Genist sechs bis acht blinde Junge, die etliche

Strecke vom Wasser lagen, und wo sie mit den Kaninchen Klee fraßen.

etliche Wochen der Muttermilch bedürfen, ehe sie auf den Insectenraub ausschwimmen können *).

Die Jungen sind oben schwarzblau, an den Seiten und Schwanze röthlich und unten weiß, und spielen den ganzen Tag auf dem Wasser und üben sich im Schwimmen.

Feinde.

Außer den bey der gemeinen Spitzmaus angegebenen Feinden verfolgt sie auch der Iltis; die Jungen findet man auch zuweilen in einem Hechtmagen begraben.

Jagd und Fang.

Man kann diese Thiere nicht besser bekommen, als wenn man sie im Sommer am heißen Mittage oder des Abends 7 Uhr erlauert, und mit Vogeldunst, wenn sie durchs Wasser schwimmen, erleget. Nur selten fangen sie sich in kleinen Tellerfallen, die man vor ihre Höhlen ganz locker aufstellt.

Nutzen.

Die Menschen haben noch keinen wichtigen Gebrauch von ihnen zu machen gewußt, ob sie gleich (ihrem Geruch nach zu urtheilen, und da sie Fischroggen und die Nahrung der Fische genießen) nicht übel schmecken mögen; auch ihr Balg müßte zu nutzen seyn, wenn sie sich häufiger fortpflanzten.

Sie

*) Man kann ihr Nest sehr leicht finden, wenn man nur den Ort bemerkt, wo sich ein Paar (da sie in der Monogamie leben) immer sehen läßt, und die Höhle, wo es immer einschlüpft.

Sie fressen die Larven vieler beschwerlichen Insekten.

Schaden.

Sie wären vielleicht ganz unschädliche Thiere, wenn sie sich nicht an der kostbaren Forellenbrut vergriffen.

Ihr Urin und Blut ist an rothen oder wunden Theilen ätzend.

(25) 32. Die grabende Spitzmaus.

Sorex cunicularius.

(Taf. X. Fig. 2.)

(Schwarze Angelmaus.)

Sorex Eremita. Meine getreuen Abbildung. naturhistorischer Gegenstände. 2s Hundert. S. 22. Taf. 14.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren sind ganz unter den Haaren versteckt; die Schnauze ist im Verhältniß kürzer und dicker, und die Augen größer, und der ganze Oberleib schwarz.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Spitzmaus, die ich noch nirgends beschrieben gefunden habe, hält in Ansehung der Größe das Mittel zwi-

zwischen der gemeinen und Wasserspitzmaus. Der Körper ist drey Zoll acht Linien, der Schwanz zwey und einen halben Zoll lang *), und die Höhe des Thiers einen Zoll und fünf Linien.

Der Kopf ist ganz im Halse versteckt, und dieser fast mit dem runden Leibe von einerley Dicke; die Füße sind kurz, die Zehen mittelmäßig und die Nägel lang und scharf. Wenn man den langen Schwanz wegnimmt, so sieht sie aus wie ein kleiner Maulwurf, doch läuft die Schnauze allmähliger spitzig zu. Wenn man ihre Schnauze mit der von der gemeinen oder der Wasserspitzmaus vergleicht, so ist sie stärker und kürzer, bis zu den Augen fünf Linien lang, und verliert sich nur allmählig in einen spitzigen Winkel; auch die schwarzen Augen sind größer. Oben und unten liegen vorne im Munde zwey spitzige, gelbliche Vorderzähne, wovon die obern kurz und breit, die untern aber spitzig und lang sind; hierauf folgen in der obern Kinnlade drey dreyeckige eingebogene Eckzähne, wovon der vordere kaum merklich ist, und unten zwey rundere und stärkere; dann oben vier und unten drey gezackte Backenzähne. Die Ohren sind so unter den Haaren versteckt, daß man auch nicht einmal einen Wulst gewahr wird. Der Schwanz ist ziemlich behaart, mit einzelnen sträubigen Borstenhaaren besetzt, gleich dick und nur am Ende plötzlich zugespitzt.

Der

*) Par. Ms.: Länge des Körpers 3 1/4 und des Schwanzes 2 1/4 Zoll.

Der ganze Oberleib mit den Füßen und dem Schwanze ist schwarz, aber nicht so glänzend, wie beym Maulwurf. Die Einfassung des Oberkiefers und ein schmaler Streifen längs dem Unterleibe, vom Kinn bis zum After, sind schmutzigrostgrau; die Nägel und Spitzen der am Oberkiefer bis zum Augen spitzwinklich stehenden und allmählig größer werdenden Baarthaare sind weiß.

Aufenthalt.

Diese Spitzmaus habe ich noch nie anders als unter der Erde angetroffen. Sie gräbt wie der Maulwurf, obgleich nicht in solcher Tiefe, doch immer tiefer als die gemeine Spitzmaus, ein bis anderthalb Fuß unter der Erde weg, und durchreutet nicht bloß die Oberfläche, wie jene. Ich habe ihr daher den Namen grabende Spitzmaus vorzugsweise geben müssen.

Am Tage muß sie wenig oder gar nicht ans Licht kommen, wohl aber des Nachts, weil ich sie mehrmals in den Magen der Eulen gefunden habe.

In Thüringen ist sie auf den Waldwiesen und in Gärten keine Seltenheit, und ich habe sie nicht nur selbst mehrmalen in den für Maulwürfe eingegrabenen Töpfen gefangen (zuweilen die ganze Familie in einem Topfe), sondern auch andere Personen haben sie mir gebracht, und statt der Maulwürfe in den Töpfen fallen gefunden.

In die Häuser geht sie nicht, wie die gemeine Spitzmaus.

Nahrung.

Diese besteht, wie die des Maulwurfs, aus Insecten, Insectenlarven, Würmern, Wurzeln, Gras und Kräutern.

Fortpflanzung.

Man hat mir auch ihr Nest mit Jungen und Alten gebracht, das man bey Umgrabung eines Gartenbeets entdeckt hatte. Es bestand aus zerbissenem Miststroh und enthielt vier schwarze Junge, die noch nicht sehen konnten.

33. Die weißzähnige Spitzmaus.

Sorex Leucodon. *Hermann.*

Der Weißzahn. v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 382. n. 311.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 159. D. ohne Beschreibung.

White-toothed Shrew-mouse. *Pennant* hist. of Quadrup. II. 228. Meine Uebers. II. p. 543.

Kenn-

Kenzeichen der Art.

Oben schwärzlich aschgrau, unten weiß, weiße Schneidezähne und ein runder behaarter Schwanz.

Beschreibung.

Die Ohren sind ziemlich groß und oval; die Vorderzähne weiß; der Oberleib ist bis zur Hälfte der Seiten herab schwärzlich aschgrau oder schwarzbraun; der Unterleib weiß; der Schwanz ohngefähr halb so lang als der Körper, dünn, stärker behaart, als gewöhnlich, oben wie der Oberleib, unten wie der Unterleib.

Sie riecht stark nach der Wurzel des Haarstrangs (Peucedanium offinale) und bewohnt Elsas.

34. Die Spitzmaus mit dem vierseitigen Schwanze.

Sorex tetragonurus. *Hermann.*

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 383. n. 312.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 159. B. ohne Text.

Square-tailed Shrew-mouse. *Pennant* hist. of Qnadrup. II. 228. Meine Uebers. II. p. 543.

Kennzeichen der Art.

Körper oben schwärzlichgrau, unten blässer; Schwanz fast vierseitig; bräunliche Schneidezähne.

Beschreibung.

Die Ohren sind mehr verdeckt; der Unterleib ist grau.

Ist ohne Geruch und wohnt ebenfalls, so wie die folgende, im Elsas.

Dieß ist wohl meine grabende Spitzmaus.

35. Die verkehrtschwänzige Spitzmaus.

Sorex constrictus. *Hermann.*

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 383. n. 313.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 159. C. ohne Text.

Unicolor Shrew-mouse. *Pennant* hist. of Quadr. II. 228. Meine Uebers. II. p. 544.

Kennzeichen der Art.

Sie ist schwärzlich aschgrau; der Schwanz ist zunächst am Leibe ungewöhnlich dünn, und bald weiter hin dicker.

Beschrei-

Beschreibung.

Die Ohren stehen nicht deutlich hervor. Der Schwanz ist behaart.

Im Elsas.

Sie hat keinen Geruch. Ich glaube, sie gehört zur grabenden Spitzmaus.

Herr Hermann hat sie nur jung beobachtet, und glaubt, sie erreiche die Größe des Maulwurfs.

36. Die gefurchte Spitzmaus.

Sorex carinatus. *Hermann.*

Carinated Shrew-mouse. *Pennant* hist. of Quadr. II. 128. Meine Ueberf. II. p. 543.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist unten ausgefurcht; hinter jedem Auge befindet sich ein weißer Fleck.

Beschreibung.

Der Oberleib ist schwärzlich aschgrau; der Bauch weißlich; die Vorderzähne sind braun; der Schwanz ist dünn, läuft spitzig zu und ist unten haarig und gefurcht.

Im Elsas.

Ist wohl eine Wasser-Spitzmaus *).

*) Die vier letzten, hier beschriebenen Thiere, welche Hr. Prof. Hermann in Straßburg für verschiedene Arten hält, finden sich alle auch in Thüringen, und ich könnte sie noch mit zwey Arten vermehren: a) Spitzmaus, deren Schwanz fast so lang als der Leib ist, und b) deren Schwanz am Ende einen Haarbüschel hat. Allein ich halte nach langer Beobachtung und Erfahrung diese Abweichungen für weiter nichts, als für Veränderungen einer und eben derselben Art, der gemeinen Spitzmaus, die Härung, Alter, Jahrszeit und Lebensart verursachen. Junge Spitzmäuse, wovon ich jetzt zu Ende des Januars ein Exemplar, das ich im Thüringerwalde fieng, vor mir habe, und das kaum noch etwas größer als ein Maykäfer ist, weil es vielleicht zu Ende des Octobers jung wurde, und dessen Schwanz fast gleiche Länge mit dem Körper hat, haben meist weiße Zähne, einen ganz behaarten Schwanz mit und ohne Stachelhaare, mit Haaren umgebene Krallen, oft kaum und oft gar nicht aus den Haaren hervorstehenden Ohren. An allen Spitzmäusen ist der Schwanz am Ende des Körpers dünner, als weiter hin; nur an einem Exemplare mehr, an andern weniger. Eben so ist fast bey allen die untere Schwanzseite eckig, nur bey den Jungen mehr, bey den Alten weniger bemerklich. Alle diese Abänderungen habe ich bey Haus- und Waldspitzmäusen, bey grabenden u. s. w. und oft alle in einer Gesellschaft gefunden, so daß ich diese Thiere unmöglich ohne genauere Angaben ihrer Gestalt und Lebensart als besondere Arten trennen kann.

Die sechzehnte Gattung.

Igel. Erinaceus.

Kennzeichen

Oben sind zwey walzenförmige von einander stehende, und unten zwey dicht an einander liegende Vorderzähne.

Oben fünf und unten drey Eckzähne *).

Backenzähne auf jeder Seite vier mit vier kurzen Spitzen.

Der Zehen sind fünfe.

Der Körper ist mit Stacheln und an den stachelfreyen Stellen mit Borsten bedeckt.

Die Thiere dieser Gattung haben immer einen kegelförmigen Kopf, der sich in einen abgestumpften Rüssel endiget.

*) Hr. Blumenbach sagt in seinem Handbuche der N. G. S. 84: Er habe oben und unten sechs Vorderzähne; oben drey und unten einen Eckzahn. Oben wären so viel Vorderzähne im os intermaxillare, dem merkwürdigen Knochen, der bey den meisten Säugethieren vorn zwischen den Oberkiefern gleichsam eingekeilt ist, und die untern paßten auf jene.

Ihre Nahrungsmittel sind Insekten, Gewürme, Baumfrüchte und andere Vegetabilien. Der Magen ist vierfach. Die Fortpflanzung geschieht von Jungen nach dem ersten Jahre. Das weibliche Geschlecht hat zehn Säugwarzen.

(26) 37. Der gemeine Igel.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Erdigel, Europäischer Igel. Die Jäger nennen diejenigen Igel, welche sich in Wäldern aufhalten, wilde, und die um die Häuser und in Gärten wohnen, einheimische Igel.

Erinaceus europaeus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 115. n. 1.

Herisson. *Buffon* hist. nat. VIII. 28. T. 6. Ed. de Deuxp. II. T. 11. f. 3. Ueberf. v. Martini V. 16. m. e. Fig.

Common Hedge-Hog. *Pennant* hist. of Quadrup. II. 234. Meine Ueberf. II. p. 549.

v. Schrebers Säugeth. III. 580. Taf. 162.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 21.

Goeze's Fauna. I. 418.

Donndorfs zool. Beytr. I. 382. n. 1.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Aus jedem Nasenloche ragt der umgebogene Rand wie ein Kamm hervor, und die Ohren sind kurz und abgerundet.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Den Igel macht sein stachlicher Rücken vor allen andern Thieren Deutschlands hinlänglich kenntlich. In der Entfernung hält man ihn, wenn man ihn ruhig sitzend antrifft, für eine abgerundete Erdscholle. Er hat in der Gestalt, und verschiedenen Eigenschaften vieles mit dem Dachse gemein. Von der Schnauze bis zum Schwanz beträgt seine Länge 1 Schuh, die Länge des Schwanzes 1 Zoll und die Höhe beynahe 5 Zoll *).

Der Kopf ist kegelförmig und endiget sich in eine abgestumpfte eingekerbte schwarze Schnauze (Rüssel), welche der Hundeschnauze ähnlich ist. Die Nasenlöcher liegen zur Seite, sind länglich, und auf der untern oder äußern Seite ragt der umgebogene Rand, als ein kurzer hautartiger gefalteter Kamm hervor. Der Oberkiefer enthält zwey lange walzenförmige von innen nach außen schief zugeschärfte Vorderzähne, welche weit von einander stehen, damit die zwey kurzen dicht zusammengefügten,

*) Par. Ms.: Körper 10 Zoll 7 Linien; Schwanz fast 1 Zoll; Höhe 4 Zoll 6 Linien.

ten, schräg vorwärtsliegenden Vorderzähne im Unterkiefer in diese Spalte einpassen können. Dann folgen oben auf beyden Seiten fünf zusammengekerbte übergebogene stumpfe Eckzähne, deren zwey und drey zusammen stehen, und deren letzterer zwey Zacken hat, und ganz wie ein Backenzahn gestaltet, nur nicht so groß ist, nebst vier Backenzähnen, wovon der letzte, gerade wie beym Hasen, sehr klein ist, und nur zwey Zacken hat, da die vordern deren vier haben. In dem Unterkiefer befinden sich drey vorwärtsgestreckte beynahe horizontalliegende Eckzähne, deren dritter wiederum den Backzähnen ähnelt, und vier Backenzähne, von welchen der erste drey, der zweyte fünf, der dritte vier und der vierte nur einen Zacken hat. Zusammen besteht also das Gebiß des Igels aus 36 Zähnen. Die Augen sind klein, und stehen weit hervor, der Stern ist schwarzbraun, und die Augenwinkel sind blau. Die Ohren sind breit, kurz, aufgerichtet, abgerundet, dünn behaart, und liegen unter den Stacheln verborgen. Der Hals ist wegen der Stacheln, die von der Stirn anfangen, unmerkbar und der Körper läuft dann, wenn der Igel ausgestreckt ist, bis zum kurzen, dünnen, fast kahlen herabhängenden stumpfen Schwanze in einer Linie und Dicke fort. Die kurzen Beine haben an jedem Fuße fünf getrennte dicke Zehen mit langen scharfen schwarzen Nägeln. Die Daumenzehe ist kürzer als die übrigen. Die Vorderfüße sind stärker als die hintern, welche schmäler und länger sind, auch längere Nägel haben. Er geht auf der ganzen Ferse.

Der ganze obere Theil des Körpers ist mit hornartigen, einen Zoll langen, Stacheln, die aus dem Fette

des

des Thiers herausgewachsen sind, besetzt. Sie sind oben und unten spitzig — weiß, braun und schwärzlich geringelt. Der Kopf ist von der schwarzen glatten Nase an bis zur Mitte der Stirn mit harschen graugelben Haaren, die nach der Stirn zu lichter werden, besetzt. An der Seite desselben zieht sich ein schwarzer Streifen hin, welcher die Augen wie ein schwarzer Ring einfaßt. Die Beine sind rothgelb und die Füße schwarz. Der ganze Unterleib hat wollige Haare, die außer einem schwärzlichen Flecken an der Brust und am After weißgelb sind. Die Seitenhaare aber sind stachlich und rothgelb, und die einzelnen Schwanzhaare oben schwarz und unten rothgelb.

Das Weibchen ist vom Männchen wenig unterschieden; doch hat es einen spitzigern Kopf, einen stärkern Leib und ist heller oder grauer als das Männchen. Es hat zehn schwarze Säugwarzen, sechs an der Brust und vier am Bauche.

Varietäten:

Man nimmt gewöhnlich in Thüringen zweyerley Arten oder Rassen an:

1) den Hundeigel mit der Hundeschnauze, welcher kleiner und schwärzer ist, und

2) den Schweineigel, Sauigel mit dem Schweinsrüssel, der grauer und nach einigen größer, nach andern aber kleiner ist, als der Hundeigel.

Allein

Allein diese Angabe ist eben so, wie bey dem Dachse *), ungegründet. Es giebt nicht mehr als eine Art, nämlich die oben beschriebene, oder den sogenannten Hundeigel. Diejenigen Igel, welche man Schweineigel nennt, sind entweder die Weibchen, oder die Jungen der Hundeigel. Das Weibchen nämlich ist, wie oben schon bemerkt wurde, etwas größer, lichter von Farbe und hat eine längere und spitzigere Schnauze, als das Männchen, welches eines Theils daher kömmt, daß wirklich der Kopf des Männchens etwas kürzer oder zusammengedruckter ist, andern Theils aber auch daher, daß bey dem Männchen die Stacheln weiter in die Stirne reichen, als bey dem Weibchen.

Diejenigen, welche kleinere Igel für Schweineigel ausgeben, nehmen die jungen Hundeigel, welche im ersten Jahre noch nicht ausgewachsen sind, dafür an. Diese haben ebenfalls spitzigere Köpfe und eine hellere Farbe als ihre Väter.

Eine schöne aber seltene Varietät ist a) der weiße gemeine Igel (E. europ. albus) Ich habe einen gesehen, der von meinem Jagdhunde gefangen wurde. Er war über den ganzen Leib weiß, und hatte ein allerliebstes Ansehen. Ich hätte ihn gern lebendig erhalten, wenn ihn der Hund nicht todt gebissen hätte. Einen andern besitzt Hr. Leutenant von Schauroth in Meiningen und Hr. Forstcommissarius Hofmann in Georgenthal.

Noch

*) Es scheint eine von der andern ihren Ursprung zu haben.

Noch seltner ist b) der gefleckte Igel (E europ. maculatus). Er ist weißgefleckt, d. h. einige Stellen des Körpers sind ganz mit weißen Stacheln besetzt. (Taf. XI. Fig. 1.)

Zergliederung*).

1) Beym Zergliedern findet man den Grund, warum sich das Thier wie eine Kugel zusammenrollen kann. Das ohnehin schon bogenförmig gebaute Rückgrat hat viele kurze Wirbel, und unter der Haut ist eine starke Muskel, damit das Fleisch auf eine verhältnißmäßige Art dem Zusammenziehen der Wirbel folge.

2) Das Auge des Igels hat weder die wäßrige noch glasartige, sondern bloß die Krystallfeuchtigkeit, an welcher die Netzhaut unmittelbar sitzt. Das Thier scheint auch wegen seiner Kurzsichtigkeit, da es bloß auf dem Boden im Dunkeln herumsucht, nicht mehr zu brauchen. Die Nase ist dafür desto besser, mit derselben schnüffelt es im Gehen immer auf dem Boden hin, um seine Nahrung zu suchen. Daß es schlecht sieht, erkennt man auch daran, daß der Igel einem zuweilen auf den Anstand, wo man ganz stille ist, vor den Füßen herum läuft, und sich nicht eher in eine Hecke reterirt, als

*) Perrault, Charras und Dodart's Abh. aus der N. G. Taf. 43.
Riegel, Philos. animalium Fasc. I. de Erinaceo, tradens huius digestionis instrumenta etc. Havniae 1799.

als bis er mit der Nase an den Fuß stößt, wo er dann wittert, daß hier eben kein Freund für ihn steht.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Der Igel ist ein dummes, furchtsames und träges Thier, das bey dem geringsten Geräusch sich in eine stachliche Kugel verwandelt, und in diesem Zustande abwartet, ob seine Furcht gegründet oder ungegründet war. Er riecht gerade wie ein Hund, geifert stets helles Wasser aus Mund und Nase, um sich vielleicht wegen seines schlechten Gesichts den Weg zu bezeichnen, und beriecht alle Gegenstände, die ihm aufstoßen, mit stätem Nasenzucken.

Der Laut, den die Igel bey ihren Spielen in abgefallenem Laube, wo sie sich jagen, verstecken und necken, in der Begattungszeit und in der Noth, hören lassen, ist ein helles Schnalzen, rufflendes Murmeln und heiseres Quäcksen.

Sie zeigen eine beynahe unglaubliche Gefühllosigkeit bey Schmerz. Wenn sie Zergliederer lebendig aufgenagelt und so allmählig aufgeschnitten haben, so haben sie kaum einen ängstlichen oder klagenden Ton von sich hören lassen. Sie sollen acht bis zehn Jahr alt werden.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Igel bewohnen Europa und Madagaskar, sind in Rußland gemein, werden aber nicht in Sibirien gesehen.

Sie

Sie halten sich im Sommer in Laubhölzern, in faulen an der Wurzel ausgehöhlten Bäumen und unter den Büschen, in Gärten in den Hecken, in zusammengeharkten Mist- und Laubhaufen, in den Löchern der Gartenmauern, und auf dem Felde im Getraide auf. Wo sie keine natürliche Höhle finden, graben sie sich eine mit ihrem Rüssel und ihren scharfen Klauen ohngefähr einen Fuß tief, und machen sie mit Laub und Stroh und altem Grase weich. Ein solches Lager hat allezeit zwey Oeffnungen, gewöhnlich eine gegen Mittag, und die andere gegen Mitternacht, welche sie aber auch zuweilen nach dem Zug der Luft verändern. In der hohen Frucht machen sie sich auch wohl nur ein bloßes Nest von Halmen. Sie graben sich auch für den Winter, doch jedes Geschlecht für sich, eine eigene Grube unter die Wurzeln der Bäume, oder in dicke Gesträuche und Hecken, oder unter die Gartenhäuser und Gartenmauern, tragen sich im Herbste einen großen Haufen Materialien an Stroh, Heu, Laub und Moos zusammen, füttern sich ihr Lager damit aus, verscharren sich beym ersten starken Frost tief in dasselbe, und liegen bis zum warmen Frühling in einer beständigen Betäubung darin begraben. Das Zeugungsglied des Männchens liegt, wie bekannt, in der Mitte des Bauches, und nicht nur beym Zusammenziehen, sondern auch den ganzen Winterschlaf hindurch, liegt allemal die Schnauze auf der Oeffnung der Scheide, und das Weibchen legt die ihrige auf die Oeffnung des Geburtsgliedes.

In und vor ihrem Sommerlager, worein sich Männchen und Weibchen zu dieser Jahrszeit beysammen

men aufhalten, spielen sie am Tage, und schleichen mehrentheils des Abends erst ihrer Nahrung halber aus.

Sie bewohnen ihre Nester viele Jahre hinter einander, wenn sie nicht verscheucht werden.

Nahrung.

Der furchtsame Igel schleicht nur bey der größten Stille des Tages nach seiner Nahrung, sonst thut er es lieber des Nachts. Er ist sowohl in Absicht der Nahrungsmittel selbst, die er zu seiner Sättigung braucht, als auch der Art der Aufsuchung derselben, dem Dachse sehr ähnlich; doch entfernt er sich weiter von seiner Wohnung ins freye Feld, als jener, und der Jäger wird oft, wenn er des Morgens auf dem Anstande steht, und dieser wieder zu Holze oder Hecke geht, von ihm hintergangen, indem er ihn für einen Hasen hält.

Die Maulwürfe, welche im Herbst und Frühjahr aus ihren Löchern hervorkommen, so wie die großen und kleinen Feldmäuse, weiß er sehr schlau zu fangen; auch hascht er Frösche und Kröten. Seine gewöhnliche Nahrung ist in den Gärten abgefallenes Obst, Aepfel und Birnen, und in den Feldern Getraide und Wurzelfrüchte, als gelbe Rüben und Pastinaken. Schnecken, Regenwürmer, Mistkäfer, Maykäfer und andere Insekten speißt er ebenfalls, und die spanischen Fliegen (Meloe vesicatorius), die andern Thieren Zuckungen und in Menge genossen, den Todt verursachen, sind ihm eine angenehme und zuträgliche Speise. Auch die Weinstöcke

stöcke besucht er und dabey giebt man ihm diesen künstlichen Diebstahl, ob mit Recht oder Unrecht, kann ich nicht aus eigner Erfahrung behaupten — Schuld, daß er nämlich die Trauben abreiße, die Beeren zerstreue, und sich mit seinem Rücken so lange auf denselben herumwälze, bis sie an den Stacheln hängen blieben, dann, so beladen, in seine Wohnung eile, die Beeren wieder abschüttele, und sich auf diese Art einen Vorrath von dieser kostbaren Speise sammle. So viel ist gewiß, wie mir ein glaubwürdiger Augenzeuge versichert hat, daß er unter den Bäumen die kleinen Birnen zusammen an den Stamm trägt, und sich alsdann auf beyden Seiten darauf legt, daß sie an den Stacheln hängen bleiben und so in seine Wohnung eilt. Man hat gesehen, daß ihn zwölf Birnen an den Stacheln sind hängen geblieben. Durch diese Art Diebstahl kommt mancher ehrlicher Mensch zuweilen in Verdacht.

Im Winter bedarf er keiner Nahrung, weil er in seinem langen und festen Schlafe zu dieser Jahrszeit von seinem Fette, das er sich im Herbste gesammelt hat, zehren kann.

Fortpflanzung.

Die Begattung der Igel fällt in die Mitte des Aprils und in den May; sie geschieht wegen ihres stachlichen Rückens stehend oder liegend.

Das Weibchen wirft nach sieben Wochen im Julius und Anfange des Augusts vier bis sechs Junge, und zwar

am liebsten in Gärten in Mist- Laub- oder Mooshaufen, doch auch ins Gesträuche, dicke Zäune und ins Getraide, und füttert allzeit ihr Lager mit klar gebissenen dürrem Grase vorhero aus. - Es säugt die Jungen, die anfangs weiß, auf ihrer Haut nur mit Spuren von Stacheln und mit hängenden Ohren versehen sind, vier Wochen, und trägt ihnen Schnecken, Regenwürmer, Weintrauben und abgefallenes Obst zu ihrer Nahrung herbey. Man kann die Jungen, die erst im zweyten Jahre ausgewachsen, und zur Begattung tüchtig sind, so wie die Alten, in den Häusern, wie die Katzen zu Wegfangung der Mäuse, mit Milch und Brod erhalten, und wenn man sie statt der Milch mit Wein tränkt, so machen sie wunderliche Gebeerden und Sprünge.

Feinde.

In Thüringen hat er keinen größern Feind als den Fuchs, der besonders im Winter seine Wohnung auswittert und ihn als eine Delikatesse verzehrt. Nur sehr gute Hunde gehen ihn an, und zerreißen ihn; alle aber bellen ihn sehr grimmig an und scheinen eine natürliche Feindschaft gegen ihn zu hegen. Auch Bären und Wölfe sollen ihn fressen. Durch eine Art gelber Erdmilben, durch die Holzböcke (Acarus Ricinus), die sich in Menge an ihn einsaugen, und durch die Bandwürmer wird er sehr geplagt.

Fang.

Der Igel macht seine Fährte (Taf. XXIII. Fig. 11.) der Dachsfährte, wenn man die Größe abrechnet, völlig

völlig gleich. Er spreizt die Zehen eben so weit von einander und hat eben den schleichenden Gang, wie der Dachs. Seine Spur formt ein Zickzack (er schränkt) und die der Vorderfüße ist größer und breiter, als die der Hinterfüße, welche schmäler, aber länger ist. Man kann ihn, wenn man ihn zur Vertilgung der Mäuse brauchen will, sehr leicht fangen. Da er sich den Sommer über vorzüglich in Hecken aufhält, so darf man nur in solchen Gegenden, wo diese Thiere sind bemerkt worden, in der Abenddämmerung, oder beym Mondenschein an denselben lauschen, an den Stellen, wo man ein Geräusch bemerkt, mit dem Stocke anschlagen, und man wird gewiß beym Nachsuchen einen zusammengerollten Igel finden, den man in ein Schnupftuch hüllen und nach Hause tragen kann. Nur sehr gute Hunde gehen dieses Stachelthier an und scheuen die Stacheln nicht. Da sie sich eher zerreißen, als mit Gewalt zur Aufwikkelung bringen lassen, so bedienen sich die Menschen um dieß zu bewirken, des Beschüttens mit Wasser oder des Eintauchens in dasselbe, welches ihnen das Athemholen hemmt, und sie zur Entwickelung zwingt, und der listige Fuchs braucht zu dieser Absicht seinen stinkenden Harn.

Nutzen.

Die Igel sind natürliche und bestimmte Feinde der Feldmäuse, und mancher schädlicher Insekten *).

*) In Senegambien befreyt er die Einwohner von den schädlichen Schaben (Blatta). Adansons Reise. 247.

Man kann ihr Fleisch essen, besonders sind sie im Herbste sehr fett, und wenn sie sich vom Obste genährt haben, am wohlschmeckendsten. In Senegambien rechnet man sie daher zu dieser Jahrszeit unter die besten Gerichte. Auch in Spanien ißt man sie zur Fastenzeit, weil man sagt, sie lebten bloß von Kräutern, und daher könnte sie auch die Kirche als kein Fleisch essen.

Ihr Fett, das unter der Haut wie Schweine fett ansetzt, ist in der Medicin ein gutes erweichendes Mittel, das an Menschen und Vieh gebraucht wird.

Seine Haut mit den Stacheln wurde sonst statt einer Hechel oder Bürste gebraucht, um den Hanf zu reinigen.

Man kann ihn auch statt einer Katze in den Scheunen, Ställen und auf den Kornböden zu Wegfangung der Mäuse nutzen; dann darf man ihm nur bloßes Wasser oder Milch zu Löschung seines Durstes hinsetzen, wenn man glaubt, daß ihn die Mäuse hinlänglich nähren können. Bey den Kalmucken ist er deshalb ein Hausthier geworden. Er macht sich aber in Häusern durch seine Unreinlichkeit, seinen unangenehmen, fast bisamartigen Geruch, und durch das Geräusch, das sein Gang verursacht, und wodurch er Stöhrer der nächtlichen Ruhe der Menschen wird, nicht beliebt.

Schaden.

Wenn man ihn in Häusern hält, so soll er die jungen Küchelchen und Eyer wegtragen.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Der oben angegebene fälschliche Unterschied zwischen Schweine- und Hundedachse.

2) Sie sollen den Kühen die Euter aussaugen.

3) Sonst brauchten die alten Aerzte den zu Asche gebrannten ganzen Igel, Leber, Milz, Galle, Blut, Koth und das innere Magenhäutchen gegen vielerley Krankheiten.

Dritter Abschnitt.

Nagethiere. Glires.

Die meisten hieher gehörigen Thiere sind klein, und nur wenige haben eine mittlere Größe, wie z. B. der Hase.

Ihre Beine sind kurz und die Füße lang, und sie gehen mit den Hinterbeinen, welche allzeit größer und stärker sind, als die vordern, auf der ganzen Ferse. Ihr Gang ist springend, und ihre Fährte bekömmt daher eine eigne, aber sehr auszeichnend kenntliche Gestalt.

Die siebenzehnte Gattung.

Halbkaninchen. Cavia.

Kennzeichen.

In der obern Kinnlade befinden sich zwey keilförmige, getrennte und zugespitzte Vorderzähne, und unten zwey oder vier, die an einander stehen.

An den Vorderfüßen sind vier und an den Hinterfüßen mehrentheils drey Zehen.

Der Schwanz fehlt oder ist nur kurz und kahl.

Ihr

Ihr Gang ist hüpfend und langsam. Sie leben in hohlen Bäumen und unter der Erde. Alle sind ursprünglich in Amerika zu Hause, und nur das Meerschweinchen ist bey uns einheimisch worden, und wird als ein zahmes Thier erzogen.

(27) 38. Das Meerschweinchen oder gemeine Halbkaninchen.

(Taf. IX. Fig. 2.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Meerschweinchen, Meerferkel, Meerfärdel, und Meersäulein heißen sie, weil sie, wie die Schweine grunzen, und übers Meer, besonders von den Holländern zu uns gekommen sind; Afterhase, Afterkaninchen, Ferkelmaus, der Cobaya.

Cavia Cobaya. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 122. n. 5.

Cochon d'Inde. *Buffon.* hist. nat. VIII. p. 1. t. 1. Ed. de Deuxp. V. T. 14. 1. Ueberf. von Martini V. 7. m. e. Fig.

Restless Cavy. *Pennant* hist. of Quadr. II. 89. Meine Ueberf. II. p. 410.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 327.

v. Schrebers Säugeth. IV. 617. Taf. 173.

Goeze's Fauna. II. 3.

Donndorfs zool. Beytr. I. 409. n. 5.

Kennzeichen der Art.

Ist ungeschwänzt; hat kurze zugerundete Ohren, und die Farbe des Leibes ist theils weiß, theils mit schwarz oder braun gefleckt.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Größe des Thiers ist eilf Zoll, und die Höhe vier Zoll. Der Kopf ist dick, oben etwas platt, die Schnauze stumpf, die Oberlippe gespalten, aber geschlossen; Vorderzähne vier, keilförmig und schneeweiß und eben so viel Backenzähne auf jeder Seite der beyden Kinnladen mit tiefen Einschnitten an den Seiten; zusammen zwanzig Zähne. Lange Bartborsten um die Lippen und über den Augen. Die Augen sind groß, braun, hervorstehend; die Ohren breit, kurz, am Rande etwas ausgeschweift, auswendig kahl, und inwendig mit einzelnen Haaren besetzt. Der Hals ist kurz; der Leib dick und hinten abgerundet. Der Schwanz fehlt gänzlich. Die Beine sind mittelmäßig; an den hintern Füßen drey und an den vordern vier Zehen mit einem stumpfen Daumenansatze, und an den Zehen lange runde Nägel.

Das Haar ist hart, und auf dem Nacken und Halse etwas länger, als auf dem übrigen Körper. Die Farbe ist

*) Par. Ms.: Gegen 11 Zoll.

ist mannigfaltig und mehrentheils gefleckt, selbst an denen, die in der Wildniß leben. Es giebt daher weiße, schwarze, gelbe, braune, erbsfarbene und bunte von allen diesen Farben.

Das Weibchen ist etwas kleiner, schlanker, als das Männchen und hat zwischen den Hinterfüßen zwey Zitzen.

Zergliederung *).

Der innere Körperbau hat mit dem Hasen seinen viel Aehnlichkeit. Der Blinddarm ist weit größer als der Magen. Wenn sie wiederkäuen, wie man vorgiebt, so trägt dieß wohl etwas dazu bey.

Die meisten vierfüßigen Thiere, besonders die, welche mit hangenden Köpfen grasen, als Pferde, Ochsen, Schafe, Schweine haben außer den sechs Augenmuskeln noch einen siebenten, welcher aus zwey bis vier andere zusammen gesetzt ist, damit das Auge nicht zu weit hervortrete. Diesem findet man auch beym Meerschweinchen.

Die Blutgefäße des Magens statt daß sie bey andern Thieren der Länge nach laufen oder baumförmig ausgebreitet sind, bilden ein in lauter kleine Vierecken sich vereinigendes Netz, welches mit rothen Wachs ausgespritzt einen sehr artigen Anblick gewährt.

*) D. Tyson's Anatomie des Meerschweinschens. S. 89.

Andere Merkwürdigkeiten.

Das Meerschweinchen ist zärtlich und frostig, und muß daher im Winter wohl in Acht genommen werden. Es schläft oft, aber kurz, und zwar sitzend mit gekrümmten Rücken, und mit nicht ganz verschlossenen Augen. Männchen und Weibchen schlafen nicht zu gleicher Zeit, sondern wenn das eine schläft, wacht das andere, und sieht jenes an; doch wohl aus keinem andern Grunde, als bey Gefahr den Gatten, da sie sich zärtlich lieben, wecken zu können. Ihr Lauf ist ziemlich hurtig; sie machen ihn gern an den Wänden hin, und das geringste Geräusch kann ihn unterbrechen, um aufzuhorchen. Sie waschen, kämmen, und putzen sich oft, wie die Katzen, selbst unter einander. So fromm und sanftmüthig sie zu seyn scheinen, so werden sie doch oft uneinig zur Zeit der Begattung und bey ihrer Mahlzeit, knirschen mit den Zähnen, stampfen mit den Hinterfüßen, kämpfen, beißen und treten einander. Sie trauen auch niemanden, außer ihrem Fütterer. Immer murmeln sie, beym Hunger aber grunzen sie, und beym Schmerz schreyen sie gar sehr.

Sie bleiben acht Jahre am Leben.

Verbreitung und Aufenthalt.

Das Vaterland ist eigentlich das warme Brasilien. Sie werden aber zum Vergnügen in den meisten Ländern von Europa, und in Deutschland und Thüringen im Sommer in Gärten, und im Winter in geheiz-

heitzten Stüben gehalten. Vorzüglich wollen sie trocken, warm und in reiner Luft wohnen; verlangen einen weitläuftigen Ort, und immer frisches Heu zu einem weichen Lager.

Nahrung.

Ihr Futter ist das nämliche, das man den zahmen Kaninchen reicht. Sie fressen Brod, Gerste, Hafer, Gras, Salat, Kohl, Laub, Obst, Rüben und besonders gern Kohlrüben. Sie genießen die Speisen, wie die Hausmäuse, auf den Hinterbeinen sitzend. Sie lecken, wie die Hunde ihren Trank, und können auch ohne Wasser und Milch, wenn sie zuweilen feuchte Speisen bekommen, leben. Sie fressen beständig, und auch allzeit vorher, wenn sie schlafen wollen. Einerley Speisen werden sie bald überdrüßig.

Fortpflanzung.

Sie können alle zwey Monate Junge bringen. Das Männchen kämpft oft um ein Weibchen, und letzteres trägt drey bis vier Wochen, und bringt ein bis vier Junge sehend und mit Haaren zur Welt. Diese werden zwölf bis vierzehn Tage von ihr gesäuget, laufen zwölf Stunden nach der Geburt schon hurtig davon, und fressen, und die Mutter läßt gleich, nachdem sie geworfen hat, das Männchen wieder zu. Der Vater frißt die Jungen gern, so wie das Kaninchenmännchen. Nach dem zweyten Monate sind die Jungen schon zur Begattung fähig.

Krankheiten und Feinde.

Eine große Art Milben, die Meerschweinslaus (Pediculus vielleicht besser Ricinus Porcelli) plagt sie gar sehr, und dem Durchfall und der Auszehrung sind sie oft unterworfen.

Nutzen.

Ihr unschmackhaftes Fleisch wird selten gegessen, und ihr Balg steht als Pelzwerk in gar keinem Werthe. In Brasilien soll das Fleisch Fieber verursachen *). Demohngeachtet werden sie doch hochgeschätzt, denn die Eingebohrnen wissen einen Landpfleger oder Missionär kein größeres Geschenk zu machen, als daß sie ihm zum Willkommen einen Cuy, wie sie das Thier nennen, geben.

Die Ratten und Wanzen sollen vor ihnen weichen.

Schaden.

Sie zernagen, besonders die trächtigen Weibchen, fast alles, was ihnen vorkommt, als Holz, Kleider, und besonders Lederwaaren.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Das Männchen soll bey der Geburt des Weibchens die Stelle der Hebamme vertreten.

2) In

*) Reisen einiger Missionarien in Amerika von Murr. S. 198.

2) In seinem Vaterlande legt man Fett vom Cuy auf, wenn man sich einen Splitter oder Dorn so tief in den Fuß getreten hat, daß man ihn nicht mehr herausbringen kann, und er holt sich von selbst heraus.

3) Man kann auch daselbst aus den Geberden und der Stimme, die man sorgfältig beobachtet, eine Menge künftiger Zufälle vorhersagen *).

Die achtzehnte Gattung.

Biber. Castor.

Kennzeichen.

Zwey Vorderzähne oben und unten, keilförmig zugeschärft, die obern hinter der Schärfe etwas ausgehöhlt.

Backenzähne vier auf jeder Seite, seltner unten fünf.

An den Füßen fünf Zehen; die hintern sind Schwimmfüße.

Der Schwanz ist platt und schuppig.

Mit

*) Murr a. a. O.

Mit Recht bewundert man den Kunsttrieb dieser Thiere, wenigstens des gemeinen Bibers. Sie haben einen einfachen Magen und nähren sich aus dem Thier- und Gewächsreiche zugleich. Die Fortpflanzung ist nicht sehr stark, da die Jungen erst im zweyten und dritten Jahre ausgewachsen sind. Das Weibchen hat an der Brust vier Säugwarzen.

39. Der gemeine Biber.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Gemeiner Biber, Castor, Erd- oder Landbiber.

Castor Fiber. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 124. n. 1.

Castor ou Bievre. *Buffon*, hist. nat. VIII. 282. t. 36. Suppl. VIII. 300. Uebers. von Martini und Otto V. 339. m. einer Fig. XXII. 19.

Castor. *Pennant* hist. of Quadr. II. 114. III. 71. Meine Ueberseß. II. p. 433.

v. Schrebers Säugeth. IV. 623. Taf. 166. 175.

Goeze's Fauna II. 14.

Donndorfs zool. Beytr. I. S. 415. n. 1.

Ellis Reise nach Hudsonsbay. 166.

Kalm's Amerika III. 28. 606.

Gott-

Gottwalds physikalisch-anatomische Bemerkungen über den Biber. Nürnberg 1787. m. 7 K.

Ridingers kleine Thiere. Taf. 84.

Kennzeichen der Art.

Der länglich eyrunde, platte, in der Mitte erhabene Schwanz ist ein Viertel vom Leibe an gerechnet haarig, dann mit Schuppen bedeckt, zwischen welchen kurze steife Haare stehen.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieses Thier, das nur noch selten in Deutschland an der Elbe, Oder, Donau, Lippe und an einigen Flüssen der Mark Brandenburg *) angetroffen wird, ist drittehalb Fuß lang, und sein Schwanz hält über eilf Zoll Länge und fünf Zoll Breite **).

Der Kopf ist kurz, etwas zusammen gedrückt, die Schnauze dick und stumpf; die untersten gelben Vorderzähne sind ein Zoll und die obern zehn Linien lang. Backenzähne stehen auf jeder Seite oben und unten vier. Die Augen sind klein; die Ohren kurz, zugerundet, und im Pelze versteckt: der Hals kurz und dick; der Rücken gewölbt; der Schwanz zunächst am Leibe den vierten Theil

*) In dem fürstlichen Garten Hellbron, eine Stunde weit von Salzburg giebt es Teiche für sie.

**) Par. Ms.: Länge 2 Fuß 4 Zoll; Schwanz 11 Zoll lang und 3 bis 4 Zoll breit.

Theil behaart, weiterhin länglich oval, glatt, in der Mitte der Länge nach erhaben, und schuppig, mit darzwischen stehenden einzelnen steifen Haaren. Das Thier trägt ihn horizontal; die Schuppen desselben sind fischähnlich, wie Pergament, ein Achtelzoll dick, sechseckig, und von blaulich blaßblauer Farbe. Die Beine sind kurz; die Füße stehen etwas einwärts. Die Vorderfüße haben fünf getrennte Zehen, und die Hinterfüße fünf weit längere mit einer Schwimmhaut verbundene, deren vierte dem Anschein nach zwey Nägel hat. Nahe am After und der Harnröhre sammlet sich in gewissen Beutelchen aus besondern Drüsen ein gelbliches zehes und schmieriges, nach dem Austrocknen dunkelbraunes bröckliches Wesen, von einem unangenehmen starken Geruch, und eckelhaft bittern Geschmack, das unter dem Namen Bibergeil bekannt ist. Er bedient sich vielleicht dieser Materie, um sein Haar damit fett zu machen, damit es dem Wasser wiedersteht.

Das Haar auf dem Kopfe ist struppig, verdeckt die Bildung desselben, und die Augen zum Theil; am Leibe ist das längere und stärkere dunkelkastanienbraun und glänzend; das kürzere und weichere aber gelbbraun. Doch wechselt die Farbe nach der Gegend, in welcher das Thier wohnet; denn je weiter nordwärts es wohnet, desto dunkler wird sie, und fällt oft ganz schwarz aus.

Farben-Varietäten.

1) Der ganz weiße Biber, C. F. albus.

2) Der

2) Der röthliche Biber. C. F. fulvus.

Er ist weiß mit untergemischten rothen Haaren.

3) Der bunte Biber. C. F. variegatus.

Er ist weiß mit grauen Flecken.

Alle drey sind selten.

Merkwürdige Eigenschaften.

Der Biber kann, wenn er jung gefangen wird, leicht gezähmt werden, und ist alsdann ein sanftmüthiges, ruhiges, trauriges und gleichgültiges Thier, und zeigt gar nicht die scharfen Sinne und Fähigkeiten, die es in der Freyheit verräth. Es ist ganz ohne alle Leidenschaften, und legt seine Wildheit so weit ab, daß man es im Hofe herumlaufen lassen kann, ja daß es seinem Fütterer nachläuft, und Wasser, das ihm in der Freyheit zu seinem Aufenthalte so unentbehrlich scheint, ist ihm nicht nothwendig. Ein Erwachsener wird nie zahm, und fürchtet den Menschen gar sehr. Wenn er nicht ausweichen kann, so richtet er sich in die Höhe, sitzet mit zusammengelegten Vorderfüßen auf den Hinterfüßen, und soll dabey Thränen vergießen. Er geht auf dem Lande langsam und lahm, schwimmt aber hurtig, und taucht schnell, aber nicht lange, unter. Er geht auf den bloßen Hinterfüßen, wenn er in den vordern etwas trägt. Er hat vortreffliche Sinne, und der Geruch ist außerordentlich fein. Unreinlichkeit kann er gar nicht vertragen. Er schläft fest, und liegt dabey selten, wie die andern Thiere, auf der Seite, sondern mehrentheils auf dem Bau-

che oder Rücken. Daß sich diese Thiere vor allen übrigen durch Klugheit und Industrie auszeichnen, beweisen ihre Gebäude, und ihre Schildwachen, die sie immer ausstellen, um jeder Gefahr ausweichen zu können.

Bey der Begattung geben sie einen schmatzenden, aber stärkern Ton, wie die Eichhörnchen, von sich. Bey ihren Kämpfen aber schreyen sie, wie ein heiseres Schwein, und rufen immer: Karr, karr!

Sie sollen funfzehn bis zwanzig Jahre leben.

Verbreitung und Aufenthalt.

Den Biber trifft man in allen gemäßigten Ländern von Europa, Asien und besonders in Amerika an. In Nordamerika ist er in großer Anzahl, wie wohl er sich auch schon da bey zunehmender Bevölkerung von den Küsten weg in die innern wüsten Gegenden zurückgezogen hat. In allen bewohnten Gegenden lebt er zerstreut, flüchtig, oder in Erdhöhlen verborgen, und da er auf diese Art keine Gesellschaft formiren kann, so hat man noch keinen Bau von ihm gesehen. In wüsten, einsamen, stillen, dichtbewaldeten und wasserreichen Gegenden hingegen wohnt er in großen Republiken von mehr als 100 bis 200 dieser Thiere in einer Gesellschaft, und da bemerkt man erst seinen Instinkt zur Arbeit und seinen Kunsttrieb. Die Europäischen Biber sind daher meist nur einsame Grubenbewohner, welche einen schmutzigen und an der Erde abgeriebenen Balg haben, und an den Ufern der Seen, Flüsse und anderer Gewässer wohnen. Hier ma-

machen sie sich Gruben in die Erde, wie die Fischottern, und zuweilen auch einen Graben etliche Fuß tief, um einen kleinen See zu bilden, der bis in die Oeffnung ihrer Höhle dringt, welche sich in der Länge bisweilen über 100 Fuß erstreckt, und immer weiter nach und nach in die Höhe geführt ist. Hierdurch können sie sich bey Ueberschwemmungen sichern *).

*) An der Elbe bey Kähnert, des Hrn. Minister von Schulenburg zu Berlin Landgute giebt es viel Biber, die noch Dämme an alte Elbarme, die stilles Wasser haben, machen. Sie werden gewöhnlich beym Eisgang, wo sie sich auf Weidenbäume retiriren, geschossen. Fünf und mehr auf einmal. Auch bey Wittenberg hat man mehrere geschossen, die sich auf Bäume geflüchtet hatten, und auch da sollen sie noch Dämme in Gesellschaft bauen.

Weiter giebt Herr Seetzen in Meyers Magazin zur Naturgeschichte ꝛc. I. 2. S. 76. auch Nachricht von Bibern an der Lippe, die ordentliche Baue verfertigen. Er sagt: „In der Lippe halten sich viel Biber auf; für Deutschland immer eine naturhistorische Seltenheit. Die meisten soll man bey dem Cöllnisch-Westphälischen Dorfe Hellinghausen, etwa anderthalb Stunden von hier finden. Doch trifft man sie auch nahe bey dieser Stadt und höher hinauf im Paderbornischen Hochstifte, beym Dorfe Deddinghausen bis Böke an. Man bekommt sie selten zu sehen, weil sie immer solche einsame Stellen zu ihrem Aufenthalte wählen, wo das Flußufer sumpfig und mit niedrigem Gesträuche dicht bewachsen ist, und weil sie einen großen Theil ihres Lebens unter dem Wasser zu bringen. Ungeachtet die Biber in den hiesigen Gegenden nicht in so großen Gesellschaften leben, als in einigen Nordamerikanischen Landschaften: so wagen sie es doch, jenen den

Die in Gesellschaft lebenden Biber aber vereinigen sich im Junius und Julius in Truppen von 100 bis 300 an dem Ufer eines Flusses oder Sees, um hier ihre Häuser (Burg) anzulegen. In Anlegung derselben wählen sie in einer Ebene beschattetes, seichtes, langsam fließendes Wasser, in welchen sie bequem arbeiten können. Etwas

Vorzug ihrer bewunderten Baukunst, streitig zu machen. Wie sie, fällen diese mit ihren scharfen Schneidezähnen Bäume von ansehnlicher Dicke, welche an den Ufern der Lippe wachsen, vorzüglich Weiden und Pappeln, ziehen sie an den Fluß hinein und bauen sodann mit gleicher Geschicklichkeit, eben so kunstvolle, dauerhafte Wohnungen, als jene nur immer thun mögen. Allein die Größe derselben kömmt der Größe jener nicht gleich.

Die Eigenthümer der Lippe-Ufer, sehen sie äußerst ungern, und verfolgen sie daher allenthalben, wo sie nur können. Die Biber untergraben die Ufer und stürzen sie ein, wodurch schon mancher einen beträchtlichen Schaden erlitt. Auch wurde mancher schöne Baum ein Opfer ihres hier verhaßten Kunsttriebes. Ihren Aufenthaltsort erkennt man an den Stümpfen der Bäume, welche sie nahe über der Wurzel glatt abbeißen. Ein kürzlich verstorbener hiesiger Schäfer besaß viele Geschicklichkeit, sie zu fangen. Er fieng jährlich öfters zehn und mehrere Stücke. Das Bibergeil verkaufte er an die hiesigen Apotheker und Materialisten, welche es mit vielem Vortheil auswärts, besonders nach Holland verschickten. Auch die Felle verkaufte er theuer. Alles übrige wurde weggeworfen und es war mir nicht möglich, so wenig ein ganzes Skelet, als einen Theil desselben zu bekommen. — Noch jetzt soll sich ein Jäger etwas mit dem Biberfange beschäftigen.

Von den Bibern, welche im Herzogthum Sachsen-Lauenburg, bey der Stadt Lauenburg, auf einigen Elbinseln leben, ist dieser Kunsttrieb nicht bekannt.

Etwas tiefe Buchten in den Flüssen sind ihnen darzu die bequemsten Plätze. Damit ihnen das Wasser nicht zu niedrig werden kann, so führen sie zuvörderst unterhalb der anzulegenden Wohnung einen Damm von hinreichender Länge senkrecht von dem Ufer ab, den sie mit erstaunlicher Kunst verfertigen. Der Grund dazu besteht aus Stücken von Baumstämmen, an welchen Pfähle eingestoßen sind, und zwar so, daß die gegen das Wasser gerichteten schräge stehen. Hierauf wird der Damm vier bis fünf Ellen dick von Zweigen und dazwischen geknetester Erde so dicht aufgeführet, daß er eine sehr lange Dauer hat, und oben sehr artig mit Rasen bedeckt.

Die Wohnungen liegen zuweilen einzeln, zuweilen 10, 12, und noch mehrere beysammen. Sie sind von verschiedener Größe; kleine, in denen nur 1 bis 2, und größere, in welchen 5 bis 6 Paar beysammen wohnen. Der Umfang derselben ist oval oder rund, und beträgt bis 30 Fuß, so wie die Höhe 8 und mehrere Fuß hat. Der Grund wird wiederum von Stücken gefällter Bäume sehr ordentlich gelegt, die Wände werden senkrecht darauf aufgeführt, worauf ein rundes Dach gewölbt, und alles mit Erde dicht ausgeknetet und dick überzogen wird. Die mehresten haben drey Geschosse, eines unter dem Wasser, das andere mit dem Wasser gleich, das dritte über der Wasserfläche. Zwey Zugänge sind an jeder Seite, deren einer vom Ufer, der andere vom Grunde des Wassers aus hineinführet und tiefer ist, als im Winter die Dicke des Eises beträgt. Solche große Wohnungen werden von ganzen Bibergesellschaften gemeinschaft-

lich verfertiget, wobey ein jedes Individuum, sein eigenes angewiesenes Geschäffte hat. Einige fällen Bäume und zernagen sie; andere wälzen die zernagten Stücke in Gestalt der Balken oder Pfeiler nach dem Wasser; ein dritter Theil scharrt Löcher in den Grund; ein vierter rammelt die Pfähle ein; ein fünfter schafft Zweige herbey, und verflicht die Pfähle; ein sechster schleppt Erde, Steine und Ton herbey; ein siebenter bringt dieß an eigene Plätze; andere verkleben und vermauern es. Sie scheinen auch bey ihren Bauen einen obersten Baudirektor zu haben, dessen Befehl alle gehorchen müssen, und hierin den Bienen ähnlich zu seyn. Die Bäume, welche dem Biber die Baumaterialien zu seinem Hausbaue liefern, sind harte Arten von Laubholz, Eichen, Eschen u. dgl. wovon ihm die stärksten Schwellenbäume nicht zu groß sind. Die weichen Holzarten, die er fället, gebraucht er nur zur Nahrung. Er geht bey dieser Arbeit vorsichtig zu Werke, um nicht von dem fallenden Baume getroffen zu werden. Deswegen kerbt er den Stamm an der Seite, wohin er fallen soll, unten ein, und nagt ihn alsdann an der andern Seite, und so rings herum ab. Die dabey abgehenden Späne räumt er mit den Vorderfüßen aus dem Wege. Wenn der Baum liegt, so beißt er die Aeste so glatt ab, und entzwey, als wenn sie mit der Axt gehauen wären; dann zertheilt er den Stamm in Ellen lange, oder kürzere, auch wohl längere Stücken, je nachdem er stark ist. Von den dicken Stämmen, die sich wegen ihrer Stärke und Entlegenheit nicht gut fortschaffen lassen, nimmt er nur die Aeste. Die zu diesen Verrichtungen erforderliche Zeit stehet natür-

türlicherweise mit der Härte und Dicke des Stammes im Verhältniß. Einen weichen Stamm, von einer Viertelelle im Durchmesser, soll ein Biber in einer Stunde fällen können. Mit harten starkern Stämmen hingegen bringt er, wie man sagt, nach und nach drey Monate auch wohl länger zu. Zuweilen wird diese Arbeit von mehrern Bibern zugleich verrichtet, welche in wenig Minuten mit Durchnagung eines Baums fertig werden können. Das so zurecht gemachte Holz schaffet er sodann fort. Dieß thut er mit den Vorderfüßen, womit er das Holz umklaftert, und theils zieht, theils vor sich her schiebet. Zu diesem Behufe legt er Wege an, die er von allem Strauchwerke reiniget, und so führet, daß sie endlich alle in einer einzigen Straße zusammen laufen. Die Erde, deren er zum Damme und Holzbaue benöthigt ist, ballet er mit den Vorderfüßen, faßt sie zwischen selbige und dem Kopfe, und trägt oder schiebt sie bis an den Ort ihrer Bestimmung. Durch den Abfall derselben wird der Weg immer gebahnter und glätter. Wenn diese Dinge zu Wasser fortgeschafft werden müssen, so hält er sie auf die erwähnte Art, und schwimmt mit den Hinterfüßen und dem Schwanze auch gegen den Strom ohne Schwierigkeit.

Nahe bey der so künstlich erbauten Wohnung pflegt der Biber in das Ufer Röhren zu graben, die ihm theils zum Aufenthalte, theils zur Communication mit benachbarten Wäldern dienen. Er führt sie schräge aufwärts und wenn sie den letztgemeldeten Gebrauch haben sollen, gern an einem Wasser oder Sumpfe wieder heraus, da

sie dann zuweilen eine Länge von mehr als hundert Schritten erlangen. Dieß thun aber nicht alle Biber, sondern nur einige, die man in Canada Castors terriers nennt. Die untere Oeffnung einer solchen Höhle ist, wie der untere Eingang eines Biberhauses, so tief unter dem Wasser, daß sie nicht vom Eiße verstopft werden kann. Etwa fünf bis sechs Fuß lang geht sie enge fort, erweitert sie sodann drey bis vier Fuß ins Gevierte, um einen kleinen Teich zu bilden, und geht sodann wiederum enge in die Höhe, bisweilen über tausend Fuß weit *).

Alle diese Arbeiten verrichtet der Biber des Nachts. Am Tage ruhet er den Sommer hindurch in seiner Wohnung

*) In The Journey from Prince of Wales Fort in Hudsonsbay to the Northern Ocean untertaken in the Years 1769, 70, 71 and 72 by Samuel Hearne. 1795. London. 4. (Uebers. von Forster im 14ten Bande des Magazins von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen aus fremden Sprachen übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen begleitet. Berlin bey Voß. 1797. Nr. 1.) wird gesagt, daß die Biber nicht so wundervolle Wohnungen machen, wie man sie gewöhnlich angiebt. Hiernach kann der Biber keinen Pfosten oder Pfahl einrammeln, oder gerade befestigen. Seine Häuser bestehen nur aus auf einander gelegtem Holzwerke mit Steinen und Erde vermischt. Eben so wenig können die Biber mit ihrem Schwanze etwas fortschaffen. Ihre Arbeiten verrichten sie nur des Nachts. Ihre Häuser haben auch nicht zwey Ausgänge an der Land- und Wasserseite. Bey den ersten würden sie in der größten Gefahr wegen ihrer Feinde der Amerikanischen Wolfsbären (Quikhath: Ursus Luscus) seyn.

nung auf einem von allerley Gräsern, sonderlich der Blasenegge (Cavex vesicaria, L.) bereiteten Lager am Rande des Wassers. Er sönnet sich auch zuweilen in dem obern Eingange oder außer seiner Wohnung. Bey verändertem Wasserstande begiebt er sich in das höhere oder tiefere Geschoß, wohin er zugleich sein Lager mitnimmt.

Will ihn das Wasser zu niedrig werden, so erhöhet er den Damm, in welchen er bey allzu hohem Wasser eine Oeffnung zum Ablauf des Ueberflusses zu machen, und auch dieselbe wieder zu verstopfen weiß. Kommen große Ueberschwemmungen und beschädigen den Bau, so vereinigen sich alle die besondern Gesellschaften und gehen an die Ausbesserung.

Im Winter halten sich die Biber vorzüglich in den gedachten Röhren auf, die sie im Herbste beziehen, und zu Anfang des Frühjahrs wieder verlassen. Sie kommen in dieser Jahrszeit nur selten zum Vorschein, um frische Nahrung zu suchen. Ihr Lager in denselben bereiten sie aus lauter, von dem gefällten Holze abgenagten, feinen Spänen, die den Drechsler-Spänen gleichen. In ihren Hütten herrscht stäte Eintracht und Frieden. Sie wechseln ihren Aufenthalt darinne und im Wasser ab, in welchss sie auch in ihren Wohnungen beständig den Schwanz und die Hinterfüße eintauchen. Wenn ihnen die Jäger nachstellen, und ihren Damm und Wohnung zerstören, so zertheilen sie sich ins Feld, graben sich Löcher in die Erde und ersticken eine lange Zeit ihren Kunsttrieb.

Nahrung.

Die Nahrung des Bibers ist die Rinde von Pappeln, Espen, Birken, und allerley Arten Weiden; in Amerika sind der Biberbaum (Magnelia glauca, L.), die dortige Esche (Fraxinus americana, L.), der Storaxbaum (Liquidambar styraciflua, L.), Sassafraß, und die süßen Gummiarten seine Lieblingsspeisen. Im Sommer füttert er sich von Feldobst und allerley Wurzelwerk, das er von Calmus, den Seerosen, Schilf, Schaftheu u. s. w nimmt, bisweilen auch von Krabben, Krebsen und Fischen. Zu Anfang des Winters sammelt er von den erstgenannten Baumarten Zweige, und trägt sie in die Röhren dahin, wo sie weder frieren, noch verwelken können. Die stärkern Weidensträucher senkt er, nachdem er vorher die Ruthen abgebissen und eingetragen hat, um die Burg herum unter dem Wasser in die Erde. Von diesem Strauchwerk nagt er im Winter die Rinde zu seiner Nahrung ab. Daß er auch Fische, Krabben und Krebse genießt, ist daher wahrscheinlich, weil er sich auch zu andern Fleischspeisen gewöhnen läßt. Er frißt, wie die Eichhörnchen, auf den Hinterfüßen sitzend, und bringt das Futter mit den Vorderfüßen zum Mund. Seines Unraths entledigt er sich außerhalb seiner Wohnung, in welcher er keine Unreinigkeiten duldet.

Fortpflanzung.

Der Biber und die Biberin leben in Monogamie, begatten sich im Winter und zwar in aufrechter Stellung. Die Mutter soll vier Monate trächtig seyn, und

bringt

bringt in einer Röhre auf dem eben beschriebenen Lager im März zwey bis drey blinde Junge, welche sie allein erzieht. Das Männchen entfernt sich alsdann und besucht nur zuweilen die Wohnung. Nach vier Wochen bringt die Mutter den Jungen schon Zweige zum Nagen, und nach sechs Wochen gehen sie mit ihr aus. Wenn sie erwachsen sind, übergeben sie ihnen ihr Haus, und bauen sich, wo möglich ein anderes darneben. Im ersten Jahre geben die Jungen schon Zeichen der Mannbarkeit von sich, ob sie gleich im dritten erst völlig ausgewachsen und zur Zeugung geschickt seyn sollen. Sie lassen sich leicht zähmen.

Feinde.

Die Biber haben große Feinde an dem Vielfraß, der Welverene (Ursus Luscus), die daher in Amerika auch Biberfresser heißt, und dem Fischotter; doch ist ihm die Nachstellung des letztern eben nicht fürchterlich, weil ein Biber wohl drey Fischottern auf sich nehmen kann; und wo sie diese Feinde merken, suchen sie sie auszurotten. Sonst haben sie von den Nachstellungen anderer Thiere wenig zu befürchten, weil sie sich auf ihr sehr scharfes Gebiß und ihre Behutsamkeit verlassen können. Denn auf dem Lande, wo ihnen stärkere Raubthiere gefährlich werden könnten, trifft man sie selten zwanzig Schritte weit von ihrer Wohnung entfernt an, und wenn sie ihrer Nahrung nachziehen, so gehen sie in Gesellschaft mit Wache aus, welche ihnen die Gefahr meldet, worauf sie sich ins Wasser flüchten.

In den Eingeweiden hat man Rundwürmer (Ascaris) gefunden.

Jagd.

Der Biber gehört zu den Regalien der Fürsten. Der Jäger spürt ihn an seiner Fährte, die der Fischotterfährte nicht unähnlich ist, nur daß die Vorderfüße sich ohne Schwimmhaut ausdrücken, und an den geschälten und gefällten Stämmen und Bäumen.

Man fängt ihn mit einem Tellereisen, welches wie ein Fuchseisen zwey gute Federn hat. Dieß legt man nahe an seine Wohnung, wo er aussteigt, bedeckt es, wo möglich, mit Laub, und befestigt es. Auch fängt man ihn in einem Netze von starken Leinen, eines Fingers dick. Dieß stellt man nur des Nachts auf das Land, wo sein Ein- und Ausgang ist, läßt ihn durch Hunde aus der Gegend, wo er schält, weg- und hineinjagen und schlägt ihn todt; oder man legt es ins Wasser in Gestalt eines Sackes vor die Oeffnung, schickt einen Stöberhund in den Bau, und läßt den Biber ins Netz treiben.

Man fängt ihn auch mit einer Wathe. Man macht nämlich eine Wathe von 15 bis 18 Ellen, wie eine gemeine Fischerwathe, mit einem langen Küttel, und mit Gesenke und Bley. Diese legt man sehr behutsam vor die Oeffnung der Biberwohnung ins Wasser, schickt einen Dachshund in den Bau, der ihn heraus stöbert. Wenn er nun in die Wathe fährt, so wird

diese

diese schnell aufgehoben, er liegt, wie ein Fisch, drinnen, und kann durch einen Schlag auf den Kopf, da er einen dünnen Scheitel hat, leicht todtgeschlagen werden. Ihn in Reusen zu fangen ist mißlich.

Nutzen.

1) Das Wildpret des Bibers ist von doppeltem Geschmacke; denn das Fleisch der vordern Theile bis zu den Nieren hat fast den Geschmack des Dachses; das übrige aber von den Schenkeln und Schwanze hat den Geruch und Geschmack des Fisches. Man ißt den Biber in Klöstern zur Fastenzeit, und in Cartheuserklöstern wohlzugerichtet zu allen Zeiten gern. Der Schwanz, der oft drey bis vier Pfund schwer ist, und die Hinterpfoten sind ein besonderer Leckerbissen. Die Wilden an der Hudsonsbay, in Canada, und überhaupt in Nordamerika, und die Kalmucken schätzen das Biberfleisch sehr hoch.

2) Der reine Balg ist ein vortreffliches Pelzwerk zu Müffen, Mützen und andern Verbrämungen; die schwarzen (schwarzbraunen) werden am meisten geschätzt und die weißen sind die seltensten.

Ein gutes schwarzes Winterbiberfell kostet neun bis zwölf Thaler, in Amerika auf der Stelle unter Brüdern einen halben Carolin. Zwölf solcher Felle gehören wenigstens zu einem guten Pelze. Das Haar auf denselben ist von zweyerley Art: die eine ist lang, fast glänzend und wird zu feinen Strümpfen, Tüchern, Handschuhen

schuhen verarbeitet; die andern kurz, wollig und seidenartig, und wird vom Hutmacher zu den sogenannten Castorhüten gesucht. Ein erwachsener Biber hat nicht über anderthalb Pfund Haare, und man bezahlt das Pfund mit acht bis zehn Thaler.

Die Kaufleute geben den Fellen noch eine dreyfache Benennung, nämlich frische, getrocknete und fette Biber. Die frischen Biber, auch Winterbiber oder Moskowitische Biber genannt, sind diejenigen, die im Winter gefangen werden, und die schönsten zu Unterfutter, da sie noch keine Haare verlohren haben. Die getrockneten oder magern Biber werden im Sommer gefangen, haben durch die Häärung eine Menge Haare verlohren, und werden daher auch haarlose oder Sommerbiber genannt. Diese braucht man in Hutfabriken. Die fetten Biber sind diejenigen, die von den Wilden in Nordamerika eine Zeitlang getragen, und als Bettdecken gebraucht werden, wodurch sie gleichsam eingeöhlt sind. Sie werden bloß zu Hüten verarbeitet. Aus einem Pfund Biberhaare können wohl zwölf Hüte gemacht werden. Man kauft aber jetzt viele Hüte aus Kaninchen- und Hasenhaaren statt Castorhüten.

3) Das Leder wird vom Sattler zu Beschlägen der Koffer und Reisekasten, vom Schuster zu Pantoffeln, und vom Siebmacher zu Sieben verbraucht.

4) Der harten schneidenden Vorderzähne bedient man sich zum Vergülden und Glätten, und die Wilden brauchen sie statt der Messer und Meisel.

5) Das

5) Das ausgeschmolzene Fett brauchen die Aerzte, wie andere Fettigkeiten, in Nervenkrankheiten, Krämpfen, Gliederreißen u. s. w.

6) Das Bibergeil (Castoreum) wird als eine der wirksamsten Arzeneyen in der Apotheke verkauft, wegen seiner nervenstärkenden, krampf- und schmerzstillenden und übrigen Kräfte, und wird auch von Jägern als eine sehr gute Witterung bey den Raubthieren benutzt. Das beste ist das Russische, welchem man das Preußische an die Seite setzt. Drey Biber liefern etwa zusammen ein Pfund.

Schaden.

Diese Thiere sind den Waldungen und Wasserbauen schädlich, weil sie viele Bäume umhauen und die Dämme verwüsten.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Man hat der Biber-Republik eine ordentliche Policey und Regierungsform zugeschrieben. So sollen sie z. B. durchreisende fremde Biber erhalten und zwingen, Erde, Holz u. s. w. mit herbeyzuschaffen, sich immer in ungleicher Zahl versammeln, damit in ihrem Collegio immer eine entscheidende Stimme wäre.

2) Den Bibergeil hielt man für die männlichen Hoden, daher schon Plinius die Fabel hat,

hat *), daß sich das Männchen bey der Verfolgung der Jäger diese Theile abbeiße und von sich werfe, weil es alsdann vor Verfolgungen sicher sey.

3) Gottwald sagt a. a. O., daß der Biber den Beutel, worin das Bibergeil sich befindet, deswegen habe, um wie die Beutelthiere seine Jungen darinn zu tragen.

4) Der Wallfisch soll das Bibergeil nicht riechen können und dadurch ganz wüthend werden. Wenn daher ein Fremder durch den Norwegischen Meerbusen reist, so warnen ihn die Einwohner kein Bibergeil bey sich zu stecken, damit ihn das Boot nicht umgeworfen würde.

5) In Sibirien hängen die Weibspersonen ein Amulet von dem Knieknochen an, wenn sie Schmerzen in den Füßen haben.

*) Plinii hist. nat. VIII. c. 30. Uebers. von Große II. 297.

Die neunzehnte Gattung.

Maus. Mus.

Kennzeichen.

Oben und unten sind zwey Vorderzähne, von denen die obern, zuweilen auch die untern keilförmig zugespitzt sind.

An den Vorderfüßen (mehrentheils) vier, und an den Hinterfüßen fünf Zehen.

Der Schwanz ist sehr dünn und zugespitzt, nackt oder mit einzelnen Haaren besetzt, aber von verschiedener Länge.

Vollkommene Schlüsselbeine.

Die hierher gehörigen Thiere leben mehrentheils unter der Erde in Höhlen und Schlupfwinkeln, wo sie sich im Winter ein weiches und warmes Lager bereiten, einige wenige davon in und an dem Wasser. Fast alle haben einen länglichen Kopf, eine spitzige Schnauze, an welcher die untere Kinnlade merklich kürzer ist, als die obere, gelbe oder braune Vorderzähne, einen langgestreckten Körper, wenn sie sich ausdehnen, und einen gewölbten Rücken, wenn sie stille sitzen. Ihr Gehör, Geschmack, Geruch und Gefühl sind sehr fein. Die

Hinterfüße sind stets höher, als die Vorderfüße, wodurch sie im Stande sind, sich desto leichter Höhlen zu graben, und wodurch sie, da sie hüpfen, eine Färthe (Taf. XIV. Fig. 13.) machen, in welcher zwey und zwey Spuren neben einander, oder gewöhnlicher nur zwey neben einander und zwey einzelne nachstehen. Sie treten mit dem ganzen Hinterfuß auf, laufen geschwind, klettern und schwimmen. Sie sind furchtsam und lichtscheu, und gehen daher mehrentheils nur des Nachts aus. Ihre Nahrung nehmen sie vorzüglich aus dem Pflanzenreiche, doch auch aus dem Thierreiche. Sie lieben die Gesellschaft ihres Gleichen, und machen sich immer etwas zu thun, spielen, putzen sich, machen wunderliche Stellungen, und benagen aus Durst, Muthwillen und zum Zeitvertreib, was nur benagbar ist. Ihre Vermehrung ist sehr stark, da sie sich des Jahrs mehr als einmal fortpflanzen; ihre Feinde sind aber auch zahlreich, wenn sie der Mensch nicht in ihren von der Natur aufgetragenen Geschäfften stöhrt. Die Jungen werden blind gebohren.

Da die Anzahl der Thiere, die zu dieser Gattung gerechnet werden, so groß ist, so hat man sie, um sie desto leichter unterscheiden zu können, in gewisse Familien getheilt *). Folgende Familien und Arten sind in Deutschland befindlich.

Erste

*) Pallas Novae Species Quadrupedum e glirium ordine. Erlangae. 1778. 4. Mit Kupfern.

Erste Familie.

Rattenschwänzige Mäuse.

Mures myosuri.

Kennzeichen.

Die Vorderzähne sind scharf, die untern besonders spitzig; die Ohren im Verhältniß des Kopfes ziemlich groß; der Schwanz lang, so dünnhaarig, daß er fast nackt erscheint, und in schuppige Ringe abgetheilt. Hierher gehören fünf Arten.

(28) 40. Die Hausratte oder große Hausmaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Ratte, Ratze, Hausratze, Rattenmaus, gewöhnliche Ratte und schwarze Hausratze.

Mus Rattus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 127. n. 12.

Rat. *Buffon.* hist. nat VII. 278. T. 36. Ed. de Deuxp. II. T. 8. f. 3. Uebers. v. Martini IV. 221.

Black Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 176. Meine Uebers. II. p. 493.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 237.

v. Schrebers Säugeth. IV. 647. Taf. 179.

Goeze's Fauna IV. 47.

Donndorfs zool. Beytr. I. 428. n. 12.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist länger, als der oben mit schwärzlichen und unten mit grauen Haaren besetzte Leib, und die Daumwarze der Vorderfüße hat einen platten Nagel.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß schädliche Thier, das seit zweyen Jahrhunderten auf dem ganzen Erdboden, die allerkältesten Gegenden ausgenommen, besonders durch die Schiffahrt *) verbreitet worden ist, wird in Deutschland sehr häufig gefunden.

Der Körper desselben wird oft bey gutem Futter acht Zoll lang, der Schwanz ist fast immer um den dritten Theil länger als jener, und die Höhe ist beynahe drey Zoll **). Der Kopf ist lang, fast eyrund, die Nase etwas erhaben, die Schnauze spitzig, und im Munde befinden sich oben zwey kurze Schneidezähne, unten zwey läng-

*) Nach Amerika ist es dadurch aus Europa gebracht worden. Das ursprüngliche Vaterland ist nicht zu bestimmen.

**) Par. Ms.: Körper 7 Zoll 3 Linien.

längere spitzige Vorderzähne und in beyden Kinnladen auf jeder Seite drey viereckige gereifte Backenzähne. Zusammen nur sechzehn Zähne. Die Zunge ist lang und glatt. Der Mund hat lange rückwärtsstehende Barthaare, die länger als der Kopf sind. Die Augen sind groß, rund, hervorliegend und schwarz, den Ohren näher als der Nasenspitze; und jedes mit einer kurzen und langen Borste. Die Ohren von halber Kopfslänge, hervorstehend, fast kahl, durchsichtig, und eyrund. Der Hals hat fast Kopfsdicke, und von da wird der Leib bis zum Schwanze immer breiter. Die kleinen Vorderfüße haben, neben den vier vollkommenen Zehen, noch einen Daumenansatz mit einem stumpfen platten Nagel, der manchen Mäusearten fehlt, und die größern Hinterfüße haben fünf Zehen. Der lange Schwanz hat viele *) Ringe mit kleinen Schuppen, zwischen welchen kurze steife, schwarze Haare hervorkommen, und dieser Theil ist es, welcher dem sonst nicht übelgestaltetem Thiere ein so unangenehmes und eckles Ansehen giebt.

Die gewöhnliche Farbe ist blauschwarz, am Kopfe am dunkelsten und nach dem Unterleibe bläßer oder aschgrau auslaufend; doch giebt es auch kohlschwarze. Die Ohren haben eine mit aschgrau vermengte Fleischfarbe. Die Pfoten sind weiß und kahl. Im October ziehen sie wie alle Mäusearten ihr dichteres Winterkleid an, und im März wieder aus.

Das Weibchen hat einen etwas spitzigern Kopf, aber breitern Leib, und zehn Säugwarzen.

*) Man zählt ihrer 250.

Farbenvarietäten:

1) Die weiße Hausratte. M. R. albus.

Sie ist rein weiß oder gelblichweiß mit rothen Augen.

2) Die aschgraue Hausratte. M. R. cinereus.

Sie ist dunkel oder hellaschgrau.

3. Die gefleckte Hausratte. M. R. maculatus.

Sie ist grau und weiß gefleckt.

Um die Wolga herum, in den Steppen des untern Theils (denn den obern haben sie noch nicht erreicht) giebt es eine sehr kleine Varietät, die kaum sieben Drachmen wiegt.

Zergliederung.

1) Das Brustbein ist vorzüglich stark.

2) In der Harnblase findet man Steine von Gestalt wie Kirschkerne, Hanfsaamen und Roggenkörner u. s. w. deren Grundlage gewöhnlich ein eckiges Blättchen wie Frauenglas ist, an welchen sich zu beyden Seiten sandige Theilchen, wie Nadeln ansetzen.

3) In Leber- und Därmen giebt es Eingeweidewürmer.

Ande-

Merkwürdige Eigenschaften.

Es sind diese Ratten, wilde, zornige und beißige Thiere. Wo sie in Gesellschaft leben, rasen sie Tag und Nacht auf den Böden und Dächern herum, jagen, zanken und beißen sich, und werden dadurch oft Störer der nächtlichen Ruhe der Menschen. In der Gefangenschaft und Verfolgung springen sie den Menschen nach den Händen und dem Gesichte, und beißen heftig. Dagegen will man aber auch diese gute Eigenschafft an ihnen bemerkt haben, daß die jüngern die alten kraftlosen und blinden Ratten bis an ihren Tod in ihren Winkeln der Ruhe genießen ließen, und sie daselbst reichlich mit Futter versorgten, warteten und pflegten. Von solchen bejahrten Ratten sagt man, daß sich ihrer zuweilen sechs, acht und mehrere, die in ihren Wohnungen das Sterbestündlein abwarteten, mit ihren Schwänzen in einander verwickelten, und so den berüchtigten Rattenkönig bildeten *).

*) Ich habe Gelegenheit gehabt, verschiedene Jahre große Gesellschaften von Ratten genau zu beobachten, habe aber weder die große Liebe der jungen Ratten gegen die alten, noch einen sogenannten Rattenkönig bemerkt. Man findet zwar oft lahme, blinde, und auf andere Art verstümmelte Thiere dieser Art in Winkeln, wo Futter liegt, allein das schleppen die andern nicht aus Mitleid zur Nahrung für diese Elenden dahin, sondern für sich. Sie leben auch gewöhnlich nicht lange, sondern werden entweder von den gesunden todtgebissen, wenn sie in deren Gegenwart von dem eingetragenem Vorrathe zehren, oder sterben für Hunger, wenn nicht immer Vorrath genug da ist. Todte

Rat-

Sie haben eine hellschreyende Stimme, die man hört, wenn sie in Gesellschaft spielen, oder sich zur Zeit der Begattung beißen.

Sie sollen acht Jahre leben.

Aufenthalt.

Ihre Wohnung schlagen die Hausratten zwischen den Leim- und Holzwänden der Pferd- und Kühställe, der

Ratten, die Gift gefressen hatten, und die zusammengelaufen waren, wie wenn sie sich ihr Unglück und ihren Schmerz hätten klagen wollen, habe ich oft haufenweise in Winkeln gefunden, aber niemals regelmäßig mit ihren Schwänzen in einander verwickelt. Lebende habe ich auch oft sehen in einem Kreise herum laufen, und mit ihren Schwänzen spielen, aber niemals habe ich sie zusammen hängend, auch nur einen Augenblick wahrgenommen. Ich wüßte auch schlechterdings nicht, wie die langen steifen Schwänze, ohne daß man Gewalt braucht, zusammen zu knüpfen wären, und braucht man Gewalt, so gehen die Schwanzwirbel in Stücken. Auf eine natürliche Art scheint es mir also unmöglich Rattenkönige zu geben. Die Rattenkönige trifft man gewöhnlich in Mühlen an, und da knüpfen denn wohl lustige Mühlbursche eine Menge Ratten an den Schwänzen zusammen und machen Rattenkönige, um die Mädchen damit fürchten zu machen. Doch dieß sind nur meine Erfahrungen!

Die Rattenkönige werden bestätigt in folgenden Schriften: Goeze a. a. O. S. 65. Wittenbergisches Wochenblatt. 1774. S. 41. Hallens Thiere. S. 427. 430. Breßlauer Sammlungen der Natur und Kunst. 1726. Cl. IV. S. 405. mit 2 Kupfern. Valentini Muſ. Muſcor. II. 151. In Blumenbachs Handbuch der N. G. 4te Aufl. wird S. 65 die Sache auch bestätigt, allein in der 5ten Aufl. ist die Stelle ausgelassen.

der Scheunen, Fußböden, oder unter den Dielen und bretternen Fußböden der Dachböden und Fruchtkammern, oder in Kellern, Holzstößen, alten Dachrinnen und Abtritten, in verfallenen Gebäuden, und in den Klüften und Hohlkehlen zwischen den Gebäuden auf. Höchst selten trifft man eine bey uns im Felde in alten hohlen Weidenbäumen an.

Sie nagen sich durch die Wände Gänge von einem Gebäude zum andern, und verschaffen sich dadurch Spaziergänge durch die Häuser ganzer Straßen. Da sie den Menschen überall nachziehen, so findet man sie sogar in den tiefsten Schachten. Wenn Schiffe ankommen und ausgeladen werden, so schwimmen sie unterdessen ans Land.

Nahrung.

Es sind äußerst gefräßige Thiere, die sogar die Scorpione angehen. Ihre Nahrung besteht beynahe in alle dem, was der Mensch genießt. Sie fressen Fleisch, Speck, Butter, Käse, Obst, Wurzel- und Knollengewächse u. s. f., aber vorzüglich lieben sie Milchspeisen und Getraide. Auf Getraideböden kann daher eine kleine Gesellschaft in kurzer Zeit einige Malter Körner, sonderlich Hafer aushöhlen, und in den Rückenhaaren ihres dichten Balges, das sie aufsträupen und fest zusammendrücken können, in ihre Schlupfwinkel tragen, und also wichtigen Schaden verursachen. Außerdem rauben sie den Tauben und andern kleinen Vögeln, die unter

den Dächern nisten, ihre Eyer und Jungen, und wagen sich sogar an junge Kaninchen. In Hungersnoth zernagen sie Kleider, Leder, Holzgeräthe, gehen andere Mäuse an, und fressen sich unter einander selbst auf. Letzteres thun sie besonders alsdann, wenn ihrer mehrere in Gefangenschaft gerathen, und ohne Futter sind. Im Winter trinken sie sehr wenig, und lecken Schnee; im Sommer aber ist ihr Durst wegen ihrer hitzigen Natur oft brennend, und man sieht sie zuweilen heerdenweise nach dem Wasser wandern, um zu trinken und zu baden. An Orten, wo sie alsdann kein Wasser finden, nagen sie an festen Körpern, um den Mund feucht zu erhalten, und thun aus dieser Ursache in Bibliotheken großen Schaden. Um sie also hier unschädlich zu machen, darf man ihnen nur alle Tage ein flaches Gefäß mit Wasser hinstellen, und um sie zu vertilgen, dürfte man es nur vergiften; allein man hat die Bemerkung gemacht, daß diesen listigen Thieren der Tod einiger vergifteten abschreckt, von diesen tödtlichen Wasser zu trinken. Wo sie Gelegenheit haben, suchen sie auch sehr gern die Milchtöpfe zu öffnen, um sich an diesem Tranke zu laben, saufen Oehllampen aus, fressen Talglichte u. s. w. Ihrer Nahrung gehen sie gewöhnlich im Finstern nach, doch auch am Tage an solchen Orten, wo sie die Katze nicht zu fürchten haben, ja hier werden sie oft so dreiste, daß sie auch die Gegenwart des Menschen nicht scheuen.

Fortpflanzung.

Da die Ratten sehr verliebte Geschöpfe sind, so vermehren sie sich auch sehr stark. Ihre erste Begattung

geschieht

geschieht im Frühjahr, im März und April, und ihr folgt gewöhnlich eine zweyte, ja wohl gar eine dritte. Sitzen sie warm, wie unter Stubenböden und zwischen Stubenwänden, oder in Pferde- und Kuhställen, so pflanzen sie sich unaufhörlich, auch im Winter fort. Das Weibchen trägt beynahe vier Wochen, und bringt in einem verborgenen Winkel auf einem von Heu, Stroh, und andern weichen Materialien verfertigten Lager, das sie, wenn sie davon geht, zuwölbt, vier bis sieben nackende, blinde Junge zur Welt. Sie bleiben zehn Tage blind, die Mutter hegt die zärtlichste Liebe gegen dieselben, und vertheidiget sie mit Lebensgefahr gegen ihren mächtigen Feind, und jedesmaligen Sieger, die Katze. Sie sehen jung blau aus. Wegen der vielen Geschwister, die sie bekommen, nehmen diese Thiere in manchen Häusern, besonders auf Kornböden so überhand, und werden so dreiste, daß sie öffentlich herumlaufen und unter menschlichen Augen rauben.

Krankheiten.

Sie werden im Alter gern blind; und sind sehr oft mit dem Steinschmerzen behaftet von Steinen, deren man viele in der Blase und den Harnwegen findet.

Feinde.

Ihre größten Feinde sind die Katzen und Wiesel. Sonst werden sie auch von Hunden, Steinmardern und großen Eulen verfolgt. Außerdem plagen sie die Bandwürmer, Blasenwürmer, Egelwürmer, Kratzerwürmer (Echinorynchus),

Haar-

Haarwürmer (Trichocephalus) und Madenwürmer, und diese Plage hat sie fast mit allen Mäusearten gemein.

Fang und Vertilgung *).

Ihre Fährte bildet gewöhnlich ein Dreyeck, weil eine von den Spuren der Vorderfüße in einer von den neben einanderstehenden Hinterfüßen steht, und die andere nur einzeln nachgesetzt ist.

In Gebäuden, wo kein Getraide liegt, kann man sie mit den bekannten hölzernen und eisernen Mäusefallen durch Lockspeisen von Speck oder in Fett geröstetem Brode leicht vertilgen. Oder man setzt ihnen klargestoßenen ungelöschten Kalch, mit Malz vermischt hin, und daneben ein Gefäß mit Wasser. Jene Nahrung reitzt sie zum Trinken, und dieß wird die Ursache ihres Todes. Arsenik, mit Mehl oder Malz vermischt, ihnen vorzusetzen, oder Giftkügelchen hinzustreuen, ist aus vielen Ursachen nicht rathsam, besonders in Getraidekammern und auf Kornböden. An letztern Orten helfen ohnehin, außer einigen guten Katzen, alle zuvor genannten Mittel, nicht viel, weil sie sich, wo sie Getraide haben, nicht leicht durch jene künstlichen Lockspeisen verführen lassen. Man vertreibt sie auch durch einen Teig aus Mehl und Eisenspänen mit gebratenem Speck vermischt.

Als

*) Hierüber vergleiche man, so wie über den Fang und die Vertilgung aller in der Oekonomie schädlichen Thiere: Robert Smiths Handbuch zur Vertreibung der schädlichen vierfüßigen und geflügelten Thiere. Aus d. Engl. übers. M. 8 K. Hannover. 1800. S. 83.

Als ein vorzügliches Mittel wird folgendes angepriesen: Man stellt etliche hölzerne Fallen eines Abends zugleich an verschiedenen Orten auf, um die Ratten lebendig zu fangen. Die Gefangenen läßt man des Morgens in einen Sack laufen. In demselben sucht man sie beym Kopfe mit der Hand zu fangen, streift den Sack über die Hand her, daß der Leib bloß wird, und taucht sie bis an den Kopf in, mit altem Fischthran verdünnten, Wagentheer. So gesalbet läßt man sie lebendig wieder los. Die Angst und der Eckel von dem ihnen anklebenden Theer jagt sie durch alle ihre Gänge, bis sie sterben, und dieser Gestank, den die Ratten nicht ausstehen können, vertreibt sie alle. Der nächste Nachbar muß sich freylich der Ankömmlinge auf die Art zu entledigen suchen.

Eins der besten Mittel ist dieses, welches gegen alle Hausmäusearten gilt: vier Gran Moschus oder Bisam werden in einen reingescheuerten messingenen Mörser mit etwas Zucker fein gerieben, alsdann mit 8 Loth frischen Schweineschmalz vermischt; dieß thut man in eine steinerne Büchse, welche aber nicht weit über halb voll werden muß, um das Gemische bequem darin umrühren zu können, und mischt mit einem Hölzchen 2 Loth gestoßenen Arsenik hinzu. Von dieser Salbe schmiert man ganz dünne auf Speckschwarten, wo noch etwas Speck sitzt, schneidet solche in Streifen und nagelt sie auf Bretter. Man muß es aber vor andern Thieren und Menschen verstecken.

Andere rühmen folgendes Mittel als das beste: Man nimmt ein ziemlich großes Faß, richtet es auf dem

Boden

Boden in die Höhe, umwickelt es mit alten Tüchern, füllt es halb mit Wasser, legt einen Stein hinein, dessen Spitze über das Wasser hervorragt, und überspannt die obere Oeffnung mit einem steif angezogenen weißgegerbten Schaffelle, welches in der Mitte übers Kreuz etliche Einschnitte hat, wodurch es hier schlaffer wird, und eine unsichtbare Oeffnung erhält. Dieß Fell bestreue man am Rande mit Hafer, und auf den Stein setzt man eine lebende Ratte, die durch ihr Winseln, da sie sich mit Wasser umgeben und ohne Nahrung sieht, ihre übrigen Kameraden zur Hülfe herbey lockt, welche dann, wenn sie auf die schlaffen Einschnitte des Felles laufen, unversehens in das Wasser stürzen und ersaufen.

Nutzen.

Was den Nutzen dieser Thiere anlangt, so scheint es beynahe als wenn sie gar keinen leisteten; allein bey einigem Nachdenken sehen wir doch, daß sie nicht nur ein Glied in der großen Kette der Geschöpfe ausmachen, sondern auch wirklich nützen sollen. Sie dienen nämlich einigen Raubthieren zur Nahrung, ihr Fleisch wird in manchen Weltgegenden, z. B. auf den Inseln Jamaika und Martinique, in Sibirien und Niederäthiopien von den Menschen gespeist, hat schon manchem Seefahrer in Hungersnoth das Leben erhalten, und ihr Balg könnte auch wohl als Pelzwerk genutzt werden, so wie ihn die Russischen Lappländer zum Rand an dem untern Theile ihrer Mützen, und zur Einfassung ihrer Unterkleider brauchen.

Schaden.

Der große Schaden, den diese Thiere in den Wohnungen der Menschen stiften, ergiebt sich aus ihrer Nahrung, da sie nicht allein alle mögliche Getraidearten, und alle Nahrungsmittel, die die Menschen genießen, angehen, sondern auch Papier, Bücher, Kleidungsstücke, Wände u. s. w. zernagen und beschädigen.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Man glaubte sonst der eckle Schwanz sey giftig.

2) Man brauchte Blut, Fett und Koth in der Medicin. Der Koth wurde sonst in den Apotheken unter den Namen Muscerda oder Stercus nigrum gegen vielerley Krankheiten an Menschen und Vieh, die vorzüglich von Beherung herrührten, gebraucht.

3) Die magische Rattenpfeife machen die Rattenfänger aus dem Rückgrate eines Rattenkönigs. Durch dieselbe lassen sich die Ratten hinführen, wohin man will.

(29) 41. Die Wanderratte oder Wandermaus.

(Taf. X. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Große Ratte, große Waldratte, wilde Ratte, Springratte, fuchsbraune Erd- oder Wanderratze, hüpfende Ratte, Sürmülot, Erdratte, große Wasserratte, Feldratte; die hannöversche und Norwegische Maus; sie wird aber in so kalten Ländern, wie Norwegen ist, so viel ich weiß, nicht angetroffen.

Mus decumanus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 127. n. 6.

Surmulot. *Buffon* hist. nat. VIII. 206. Ed. de Deuxp. III. T. 1. f. 1. Uebers. von Martini IV. 290. Taf. 79.

Brown Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 178. Meine Uebers. II. p. 496.

v. Schrebers Säugeth. IV. 645. Taf. 178.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 12.

Goeze's Fauna. II. 83.

Donndorfs zool. Beytr. I. 426. n. 6.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Sie hat einen sehr langen schuppigen Schwanz; der röthlichgraue Oberleib ist mit schwarzen Stachelhaaren besetzt, und der Unterleib ist weißlich. Die Daumenwarze hat einen kaum merklichen Nagel.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Wanderratte ist eben so boshaft, raubsüchtig und schädlich, ja in gewisser Rücksicht noch schädlicher, als die Hausratte, und fast von gleicher Gestalt.

Ihre Länge vom Kopf bis zum Schwanze beträgt 10 Zoll und drüber, die Länge des Schwanzes 8 Zoll *), und die Höhe 3 1/2 Zoll **). Der Kopf ist 2 1/2 Zoll lang und an dem breitern Theil zwischen den Ohren 1 1/2 Zoll breit. Er läuft von der Stirn bis zum Mund eyförmig in einer dünnen Schnauze aus. Einen halben Zoll unter der Nasenspitze ist die Mundöffnung, welche mit einem großen Barte versehen ist, wovon die längern obern Haare 3 Zoll haben, weiß, und die kürzern

*) Par. Ms.: Körper 9 Zoll; Schwanz über 7 Zoll.

**) Das vor mir liegende Männchen, das ich, da es über einen Bach schwamm, mit einem Stocke todtschlug, hat einen 11 Zoll und 3 Linien langen Körper und einen 8 1/2 Zoll langen Schwanz, und das Weibchen, das ich in einer Feldmühle fieng, einen 10 Zoll langen Körper und 8 1/2 Zoll langen Schwanz.

zern untern schwarz sind. Die Vorderzähne sind braungelb, und die zwey spitzigen untern 3/4 Zoll lang. In jeder Kinnlade befinden sich auf jeder Seite drey viereckige gereifte Backenzähne, wovon der vordere der breiteste ist. Die Zunge ist lang, dick und glatt. Die Augen sind groß und schwarz und über und neben denselben stehen ebenfalls 2 Zoll lange borstenartige Haare. Die Ohren sind kürzer als an der Hausratte, doch hervorragend, kahl, oval, und der Gehörgang schmal. Der Hals ist 3/4 Zoll lang und erhaben. Von der Stirn läuft der Körper immer breiter zu, bis zu den Hinterschenkeln, wo er 2 1/2 Zoll breit wird. Von da nimmt er einen Zoll lang wieder spitzig ab, und der Balg, der daselbst gleichsam hohl zu seyn scheint, umschließt oben ein Stück Schwanz, und unten beym Männchen die großen Testikeln und den After. Der Schwanz ist klar beschuppt *), läuft spitzig zu, und hat zwischen jeder Schuppe schwarze kleine Borsten. Die Vorderfüße sind von der mittlern Zehe an bis zum Leib 2 3/4 Zoll lang, und haben vier mit kurzen Nägeln versehene Zehen, und einen unmerklichen Daumenansatz mit einem noch unmerklichern stumpfen Nagel; die Hinterfüße aber sind bis zum Leibe vier Zoll lang mit fünf gewöhnlichen Mäusezehen. Alle vier Füße sind fast kahl, stark und dick, wie geschwollen, und haben an der Wurzel zwischen jedem Zehen eine drey Linien lange Membrane, die ihnen allerdings beym Schwimmen nützlich ist.

Der

*) Er hat ohngefähr 200 schuppige Hauptringe.

Der Balg ist wegen der vielen langen schwarzen starken Haare viel rauher anzufühlen, als bey der Hausratte und den übrigen Mäusearten.

Der Kopf ist vom Mund bis zur Stirn aschgrau, von da bis zum Ende des Rückens röthlichgrau, welche Farbe die röthlichen Spitzen der kürzern Haare, und die langen schwarzen Stachelhaare verursachen. Von den weißen Grundhaaren und den schwarzen steifen Haaren bekommen die Seiten und die Schenkel der Vorder- und Hinterfüße eine graue Farbe. Kehle, Brust, Bauch und Füße sind schmutzig weiß.

Das Weibchen sieht mehr grau, als röthlich auf dem Rücken aus, ist weißer am Unterleibe, hat etwas längere und weiter auseinander stehende Ohren, halb so kurze Schneidezähne, einen beynahe ganz weißen Schwanz, sechs Säugwarzen an der Brust, und sechs am Hinterbauche, und der Balg ist weicher anzufühlen.

Diese Thiere schwimmen sehr schnell und tauchen auch unter, wozu ihnen nicht allein die kleine Zwischenhaut der Hinterfüße, sondern auch ihr weites Fell, welches verursacht, daß sie sehr viel Luft einpumpen können, beförderlich ist. Ihre Stimme ist hellpfeifend; ihr Alter aber unbekannt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Ostindien und Persien sollen das ursprüngliche Vaterland dieser Thiere seyn. In Europa sind sie erst

seit diesem Jahrhunderte bekannt, und durch Ostindische Schiffe dahin gebracht worden. Vor dreyßig Jahren hatte ich in Thüringen noch keine gesehen. Jetzt sind sie aber an den Wehren der Flüsse, in Mühlen, Häusern und auf den Feldern in ziemlicher Anzahl vorhanden. Eben so haben sie sich nun auf der ganzen Erde verbreitet.

Sie halten sich im Sommer im Felde, in den hohen Ufern der Flüsse, in den hölzernen und steinernen Einfassungen der Bäche in Städten und Dörfern, unter Wehren, und vorzüglich in den Mühlbetten und Radestuben auf, im Winter aber schlüpfen sie, oder graben sich vorzüglich gern in die Mühlen, und in die Häuser, welche nahe an Flüssen liegen, als Gerbereyen u. a. m., und wohnen da gern in den Abzügen, besonders in denen, die zu den Kellern führen. Ihre Wohnungen sind also entweder schon aufgefundene Höhlen, die ihnen das Wasser ausgeschwemmt und die Hamster und Maulwürfe ausgegraben haben, oder solche, die sie sich selbst in den Ufern der Teiche und Flüsse und in den Häusern graben.

Nahrung.

Alles, was die Hausratten als Nahrungsmittel zu sich nehmen, genießen auch die Wanderratten; doch lieben sie wirklich die Speisen aus dem Thierreiche mehr, als die aus dem Pflanzenreiche. An einem Orte, wo ihnen ihr feiner Geruch Fleischspeisen verräth, lassen sie alle Getraidearten unberührt, und gehen jener Nahrung nach. Sie fallen in Fischkästen die größten Karpfen an,

tödten

tödten sie, schleppen sie heraus, und fressen sie ganz oder zum Theil auf. Ja sie tödten junge Tauben, Hühner, Enten und Gänse *), wagen sich sogar an die alten Thiere von diesen Arten, suchen sie in Gesellschaft zu überwältigen, und fressen die fetten Schweine an. Der selige Goeze sagt (a. a. O. S. 89), daß sie in einem Halberstädtischen Amte die jungen Lämmer in den Ställen aufgefressen, und einem Pferde den Schwanz bis auf den Rücken abgenagt hätten. Auf den Feldern beißen sie die Aehren ab, in Gärten höhlen sie die Knollengewächse aus, und in Wäldern verheeren sie die Eichel- und Bucheckersaat. In Gerbereyen nagen sie große Löcher in die gegerbten und ungegerbten Felle, und in den Mühlen fressen sie das Fett aus den Pfannen, in welchen die Räder und Mühleisen laufen, besteigen die Mehlkästen, durchfressen die Getraidesäcke. Vorzüglich merkwürdig ist, daß sie den Käse so sehr lieben, daß sie oft weite Gänge unter der Erde hingraben und große Haufen aufwerfen, um in einem Keller zu diesen Leckerbissen, den sie von weitem riechen müssen, zu gelangen. Im Winter, wo sie sich mehrentheils in die Gebäude begeben, nähren sie sich besonders von den Exkrementen der Menschen in den Abtritten, von Getraide in den Scheunen und auf den Böden.

*) Ich habe eine unter den jungen Enten, die an einem Teiche saßen, wie ein Marder würgen, und da sie verfolgt wurde, sich ins Wasser stürzen und auf dem Boden so geschickt weglaufen sehen, wie eine Wasserratte.

Fortpflanzung.

Sie pflanzen sich zu eben der Zeit und auf eben die Art, wie die Hausratten, fort. Die Mütter bringen auf einem weichen Bette, das sie sich in einer von ihren oben beschriebenen Wohnungen bereiten, des Jahrs zwey- und dreymal, gewöhnlich 12, doch auch 18 bis 21 Junge zur Welt, die in ihrer Jugend grau sind. Die Alten vertheidigen dieselben grimmig. Sie begatten sich auch zuweilen, wenn sie nicht ihres Gleichen finden können, mit den Hausratten, und die Bastarten davon haben verschiedene Eigenschaften von beyderley Eltern gemein *).

Feinde.

Nur gute Katzen, Uhue und das große und kleine Wiesel wagen sich an diese beißigen Thiere. In der Leber findet man zuweilen einen großköpfigen Bandwurm.

Fang.

Man fängt sie, wie die Ratten, in hölzernen und eisernen Fallen, welche man ihnen mit in Fett gebra-

*) Ich habe so eben eine solche Bastartart vor mir, welche Größe, Kopf und Leib von der Wanderratte, Ohren und Füße von der Hausratte, und die Farbe von beyden vermischt hat. Sie ist 11 Zoll lang, hat einen Schwanz von 9 Zoll, der an der Wurzel wie ein Finger dick ist. Der Oberleib hat bey schwärzlichem Grunde lange röthlich graue und schwarze Stachelhaare, die den Balg sehr rauh machen; der Unterleib ist ganz dunkelaschgrau, wie bey der gewöhnlichen Hausratte.

gebratenem Fleisch und im Winter mit frischem Menschenkoth ankörret.

Auch die Frettchen lassen sich auf sie abrichten.

Folgendes sind zwey Mittel, welche man mit gutem Erfolg gegen sie anwenden kann. Man legt auf Kornböden um die ganz frey liegenden Getraidehaufen Leinwandlappen, die etwa einen Quadratfuß groß und mit Vogelleim bestrichen sind. In diese wickeln sich die Ratten, wie in Windeln ein, und werden dann schnell und leicht gefangen. Oder man legt überall, in Pottaschenlauge abgesottene Wallnußkerne für sie hin, die sie gern und in Menge fressen, an denen sie sich aber zu todte purgiren. Beyde Methoden sind weniger gefährlich, als der Gebrauch der Giftkugeln oder des Futters, das mit Gift gemischt ist.

Nutzen.

Man kennt keinen Nutzen von ihnen, als daß sie den Katzen und Uhuen zur Speise dienen; denn daß sie aus Scheunen und Ställen die Hausratten vertrieben, scheint noch nicht ganz ausgemacht zu seyn, ob es gleich Büffon, Pennant und Goeze behaupten. Ich habe in meinem Hause mehrmalen Hausratten und Wanderratten zugleich gehabt, und kenne Häuser in meiner Nachbarschaft, wo es eben so ist. Die Hausratten halten sich auch gewöhnlich auf den Böden auf, und die Wanderratten in Kellern, Ställen und Abzügen.

Schaden.

Der Schaden ist sehr groß, den sie in Häusern, Gärten und Feldern verursachen, und sie sind die schädlichsten Mäuse, die wir kennen. Sie könnten, wenn sie sich fernerhin so stark vermehrten, wie die andern Mäusearten, eine Landplage werden. (s. Nahrung.)

(30) 42. Die kleine oder gemeine Hausmaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Sie heißt auch Maus, Hausmaus, und gemeine Hausmaus.

Mus Musculus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 128. n. 13.

Souris. *Buffon* hist. nat. VIII. 309. T. 59. Suppl. III. 181. T. 30. Ed. de Deuxp. II. T. 9. f. 1. Uebers. von Martini IV. 235. Taf. 70.

Mouse. *Pennant* hist. of Quadrup. II. 184. Meine Uebersetz. II. p. 502.

v. Schrebers Säugeth. IV. 647. Taf. 179.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 237.

Goe-

Goeze's Fauna II. 104.

Donndorfs zool. Beytr. I. 433.

Kenzeichen der Art.

Sie hat einen sehr langen Schwanz, ist dunkelaschgrau, und ihr stumpfer Daumenansatz der Vorderfüße hat keinen Nagel.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Hausmaus ist ein artiges, munteres, aber auch sehr gefräßiges und schädliches Thierchen, welches in Rücksicht auf Gestalt und Aufenthalt sehr vieles mit der Hausratte gemein hat. Die Länge des Körpers beträgt 3 Zoll 3 Linien, die Länge des Schwanzes 3 Zoll, und die Höhe 1 Zoll 9 Linien *). Der Kopf läuft oben eyrund

*) Man findet zuweilen alte Mäuse dieser Art von außerordentlicher Größe und Farbe in Häusern und in Wäldern, die man deswegen nicht für verschiedene Arten halten muß. Ich habe zuweilen solche Mäuse gefangen, deren Körper 4 Zoll 3 Linien und der Schwanz 4 Zoll hielt. Der Kopf und Vordertheil des Leibes war schwarzgrau; der Rücken dunkelgrau mit durchschimmerndem gelb; der Schwanz schwarzgrau; der Unterleib hellgrau mit einem großen schneeweißen Flecken auf der Mitte des Bauchs; der After hochgelb eingefaßt; die Zehen der Hinterfüße schneeweiß.

Par. Ms.: Körper 3 Zoll; Schwanz fast die nämliche Länge.

rund ab, die Nase ist spitzig und hinter derselben verdickt sich die Schnauze durch die vielen großen schwarzen Barthaare. Die Augen sind groß, schwarz und hell; die Ohren eyrund, groß, dünn, beynahe kahl, schwarz gerändelt und weit offen. Nebst den zwey langen blaßgelben spitzigen Vorderzähnen befinden sich im Unterkiefer drey stumpfzackige Backenzähne auf jeder Seite, deren erster sechs, der zweyte vier, und der dritte drey Zakken hat, und im Oberkiefer außer den zwey gelblichen Schneidezähnen auf jeder Seite drey mit Punkten erhabene Backenzähne, deren erster sehr groß ist. Der Hals ist kurz, und der Hintertheil des Körpers läuft stumpfer zu, als bey den andern Mäusen. Die Vorderfüße haben vier Zehen, an welchen der Daumennagel der Hausratte fehlt, und die Hinterfüße fünf derselben. Der Schwanz ist sehr klar geschuppt, beynahe ganz kahl, und nur sehr einzeln mit kurzen steifen Haaren besetzt, die oben schwärzlich und unten weißlich sind.

Die Farbe des Kopfs, Rückens und der Beine ist bläßer, als bey der Ratte, und daher fahl, jedoch zuweilen auch dunkel- und hellaschgrau, und völlig grau, je nachdem die gelblichen Spitzen der kürzern Haare lang oder kurz gezeichnet sind. Der Untertheil des Halses, der Brust und des Bauchs ist bläßer, oder ins gelbliche spielend, und verliert sich zwischen den Hinterbeinen gewöhnlich in einen röthlichgelben After. Zuweilen sind alle vier Füßchen, zuweilen nur zwey weiß, auch ist oft mitten unter dem Bauch ein weißer Fleck.

Farbenvarietäten.

1) Die weiße kleine Hausmaus. M. M. albus.

Sie ist rein weiß oder geblichweiß mit rothen Augen.

Sie pflanzen sich wie die andern leicht fort, und es giebt Leute, die sie aufziehen und verkaufen. Damit sie ein recht fremdes Ansehen bekommen, so schneiden ihnen einige die Schwänze glatt am Rumpfe ab.

2) Die gelbe kleine Hausmaus. M. M. flavus.

Sie ist erbsgelb oder hellgelb.

3) Die gefleckte kleine Hausmaus. M. M. maculatus.

Sie ist weiß und grau, oder weiß und schwarz gefleckt.

4) Die schwarze kleine Hausmaus. M. M. niger.

Sie ist kohlschwarz. Sehr selten.

Zergliederung.

1) Am Brustbein ist ein Anhang.

2) Der

2) Der Magen ist nierenförmig und immer mit einem weißlichen Brey angefüllt.

3) Die Därme sind sehr lang, fast gerade aus laufend und sehr zart. Der Mastdarm hat paternosterförmige Abtheilungen, in welchem sich der cylinderförmige Unrath befindet.

4) Die Leber ist sehr groß, und in zwey große und zwey kleine Lappen getheilt, wovon die letzten bis zu den Nieren reichen. Sie enthält viele Blasenbandwürmer.

5) Der Uterus ist paternosterförmig, worin die Jungen in abgetheilten Zellen liegen.

6) Die Eingeweide sind voller Eingeweidewürmer aller Art.

7) Unter allen Thieren haben sie das wärmste Blut; denn seine Wärme geht sogar mitten im Winter auf 107 bis 109 Grad des fahrenheitischen Wärmemessers *).

Merkwürdige Eigenschaften.

Diese Thiere sind schnell, listig, aber schüchtern, und furchtsam. Sie scheinen große Liebhaber der Musik zu seyn, denn sie ziehen sich nicht nur an solche Orte hin, wo immer musicirt wird, sondern laufen auch am hellen Tage dabey herum, und vergessen, von Vergnügen beräubt,

*) Pallas novae Spec. Quadr. e glirium ordine. p. 95.

täubt, ihre angebohrne Furchtsamkeit. Wenn sie in Zimmer kommen, wo Klaviere stehen, so suchen sie allezeit diese Instrumente zuerst auf, und ergötzen sich an dem Klimpern, das ihr schädliches Hin- und Herlaufen auf den Saiten verursacht. — Nur eine heisere Stimme hört man in der Todesnoth von ihnen. Man hat Hausmäuse sechs Jahre lang gefüttert, sie können also in der Freyheit noch älter werden. — Zwischen Männchen und Weibchen habe ich keinen Unterschied bemerken können, als daß letzteres zehn Säugwarzen hat.

Verbreitung und Aufenthalt.

Sie bewohnen alle Welttheile, die Arktischen Kreise ausgenommen. Ihr Vaterland scheint das mittlere Europa und Asien zu seyn. Kalm *) aber behauptet, daß sie Amerikanischen Ursprungs wären; denn er hat sie da an öden Orten weit entfernt von menschlichen Wohnungen getödtet.

Ihren Aufenthalt haben sie bey uns bloß in Häusern. Es ist eine große Seltenheit, wenn man eine in einem Garten oder Wald in hohlen Stöcken oder Bäumen sieht. Hier graben sie sich Löcher in die Erde, leben unter den Fußböden, in den Klüften und Ritzen der Gebäude, und unterscheiden sich dadurch merklich von der großen Hausmaus, daß sie ihr Quartier nicht leicht eher verwechseln, als bis sie durch Noth und Gefahr gezwungen werden.

Nah-

*) Dessen Reise II. 46.

Nahrung.

Die Hausmäuse scheinen an gar keine bestimmten Nahrungsmittel gebunden zu seyn, da sie beynahe alles, was ihnen vorkommt, genießen, ja selbst das Bley nicht unbenagt lassen. Doch nähren sie sich von fetten Sachen und Getraide am liebsten; daher man sie auch am häufigsten auf Kornböden, in Mehl- und Speisekammern, in Küchen und Kellern findet. Ihr Geruch ist so fein, daß sie auch durch die Leim- und Breterwände ihre Leckereyen riechen, und sich vermittelst ihrer scharfen Zähne Zugänge dahin zu verschaffen suchen. Um sich mit geräuchertem Fleisch und Würsten zu sättigen, klettern sie an rauhen Wänden in die Schornsteine hinauf, und großen gemästeten Schweinen fressen sie Löcher in den Speck. Außerdem genießen sie Brod, Butter, Käse, Oehl, Kraut, Rüben, Ober- und Unterkohlrüben, Kartoffeln, und beynahe alle Arten von Wurzelgewächsen. Sie gehen vorzüglich des Nachts, oder wenn es ganz still ist, ihrer Nahrung nach, und entfernen sich nicht weit von ihren Höhlen, damit sie beym geringsten Geräusch entfliehen können. Sie wählen daher auch jedesmal ihren Aufenthalt an solchen Orten, wo sie ihre Nahrung in der Nähe finden, und sind daher genöthigt, ihn immer zu verändern. Da sie noch mehr, als die Ratten, Kleider, Bücher und alles, was ihnen im Wege steht, oder liegt, benagen, und dieß besonders bey heftigem Durst thun sollen, so stellt man ihnen eben so, wie jenen, Theeschaalen mit Wasser an dergleichen Orte, wo sie schädlich werden können, hin. Wo sie schmackhafte Speisen für sich finden, tragen

und

und verbergen sie sich dieselben in ihren Schlupfwinkeln.

Fortpflanzung.

Sie vermehren sich, wie die andern Mäuse, des Jahrs mehr als einmal, und begatten sich im April und May gewöhnlich das erstemal; diejenigen aber unter ihnen, welche an warmen Orten, unter den Fußböden und zwischen den Wänden der Zimmer ihre Wohnungen aufgeschlagen haben, pflanzen sich auch den Winter über fort. Das Weibchen trägt ohngefähr drey Wochen, und da diese Thiere die Gesellschaft ihres Gleichen lieben, so findet man oft in einem Winkel mehrere Nester von zerbissenem Stroh, Papier, Heu, von Federn und allerhand kleinen weichen Materialien, die in der Nähe gefunden werden, in deren jedem vier bis acht blinde nakkende junge Mäuse liegen. In der Wahl des Orts sind sie nicht sorgfältig genug. Sie nisten daher in Betten, in hohle Kohlrüben, Kohlköpfe, Perücken, Taschen, Mäusefallen, und skeletirte Todtenköpfe, allemal aber machen sie eine weiche Unterlage.

Die Mutter liebt ihre Kinder so zärtlich, daß sie auch den Menschen, der sich ihrem Wochenbette nahet, nicht scheut, sondern ängstlich um ihn herumläuft, wenn sie ihn zum Mitleiden bewegen wollte, sie nicht wegzunehmen. In vierzehn Tagen können die Jungen sehen und schon die Mutter verlassen. Wegen ihrer lächerlichen Posituren ziehen manche Personen auch junge, sonderlich weiße Mäuse auf, und sie werden so zahm, daß

daß sie ihnen das Futter aus den Händen nehmen, und auf einen gewissen Ton oder Ruf herbeykommen. Ja es giebt Alte, die, wo sie keine Verfolgung befürchten, oft so dreiste werden, daß sie am hellen Tage in die Zimmer kommen, und ihre Nahrung suchen, die sich an gewisse Zeiten gewöhnen lassen, wenn sie kommen müssen, um ihren Tisch gedeckt zu finden, alsdann sich sattfressen, und das übrige in ihre Höhlen tragen.

Feinde.

Hunde, Katzen, Wiesel, Marder, Iltisse, Igel und Eulen sind ihre Verfolger. Auf dem Balge findet man den kleinen hellbraunen Mistfloh. In Leber, Magen und Därmen findet man eine Menge Blasenwürmer, Rundwürmer, langgliedrige Bandwürmer, Kratzerwürmer und Haarwürmer.

Fang und Vertilgung.

Wenn man im Schnee oder Sand eine sehr kleine Spur sieht, wo alle vier Füße in zwey Spuren stehen, die wie im Zickzack fortlaufen, so ist sie gewöhnlich von einer Hausmaus.

Man vertreibt diese schädlichen Gäste in Häusern vorzüglich durch gute Katzen, durch Gift und verschiedene bekannte Arten von hölzernen und eisernen Mäusefallen. Giftkügelchen findet man in jeder Apotheke. Auch vermischt man feines Weizenmehl und

Zucker

Zucker mit Arsenik und setzt es ihnen hin. In die Mäusefallen lockt man sie mit in Oehl geröstetem Brod oder gebratenem Speck.

Die sogenannten Doktor Luthers Fallen, oder die mit Ziegelstücken und Backsteinen, welche man mit drey schwachen Hölzchen, an deren eines man die Lockspeise heftet, aufstellt, die bey der geringsten Berührung zusammenfallen, und die nagende Maus erquetschen, sind die wohlfeilsten und besten.

Ein unschädliches und bewährtes Mittel für diese und der Hausmäuse ist auch folgendes: Man brät ein Stück Wischschwamm in Oehl oder Fett, preßt es dann recht derb zusammen, schneidet es in kleine Würfelchen und streut diese dahin, wo man Mäuse spürt. Sobald dieser Fraß im Magen kommt, quillt er auf, und die Maus stirbt.

Nutzen.

Außer daß diese Thiere in der Natur den Nutzen schaffen, daß sie den Katzen, Iltissen, Mardern, Wieseln, Igeln und andern Raubvögeln zur Nahrung dienen, so essen auch die Menschen in manchen Gegenden, als die Tunguſen, und Bewohner der Insel Martinique ihr Fleisch ohne Ekel, und in der Medicin brauchte man sonst ihr warmes Blut zur Zertheilung des Geschwulstes der Mandeln, ihren Koth als Purgiermittel, und eine gebratene Maus als Brechmittel.

Die Japaneser zähmen sie, lehren sie allerhand Künste, und ernähren sich auf diese Art. Die Perser glauben, daß eine aufgerissene Maus, auf einen Schlangenbiß gelegt, das Gift ausziehe.

Schaden.

Der Schaden, den diese unangenehmen Gäste auf den Fruchtböden, in den Vorraths- und Speisekammern stiften, ist aus ihrer Nahrung bekannt. Außerdem verderben sie auch noch durch ihr Nagen und ihren Urin Bücher, Papier, vieles Hausgeräthe und die Kleidungen der Menschen. Die Saiten auf den musikalischen Instrumenten, als Flügeln und Klavieren springen, wenn sie mit ihrem scharfen Harn benetzt werden.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Viele gemeine Leute halten den Schwanz für giftig.

2) Ihr Koth, Fleisch, und sie selbst gebraten heilt manche schwere Krankheit. s. auch Nutzen.

3) Der Teufel braucht sie als Larve und rechte Hexenmeister können Mäuse machen *).

*) Goeze's Natur, Menschenleben und Vorsehung. II. 66, 68, 70, 72, 75tes Stück.

(31) 43. Die Feldmaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Waldmaus, große Feldmaus, gelbbraune Feldmaus, Waldratte, Heermaus, braune Maus, Mülot, Baumratze, Nielmaus, Haumaus, und bey vielen Jägern, denen sie die Beeren in der Schneuß abfrißt, kleine Haselmaus.

Mus sylvaticus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 129. n. 17.

Mulot. *Buffon* hist. nat. VII. 325. T. 41. Ed. de Deuxp. II. T. 9. f. 2. Uebers. von Martini IV. 243. T. 71.

Field Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 184. Meine Uebers. II. p. 302.

v. Schrebers Säugeth. IV. 651. Taf. 180.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 15.

Göze's Fauna. II. 135.

Donndorfs zool. Beytr. I. 437. n. 17.

Kennzeichen der Art.

Mit langen schuppigen Schwanze, graubräunlichen, im Sommer hellern, im Winter dunklern Oberleibe, und weißen, wie abgeschnittenen Unterleibe.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Maus ist in Thüringen eine der schädlichsten wegen ihrer großen Fruchtbarkeit. Die Länge ihres Körpers beträgt 4 Zoll *), die Höhe aber 1 Zoll 6 Linien, und der Schwanz hat ebenfalls fast die Länge des Körpers.

Ihr Kopf ist verhältnißmäßig größer als an der Hausmaus, dick, eyrund, die Nase etwas erhaben, und die Schnauze stumpf. Der Mund ist sehr klein und enthält vier braune Vorderzähne, und zwölf stumpfe Backenzähne, wovon die in der obern Kinnlade auf der Oberfläche stumpfwinklich eingeschnitten sind, und die in der untern Kinnlade aus lauter erhabenen Punkten bestehen. Aeußerlich ist er mit sehr langen Fühlhaaren besetzt, die an der Wurzel schwarz und übrigens weiß sind. Die Zunge ist dick und glatt. Die Augen sind sehr groß, hervorstehend und schwarz, jedes oberhalb mit einer feinen Borste; die Ohren hervorragend, eyrund, pergamentartig, beynahe kahl und schwärzlich. Die Füße

*) Par. Ms.: Länge des Körpers, so wie des Schwanzes, fast 4 Zoll.

Füße haben vorne, ohne den Daumenansatz mit einem stumpfen Nagel, vier und hinten fünf Zehen, und sind sehr zart.

Die Schnauze ist aschgrau, um den Mund herum weiß. Der Rücken und die Seiten haben wegen der rostfarbenen Haarspitzen eine röthliche Farbe; doch ist der mittlere Rückenstreifen dunkler oder grauer wegen der dichtern und längern schwarzen Stachelhaare. Kehle, Brust und Bauch sind weiß; die Füße blendend weiß, und nur das alte Männchen hat oft von der Brust bis zum After einen gelben Streifen, und an jeder Seite der Brust zwey solcher Punkte. Die Farbe des Oberleibes ist von der des Unterleibes scharf abgeschnitten. Wenn sie im October den Winterpelz angezogen hat, so ist sie graubraun*), auch wohl bräunlichgrau. Der Schwanz ist klarschuppig, seine Haut läßt sich sehr leicht abstreifen und die kurzen einzelnen Zwischenhaare sind auf seiner Oberseite schwarz und auf der Unterseite weiß.

Das Weibchen ist kürzer und spitzköpfiger, als das Männchen.

Farben-Varietäten.

1) Die weiße Feldmaus.

Mus syl. albus.

Sie ist über und über weiß. Ich habe auch eine gesehen, die am Unterleibe rein weiß, am Oberleibe aber gelblichweiß war.

*) Man darf sich durch diesen sehr auffallenden Farbenwechsel nicht irre führen lassen, und die rothen, die man im Sommer fängt, und die graubrauneu, die man im Winter fängt, für verschiedene Arten halten.

2) Die bunte Feldmaus.

M. syl. varius.

Sie ist unregelmäßig weiß gefleckt.

3) Die Feldmaus mit weißem Kopfe.

M. syl. leucocephalus.

Sie hat bloß einen weißen Kopf. Ich habe auch in dem mäusereichen Herbste 1794 eine mit einer weißen Blässe gesehen, die sehr schön aussah.

4) Die schwarze Feldmaus.

M. syl. niger.

Sie war oben rauhschwarz, unten schneeweiß. Sie wurde auch im Herbst 1794 gefangen.

Diese Maus bekommt durch ihre Farbe und ihr munteres Gesicht ein sehr angenehmes Ansehen; kann geschickt schwimmen und noch geschickter klettern. — Sie läßt keine Stimme von sich hören und ihr Alter ist unbekannt.

Zergliederung.

Sie hat in Ansehung der innern Theile mehr Aehnlichkeit mit der Wasser- als Hausmaus, ob sie gleich der letzten in der Gestalt so nahe kommt. Das Herz liegt ebenfalls schief in der Brust und kehrt die Spitze nach der linken Seite. Die Hirnschale ist so

dünn

dünn wie Postpapier, daß man Schrift durchlesen kann. In den Eingeweiden findet man fast gar keine Würmer.

Verbreitung und Aufenthalt.

Diese Thiere haben ganz Europa zu ihrem Vaterlande und sind in Deutschland sehr gemein.

Sie leben unter der Erde in Löchern, die sie sich graben, und zwar in Aeckern, Wiesen, Gärten und Wäldern. In den Feldern schlagen sie ihre Wohnungen gern in den ungepflügten Zwischenräumen der Aecker, den sogenannten Rainen auf, weil sie hier den Stöhrungen des Pfluges weniger ausgesetzt sind. Wo sie diese nicht haben, suchen sie solche Aecker auf, wo die Stoppeln untergeackert sind, weil sie da bequem wohnen und nisten können. Im Herbste lassen sie sich mit dem Getraide gern in die Scheunen fahren, und verstecken sich im Stroh und Heu bis zum Frühjahr. Andere, die im Sommer nahe an Häusern leben, suchen sie im Winter auf; die übrigen aber bleiben im Felde und Walde in ihren Höhlen, in welchen sie, wenn hoher Schnee liegt, warm genug wohnen, und mehrentheils eine schräge und eine senkrechte Röhre haben.

Nahrung.

Die Nahrung dieser Thiere besteht im Felde beynahe aus allen Feldfrüchten; im Walde aus Fichten-Kiefer- und Tannensaamen, aus Eicheln, Bucheckern, Haselnüssen, allerhand Beeren, Beerkernen, Baumsaamen, und aus den Schalen der jungen Bäume und

Baumwurzeln; in den Gärten aus mancherley Wurzelwerk, besonders der Zwiebelgewächse, und in Häusern aus dem, wovon sich die Hausmaus nähret. In der Aerndte ziehen sie sich in Menge unter die aufgestellten Garben und fressen die Aehren aus. Im Winter bleiben diejenigen, die im Felde wohnen, entweder auf den eingeärndteten Haferäckern, und suchen die ausgefallenen Körner unter dem Schnee auf, oder gehen in die Wälder, wenn sie ihnen nahe liegen, nähren sich von abgefallenen Saamen und Früchten, erklettern die Sträucher, die zu dieser Jahrszeit noch Beeren haben, lesen sie ab, und thun in Buchwäldern bey lange und hoch liegendem Schnee großen Schaden, indem sie die Schale der jungen Buchen von der Erde an, so hoch als der Schnee liegt, abnagen. Im Herbste trifft man zuweilen in ihren Höhlen oder unter einem Strauch einen Vorrath von Beerkernen und Sämereyen an, den sie dahin zusammengetragen haben. Sie fressen auch Insekten, besonders Käfer und in Hungersnoth fressen sie sich einander selbst auf. Daß sie auch Fleisch fressen, bemerkt man an dem Aas, das sie im Felde und Walde angehen. Sie sollen auch in Gesellschaft die Kröten anfallen und umbringen *). Wenn sie sich zu stark vermehrt haben, so reizt sie ihre Natur selbst zu ihrem Untergange. Ein innerer Trieb treibt sie nämlich in gewissen Jahren zur Herbstzeit an, sich in große Heerzüge zu sammeln und eine Auswanderung vorzunehmen. Ihre Reise treten sie allezeit nach der Aerndte an, marschiren immer gerade aus, steigen über Berge und schwimmen über Flüsse, und verlieren

*) Smiths Vertreib. d. schädl. Thiere. 97.

lieren sich so nach und nach, indem sie entweder von Raubvögeln und Raubthieren, die ihnen nachziehen, gefressen werden oder ersaufen. Gar merklich wird eine solche Wanderung, und wenn man sie auch nicht zu ganzen Heeren bey Tage und des Nachts im Mondenschein ziehen sähe, durch die Hechte, deren Magen, wenn sie zu einer solchen Zeit gefangen werden, mit solchen Mäusen ausgestopft ist. Sie sind daher wirkliche Zugthiere *).

Fortpflanzung.

Sie begatten sich im Frühjahr gleich in den ersten warmen Tagen, wenn der Schnee die Erde wieder entblöset hat. Das Weibchen trägt ohngefähr drey Wochen und begattet sich bis im späten Herbst alle fünf Wochen; ja in Häusern pflanzt es sich auch im Winter fort. Es sucht sich gern einen Klumpen untergegrabenen Mist auf den Aeckern aus oder macht sich in einer Höhle ein feines rundes Nest von weichem zerbissenen Gras, Moos und Stroh, und bringt vier bis zehn nackende blinde Junge auf einmal zur Welt, die es nur zwölf Tage bis zur gänzlichen Oeffnung der Augen säugt, und alsdann fast immer schon ihrer eigenen Sorge überläßt, um sich aufs neue befruchten lassen zu können. Die Vermehrung dieser Thiere ist daher in trockenen Sommern außerordentlich groß; und nur ein baldiger Winter

*) Der Aberglaube in Thüringen sagte sonst bey einer solchen Auswanderung, wo plötzlich ein ganzer Zug in eine Gegend einfiel, daß es Mäuse geregnet habe. Im Jahr 1780 war die letzte. Goeze hat eine solche Wanderung im Herbst 1755 zu Quedlinburg bemerkt, wo sie zu hunderten durch die Stadt zogen. s. Goeze a. a. O. S. 139.

reibt die letztern Bruten wieder auf, wo man diese ohnmächtigen Thiere häufig auf dem Schnee herumkriechen, verhungern und erfrieren sieht. Sie sehen in der Jugend röthlichgrau aus.

Krankheiten.

Blindheit an einem oder beyden Augen ist eine ihrer gewöhnlichsten Krankheiten.

Feinde und Vertilgung.

Zu ihrer Vertilgung hat die Natur schon von selbst durch ihren Trieb bey ihrer zu starken Vermehrung Reisen anzustellen, und durch nasse Jahre gesorgt; allein auch die Wölfe, Füchse, Marder, Iltisse, Wiesel und Raubvögel, als Weihen, Bussarte, Eulen, Kolkraben, Dohlen und alle Arten von Krähen, auch der gemeine Würger, richten besonders im Winter große Niederlagen unter ihnen an.

Sonst hat man viele durch Brodkugeln, welche mit Arsenik vermischt waren, und in die Furchen der Aecker und Beete gestreut wurden, aus der Welt geschafft; allein dieß Mittel ist wegen vieler unvorhersehbarer Unglücksfälle nicht anzurathen, und man muß hier gewöhnlich die Natur allein wirken und helfen lassen. Bey Holzanlagen hat man sie mit Hanfkörnern, die mit Arsenik bestreut waren, auch mit Mehl, das mit Arsenik vermischt war, und welches beydes unter Holzhügel wegen Regen

und

und Feuchtigkeit gelegt wird, vertilgt *). Gut ist es, wenn sie in Menge da sind, große Sträucher oder Pfähle mit Queerstöcken auf die Saatfelder zu bringen, auf welche sich die Krähen gern setzen und sie wegfangen, wenn sie aus den Löchern schlüpfen.

In den Häusern fängt man sie in den gewöhnlichen Mäusefallen mit fetten Lockspeisen, und in den Scheunen soll man sie mit gutem Erfolg, indem man die Wände mit den stachlichen Wachholdersträuchern besetzt, zum Weichen bringen.

Wenn man im Schnee oder im Sande eine kleine Spur von einem Thiere findet, wo die Füßchen in einem Dreyeck, oder zwey und zwey zusammenstehen, in einem Zickzack fortlaufen, und bey tiefem Schnee eine Linie in der Mitte derselben fortgezogen ist, welche der Schwanz verursacht, so ist es gewöhnlich die Fährte dieser Feldmaus.

Auf ihrem Balge findet man gelbliche Erdmilben.

Nutzen.

Man weiß keinen Nutzen von ihnen anzugeben, als daß sie verschiedenen Raubthieren und Raubvögeln zur Nahrung dienen müssen. Allein ihr schönes Fellchen könnte vielleicht gebraucht werden.

Scha-

*) Unächter Acacienbaum von Medicus. IV. 1. S. 47.

Schaden.

Der Schaden ergiebt sich aus ihrer Nahrung. Vorzüglich nachtheilig werden sie in der Erndte an den Schwaden, im Winter an der Saat und in den jungen Buchenwäldern in harten Wintern, wenn es keine abgefallenen Bucheckern giebt, auf dem Vogelheerd und in der Schneuße. Sie ersteigen die Beerreißer, wenn sie auch noch so glatt sind, und fressen die Vogelbeeren (Ebereschenbeeren) ab. Wenn sie einmal einen Schneußengang wissen, kann man nicht genug vorbeeren. Sie fangen sich nicht selten über ihrem Diebstahl in den aufgestellten Schlingen, beißen aber jederzeit, wenn sie sich nicht am Halse erdrosseln, die Vogelbänder entzwey, und laufen wieder davon.

(32) 44. Die Brandmaus.

(Taf. XII. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Diese Maus wird auch Kornmaus, Ackermaus, Streifmaus, Gartenmaus, wilde Maus und Erbsmaus genannt, und letzteres deswegen, weil sie sich ihrer Nahrung halber gern bey dieser Pflanze aufhält *).

Mus

*) Die alten Brandmäuse habe ich niemals kleiner als die Hausmaus gefunden, wie man doch angiebt, sondern allezeit von der unten angegebenen Größe Auch sind mir in Thüringen, bey sorgfältiger Beobachtung, keine Durchzüge von diesen Thieren bekannt.

Mus agrarius. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 130. n. 7.

Rustic Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 189. Meine Ueberſ. II. p. 507.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 363.

v. Schrebers Säugeth. IV. 658. Taf. 182.

Donndorfs zool. Beytr. I. 440. n. 7.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz iſt lang und ſchuppig; die Ohren ſind klein und haarig; der Oberleib iſt roſt- oder graubraun, und über den Rücken läuft ein ſchwarzer Streifen.

Geſtalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geſchlechts.

Dieſe Maus trifft man oft genug in Thüringen an. Sie unterſcheidet ſich merklich von voriger durch ihre kurzen abgerundeten Ohren und durch die Farbe. Ihre Länge beträgt 4 Zoll 9 Linien, die Länge des Schwanzes 3 1/2 Zoll und die Höhe 1 1/2 Zoll *). Der Kopf iſt länglicher, als bey der vorigen Art, faſt eyrund, 1 Zoll 3 Linien lang und die Schnauze ſpitzig. Der Mund ſteht in gerader Linie unter den Augen, alſo weit hinten.

Das

*) Die kleinern rothgrauen, die man im Herbſt fängt, ſind gewöhnlich Junge oder Weibchen. Par. Ms.: Körper über 4 Zoll; Schwanz über 3 Zoll.

Das Gebiß ist eben dasselbe, das die zuvor beschriebene Feldmaus hat. Die Augen sind klein, stehen hervor und sind schwarzbraun. Ueber jedem Auge stehen auf zwey Wärzchen eine große und kleine schwarze Borste und hinter dem hintern Augenwinkel eine gleiche noch kleinere Borste und ein Wärzchen. Die Ohren sind klein, fünf Linien lang, ragen nicht viel unter den Haaren hervor, sind auswendig beynahe kahl, inwendig mit vielen gelblichen Haaren besetzt, stark abgerundet und nach außen zu umgelegt. Die ganze Maus ist dick und stark, und der Körper von unbemerkbarem Hals und ein runder Cylinder.

Die Schnauze ist aschgrau; die Barthaare sind an der Wurzel schwarz, übrigens weiß; von den Augen bis zur Stirn ist der Kopf rothgrau; der ganze Oberleib nebst Backen, Seiten, Schultern und Schenkeln, im Sommer schön rostbraun, im Winter graubraun. Zwischen den Ohren zieht sich dann ein glänzend schwarzer, oder auch bloß schwärzlicher zwey Linien breiter, Streifen, über den Rücken hin bis einen halben Zoll vor das Ende des Körpers. Der ganze Unterleib ist weiß, doch nicht so schön, als an der vorigen Art, weil der aschgraue Grund mehr vorschimmert; die Füße sind fleischfarben. Die fünf Schwielen an den Hinterfüßen, und die sechs an den vordern sind aschfarben. Der dünn- und weißbehaarte Schwanz hat oben schwarze und unten weiße Schuppen. Das Männchen hat einen sehr großen Hodenbeutel, der so wie der After, schwarz gezeichnet ist.

Das Weibchen ist merklich kleiner und minder hell als das Männchen.

Man

Man hört keine Stimme von diesen Mäusen, und wie alt sie werden, ist nicht bekannt.

Farbenvarietäten:

1) Die weißgestreifte Brandmaus. M. agr. albostriatus.

Sie hat bey hellisabellfarbener Hauptfarbe einen weißen Rückenstreifen. Ein sehr schönes Thierchen.

2) Die gefleckte Brandmaus. M. agr. maculatus.

Sie hat die gewöhnliche Grundfarbe, einen weißen Rückenstreifen, und ist am Kopfe und an den Seiten schwarz gefleckt. Ebenfalls ein sehr schönes Thierchen.

Beyde Varietäten habe ich in dem mäusereichen Jahre 1791 angetroffen.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Brandmäuse wohnen in Europa und im Asiatischen Rußland; in letzterer Gegend in großer Menge, und sie richten hier zuweilen in Feldern große Verheerungen an. Pallas sagt, daß sie oft große Wanderungen anstellten und die Erndte der Pächter ganz vernichteten. Eine solche Landplage war vorzüglich im Jahre 1763 und 1764, wo sie in den fruchtbaren Gegenden um Casan und Aresk die größten Verheerungen anrichteten. Sie kamen in so großer Menge, daß sie die Häuser anfüllten, und wurden so hungrig und kühn, daß

sie

sie das Brod vor den Augen der Gäste von der Tafel wegfrasen *).

Sie haben mit der vorigen Art einerley Aufenthalt, leben im Felde, in Gärten, und vorzüglich in Laubhölzern, im Winter auch im Häusern. Im Felde trifft man sie bey uns gewöhnlich auf Erbsenäckern und in Gärten in Baumschulen an. Ihre Wohnungen sind nicht tief unter der Oberfläche der Erde. Jede besteht aus einer Röhre, an deren Ende eine Kammer ist, in welcher das Weibchen heckt, und für den Winter der Vorrath eingetragen wird.

Nahrung.

Von alle dem, was jene Art genießet, ernähret sich auch diese. Vorzüglich wählt sie zu ihrer Nahrung Fruchtkerne. Sie sucht daher die Baumschulen auf und frißt die gesäeten Aepfel- Birn- Kirsch- und Pflaumenkerne weg. In Gärten und Wäldern sucht sie unter den Kirschbäumen die Kerne, unter den Buchen, die Bucheckern und beißt sie sehr geschickt auf. Auf den Erbsäckern und Erbsbeeten thut sie großen Schaden, indem sie die gesäeten und eingelegten Erbsen ausscharrt und bis auf dem Keim ausfrißt. Sie frißt auch in der Noth andere Mäuse ihrer Gattung und Art auf. Im Winter hat sie von ihrem Vorrathe zu zehren.

Fortpflanzung.

Sie pflanzt sich ebenfalls, so wie die vorige Art fort, nur nicht so stark. Fein-

*) Pallas Reisen I. 130. II. 7. 651

Feinde.

Die Brandmaus hat eben die Feinde, welche ihre Verwandtin, die vorher beschriebene Feldmaus hat, und wird besonders von weißen und braunen Erdmilben sehr geplagt.

Vertilgung.

Zur Vertilgung dieser Mäuse pflegt man eingeweichte Erbsen, Stückchen Kartoffeln, Rüben u. d. gl. mit Arsenik, das in Baumöhl aufgelöst ist, zu bestreichen, und hiervon in jedes gangbare Mäuseloch in Gärten etwas zu legen. An den Verfall dieser Eingänge bemerkt man, ob das Mittel gewirkt hat. Daß dieß Mittel Vorsicht nöthig hat, versteht sich von selbst.

Nutzen.

Ihr Nutzen schränkt sich bis itzo bloß darauf ein, daß sie verschiedenen Raubthieren und Raubvögeln zur Nahrung dienen müssen.

Schaden.

Daß dieser groß sey, ersieht man aus ihrer Nahrung, besonders richten sie im Frühjahr in Mistbeeten großen Schaden an.

45. Die Rüsselmaus.

Mus Soricinus. *Herrmann.*

(Taf. XII. Fig. 2)

Mus soricinus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 130. n. 10.

Soricine Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 190. Meine Uebers. II.

v. Schrebers Säugeth. IV. 661. Taf. 183. B.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz hat die Länge des Körpers, ist etwas behaart, und die Schnauze ist rüsselartig.

Beschreibung.

Die Länge dieses Thieres, das bey der großen Ueberschwemmung zu Ende des Octobers 1787 auf den Außenwerken der Stadt Strasburg gefangen, und dem Herrn Professor Herrmann daselbst gebracht wurde, ist fünf Zoll, wovon der Schwanz gerade die Hälfte ausmacht *). Die obere Kinnlade ist zugespitzt, fast wie an der Spitzmaus; die Oberlippe gespalten. Die Vorderzähne sind blaßgelb. Der Bartbosten sind sieben Reihen, und stehen in die Höhe. Die Ohren sind hervorragend

*) Par. Ms.: Länge 4 Zoll 6 Linien.

gend, und behaart. An den Vorderfüßen sind vier Zehen nebst einer Warze statt des Daumens, und an den Hinterfüßen fünf, wovon die äußere ziemlich weit zurücksteht. Die Klauen sind sehr kurz.

Die Farbe ist gelb mit grau gemischt, und der Bauch weiß. Hinten am Leibe, an der Wurzel des Schwanzes ist das Gelbe reiner, vom Grauen unvermischter, und eher aufs fuchsrothe stechend. Der Schwanz ist einfarbig, mit schuppigen Ringen und darzwischen eingestreuten Haaren besetzt, unten etwas haariger, nach und nach abnehmend, an den Seiten und von unten her etwas gedrückt, von unten mit einer kaum merklichen Furche ausgehöhlt.

Sie hat mir immer, wie eine Spitzmausart ausgesehen.

Zweyte Familie.

Haarschwänzige Mäuse.

Mures cunicularii.

Kennzeichen.

Die untern Vorderzähne haben eine breite Schneide. Der Schwanz ist kurz, mit kurzen Haaren so dicht bedeckt, daß die Ringe nicht deutlich zu erkennen sind. Der Kopf ist dick und kurz. Die Ohren, Füße und Zehen sind klein. In Thüringen giebt es zwey Arten.

(33) 46. Die Wassermaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Wasserratte, Wasserratze, große Wassermaus, amphibische Maus, und Wasserzeist.

Mus amphibius. *Gmelin. Lin.* I. 1. p. 132. n. 11.

Rat d'eau. *Buffon* hist. nat. VII. 348. t. 43. Ed. de Deuxp. II. T. 11. f. 1. Uebers. v. Martini IV. 251. T. 72.

v. Schrebers Säugeth. IV. 668. Taf. 186.

Erdwolf, Erdschüffel, Feldmaus, Feldratze, Stoßmaus, Reutmaus, Scharrmaus, Scheermaus und Haumaus.

Mus terrestris. *Lin.* Syst. nat. ed. 12. p. 82. n. 10. Faun. suec. 2. p. 11. n. 31.

Sumpfmaus, Sumpfratte.

Mus paludosus. Mantiss. plant. 2. p. 522.

Büffons Uebers. von Martini. IV. 252.

Water Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 182. Meine Uebersetz. II. p. 500.

Sher-

Shermann. *Pennant.* I. c. n. 379. Ueberf. a. a. O. S. 499.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 295.

Goeze's Fauna. II. 159.

Donndorfs zool. Beytr. I. 447. n. 11.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz hat ohngefähr die halbe Länge des Körpers; die Ohren sind kurz, kaum aus dem Felle hervorragend; an den Vorderfüßen befindet sich eine kurze Daumenwarze mit einem kleinen Nagel.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese schädliche Maus wird in Thüringen an den Ufern der Flüsse, in den Gärten, Feldern und Wäldern in großer Menge angetroffen. Sie erlangt die Größe der Hausratte, ist aber stärker. Die Länge vom Kopfe bis zum Schwanze beträgt sieben Zoll, der Schwanz vier Zoll *) und die Höhe drittehalb Zoll.

Der Kopf ist rund und dick, ein und drey Viertel Zoll lang, und scheint wegen der breiten Backen breiter, als lang zu seyn. Die Schnauze ist kurz, stumpf, zwischen den eyrunden Nasenlöchern der Länge nach getheilt. Nur die Nase ist kahl und fleischfarben. Die vier Vorderzähne in beyden Kinnladen, wovon die untern nicht

*) Par. Ms: Körper 6 Zoll 3 Linien; Schwanz 3 1/2 Zoll.

spitzig, sondern eyrund auslaufend und einen halben Zoll lang sind, sind braun. Sie sind äußerlich sichtbar und theilen die Oberlippe weit. In der obern Kinnlade befinden sich außerdem auf jeder Seite drey Backenzähne, deren Vertiefungen zwölf Dreyecke geben, die in einem Zickzack an einander hängen; in der untern aber stehen auf jeder Seite vier Backenzähne, die ebenfalls und noch regelmäßigere Dreyecke in einem scharfeckigen Zickzack bilden, weil sie kleiner sind, und kaum merkliche Vertiefungen haben. Man kann auch jeden Winkel für einen eigenen Zahn ansehen, indem er seine eigene Wurzel hat und sich leicht ablösen läßt. So gestaltete Backenzähne waren ihr zum Zermalmen der Wurzeln und Körner nöthig. Beyde Lippen ziehen sich zwischen den Raum, der die Vorderzähne von den Backenzähnen scheidet, in den Mund, und sind inwendig, eben so wie äußerlich, mit harschen Haaren besetzt. Die Backen sind, wie gesagt, dick, aufgeblasen, und die Barthaare, welche neben der Nase bis zu den Augen auf vielen Wärzchen stehen, lang und schwarz, zuweilen mit weißen Spitzen. Die Augen sind mittelmäßig groß, hervorstehend, schwarzbraun, und liegen in tiefen Höhlen. Die Ohren sind unter den langen Haaren äußerlich beynahe ganz unsichtbar, dünn, breit, wenig behaart, grau, weit offen, und am Rande nach außen zu umgebogen. Der Leib schließt ohne merklichen Hals dicht am Kopfe an, ist rund und dick und wird am Hinterleibe kaum etwas stärker als dieser.

Die

Die Vorderfüße sitzen dicht am Leibe an, und haben vier Zehen und am Daumenansatze, der weit zurückliegt, wie die Hausratte, einen stumpfen länglichen Nagel. Die Hinterfüße haben fünf lange Zehen, sitzen weit hinten, da, wo der Körper nach dem Schwanze zu wieder spitzig ausläuft, sind ohne eigentliche Schwimmhaut, doch sind die Zehen, so wie an den Vorderfüßen mit einer kleinen Membrane verbunden. Der Schwanz hat 130 Schuppenringe und ist mit vielen Stachelhaaren, so wie die Füße, besetzt, so daß die Ringe nicht sehr vorstechen.

Das ganze Thier ist mit einem dichten Pelze versehen. Die kürzern Haare des Kopfs, Rückens und der Seiten haben schwarzblauen Grund und braune Spitzen; zwischen diesen stehen einzelne längere schwarze Haare, die von der Schnauze an bis zum Ende des Rückgrats am engsten stehen, und also dem Obertheile ein dunkelbraunes Ansehen geben, die Backen und Seiten aber braun lassen. Die Kehle, der Unterhals und die Gegend des Afters ist aschgrau; die Brust und der Bauch aber rostbräunlich; die Schenkel und Füße grau, obgleich der Grund des ganzen Unterleibes dunkelaschgrau ist. Der Schwanz ist auf dem Obertheile schwarz, auf dem Untertheile schmutzig weiß, und da die Haare dichter stehen, so hat er auch nicht das eckelhafte Ansehen, wie an der Hausratte.

Das Weibchen ist vom Männchen darin unterschieden, daß der Kopf nicht so dicke, bausige Backen hat, der Unterleib hellaschgrau, und der Schwanz oben röthlich

lich ist. Außerdem hat es acht Säugewarzen, vier auf der Brust zwischen den Vorderfüßen, und vier am Bauche zwischen den Hinterfüßen.

Varietäten:

Die oben angegebenen Varietäten (Mus amphibius, terrestris et paludosus) haben vorzüglich ihren Grund in den unten angegebenen höchst verschiedenen Aufenthalte dieser Maus. Sonst zeigen aber die genauesten Beobachtungen, die ich über dieß Thier angestellt habe, daß diese Namen nur ein und dieselbe Art bezeichnen. Weder in der Länge des Körpers, des Schwanzes, der Höhe, noch in der Dicke des Kopfs, Größe der Ohren, in dem Gebisse, noch in der Farbe, der Alten und Jungen, welche bey letztern wirklich ein entscheidendes Merkmahl abgeben muß, ist der mindeste Unterschied sichtbar, und wenn die eine von diesen Mäusen auf dem höchsten Berge und die andere in dem tiefsten Flusse gefangen worden ist. Ihre Oekonomie ist so verschieden, wie die Oekonomie der Ringelnatter (Coluber natrix). Manche von diesen Amphibien leben fast stets im Wasser, und andere, die auf hohen Bergen wohnen, sehen es fast nie.

Weiter bemerkt man:

a) Die schwarze Wassermaus. M. amph. niger.

v. Schrebers Säugeth. IV. 620.

Sie ist durchaus schwarz. Die Jungen sehen bis zum fünften Monate auch so aus, s. unten Fortpflanzung.

b) Die

b) Die gefleckte Wassermaus. M. amph. maculatus.

v. Schrebers Säugeth. a. a. O.

Sie hat einen großen weißen Fleck von unregelmäßiger Gestalt mitten auf dem Rücken über den Schultern, und einen kleinen weißen Strich auf der Brust.

Ich habe sie auch mit weißem Kopfe und Schwanze gesehen.

c) Die weiße Wassermaus. M. amph. albus.

Sie ist rein weiß oder gelblichweiß.

Ich habe sie bloß im Neste gefunden.

In Canada giebt es auch eine weiße, so wie auch eine gelbrothe Varietät.

Buffon h. n. XIV. 401. XV. 146.

d) Die weißgraue Wassermaus. M. amph. canus.

Die ist weißgrau, oder vielmehr blaß silberfarben.

Ich fieng sie im Sommer 1797 bey Fischung eines Forellenbaches.

Merkwürdige Eigenschaften.

Zwey vorzügliche Eigenschaften zeichnen diese Thiere vor andern Mäusen aus: die Kunst sehr geschickt zu graben, und zu schwimmen. Sonst haben sie gleiches Naturell mit der Hausratte. Man sieht sie zusammen

spielen, sich jagen, zanken und beißen, und wenn ihnen ein Hund angehetzet wird, eben so boshaft vertheidigen, so daß auch nur gute Hunde und Katzen mit ihnen anbinden. Sie leben auch wohl so lange, wie jene, und lassen bey der Begattung einen Laut von sich hören.

In Ansehung der Zergliederung ist nichts besonders merkwürdig. Die innern Theile sind wie bey der großen und kleinen Hausmaus beschaffen. In der Leber befindet sich der großköpfige Blasenbandwurm.

Verbreitung und Aufenthalt.

Europa, das nördliche Asien *) und Amerika sind das Vaterland dieser Maus.

In der Lebensart hat sie vieles mit dem Maulwurfe und dem Fischotter gemein. Sie gräbt so geschickt wie jener, und schwimmt so geschickt wie dieser. Ja sie hat in dieser Rücksicht ganz die Natur der Ringelnatter; denn man findet sie sowohl auf den höchsten felsigen Gebirgen, als auch im flachen Felde, und in den Wäldern gräbt sie sich in den steinigsten Boden unter die Wurzeln der Bäume und Gebüsche ein. Im Felde sucht sie feste Oerter, als Feldbüsche, Raine und Steinhaufen, zu ihrer Wohnung auf. In Gärten wohnt sie unter den Baumwurzeln, und an Flüssen in den hos-

*) Am Wolgastrom halten sie wie mehrere Mäusearten ordentliche Wanderungen. Pallas nordische Beytr. I. 335.

hohen Ufern. Letzteres ist ihr liebster Aufenthalt, wenn sie genug Nahrung in der Nähe hat.

Sie gräbt sich einen ordentlichen Bau etliche Schuh tief unter der Erde und füttert ihn mit Heu, Stroh, Laub und anderm Geniste aus. Zu diesem Baue führen verschiedene Röhren, welche oft etliche hundert Schritte weit nach dem Wasser, oder einem andern Orte, wo sie ihre Nahrung findet, hinlaufen. Solche Hauptgänge kann man dadurch von ihren andern unterscheiden, daß sie, wenn man sie, da sie oft flach über der Erde hinlaufen, zutritt, sogleich nach etlichen Stunden wieder aufgegraben und gangbar gemacht sind *). In einem solchen Baue, der besonders im Herbste noch mehr erweitert wird, indem Zugänge zu Baumwurzeln von ihr verfertiget werden, hält sie sich im Winter auf, und kömmt beym hohen Schnee niemals, oder höchst selten an die freye Luft. Ihren aufgeworfenen Haufen der oft sehr groß ist, kann man dadurch von Maulwurfshaufen unterscheiden, weil man, wenn er weggescharrt wird, die Oeffnung allezeit einen Fuß tief fest verdämmet findet, welches der Maulwurf nie thut.

Nahrung.

Die Nahrungsmittel dieser Thiere sind noch mannichfaltiger, als der übrigen Mäuse ihre, da sie nicht nur

*) Ich habe bemerkt, daß ein solcher Hauptweg vier Jahre von einem solchen Thiere erhalten wurde, ob er gleich über einen Fahrweg hinlief, und alle Tage verschiedenemal zerstöhrt wurde.

nur alles genießen, was jene genießen, sondern auch als Bewohner des Wassers noch Unterhalt in diesem Elemente finden. Sie nähren sich nämlich nicht nur von Pflanzen, welche in und an dem Wasser wachsen, als Bachbungen, Rohrkolben (Typha) u. d. gl. sondern fangen auch Krebse, Wasserinsekten und allerhand Larven, die in diesem Elemente ihre Verwandlung zu vollkommenen Insekten abwarten, z. B. die Hülsen- oder Wassermottenlarven; ja sie sollen sogar kleine Fische rauben und den Fischroggen begierig verschlucken. Allein deshalb würde man sie kaum mit dem Namen schädlicher Thiere belegen können, wenn sie nicht an den Pflanzen und Bäumen in Wäldern, Wiesen und Feldern, und sonderlich in Gärten, die an Flüssen und Teichen liegen, so große Verwüstungen anrichteten. Auf den Wiesen, wo sie den Graswurzeln nachgraben, werden sie schädlicher, als die Maulwürfe. Sie durchackern den Erdboden flächer, als diese, wodurch ein Gewölbe gebildet wird, auf welchem auch die andern Gewächse, die nicht durch sie ihrer Wurzeln beraubt sind, da sie hohl stehen, verdorren müssen. Auf frischbestellten Aeckern richten sie ebenfalls Verwüstungen an, indem sie nicht nur die erweichten ausgesäeten Getraidearten und Hülsenfrüchte mit ihren Keimen abfressen, sondern auch die versetzten zarten Pflanzen des Kohls, Krautes, und der Rübenarten zu sich in ihre Laufgräben ziehen. In Wäldern verheeren sie die neuen Anpflanzungen, indem sie die Wurzeln der zarten Gewächse abnagen oder unterhöhlen, und den ausgesäeten Birken- Buchen- Eichen- Fichten- und Tannensaamen ausscharen. Den größten Nachtheil aber

brin-

bringen sie in Gärten, die an Flüssen und Teichen liegen. Hier werden sie das, was die Hamster auf dem Felde sind. Sie versammeln sich an solchen Orten zuweilen zu hunderten, und die Ufer werden voller Löcher gefunden, die alle zu den Beeten und Bäumen in den Gärten führen. Sie werden fast allen Gartengewächsen gefährlich. Da, wo sie wohlschmeckende Speisen, als junge Erbsen, Scorzenier und Sallat für sich finden, ackern sie zwar nicht, kommen aber zu gewissen Zeiten des Tages, gewöhnlich um acht Uhr früh, um zwey Uhr Nachmittags, um sieben Uhr Abends aus ihrem Hinterhalte hervor, hauen, so viel sie zu einer Mahlzeit bedürfen, mit ihren scharfen Vordergebiß ab, und schleppen es in ihre Höhle. Außerdem graben sie oder gehen in den alten Gängen der Maulwürfe nach den Kartoffeln, Petersilien- Pastinaken- und Sellerіewurzeln, höhlen die Unter- und Oberkohlrüben, besonders die Artischockenwurzeln aus, und fressen die Tulpen- Hyacinthen- und andere Zwiebelwurzeln sehr gern. Von letztern machen sie im Herbste ganze Beete leer, tragen sie zusammen auf einen Haufen in ihre Vorrathskammern, und leben davon, wenn sie der Frost hindert, die Oberfläche der Erde zu durchwühlen. Man findet in solchen Höhlen zuweilen im Frühjahr noch einen großen unversehrten Vorrath, den man wieder verpflanzen kann. Aber nicht allein unter den Gartenkräutern, sondern auch unter den Gartenbäumen richten sie dergleichen Uebel an, indem sie nicht nur in kurzer Zeit eine ganze Pflanzschule durch das Benagen der Wurzeln verderben, sondern auch die dicksten Wurzeln der Obstbäume aller Art abschälen,

durch-

durchfressen, und cirkelförmig umwühlen, daß sie verdorren müssen. Dieß thun sie nun besonders im Winter, wo selbst die Weidenbäume nicht von ihnen verschont bleiben. Den Gerbern fressen sie Stücken aus den Thierhäuten, die sie zur Zubereitung des Leders ins Wasser legen müssen. Sie werden also durch alle ihre Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen, nachtheilig *); man müßte ihnen denn dieß zum Lobe anrechnen, daß sie auf Angern zuweilen, in Gesellschaft der Raben und Krähen die Aeser wegfressen, und dadurch die Pestdünste derselben verhindern **).

Fortpflanzung.

Die beyden Geschlechter dieser Thiere leben fast Jahr aus Jahr ein unzertrennlich beysammen. Der Trieb zur Fortpflanzung schläft bey ihnen nur im Winter, regt sich im Frühjahre zu Anfang des Aprils, und dauert bis im späten Herbst ununterbrochen fort ***). Sie riechen dann

*) Daß sie Enten anfielen, habe ich niemals bemerkt; wohl thut aber dieß die Wanderratte, die auch sehr häufig Wasserratte genannt wird.

**) Ihre Freßbegierde scheut die todten Menschen nicht. Vor einigen Jahren wurde im Thüringerwalde ein verunglückter Bettler gefunden, welchen sie, da er etliche Tage todt gelegen hatte, das Fleisch von den Schenkeln und Beinen gänzlich abgefressen hatten.

***) Ich habe verschiedenemal Mütter gefangen, die im späten October noch Junge im Leibe trugen.

dann stark nach Bisam. Männchen und Weibchen locken sich wechselsweise bey hellen Abenden mit einem hoch und rauh klingenden Laut zum Genuß der Liebe. Letztere gebähren nach einer beynahe vierwöchigen Schwangerschaft fünf bis sieben blinde, dünnbehaarte Junge, welche vierzehn Tage an ihnen säugen. Die Mütter sind zärtlich genug, sie gegen die Angriffe ihrer Feinde zu vertheidigen. Sie springen nach den Hunden, Katzen und Menschen, und verwunden sie mit ihrem scharfen Gebisse, wenn sie ihnen ihre Kinder rauben wollen. Glauben sie in ihrem Neste ihre Jungen nicht sicher genug, so tragen sie dieselben im Munde weg in eine andere Höhle, und man sieht sie nicht selten also beladen über Flüsse schwimmen *). Wenn der Ackermann ein Nest auspflügt, und die Jungen nicht gleich tödtet, so verbirgt sie die treue Mutter, ehe er sichs versieht, in eine andere Höhle, oder trägt sie, wenn diese zu entfernt ist, einstweilen unter ein nahes Gebüsch.

In manchen Jahren und an manchen Orten, besonders da, wo Gemüßgärten an Flüsse gränzen, ist ihre Vermehrung so stark, daß die Ufer der Flüsse ganz durchlöchert sind, und man fast bey jedem Schritt zu gewissen Stunden ein solches Thier über das Wasser rudern sieht.

Sie

*) Neulich fieng ich mit der Hand eine solche zärtliche Mutter, die ihr Kind vielleicht aus einer bemerkten Gefahr retten wollte, da sie eben so beladen über einen Bach schwamm. Aus Liebe zu ihrem Jungen vergaß sie ganz ihre Gefahr, und ich konnte ihr dasselbe nur mit Mühe aus dem Munde bringen.

Sie verursachen daher den Gärten, die in der Nähe liegen, den größten Schaden, und nur ein sehr harter Winter kann sie an Flüssen, die flache Ufer haben, vermindern, wo man alsdann viele von ihnen erstarrt in ihren Höhlen findet.

Die Jungen sehen bis zum fünften Monate am Oberleibe, an den Füßen und am Schwanze schwarz aus, am Unterleibe aber dunkelaschgrau, und erst nach dieser Zeit nehmen sie die Farbe der Alten an. Die Mutter führt sie nach drey Wochen heraus aus ihrer Höhle und sie bleiben öffentlich auf einem Beete sitzen und fressen, unterdessen ihre Mutter ihre Speise, z. B. junge aufgesproßte Erbsen abbeißt, und nach Hause trägt. Wenn sie anfangen zu graben, welches zu eben der Zeit geschieht, werden sie den Gärten, Aeckern und Wiesen sehr schädlich.

Feinde.

Hechte, wilde Katzen, Füchse, Marder, besonders die Wiesel und mittlern Ohreulen, sind ihre Feinde. Letztere nähren sich in unsern Gegenden beynahe allein von ihnen *). In ihrem Balge hauset eine Art schuppige Milben**) und in der Leber findet man einen Blasenbandwurm.

Fang

*) Ich habe allezeit in dem Magen dieser Ohreule fünf bis sechs Gerippe von solchen Mäusen allein gefunden.

**) Pallas novae Spec. Quadr. e glir. ord., p. 82.

Fang und Vertilgung.

Nur höchst selten spürt man die Fährte dieser Thiere im Frühjahr im Schnee als ein Dreyeck, da sie fast niemals, wenn Schnee liegt, die Oberfläche berühren.

Da sie so schädliche Thiere sind, so haben die Menschen auf vielerley Mittel gedacht, ihrer großen Vermehrung Gränzen zu setzen. Diese Mittel aber sind, als gegen Amphibien gerichtet, von verschiedener Art.

In ihrem flüssigen Elemente werden sie am besten in Fischreußen gefangen. Man schließt die große Oeffnung derselben an das Ufer so an, daß sie etliche gangbare Röhren einfaßt. Den mittlern Theil der Reußen verbirgt man gänzlich unter dem Wasser, bedeckt ihn mit schweren Steinen, und das Hintertheil verstopft man sehr gut mit Gras. Um allen Entwischen vorzubeugen, kann man um dieselben auch noch einen Zaun von Weiden flechten. Hierein schlüpfen sie nun, wenn sie ins Wasser wollen, können nicht wieder zurück und ersaufen, da sie nicht lange in diesem Elemente, ohne Luft zu schöpfen, ausdauern können. Es giebt Gegenden in Thüringen (z. B. um Erfurt herum), wo in einem Jahre viele hundert auf diese Art gefangen werden.

In ihrem trockenen Elemente sind sie schwerer zu fangen, als die Maulwürfe. Doch fängt man sie zuweilen in einer Fangklammer (Maulwurfsklammer),

welche aus einem schmalen, gleich lang zusammengebogenen federartigen Stück Stahl besteht, an dessen vordern Enden zwey Klammern angebracht sind, die ihre Spitzen einwärts kehren. Dieß Eisen ist ohngefähr einen halben Schuh lang und wird in der Mitte mit einem runden Blech, das an einen Kettchen hängt, in ihre Gänge aufgestellt. Bey der geringsten Berührung dieses Blechs greifen die beyden Klammern zusammen, und zerquetschen die Maus. Allein, da sie auch diese Fallen vermeiden, wenn sie nicht eben auf einem Wege aufgestellt sind, wo sie einer ihrer Lieblingsspeisen, z. B. den Zukkererbsen nachgehen, so ist das beste Mittel sie zu vertilgen dieses, daß man ihre eigentliche Wohnung auszuspüren sucht, deren Eingang, der beständig zugedämmt ist, öffnet, sich mit einem geladenen Gewehr davor stellt, und sie, da sie keine frische Luft in derselben vertragen können, wenn sie kommen, diese Oeffnung wieder zu verschließen, welches gewöhnlich kaum etliche Minuten dauert, todtschießt.

Eben so können sie, wenn sie zu bestimmten Stunden verborgen, ihrer Nahrung nachgehen, ausgehackt, oder wenn sie es öffentlich thun, erschossen werden.

Auch ein Selbstschuß in die Gänge gestellt, thut gute Dienste. Man muß aber die Stoßscheibe fest machen, weil sie, wenn sie auf etwas unerwartetes kommen, nicht wie die Maulwürfe immer weiter vor sich hinstoßen, sondern rückwärts ziehen und ausweichen. Wenn also

eine

eine solche Scheibe locker ist, so suchen sie sie abzureißen, und neben dem Drath hinzuschlüpfen. Ist sie aber fest, so fangen sie endlich an zu ziehen und zu stoßen und erschießen sich.

Man fängt sie auch in vor ihre Löcher aufgestellten Tellerfallen.

Nutzen.

Ihr Nutzen, den sie in Deutschland leisten, schränkt sich bloß darauf ein, daß sich verschiedene Raubthiere und Raubvögel von ihnen nähren. Besonders scheinen sie die einzige Nahrung der mittlern Ohreulen (Strix Otus) zu seyn.

In Frankreich sollen die Bauern ihr übelriechendes Fleisch als Fastenspeise genießen. Die Jakuten essen sie gebraten als eine große Delikatesse. An den Obertheilen des Obflusses werden sie von den Hunden, die man zum Zuge braucht, gefressen *).

An andern Orten werden ihre dichten Bälge als Pelzwerk genutzt. So kommen sie z. B. unter den Handlungsartikeln von Rußland und besonders von Kjachta vor, woselbst ein Sack für vier bis zehn Rubel verkauft wird. Die Kalmucken fangen sie bey ihren Wanderungen häufig und machen sich Pelze von ihren Bälgen.

Schaden.

Der Schaden, den diese Thiere anrichten, ergiebt sich aus ihrem Aufenthalte und aus ihrer Nahrung.

*) Pallas Reisen. III. 19.

Zu den Vorurtheilen gehört, daß eine gebrannte und mit Haut und Haar zu Pulver gestoßene Wassermaus, die Wassersucht kurire *).

(34) 47. Die Ackermaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Kleine Feldmaus, Feldmaus, Heermaus, Heerdenmaus, Stoßmaus, kleine Stoßmaus, Reutmaus, kleine Reutmaus, Kampagnol, Erdzeißel, Erdzeist, Erdmaus, Nüllmaus, Wühlmaus, Schnorrmaus, Scharrmaus, Schörmaus, Stockmaus und Erdfahren.

Man findet zuweilen von dieser Art Junge und Einjährige, welche rothgelb oder rothbraun mit etwas grau überlaufen aussehen. Und dieß ist wahrscheinlich die sogenannte rothe Maus (Mus rutilus, Lin.), welche man in Deutschland als eine eigene Art antreffen will. Wenn aber in ökonomischen Schriften von der rothen Feldmaus die Rede ist, so ist dieß keine andere, als die Feld- oder Waldmaus (Mus sylvaticus, Lin.).

Mus arvalis. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 184. n. 16.

Mus gregarius *Lin.* syst. nat. ed. 12. I. p. 85.

Campagnol. *Buffon* hist. nat. VII. 369. T. 47. Ed. de Deuxp. II. T. 9. f. 3. Ueberf. v. Martini IV. 256. Taf. 73.

Meadow Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 205. Meine Ueberf. II. p. 522.

Gre-

*) Schwedische Abhandl. XXIX. 306.

Gregorious Rat. *Pennant* l. c. n. 410. Meine Ueberf. II. p. 523.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 296.

v. Schrebers Säugeth. IV. 680. Taf. 191.

Goeze's Fauna. II. 140.

Wolf über die Feldmäuse, insonderheit in Norderdithmarsen. Hamburg 1786.

Donndorfs zool. Beytr. I. 454. n. 16.

Kennzeichen der Art.

Mit kurzem Schwanze, etwas aus den Haaren hervorragenden Ohren, kaum merklichem Daumen an den Vorderfüßen, und rothgrauen Körper.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Maus vermehrt sich im Thüringischen Boden zuweilen ganz ungeheuer. Sie ist gerade die Wasserratte oder der Erdwolf im Kleinen, an Gestalt und Farbe. Der Körper ist bis zum Schwanze vier Zoll, und der dünne Schwanz einen Zoll drey Linien lang *). Die Höhe ist beynahe anderthalb Zoll.

Der Kopf ist eyrund, dick und die Schnauze stumpf. Die vier Schneidezähne sind gelbbraun, und die Backenzähne

*) Par. Ms.: Länge 3 Zoll; Schwanz 1 Zoll.

zähne sind, wie bey der Wasserratte, oben größere und unten kleinere Dreyecke im Zickzack. Die Augen sind klein und blauschwarz, liegen näher nach dem Mund als Ohren zu, und nahe zusammen; die Ohren kurz, etwas hervorragend, und inwendig behaart; der Hals kurz; der Leib dick und rund; die Vorderfüße sehr kurz mit vier Zehen, und einem kleinen Daumen, der einen spitzigern Nagel hat, als bey den übrigen Mäusen; die längern Hinterfüße fünfzehig.

Von der Schnauze bis zum Schwanzende ist der Oberleib rothgrau, weil der Balg aus gelblichen und schwarzen Haaren besteht; der Unterleib weißgelb, an der Seite ins bräunliche fallend; die Füße gelblichweiß und die Zehen aschgrau.

Das Weibchen ist unmerklich vom Männchen unterschieden und hat vier Säugwarzen zwischen den Vorder- und vier zwischen den Hinterfüßen.

Ich habe auch eine weiße Varietät von dieser Maus gefunden. (M. arv. albus).

Es ist die schnellste, im Graben die geschickteste Maus, auch ein guter Schwimmer; doch schwimmt sie nur, wenn sie dazu gezwungen ist. Im Sitzen ballt sie sich zusammen, und steckt den Kopf so tief in die Brust, daß man keinen Hals sieht.

Ihre Stimme ist zur Zeit der Begattung und in der Noth ein helles Quickfen; ihr Alter aber unbekannt.

Sie stirbt mehrentheils keines natürlichen Todes.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Heymath dieser Thiere ist ganz Europa und das nördliche Asien.

Sie leben allenthalben in Wäldern und Feldern; in Wäldern mehr in Laub- als Schwarzhölzern, und in Feldern mehr auf den Aeckern als Wiesen. In Feldern verändern sie ihren Wohnplatz nach den Jahrszeiten. Im Herbste ziehen sie den Schnittern nach, und halten sich, so lange die Erndte der Winterfrucht dauert, im Winterfelde auf, und wandern, wenn diese vorbey ist, nach der Sommerfrucht, und besonders nach den Haferäckern. Wenn hier der Wind viel Hafer ausgeschlagen hat, wovon sie im Winter zehren können, so bleiben sie in diesem Felde und schlagen ihre Winterwohnung daselbst auf; wo nicht, so ziehen sie in großen Märschen über und unter der Erde nach der Wintersaat, und graben sich da ihre Winterwohnung. Hier bleiben sie theils bis zum folgenden Herbst, theils zerstreuen sie sich im ganzen Felde herum. Sehr gern wohnen sie in den Feldrainen oder unter den Feldbüschen. Zwey Röhren, ein Eingang und ein Ausgang, führen gewöhnlich zu ihrem Bau; Schlafgemach, Vorrathskammer und Abtritt haben ihre besondern Abtheilungen in demselben, und ersteres füttern sie mit in der Nähe wachsenden, klar zermalmten Gewächsen aus, damit sie weich und warm liegen. Eben so ist das Wochenbett des Weibchens beschaffen. In Wäldern graben sie sich unter den Bäumen, Büschen und Steinen ein. Sie machen ebenfalls, doch nicht so häufig, wie die Erdwölfe, flache Gewölbe über

der Erde, wenn sie ihrer Nahrung nachgehen, oder von einem Orte zum andern wandern.

Nahrung.

Bis zur Reife des Getraides besteht die Nahrung dieser Mäuse vom Frühjahr an aus zarten Kräuter- und Graskeimen, und deren Wurzeln in Feldern, Wäldern, Wiesen und Gärten. Alsdann aber laufen sie im Felde von allen Orten zusammen und begeben sich auf die reifenden Aecker, beißen die Halmen ab, und tragen die Aehren in ihre Höhlen. Hierauf folgen sie in der Erndte den Schnittern vom Winter- zum Sommerfelde auf dem Fuße nach, und nähren sich von den ausgefallenen Körnern und verlohrnen Aehren. Allein auch die Krautfelder lassen sie nicht unbesucht, und benagen alle Früchte derselben, sie mögen über oder unter der Erde wachsen. Den größten Schaden aber richten sie auf der Winterfaat an, wohin sie sich begeben, wenn sie die eingeerndteten Felder ausgezehrt haben. Wenn auf einen warmen trockenen Sommer ein kalter schneereicher Winter folgt, so findet man im Frühjahr die Aecker des Winterfeldes von Kreuzgängen unter dem Schnee ganz durchschnitten, und die grüne Saat abgefressen, wodurch bey schlechter Frühjahrswitterung, wenn die Saat nicht schnell nachwachsen kann, Mißwachse entstehen. Wenn sie in Stoppeln bleiben, so legen sie sich ein Magazin von allerhand trockenen Nahrungsmitteln, besonders von Hafer und Queckenwurzeln an *). In Laubhölzern nähren sie sich

*) In queckenreichen Gegenden habe ich daher oft noch im Frühjahr Behältnisse von vier Zoll im Durchmesser und drey

sich von Kernen und Saamen der Bäume und Stauden, und tragen im Winter abgefallene Hagebutten, Wachholderbeeren und vielerley Sämereyen und Kerne zusammen in ihr Winterquartier. Auf den Wiesen suchen sie die besten Gras- und Kräuterarten, besonders Klee aus. Wenn es im Winter wenig schneyet, viel regnet, und zuweilen stark friert, die Wintersaat kurz ist, und also die Nahrung fehlt, so wird der Landmann gewöhnlich von diesen Raubthieren befreyet, und sie werden in Menge verhungert und erfroren im Frühjahr gefunden.

Fortpflanzung.

Männchen und Weibchen schlafen Sommer und Winter mehrentheils, so wie ich es bemerkt habe, auf einem gemeinschaftlichen, aus zerbissenem Gras, Moos, oder Stroh bestehenden Bette, und ihre Begattung richtet sich daher um desto mehr nach der bald oder spät eintretenden warmen Frühlingswitterung. Im April giebt es schon Junge. In Wiesen, besonders auf solchen, die so liegen, daß sie gewässert werden können, machen sie mitten ins Gras große ballförmige Nester von sehr klar zerbissenem Gras, und haben da noch zu Ende des Septembers Junge. Gewöhnlich stehen zwey solcher Nester nahe beysammen, wovon das eine von vorigem Wochenbette ist. Man findet diese Nester in großer Menge auf den Wiesen.

Das Weibchen trägt drey Wochen, und gebiert fast alle fünf Wochen, bis zum späten Herbst, da die

drey Fuß lang gefunden, die dicht mit Queckenwurzeln voll gestopft waren.

Kälte die Vermehrung stöhrt, fünf bis acht *), auch wohl zwölf Junge, welche gleich Anfangs die Farbe der Eltern haben, außer daß ihr Schwanz schwarzblau ist.

Die Mutter muß sie treulich warten und pflegen, da man diese Thiere in trockenen Sommern in so außerordentlicher Menge antrifft, daß sie eine wahre Landplage werden. Denn es giebt Jahre, in welchen der Wanderer kaum etliche Schritte thun kann, wo ihm nicht einige dieser Feldmäuse über den Weg laufen. Nur nasse und kalte Sommer können dieser großen Vermehrung Gränzen setzen, weil die Nässe und Kälte nicht nur die Begattung der Alten stöhrt, sondern auch dadurch sehr viel Junge erfrieren und ersaufen. Eben dieß bewirken regenhafte Winter.

Feinde.

Feinde sind die meisten Raubthiere und viele Raubvögel, Hunde, Füchse, Katzen, Marder, Iltisse, Wieseln, Hamster, Igel, Dachse, Bussarte, Eulen und andere Raubvögel, Raben, Krähen, Störche, Neuntödter, Aelstern und Ringelnattern und andere Schlangen, auch Hechte und andere Raubfische, wenn sie ins Wasser gerathen. Diesen Thieren sind sie besonders zur Winternahrung vom Schöpfer angewiesen.

Die Schweine, welche im Herbst auf die Haferäcker getrieben werden, wittern ihre Nester, wo sie ihre Früchte

*) Gewöhnlich acht Junge.

Früchte für den Winter aufbewahrt haben, wühlen sie auf und fressen nicht nur das Getraide, sondern auch die Mäuse selbst, wenn sie sie antreffen. Im Balge wohnen gelbe Erdmilben und in den Eingeweiden Bandwürmer *).

Vertilgung **).

Auf dem Schnee sieht man ihre kleine Fährte zwey und zwey Füße zusammen in einem Zickzack fortlaufen. Man kann sie durch abgeschälte Wall- und Haselnüsse, durch Erbsen und andere Getraidekörner, die in Schierlingskraut abgekocht werden, indem man in jedes Loch etwas von dieser vergifteten Speise steckt, vertilgen; besser aber, wenn man ein Maas Gerstenmehl mit einem Pfund weißer Nießwurz, und acht Loth Läusekraut, welches gepülvert und durch ein Haarsieb geschlagen ist, vermischt, nimmt, und dieses mit einem halben Pfund Honig und einem halben Pfund Milch zu einem Teig verwandelt; hiervon Kügelchen in der Größe einer Erbse macht, und diese in die Mäuselöcher oder auf dem Felde verlohren hinwirft. Sie fressen diese Speise mit Begierde, werden davon blind und sterben ***).

Ein erprobtes Mittel gegen alle Arten von Mäusen ist noch dieses: Man kocht Eichenholzasche mit Wasser zu

*) Taenia omphalodes. Naturforscher. XVII. 34. Taf. 4. f. 1. a—d.

**) Hübsch ökonomische Vorschläge die schädlichen Ackermäuse zu vertilgen. Köln 1768.

***) Dieses Recept ist probat, und kostet ohngefähr 8 Gr.

zu einer guten Lauge; wenn sich die Asche zu Boden gesetzt hat, so schüttet man die Lauge ab, und weicht darein Roggen, Waizen oder Gerste 24 Stunden lang. Wo sich nun in den Feldern Mäuse aufhalten, streut man die so gebeizte Frucht in die Löcher. Auf diese Art präparirte Walnußkerne dienen gleichfalls auf den Fruchtböden gegen die Hausratten und in Gärten gegen die Wassermäuse.

Ein anderes Verminderungsmittel ist dieses, daß man auf einen Acker, wo sie zu häufig sind, beym ersten Schnee Baumäste hinlegt, oder Stangen mit Queerstöcken hinstellt, auf welche sich die Krähen und Raben setzen, und sie, wenn sie aus ihren Löchern schlüpfen, auffangen.

In Gärten soll sie der Geruch von einigen Knoblauchspflanzen, der ihnen zuwider ist, verscheuchen. Man pflanzt daher einige dieser Gewächse dahin, wo man sie wegwünscht.

Nutzen.

Ihr bekannter Naturnutzen besteht darin, daß sie ihren Feinden zur Nahrung dienen.

Schaden.

Dieser ist zu manchen Zeiten unbeschreiblich groß, wie man aus ihrer Nahrung und Fortpflanzung sieht. Ist er aufs höchste gestiegen, so vertilgt sie gewöhnlich die nasse kalte Witterung im Frühjahr und Winter. Sie

fangen

fangen auch an räudig zu werden, fangen an zu kränkeln und die gesunden verzehren dann die kranken in Menge. So verlieren sie sich nach und nach. Man sagt auch, daß sie wandern.

Die dritte Familie.

Hamstermäuse mit Backentaschen.

Mures buccati.

Kennzeichen.

Die beyden Vorderzähne der obern Kinnlade sind breit. Sie haben einen kurzen Körper, kurze Füße, einen sehr kurzen Schwanz, dicken, doch zugespitzten Kopf; innerhalb der Backen geräumige Taschen, worin sie ihre Nahrung in ihre Baue, die sie unter der Erde graben, eintragen; sie erstarren bey strenger Kälte. Wir kennen nur eine Art.

(35) 48. Der gemeine Hamster.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Hamster, Amster, Hamstermaus, große Feldmaus, Strasburgisches und deutsches Murmelthier, Kornhamster, Kornferkel, Grentsch, Grutschel, Krietsch und Erdwolf.

Mus

Mus Cricetus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 137. n. 9.

Hamster. *Buffon.* hist. nat. XIII. 117. T. 14. Ed. de Deuxp. VI. T. 5. f. 3. Ueberf. von Otto. XIV. 5. m. c. Fig.

Hamster Rat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 206. T. 84. Meine Ueberf. II. p. 523.

Sulzers Verfuch einer Naturgeschichte des Hamsters. Gotha 1773.

v. Schrebers Säugeth. IV. 695. Taf. 198. A.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 10.

Goeze's Fauna II. 177.

Donndorfs zool. Beytr. I. 463.

Kenzeichen der Art.

Mit zugerundeten Ohren, kurzen Schwanze, und zwey Borstenflecken an beyden Seiten des Rückens.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß Thier, wird in Thüringen in großer Menge angetroffen, und thut in Gärten und Feldern großen Schaden. Sein unproportionirter Körperbau verdirbt das gute Ansehen, welches ihm sein feingezeichneter Balg geben würde.

Er hat einen dicken, kurzen, stumpfen Kopf, kurzen Hals, langgestreckten dicken Körper, einen kurzen, halb nackten, nur mit einzelnen langen Haaren besetzten Schwanz, und niedrige stämmige Füße. Die Größe eines völlig erwachsenen Hamsters beträgt einen Schuh zwey Zoll, wovon der Schwanz ein und drey Viertel Zoll lang ist *), und seine Höhe ist drey und einen halben Zoll. Die Oberlippe ist sehr gespalten, wodurch der Mund stets geöffnet ist, und die vier hervorstehende Schneidezähne sichtbar werden. Die untern zwey sind länger, schwächer, und mehr gebogen als die obern. Auf jeder Seite befinden sich oben und unten drey Backenzähne. Die Kinnladen sind mit einer weiten Haut überzogen, die inwendig zu beyden Seiten, die ihnen so nützliche und bequeme Backenblasen (Backentaschen) bildet. Es sind dieß zwey häutige, länglich eyrunde Säkke, die meist drey Zoll lang, und anderthalb Zoll breit sind, deren äußere Fläche glänzend glatt, und deren innere mit schleimigen Drüschen besetzt ist, welche die eingepreßten harten und spitzigen Körner anfeuchten, damit sie nicht in die Haut einstechen, oder dieselbe ritzen mögen. Zu beyden Seiten des Mundes stehen Barthaare davon die kleinern weiß, und die größern schwarz sind. Dergleichen ungleiche schwarze Borsten stehen auch drey über jedem Auge, und eine auf jedem Backen. Die Augen sind klein, rund, hervorstehend und schwarzbraun, in der Mitte zwischen der Nase und den Ohren; die Ohren selbst sind ziemlich groß, zugerundet, dünn und fast nak-

*) Par. Ms.: Körper 10 bis 12 Zoll; Schwanz fast 2 Zoll.

nackend. Die anderthalb Zoll langen Vorderfüße haben vier Zehen mit einem tief stehenden kaum bemerkbaren Daumen, der eine stumpfe Kralle hat; die etwas höhern Hinterfüße aber haben fünf Zehen, woran die beyden äußern tief und gegen einander über stehen; die Fußsohlen sind mit vielen Schwülen (Wülsten) besetzt, und die Nägel sind lang, scharf und fleischfarben. Der Nabel ist kahl, und hat in der Mitte eine haarige Röhre, worin eine unschlittartige Feuchtigkeit sich befindet. Am Ende des Rückens hinter der Gegend der Nieren läuft an jeder Seite ein langer haarloser, nur mit kurzen, schmutzig braunen Borsten besetzter Flecken mit dem Rückgrade parallel.

Die gewöhnlichen Hamster haben einen bunten Pelz, der einen dunkel aschgrauen Grund hat, und mit weißen, gelben, rothbraunen und schwarzen Haaren besetzt ist. Der Mund ist nämlich weiß eingefaßt; von der Mitte des Kopfes bis zu demjenigen Theile des Rükkens, der den Hinterschenkeln gleich ist, hat er eine hasengraue Farbe, indem die weichen, kürzern, lichtgrauen Haare mit längern einzelnen schwarzen Stachelhaaren vermischt sind; die Augen und Ohren sind mit fuchsrothen Haaren umgeben, und die inwendigen Ohren, die Seiten, der äußere Theil des Rückens, die auswendigen Schenkel und der Schwanz haben eben diese Farbe; die Kehle, Füße und Schwanzspitze sind weiß, unter dem äußern Ohrwinkel steht ein großer weißer Punkt, und die Seiten sind mit drey weißen oder lichtgelben länglich runden Flecken besetzt: die Brust, der Bauch und die innern

nern Schenkel sind schön schwarz. Die Haare stehen dicht und fest und machen einen guten Balg.

Das Weibchen hat acht Säugwarzen, vier an der Brust und vier am Bauche, ist immer etwas kleiner, und die hellen Farben des Balges sind immer bläßer.

Farbenvarietäten:

1) Der schwarze Hamster. M. C. niger.

Sulzer a. a. O. Titelblatt.

v. Schreber a. a. O. Taf. 198. B.

Lepechins Tagebuch seiner Reise durch das Russische Reich. I. 195. Taf. 15.

Er ist ganz schwarz, zuweilen an Schnauze und Füßen weiß.

Man trifft ihn einzeln im Gothaischen an; häufig aber im Kasanischen.

2) Der geschäckte Hamster. M. C. variegatus.

Lepechin a. a. O.

Er ist entweder schwarz, mit großen weißen Flecken auf dem Rücken, oder weiß mit schwarzen Flecken.

Auch in Thüringen, so wie im Uralischen Gebiete.

3) Der weiße Hamster. M. C. albus.

Lepechin a. a. O.

Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik. III. 4. S. 214.

Ganz weiß oder gelblichweiß, mit rothem Augensterne.

In Thüringen und im Uralischen.

4) Der gelbe Hamster. M. C. fulvus.

Er ist blaßgelb oder erbsgelb, mit oder ohne rothen Augen.

Auch, wiewohl selten, in Thüringen.

Zergliederung.

1) Von den Backentaschen, welche aus einer zähen, pergamentartigen Haut bestehen und hinten, wo sie zusammenstoßen mit einem besondern Muskel zur Verhinderung des Vorfallens befestigt sind, ist schon oben geredet worden.

2) Die Lunge besteht aus vier Lappen und ist sehr weiß.

3) Die Leber hat drey über einander liegende Lappen und die Gallenblase liegt zwischen dem untersten und mittelsten Lappen.

4) Es scheint, wie wenn der Hamster zwey Mägen hätte, der eine ist weiß und rundlich, und der zweyte längliche hängt daran. Beyde sind mit einen weißen mehlartigen Brey angefüllt.

5) Der

5) Der Eyerstock ist von der Größe einer Haselnuß und wie Fischroggen gekörnet. Der Uterus ist paternosterförmig.

6) In den Eingeweiden findet man den strohhalmigen Bandwurm. Goeze a. a. O.

Merkwürdige Eigenschaften.

Beyde Geschlechter lassen einen kreischenden durchdringenden Ton bey ihren Kämpfen und schmerzhaften Empfindungen, ein dumpfiges Pfauchen aber bey Gefahr und Verfolgung im Zorne von sich hören.

Die herrschende Leidenschaft des Hamsters ist der Zorn. Er läßt ihm bey Zusammenkünften mit seines Gleichen, nicht nur so weit die Oberhand, daß bey dem jederzeit entstehenden Zweykampf der Tod des einen Kämpfers, wenn er nicht die Flucht ergreift, allzeit erfolgt, und die Speise seines Ueberwinders wird, sondern er wird auch sogar ein grausamer Peiniger, ja oft der Mörder seiner Gattin. Gegen alles, was ihm nicht ausweicht, oder ihn ergreift, setzt er sich zur Gegenwehr, und große und kleine Feldmäuse, die sich erfrechen, mit ihm anzubinden, und nicht plötzlich die Flucht ergreifen werden ihm immer zur Beute. Vor Hunden und Pferden erschrickt er nicht. Wird ihm ein Hund angehetzt, so wetzt er durch Aneinanderreiben die Zähne, bläßt seine weiten Backen auf, murret zornig, setzt sich auf die Hinterfüße, und empfängt so mit grimmigen Beißen seinen Gegner, der oft furchtsam und schwach genug ist, zu

weichen, und ihm den Sieg zu lassen. Auch das Pferd ist ihm nicht zu groß, es anzufallen, wenn ihn der Reuter gereizt hat. Nicht weniger kühn wiedersetzt er sich auch den Menschen, die ihm mit dem Stocke angreifen, oder mit dem Spaten ausgraben wollen.

Er soll über acht Jahre alt werden.

Verbreitung und Aufenthalt.

Das Vaterland dieses Thiers sind mehrere Gegenden von Deutschland, Polen, die Ukraine, alle südlichen und gemäßigten Theile von Rußland, Sibirien, sogar die Gegend um den Jerusey, aber nicht weiter gegen Osten.

Da des Hamsters vorzügliche Nahrungsmittel Körner sind, und er nur unterirdische Wohnungen zu seinem Aufenthalte wählt, so findet man ihn an festen, steinigen, thonigen und sandigen Orten, in Wiesen, Wäldern, Gebirgen und Sümpfen, und eben deshalb in vielen Gegenden Deutschlands fast gar nicht, da hingegen er in andern z. B. einigen thüringischen Gegenden, wo guter, fruchtbarer, aus Thon und Sand gemischter, nicht zu leichter und nicht zu fester Boden ist, sehr häufig angetroffen wird.

Seine Wohnung ist eine Grube (Bau) unter der Erde, in einer Tiefe von drey bis vier, und im Winter vom fünf bis zehn Schuhen angelegt. Wenigstens zwey Oeffnungen (Röhren) führen zu derselben, wovon die

eine

eine schreg, und die andere senkrecht hinunter geht. Jene wird der Auslauf genannt, weil er von hieraus gewöhnlich ins Freye geht, und durch dieselbe scharrt er mit seinen Pfoten oder trägt in seinen Backentaschen die Erde und andere Unreinigkeiten weg, welches ein großer aufgeworfener Haufe zu erkennen giebt; diese aber heißt das Falloch, ist immer nur ein oder zwey Fuß von jener entfernt, und dient dazu, daß, wenn er mit Beute beladen nach Hause kehrt, von Menschen oder Hunden verfolgt wird, oder sonst von weiten etwas für sich unvortheilhaftes bemerkt, er sich hineinstürzen kann. Dieß ist auch die Oeffnung, durch welche er in der Erndtezeit, oder sonst, wenn das Feld laut wird, den Kopf herausstekt, und sich vorhero, ehe er seiner Nahrung nachgehet, umsiehet, ob es um ihn herum sicher ist, um alsdann durch die andere Oeffnung ruhig seinem Geschäfte nachgehen zu können. Zwischen diesen beyden Offnungen befinden sich verschiedene Kammern von der Größe einer Rindsblase und drüber, die alle schön ausgeglättet sind, und worunter eine zur eigentlichen Wohnung, eine andere für den Unrath, und die übrigen größern zu Vorrathskammern erbauet sind. Der Vorrathskammern sind drey, vier und fünf, je nachdem die Grube ein alter oder junger Hamster verfertigt hat. Beyde Geschlechter leben außer der Zeit der Begattung getrennt, und man findet auch einen Unterschied in ihren Wohnungen. Das Weibchen hat nämlich gewöhnlich in dem Baue, in welchem es niederkommen will, neben seiner Nestkammer, die einen Fuß und drüber im Durchschnitt hat, und mit weichen Stroh- und Grashalmen ausge-

füttert ist, nicht mehr als eine Nebenkammer, weil es zur Zeit seiner Schwangerschaft und Niederkunft keine Früchte einträgt, und die Familie, wenn die Jungen groß sind, auseinander geht, diese Wohnung alsdann entweder leer bleibt, oder von einem Jungen eingenommen, oder von der Mutter für den Winter behalten wird, und es dann noch Zeit genug ist, mehrere Vorrathskammern anzulegen. Da das Hamsterweibchen eine Mutter vieler Kinder wird, so hat es auch die Natur gelehrt, zu seiner Wohnung mehr Fallöcher zu machen, nicht sowohl um im Gefahr den Jungen desto eher zu Hülfe eilen zu können, als vielmehr sich selbst mit diesen Jungen ein leichtes Rettungsmittel vor den Feinden durch die Flucht zu verschaffen. In Gärten sucht der Hamster seine Wohnung gern tief unter den Wurzeln der Bäume, und in Weinbergen unter alten Weinstöcken und Mauern aufzuschlagen.

Die Erstarrung dieser Thiere in diesen Wohnungen, die sich beym ersten Schnee ereignet, und bis zur Entblösung der Erde in den wärmern Tagen des Märzes dauert, ist von der Erstarrung der andern Winterschläfer verschieden. Da die letztern die bloße Kälte dazu reizet, ihren langen Schlaf zu beginnen, so bedürfen die erstern außer dem gehörigen Grad von Kälte auch noch die gänzliche Entfernung der frischen Luft. Denn man hat die Versuche gemacht, hat Hamster in Kasten, die mit Stroh ausgefüttert waren, der größten Kälte ausgesetzt, und sie sind nicht eher eingeschlafen, bis man diese Kasten in die Erde eingegraben, und vor dem Zufluß der freyen

Luft

Luft verwahrt hat; und eben so sind sie in der größten Kälte nach und nach aufgewacht, so bald sie nur von der Luft berührt wurden. Licht und Finsterniß tragen hierzu nichts bey. Was die Lage eines betäubten Hamsters betrifft, so liegt er auf der Seite, hat die Augen verschlossen, den Kopf, welchen die Vorderfüße umfassen, unter den Bauch gezogen, und die Hinterfüße vor dem Munde. Er ist in diesem Zustande kalt, und man bemerkt äußerlich weder Athemholen, noch die sehr langsame Bewegung seines Herzens. Bey seinem Erwachen giebt es allerhand sehr artige Auftritte. Anfangs entwickelt sich die zusammen gepreßte Lage seiner Glieder, und er dehnt sie aus. Bald darauf spürt man deutlich sein Athemholen, er öffnet den Mund, gähnt, und giebt solche verdrüßliche, knurrende Töne von sich, wie wenn es ihm gar nicht angenehm sey, daß er erwacht wäre. Hierauf öffnet er blinzelnd die Augen, und versucht sich zu setzen, welches ihm aber erst nach einigen Versuchen, bey welchen er taumelnd bald auf die rechte, bald auf die linke Seite fällt, gelingt. Nun wagt er es auch, sich aufzurichten, und auf seine vier Beine hinzustellen; es gelingt ihm, und er dehnt sich, und holt sauer, sauer Athem. Endlich fängt er auch an erstlich herum zu wandern, dann herum zu laufen, und zuletzt sich zu putzen, zu streichen und seine Nahrung zu suchen, und ist so, in etlichen Stunden und weniger, ganz der böse und thätige Hamster wieder, der er vorher war, ehe er einschlief.

Nahrung.

Die Hamster verachten keine Kost. Sie fressen Fleisch, Gras, Wurzeln, Saamen, Getraide, schalige

und fleischige Baumfrüchte; besonders nähren sie sich im Frühjahr von Wurzeln, Kräutern, grüner und ausgesäeter Saat, und im Herbste von allerley Arten von Körnern. Sie gehen am Tage und in der Nacht, vorzüglich in der Abend- und Morgendämmerung ihrer Nahrung nach. Im Herbste pflegen sie eine ansehnliche Menge Nahrungsmittel in ihre Vorrathskammer einzutragen. Dieß geschieht in ihren Backentaschen, welche sie durch die Vorderpfoten so gedrängt voll stopfen, daß man oft Alten begegnet, die zwey Händevoll Körner in diesen Säcken tragen. Um sie auszuleeren, drücken sie mit den Vorderfüßen an das hintere Ende jeder Blase, und streichen die Früchte so vorwärts heraus. In diesem Zustande, da sie die Backen voll haben, können sie weder geschwind laufen, noch ihr Gebiß brauchen, und man kann sie jetzt, wenn sie nicht Zeit gewinnen, ihre Backen leer zu machen, ohne Schaden mit den Händen fangen. Ist man aber nicht hurtig genug, so suchen sie dieß Hinderniß wegzuräumen, setzen sich auf die Hinterfüße, fletschen die Zähne, zischen und murren, springen nach Gesicht und Händen und wehren sich tapfer durch ihr scharfes Gebiß. Der Vorrath, den sie in ihre Winterkammer einsammeln, ist verschieden, je nachdem die Früchte in der Gegend, die sie bewohnen, verschieden sind. Bewohnen sie Gärten, so tragen sie Stücken Wurzeln, Mohnkapseln, Bohnen, Erbsen, Obst ꝛc. ein; bewohnen sie aber Felder, so sammlen sie sich einen Vorrath von Roggen, Waizen, Gersten, Wicken, Linsen, Leinknoten, Hafer, Kartoffeln ꝛc. ein. Die Liebe zur Ordnung und Reinlichkeit, die man diesen Thieren in so hohem Grade zu-

ge-

geschrieben hat, ist nicht so groß, besonders bey den jungen. Dieß lehrt die Erfahrung bey den Gartenhamstern, die alles, wie sie es antreffen, gemengt nach Hause in ihre Kammern tragen. Trifft man bey alten Feldhamstern zuweilen diese Ordnung an, daß alle Getraidearten in abgesonderten Zellen liegen, so kömmt dieß daher, weil sie von den verschiedenen Getraidefeldern, so wie sie reif und von den Menschen eingeerndtet werden, nach und nach ihren Vorrath eintragen. Sie fügen denselben dicht zusammen, pressen auch die weich gewordenen Mohnköpfe dicht in einander, und beißen die Keime, die etwa an den Getraidearten ausprossen möchten, ab. Diese eingesammleten Früchte gehen sie nicht leicht eher an, als bis ihnen das weite Feld ihr Futter versagt, genießen sie dann so lange, bis sie ihr fester Winterschlaf überfällt, und das, was übrig bleibt, zehren sie bey ihrem Erwachen vollends auf.

Wenn sie ihre Speisen genießen wollen, so setzen sie sich mehrentheils auf die Hinterfüße, bringen sie mit den Vorderfüßen zum Munde, wie die Eichhörnchen, und hülsen die Körner vorhero künstlich aus.

Sie trinken wenig, sind aber oft, wenn der Durst so heftig wird, so unekel, sich selbst auszusaufen.

Der seelige Goeze (s. Fauna a. a. O. S. 199.) sagt, daß sie auch die Speisen aus dem Thierreiche nicht verschmähten, und Ratten, Mäuse, junge Hasen, Kaninchen, Rebhühner, Wachteln, Lerchen u. s. w. verzehrten. Man trifft auch in ihren Magen die Ueberbleibsel

von Insecten von Roßkäfern, Goldkäfern, Maikäfern, auch Stücken von Fröschen an.

In der Gefangenschaft frißt der Hamster rohes und gekochtes Fleisch, Brod ꝛc. Wenn man eine Hausratte zu ihm thut, so hat er sie bald unter sich, beißt sie todt und verzehrt sie bis aufs Fell. Eben so macht er es mit andern kleinen Thieren und Vögeln, die man ihm vorwirft.

Fortpflanzung.

Die Hamster begatten sich öfters des Jahrs zweymal, und zwar das erstemal zu Anfang des Frühlings am Ende des Märzes, und den ganzen April durch, und zum zweytenmal zu Ende des Junius. Da bisher Männchen (Ramler) und Weibchen (Betze) von einander abgesondert gelebt haben, so besuchen sie sich nun wechselsweise, lieben sich zärtlich, ja vertheidigen sich einander, da sie außer dieser Zeit grausam genug sind, einander zu mißhandeln, ja gar zu tödten. Sie begegnen sich entweder nur vor ihren Höhlen, pflegen der Liebe, und trennen sich wiederum, oder halten sich auch einige Tage zusammen in einer Höhle auf. Das Männchen besucht oft zwey Weibchen oder zwey Weibchen besuchen ein Männchen, allein zwey Männchen dürfen nicht bey einem Weibchen zusammen treffen, denn geschieht dieß, so entstehen blutige Gefechte, die sich nicht anders, als mit der Flucht, oder dem Tode des schwächern Theils endigen können.

So:

Sobald sich das Weibchen schwanger fühlt, so geschieht die Trennung wiederum, und zwar mehrentheils im Zank, und so oft sich nachher beyde Gatten einander begegnen, so betragen sie sich eben so feindselig, als wenn sie sich immer fremd und feind gewesen wären. Die Zeit der Schwangerschaft dauert fast fünf Wochen, und ein altes Weibchen gebiert sechs bis zwanzig Junge, und ein Junges drey bis sechs, die nackend, blind, und mit Zähnen zur Welt kommen. Die Mutter säugt und ernährt sie nicht länger als drey Wochen, und liebt sie nicht so zärtlich, wie andere Mütter, denn wenn ihre Jungen in Gefahr gerathen, so stellt sie sich nicht so verwegen, wie sonst, zur Wehre, sondern sucht sich, so bald ihr der Feind zu stark scheint, entweder durch die Flucht zu retten, oder vergräbt sich in ihre Höhle, verstopft den Eingang, so wie sie sich weiter verkriecht, und verläßt auf diese Art stiefmütterlich ihre Kinder *).

Nach den ersten vierzehn Tagen fangen die Jungen schon um den schiefen Eingang ihrer mütterlichen Wohnung an so viel Löcher, als ihrer sind, zu graben, nach drey Wochen aber werden sie völlig ausgestoßen, müssen allein für ihren Unterhalt sorgen, und sich eigne Wohnungen bauen. Die Kinder aus dem ersten Wochenbette begatten sich noch in demselben Jahre, und bringen während der Erndte ihre Jungen. Wegen dieser gro-

ßen

*) Dieß ist ein Zug in der Geschichte dieses Thieres, der uns in Verbindung mit der Vermehrung, dem Nutzen und Schaden desselben zu manchen Betrachtungen über die Weisheit des Schöpfers der Natur Anlaß geben kann.

ßen und schnellen Vermehrung darf man sich nicht wundern, wenn zuweilen im Gothaischen Lande, dessen dritter Theil doch kaum von diesen schädlichen Thieren heimgesucht wird, in einem Jahre etliche dreyßig tausend sind gefangen, und dieser Abgang das folgende Jahr doch kaum ist gespürt worden.

Die Jungen lassen sich zähmen, wiewohl schwer, weil sie ihre unbändige Leidenschaft, der Zorn, niemals verläßt. Auch schaden sie gezähmt, indem sie alles benagen, was ihnen vorkommt. Sonst machen sie lächerliche Gebärden, sitzen immer auf den Hinterfüßen, puzzen und kämmen sich u. d. gl.

In Gegenden, wo sie unbekannt sind, werden sie, wie die Murmelthiere, für Geld gezeigt.

Feinde.

Sie sind den Verfolgungen der Wiesel, Marder, Iltisse, Füchse, Katzen, Eulen Buffarte und Weyhen ausgesetzt, und eine Art großer Milben zerbeißt sie zuweilen so sehr, daß sie räudig werden und sterben. Auch wohnen Bandwürmer in ihnen.

Fang und Vertilgung.

Die gewöhnliche und nützliche Art sie auszurotten, ist das Ausgraben, welches im Herbste von den sogenannten Hamstergräbern, die eine Zeitlang ihre Nahrung davon haben, geschieht. Der Hamster versucht dabey verschiedene Kunstgriffe seinem Verfolger zu entgehen.

So:

Sobald der Gräber dem Wohnzimmer nahe kommt, so dreht er sich anfangs bloß in demselben herum, und wühlt alle Zugänge zu, und da ist der schicklichste Zeitpunkt ihn todt zu schlagen; läßt er ihm aber Zeit und öffnet die Grube, wo er sich aufhält, sicher, so kömmt er unversehens hervor, springt ihm nach Gesicht und Händen und wo er einbeißt, hängt er sich so fest ein, daß er sich lieber todtschlagen als fahren läßt, oder gräbt sich in einer Zeit von 5 Minuten 3 bis 4 Ellen weiter in der Erde von seiner eigentlichen Wohnung, und verstopft den Gang so gut, daß er schwer zu entdecken ist. Die Hamstergräber bekommen ihre Mühe reichlich belohnt, da sie nicht nur oft einen Vorrath gutes und schönes Getraide von einen Centner und drüber finden, sondern auch den Balg, und wenn sie wollen, auch das Fleisch nützen können *).

Man hat noch verschiedene Methoden dieses schädliche Thier zu vertilgen.

Vor der Erndte, ehe sie ihre Nahrung häufig finden, kann man sie leicht in Töpfen fangen, die man etliche Schritte von ihrem Baue entfernt in die Erde gräbt, auf welche eine schwere steinerne Platte eingepaßt ist. Man nimmt ein Holz, wie eine Gabel gestaltet, und stellt den Stein mit dieser Gabel, an deren spitziges Ende man ein Stückchen Brod gesteckt hat, so auf, wie man Mäusefallen aufzustellen pflegt, daß nämlich

*) Die Obrigkeit hat nöthig auf die Hamstergräber ein wachsames Auge zu haben, indem sie oft nur das Getraide wegnehmen und die schädlichen Hamster laufen lassen, um das folgende Jahr wieder erndten zu können, wo sie nicht gesäet haben.

lich bey Berührung des Brods die Platte den Topf und den Hamster verschließt. Diesen zu locken, kann man von seinen Röhren bis zum Topf etliche Stückchen Brod streuen. Diese Fallen fangen sehr leicht und gewiß.

Da sie im Frühjahr, wenn sie sich paaren, häufig aus ihren Löchern kommen, so kann man sie auch so fangen, daß man vor dieselben Töpfe in die Erde gräbt, in welche man etwas Getraide thut und welche man mit Stroh bedeckt; sie riechen das Getraide, springen hinein und können nicht wieder heraus.

Man hat auch eine Maschine erfunden, welche aus einem starken Blasebalg besteht, in dessen Röhre eine Kapsel von durchlöchertem Eisenblech angebracht ist. In diese werden kleine leinene Läppchen, die in Schwefel getaucht sind, gelegt und angezündet. Hierauf wird die Röhre des Blasebalges in den Bau gesteckt, und der Schwefeldampf in alle Gänge desselben verbreitet. Sobald der Bau mit Rauch angefüllt ist, wird die Maschine aus der Oeffnung genommen, und diese mit Erde fest verstopft. Der Hamster muß in diesem Dampfe ersticken.

Auf Aeckern, wo das Wasser nicht weit herbey zu holen ist, kann man ihn noch leichter vertilgen. Man verstopft die Fallöcher, und gießt durch den schiefen Eingang so viel Eimer Wasser in die Grube, daß er, durch das Wasser verjagt, herausgekrochen kömmt, wo man ihn leicht tödten kann. Hierbey ist zu beobachten, daß man

nicht

nicht nachlassen darf, einzugießen, wenn gleich anfangs die Höhle gefüllt zu seyn scheint; denn sobald er Wasser spürt, macht er einen Damm vor den Eingang, welcher aber leicht eingeschwemmt wird, wenn man fortfährt einzugießen. Nur zuweilen gelingt es ihm der Fluth zu entgehen, indem er sich nämlich senkrecht und dann wieder wagerecht in der Erde fortgräbt, den Gang fest verstopft, und dadurch verursacht, daß wegen des Winkels das Wasser stehen bleibt, und ihn nicht erreicht.

Noch eine andere Art, diese Thiere auszurotten, ist, wenn man Kügelchen aus schönem weißen Waizenmehl und pulverisirten weißen Nieswurzblättern mit Honig vermischt, bereitet, trocknet, und in die Löcher wirft. Nach etlichen Tagen kann man die Höhlen zuscharren, und man wird bemerken, daß sie nie wieder aufgescharrt werden, und also die Bewohner getödtet sind. Eben diese Wirkung thun Brod- und Rübenwürfelchen mit Arsenik bestreut, in ihre Höhlen geworfen.

Ferner im Frühjahr für etliche Groschen Mercurium sublimatum gekauft, zerdrückt und im Wasser eine halbe Stunde gekocht, alsdann Gerste hinzu gethan, so viel, daß sie völlig bedeckt wird; des andern Tages in jedes Hamsterloch einen Theelöffel voll gelegt, so werden die Bewohner desselben in etlichen Stunden todt seyn.

Die Natur hilft auch gewöhnlich alsdann selbst, wenn ihre Vermehrung so stark ist, daß sie eine Landplage

plage werden könnten. Eine trockne und kurze Erndte, wo sie das Einsammeln versäumen, oder nicht genug einsammeln können, und ein anhaltender, langer, abwechselnder, besonders feuchter Winter macht, daß sie in ihren Löchern Hungers sterben müssen.

Nutzen.

Der Schaden, den sie an Feld- und Gartenfrüchten thun, scheint ihren bekannten Nutzen weit zu überwiegen.

Sie dienen den Wieseln, Iltissen, Mardern, Füchsen, Eulen und Habichten zur Speise, und können auch von Menschen gegessen werden; doch sagt man, daß Hamstergräber, die ihrer viel gegessen hätten, mit einer Art Aussatz wären befallen worden. Vielleicht hat aber dieß eine andere Ursache. Diese Leute füttern auch ihre Schweine damit, braten das Fett aus und brennen es in Lampen.

Sie verzehren auch manche schädliche Feldmaus und dergleichen Insecten.

Ihr Balg könnte als Pelzwerk weit mehr benutzt werden, als bisher geschehen ist. Die Felle, welche im Frühjahre, wenn sie nach ihrem Winterschlaf wieder ausgehen, ihre vorzügliche Güte haben, sind schön und dauerhaft. Das Stück kostet aber doch nicht mehr, als drey und vier Pfennige. Der Kürschner wirft den untersten Theil des Bauchs bis auf einen kleinen schwarzen Streifen an jeder Seite des Rückens als unnütz weg. Es werden allezeit sechzig Felle zusammengenäht, und zwey

Schock

Schock werden unter dem Namen eines Sackes für drey bis vier Reichsthaler von ihm verkauft.

Schaden.

Die Hamster schaden den Getraidefeldern unter allen Thieren am meisten. Man findet oft in einem Hamsterloche einen Centner Früchte an Erbsen, Wicken, Gerste, Hafer, Waizen, Roggen, Leinknoten u. dergl., und von diesen Getraidearten suchen sie allezeit das beste aus, und tragen es ein. Auch die grüne Saat zehren sie ab. Man berechne hieraus den Schaden, wenn in einem kleinen Bezirk um Gotha herum zuweilen in einem Herbste 30000 Hamster sind ausgegraben und getödtet worden! Auch im Amte Weißenfels hat ein Hamsterfänger jährlich 12000 Hamster gefangen.

Ihre zornigen, geifernden Bisse verursachen auch oft schwer zu heilende Wunden; daher man sagt, daß die Hamster giftig wären.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Es sollen mehr Männchen als Weibchen gebohren werden.

2) Er soll die Kornähren wiegen und die schwersten aussuchen.

3) Die außerordentliche Ordnung und Bestimmtheit seiner Kammern.

4) Der erste Donner soll ihn aus dem Winterschlaf erwecken.

5) Büffon sagt sogar, daß er keinen Winterschlaf habe.

Die zwanzigste Gattung.

Murmelthier. Arctomys.

Kennzeichen

In jeder Kinnlade sind zwey große keilförmige Vorderzähne.

Oben fünf und unten vier Backenzähne auf jeder Seite.

An den Vorderfüßen vier Zehen und ein kurzer Daumen, an den Hinterfüßen fünf Zehen.

Die äußern Ohren klein oder scheinen ganz zu fehlen.

Der Schwanz ist mit Haaren bedeckt und von mittler Länge, bey einigen sehr kurz.

Die Schlüsselbeine vollkommen.

Ihr Körper ist groß und dick; der Kopf stumpf und groß.

Sie wohnen unter der Erde, graben, klettern, nähren sich von Wurzeln und Körnern, pflanzen sich nicht so häufig, wie die Mäusearten fort, da sie des Jahrs gewöhnlich nur einmal Junge bringen, verrichten ihre Geschäffte am Tage und erstarren im Winter. Zwey Arten.

49. Das Alpen-Murmelthier.

(Taf. XIII. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Murmelthier, rechtes oder eigentliches Murmelthier, Bergmaus, Murmelmaus, Murmrutle, Miſtbellerle, Alpenmaus, Alpenratze, Bergratze, Murzerchen und Bergdachs.

Arctomys Marmota. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 141. n. 1.

Mus Marmota. *Lin.* Syst. nat. ed. 12. I. 81.

Marmotte. *Buffon.* hist. nat. VIII. 219. T. 28. Ed. de Deuxp. III. T. 1. f. 2. Ueberſ. von Martini IV. 296. Taf. 80.

Alpine Marmot. *Pennant* hist. nat. II. 128. Meine Ueberſ. II. p. 446.

v. Schrebers Säugeth. IV. 722. Taf. 207.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 291.

Goeze's Fauna. II. 223.

Lichtenbergs und Voigts Magazin für das Neueſte aus der Phyſ. IV. 2. S. 17.

Donndorfs zool. Beytr. I. 476. n. 1.

Kennzeichen der Art.

Ohren und Schwanz sind kurz und langhaarig; der Körper oben braun, unten röthlich.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Das Murmelthier trifft man in Oestreich und Tyrol an, und die Länge seines Körpers ist gegen 1 Fuß 8 Zoll, des Schwanzes 6 3/4 Zoll *), ohne das Haar an der Spitze desselben, und es wiegt 6 bis 9 Pfund.

Der Kopf ist dick und wird von dem sitzenden Thiere öfters etwas aufwärts getragen. Die Schnauze ist dick und stumpf; die Oberlippe gespalten, und bis an die Nase aufwärts gefurcht. Die Vorderzähne sind mit einer abgerundeten Spitze versehen, und pommeranzenfarbig. Die Augen sind von mäßiger Größe und stehen in der Mitte zwischen Nase und Ohren, doch diesen ein wenig näher. Auf jedem Auge und Backen steht eine Warze mit längern und kürzern Borsten. Die Ohren sind kurz, rund, haarig, und in den Haaren versteckt. Das Haar auf und hinter den Backen ist vorzüglich lang, daher die dicken Backen. Der Körper ist kurz, dick, mit flachem breiten Rücken, und einer schlaffen Haut umgeben, die sackförmig nach den Füßen herunter läuft. Eine Haarnath läuft von der Kehle über die untere Seite des Leibes bis an den After. Der Schwanz steht gerade aus,

*) Par. Ms.: 18 Zoll; Schwanz 6 Zoll.

aus, und ist langhaarig. Die Füße sind kurz und haben lange kahle Fußsohlen, weil das Thier auf den Ferſen geht. Der Daumen an den Vorderfüßen ist kegelförmig, und mit einem rundlichen undeutlichen Nagel verſehen. Die Klauen der übrigen Zehen sind ziemlich lang, gebogen, spitzig, oben einigermaßen flach; die an den Hinterfüßen kürzer, als die vordern.

Der Kopf ist auf dem flachen Scheitel mit angedrückten schwarzen und darzwischen durchstechenden weißgrauen Haaren bedeckt. Die Spitze der Schnauze ist gelblich weißgrau; die Bartborsten schwarz. Die Ohren haben graue und weiße Haare, und hinterwärts kurze schwärzliche Bürstchen. Der Hals und Rücken sind oben weißgrau, schwarz und weißgelb melirt; die Seiten des Halses und Leibes hinter den Vorderfüßen bräunlich gelb; etwas dunkler das Ende des Leibes hinter den Hinterfüßen; noch dunkler Kehle, Brust und Bauch; die Vorderbeine äußerlich, wie die Mitte des Rückens; die Hinterbeine, wie die Seiten des Halses; die Füße oben auf schmutzig weißgelblich; der Schwanz lichtbraun mit schwarzbraun melirt und an der Spitze ganz schwarzbraun.

Varietäten.

1) Erst neulich hat man bey Pultawa eine eigne Varietät mit einem wie ein Tiger gefleckten Balge (A. M. tigrina) entdeckt. Sonst giebt es auch:

2) weiße und 3) schwarze Alpenmurmelthiere (A. M. alba et nigra) *).

Zergliederung **).

Gleich beym Einschnitt in den Unterleib zeigen sich zwey große Blätter von weißen, dichten, fingersdicken Fett, die zwischen den Häuten eingeschlossen sind. Ein jedes ist fünf Zoll lang und vier Zoll breit. Es hängt an der ganzen Gegen der Lappen, erstreckt sich bis an das heilige Bein und bedeckt die Leber mit den Därmen. Diese Blätter sind gleichsam zwey abgesonderte Netze, die eine Menge Blut- und Schlagadern haben. Unter diesen beyden Blättern ist wieder ein anderes Netz, (wie dieß bey den wilden Thieren ist, welche viel laufen und springen,) worein der Magen und der größte Theil der Därme eingeschlossen ist. Zwischen der Leber und dem Zwerchfell ist noch ein anderes und zwar das vierte Netz, wovon die ganze Leber bedeckt wird.

Der Magen ist sehr klein, nur zwey Zoll lang, und dem menschlichen ähnlich.

Der große Blinddarm ist mit ringförmigen Klappen versehen, um den geringen Vorrath von Unreinigkeiten, die sich im Winter sammeln, darin aufzubewahren.

Am

*) Pallas neue nordische Beytr. II. 343.

**) Perraults, Charras und Dodarts Abh. aus der N. G. II. 205. Anatomische Beschreib. u. Abbild. Taf. 67. 68.

Am äußersten Ende des Mastdarms befinden sich drey leere Säcke, fast wie die kleinen Blinddarme bey einigen Vögeln.

Die Leber besteht aus fünf Lappen.

Die Milz ist sehr groß.

Die Gekrösdrüse ist doppelt, wie bey den Hunden.

Die Lunge besteht aus fünf Lappen, die in der Brust auf eine besondere Art vertheilt sind.

Das Herz ist walzenförmig und läuft nicht spizzig aus.

Von Eingeweidewürmern wird nichts erwähnt.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Diese Murmelthiere leben in großen Gesellschaften, um sich, da sie unbewehrt sind, bey Gefahr zu sichern, und lieben den Sonnenschein sehr, so daß sie sich stundenlang sönnen. Ehe sie sich legen, und auch wenn sie weiden wollen, richten sie sich allezeit auf den Hinterbeinen in die Höhe, und schauen sich um; das erste, das jemanden erblickt, giebt der ganzen Gesellschaft ein warnendes Zeichen mit einem durchdringenden scharfen Pfiffe, die andern antworten alle durch das nämliche Zeichen, und alle nehmen stille alsdann die Flucht. Aus der Anzahl der auf einander folgenden Pfiffe wissen die

Jäger, wie groß die Anzahl dieser Thiere in einer Gegend ist. Eben wegen ihrer großen Wachsamkeit sind sie, wo viele beysammen sind, nicht leicht zu erschleichen, denn da wacht immer das eine oder das andere und zwar auf einer gewissen Anhöhe. Sie müssen ein überaus scharfes Gesicht haben.

Sie erzeigen sich gegen kein Thier feindselig; wenn sie verfolgt werden, so fliehen sie, und ändern, um sicher zu leben, wohl gar ihren Wohnort, so daß ganze Familien von einem Berge zum andern ziehen. In die Enge getrieben, setzen sie sich aber gegen Menschen und Thiere zur Gegenwehr, und beißen und kratzen gewaltig. Wenn sie spielen murren sie wie junge Hunde.

Ihr Leben soll sich auf neun bis zehn Jahre erstrecken.

Verbreitung und Aufenthalt.

Das Vaterland dieser Thiere sind die hohen Alpen Europens und Asiens.

Sie bewohnen nur die höchsten Gebirge von Savoyen, der Schweiz, Tyrol und von den Pyrenäen, wo kein Holz mehr wächst, und wo gewöhnlich weder Menschen, noch Heerden zahmes Vieh hinkommen. Vorzüglich wählen sie durch steile Felsen abgeschnittene freye Plätze und die kleinen engen Thäler, welche die steilen Gebirge und nadelförmigen Felsenspitzen zwischen sich lassen, zu ihrem Aufenthalte. Sie

ziehen

ziehen durchaus die westliche und südliche Seite, die der Sonnenwärme am meisten genießen, den andern vor, und vermeiden mit Sorgfalt alle feuchten Plätze, ob sie gleich eine frische Quelle in der Nähe sehr lieben.

Es halten sich, wie schon oben angemerkt worden, von diesen Thieren allezeit eine Menge zusammen, welche eine einzige Familie ausmachen. In der Gegend ihres Aufenthalts sieht man zwar allemal viele Löcher und Höhlen, besonders unter Steinen und kleinen Erdhöhlen, dessen Gänge gegen den Berg gerichtet, bald gerade hinein, bald wieder abwärts gehen, besonders, wo der Boden nicht sehr steil ist, bald sich wieder aufwärts ziehen, oft hin und herlaufen, und sich zuweilen auf beyden Seiten vertheilen. In einer ziemlich weitläuftigen Gegend aber, und meistens in dem ganzen Bezirke ihres Aufenthalts ist nur eine einzige Höhle, die eigentliche Winterwohnung, welche mehrentheils nur aus einer einzigen Röhre, und aus der eigentlichen Höhle besteht, die wie ein Backofen aussieht, welche die Landleute vor ihren Häusern haben. Darin liegen die Thierchen, so viel ihrer sind, ringsherum, eins an dem andern, und jedes zusammengerollt. Die Höhle ist sehr glatt, und man findet nicht viel Erde vor der Mündung derselben aufgeworfen; denn sie verstehen die Kunst, die losgekratzte Erde mit ihren vordern breiten Pfoten nicht nur hinter sich zu werfen, sondern in dem Baue gleichmäßig zu vertheilen, und fest zu schlagen. Diese Winterhöhle ist außer dem Zugange gänzlich verschlossen, und die Fluchtgänge, wenn sich welche finden, sind nur was zufälliges,

fälliges, nichts nothwendiges und entstehen wohl erst während dem Nachgraben der Menschen, wenn einige Thiere wach werden, und sich zu retten suchen. Einen eignen Abtritt haben sie gewöhnlich nicht neben ihrer Winterbehausung, weil sie ihn nicht nöthig haben, da sie nichts mehr fressen, wenn sie das Winterquartier beziehen; jedoch mögen sie ihn vielleicht alsdann nöthig haben, wenn sie im Frühjahr bey noch liegendem Schnee aufbrechen, und die Sommerhöhlen noch nicht beziehen können. Die andern Röhren sind nur sogenannte Sommerröhren, theils auch kleine Fluchtlöcher, wo man das Ende mit dem Arm oder Stock erreichen kann. Doch ziehen sich einige Sommerhöhlen auch sehr weit hinein, sind aber inwendig nicht breiter, als die Zugänge selbst, deren oft mehrere sind. Zu Fluchtröhren brauchen sie auch Klüfte unter Felsenstücken und Steinen. In den Sommerhöhlen findet man niemals Heu, und sie sind schon äußerlich von den Winterwohnungen sehr leicht zu unterscheiden. Man findet nämlich in diesen Sommerwohnungen viel Erde aufgeworfen, welche jährlich, so wie die anwachsende Familie mehrere Kammern nöthig macht, zunimmt. In einigen dieser Kammern liegt auch viel Koth, und es scheint, daß sie dieselben zu bloßen Abtritten brauchen. Auch findet man im August und September vor den Eingängen der Winterwohnungen etwas Heu liegen, von welchen sich vor den andern Höhlen nie eine Spur zeiget, und zu Anfang des Octobers sind die Mündungen derselben fest verschlossen, welches ein sicheres Zeichen ist, daß sich die Thiere nun wirklich einquartirt haben. Die Weite der Mündungen

und

und Röhren ist kaum so groß, daß eine Faust eindringt, und es ist kaum begreiflich, wie die Thiere hindurch können. Sie graben sehr schnell und weichen aufstoßenden Hindernissen, als Felsen und Steinen geschickt aus. Die Mündung des Hauptganges ist zwey bis sechs Schuh hinein fest von innen mit Erde, Steinen, Sand, Leimen und Gras ausgemauert, worunter sich oft einen Fuß lange Steine befinden. Die Länge dieser Röhre ist nicht immer gleich; oft muß man zwey bis fünf Klaftern weit hinein eine halbe bis zwey Klaftern tief graben, ehe man zu ihrem Bette kommt; oft geht es weder weit noch tief hinein. Das Winterlager selbst ist eine runde oder eyrunde drey bis sieben Fuß im Durchmesser habende Höhle, größer und kleiner nach dem Bedürfniß ihrer Familie und nach Zulassung des Bodens eingerichtet. In dieser liegt dürres aber rothes Heu in Menge, und die Thierchen hart an einander, mit dem Kopf gegen den Hintern gekehrt, und man sagt, mit der Nase im After, oben auf dem Heu, ganz kalt, und in solcher Erstarrung und Erkältung des Bluts, daß sie ohne Leben und Athem zu seyn scheinen. Man findet zwey bis vierzehn, am öfterſten aber fünf bis neun zusammen. Sonst hat man auch wohl in eben derselben Höhle zwey Nester und zwey Familien angetroffen. Das Heu tragen sie im Munde in die Höhle, fassen es so, daß es wie ein Knebelbart aussieht, und streichen das, was locker ist, mit den Vorderpfoten sorgfältig ab; sie laden es also einander nicht auf den Bauch, und lassen sich auf dem Rücken zur Höhle schleppen, und scharren es auch nicht bloß allein vor der Mündung ihrer Behausung zusammen, wie man

sonst

sonst geglaubt hat. Dieß sieht man auch daher, weil die zahmen, wenn sie sich ein Winterlager bereiten wollen, sich mit allen, was sie finden, mit Tüchern, Lumpen, Laub, Stroh ꝛc. den Mund voll stopfen, und es zusammen schleppen. Dieß Heumachen geschieht in den schönsten Tagen des Augusts, und sie verwechseln es vermuthlich alle Jahre mit neuem, weil man viel Heu unter dem Auswurfe des Baues findet, der sich jährlich vergrössert. Von demselben fressen sie aber im Winter nichts.

Sie beziehen ihre Winterquartiere nach der Verschiedenheit der Gegenden und der Witterung vom September an bis zu Ende des Octobers, und kommen eben so zu Ende des Märzes oder im April wieder hervor. Sie liegen also gewöhnlich sechs bis sieben Monate in Erstarrung *). Es darf, wie beym Hamster, keine äußere Luft zu ihnen dringen, wenn sie einschlafen sollen; das sieht man aus der genauen Verstopfung des Eingangs, welche sie von innen nach außen zu verrichten. Bey ihrem Auszuge stoßen sie auch den Pfropf nicht nach außen

*) Herr Hofrath Blumenbach sagt (Handbuch der N. G. 5te Aufl. S. 78.) daß man die Murmelthiere auf der Allée blanche in Savoyen theils auf isolirten Klippen finde, die wie Inseln aus diesem Eismeer hervorragen, etliche Stunden weit von allem unbeeißten Erdreiche entfernt, und im ganzen Jahre nur etwa 6 Wochen lang von Schnee entblößt sind; so daß es scheine, die dasigen Murmelthiere durchschliefen wenigstens 10 Monate im Jahre und brächten nur einen äußerst kleinen Theil ihrer Existenz wachend zu.

außen heraus, welches auch nicht möglich seyn würde, sondern sie nehmen nach und nach die Erde, Steine, das Heu u. d. gl., woraus er besteht, von der Seite hinweg. Wenn man sie an die Wärme oder Sonne bringt, so fangen sie nach wenig Minuten an zu schnarchen, und bewegen sich taumelnd hin und her. In warmen Zimmern soll man sie den ganzen Winter über wachend erhalten können; doch wollen sie dazu, und zum Fressen, wenn sie erst aus der Erstarrung kommen, gezwungen seyn.

Herr Girtanner behauptet zwar (Lichtenbergs und Voigts Magazin a. a. O.) daß die gezähmten Murmelthiere nie in den Winterschlaf verfielen, ob sie gleich im Herbste alles zusammen schleppten, um sich ein Nest zu bauen. Allein des Grafen Mattuschka (Schriften der Berl. Gesellschaft naturforschender Freunde VI. 401.) Erfahrungen an seinem zahmen Murmelthiere, das sich in der Bedientenstube hinter dem Ofen in der Mitte des Septembers eingrub und zu Anfange des Aprils erst wieder erwachte, beweisen das Gegentheil; vielleicht, daß verschiedene Umstände, die eine oder die andere Wirkung hervorbringen; vielleicht erhält sie zur Zeit, wenn dieser Naturtrieb zum Erstarren erwacht eine sehr warme Stube wachend, und eine kühle oder ungeheizte macht, daß die Natur wie in der Freyheit wirken kann.

Nach ihrem Erwachen im Frühlinge begeben sie sich in die mittlere Gegend der Gebirge, um daselbst ihre Nahrung zu suchen; aber bey herannahenden Sommer stei-

steigen sie wieder in die Höhe um der Einsamkeit zu genießen.

Im Herbste, ehe sie einschlafen, sind sie sehr fett, und im Frühjahr, wenn sie erwachen, gewöhnlich sehr mager.

Im Sommer fliehen sie bey Ungewitter, Regen oder Gefahr allezeit in ihre Höhlen, und verlassen sie nur an schönen Tagen, ohne sich jedoch weit davon zu entfernen.

Nahrung.

Ihre Nahrung besteht aus Kräutern und Wurzeln, und aus dem zärtesten und kräftigsten Grase. Sie sollen besonders den kräftigen Alpen-Wasserfenchel (Phellandrium Mutellina L.), Alpenwegrich (Plantago alpina. L.), Alpen-Bärenklau, (Heraclium alpinum), bisamduftende Schafgarbe (Achillea moschata Lin.), Alpen-Afterchemille (Alchemilla alpina), zweyweibige Grindwurz (Rumex digynus), Alpenlöwenmaul (Antirrhinum alpinum), Alpenklee (Trifolium alpinum) und Alpensternblume (Aster alpinus) lieben.

Die gezähmten aber genießen allerhand Speisen, Fleisch, Obst, Brod, Wurzeln, Milch und Butter, besonders Mandeln, Nußkerne, rohe Kastanien, Rosinen, getrocknete Zwetschen u. d. gl.

Im Frühjahr, wenn noch Schnee liegt, müssen sie ihr Futter weit suchen. Mit der Morgendämmerung gehen

hen die alten Murmelthiere aus ihren Löchern und fangen nach Aufgang der Sonne an zu weiden, und weiter hin lassen sie auch die Jungen heraus gehen. Diese springen dann nach allen Seiten herum, jagen einander, setzen sich auf die Hinterfüße und bleiben in dieser Stellung gegen die Sonne gerichtet, mit der Miene eines außerordentlichen Wohlbehagens, lange Zeit sitzen. Alle, jung und alt, setzen sich, ehe sie anfangen das Gras zu ihrer Nahrung abzumachen, auf ihre Hinterschenkel in einen Kreis herum, und drehen ihre Köpfe nach allen Seiten. In der heißesten Jahrszeit, und ehe sie den Winterschlaf beginnen, sieht man sie um die nahen Quellen, und die Jäger wollen sie auch an den Salzlecken bemerkt haben. Sie saufen nur höchst selten, und wenn sie es thun, so recken sie den Kopf in die Höhe, wie die Gänse, wenn sie saufen, und drehen sich sogleich aus Furcht nach allen Seiten um.

Ihr Magen und ihre Gedärme sind im Winter ganz leer, wie ausgewaschen. Dieß findet man schon, ehe sie sich schlafen legen; denn sie sollen wirklich, sobald sie den ersten Frost empfinden, so viel und lange Wasser trinken, bis es klar und rein wieder von ihnen abgeht. Der Magen ist daher zu dieser Zeit sehr klein und wie zusammen geschrumpft.

Fortpflanzung.

Sobald sie erwachen, sind sie munter, scherzhaft, lustig, und fangen an sich zu begatten, welches also gewöhnlich im April und May geschieht. Sie tragen ohn-

gefähr vier bis sechs Wochen, und bringen nur einmal des Jahrs zwey bis vier Junge in den weichen Winterhöhlen zur Welt, die im Junius schon gefunden werden, und im Julius schon ziemlich hurtig herum laufen können. Die Mutter bewacht sie fleißig.

Sie lassen sich jung zähmen, lernen allerley possirliche Stellungen, tanzen, und auf dem Wink ihrer Herrn gehorchen. Sie fallen die größten Hunde an, wenn sie gereitzt werden und beißen sie; fressen in aufrechter Stellung; klettern auf Bäume; steigen an nahe stehenden Mauern hinauf, und die Savojarden richten sie ab, an einem Stocke zu gehen, und in den Schornsteinen hinauf zu steigen.

Jagd und Fang.

Wenn die Murmelthiere zahm gemacht werden sollen, so werden sie ganz jung gehascht, wenn sie von den Müttern aus der Höhle geführt werden.

Geschossen können sie nur werden, wenn man sich vor Tagesanbruch vor ihnen ins Gebüsche, oder hinter eine trockene Mauer, die man von Steinen zu dieser Absicht erbauet, den Wind entgegen, versteckt hat. Man muß aber die Schildwache zu erlegen suchen, sonst pfeift diese den andern und man wartet vergeblich auf ihre Wiederkunft.

Der Fang durch das Ausgraben ist aber der angenehmste und nützlichste, wenn er zur rechten Zeit geschie-

schehen kann. Hierbey sondirt man von Zeit zu Zeit mit einem Stocke den Gang der Röhre zur Winterwohnung, welche man sich schon frühe bemerkt und besteckt hat. Man gräbt sie gemeiniglich auf St. Gallustag, und man kann sie, wenn sie drey Wochen oder einen Monat schon gelegen haben, leicht wegnehmen, da sie alsdann alle auf ihrem Bette erstarrt liegen. Kömmt man aber zu früh, ehe sie ganz schlafen, so verfehlt man meist seinen Zweck, indem sie sich während des Grabens auf der andern Seite Ausgänge verschaffen, oder sich verstecken. Hier wird den Gräbern auch oft ein Arm voll Heu zur Beute, womit sie Lämmer und Ziegen füttern können.

Man stellt auch Steinplatten, welche man mit Sprenghölzern, wie die Mäusefallen, aufstellt, vor die Mündung ihrer Sommerhöhle, bedeckt die Fluchtlöcher, und sie werden von dem Steine, wenn sie an das Stellholz stoßen, erschlagen. In einigen Gegenden werden sie von den Landleuten, die Liebhaber der Jagd sind, mit Hunden aufgesucht, und in Fallen oder Schlingen, die man vor ihren Höhlen anbringt, gefangen.

Nutzen.

1) Das Fleisch ist hart und schwer zu verdauen; doch essen es die Schweitzer gekocht und gebraten mit Kohl sehr gern. Es soll wie Schweinefleisch aussehen und schmecken, und ihm sein besonderer Geruch durch starke Gewürze leicht benommen werden können. Gegen den

Winter ist es sehr fett. Aus den Keulen macht man eingepökelt und geräuchert kleine gute Schinken.

2) Der Balg ist ein guter Futterpelz, und giebt roh oder schwarz gefärbt Müffe und allerhand Gebräme.

3) Das Fett dient statt des Oels in Lampen, und die Bergbewohner bedienen sich desselben zu einer Arzeney wider viele Krankheiten.

4) Sie sollen Wetterpropheten seyn, und durch ihr Pfeifen die Veränderungen des Wetters anzeigen. Wenn sie die Bewohner der schweizerischen, tyrolischen und italiänischen Alpen, nicht auf den Bergen herumspielen sehen, so halten sie dieß für ein Zeichen, daß es den folgenden Tag regnen wird. Ja sie sollen sogar durch Auswerfung ihres Schuttes Erzgänge verrathen.

5) Viele arme Savojarden nähren sich durch sie, indem sie sie herumtragen, tanzen und allerhand Künste machen lassen.

Schaden.

Die zahmen werden oft durch Nagen an Hausgeräthe und andern Dingen schädlich.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Das oben angegebene Fuhrwerk auf dem Rücken s. Martini Uebers. von Büffon IV. 313.

2) Das

2) Das Fleiſch mit Rüben oder weißen Kohl gekocht iſt ein Mittel wider Mutterbeſchwerden.

3) Der aufgelegte Magen ſtillt die Kolik.

4) Das Fett ſoll gegen Lähmungen und contracte Glieder ein vortrefliches Mittel ſeyn. Hierüber hat Becher folgendes ſchöne Verschen:

Das Murmelthier iſt auch ein rechter Rattenart,
Das Schmalz davon wird für die Nerven wohl bewahrt.

50. Der Zieſel oder das ohrloſe Murmelthier.

(Taf. XIII. Fig. 2.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Kleines Murmelthier, Zieſelmaus, Zeiſel, Ziſel, Erdzeiſel, Erdzeiſelchen, Zieſelratte, lange ſchmächtige Zieſelratte, polniſche Maus, Bilgmaus, große Haſelmaus, Suslic, Kritſch, orientaliſcher Hamſter.

Arctomys Citellus. *Gmelin. Lin.* I. 1. p. 144. n. 6.

Mus Citellus. *Lin.* Syst. nat. ed. 12. I. p. 80.

Zisel ou Souslik. *Buffon* hist. nat. XV. 139. 144. 195. Suppl. III. 191. T. 31. Ed. de Deuxp. VIII. T. 9. f. 4. Ueberſ. von Martini. XIV. 37.

Earleſs Marmos. *Pennant* hist. of Quadr. II. 135. Meine Ueberſ. II. p. 452.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 8.

v. Schrebers Säugeth. IV. 746. Taf. 211. A, B.

Goezes Fauna. II. 288.

Pallas Nov. Quadr. spec. e Glirium ordine, 119. Tab. VI, 156. IX. f. 6— 10. Anatome.

Donndorfs zool. Beytr. I. 783.

Kennzeichen der Art.

Statt des deutlichen äußern Ohrs iſt ein dicker behaarter Wulſt; der geringelte Schwanz zu beyden Seiten mit langen Haaren beſetzt; die Füße ſind kurz und fünfzehig.

Geſtalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geſchlechts.

Der Zieſel iſt ein ſehr artiges Thier, welches zwiſchen dem Murmelthier und Hamſter in der Mitte ſteht. Mit jenem hat es Farbe, äußere Geſtalt und Sitten gemein, und dieſem gleicht es an Größe, innern Körperbau, Backentaſchen u. ſ. f. Die Größe iſt neun bis zwölf Zoll und die Länge des Schwanzes vier Zoll *).

Der

*) Par. Mß: Körper 7 bis 10 Zoll; Schwanz 3 Zoll.

Der Kopf ist dick; die Nase schwärzlich, oben mit feinen Häärchen besetzt. Die Schnauze ist fast kegelförmig; Stirn und Scheitel platt. Die Oberlippe gespalten, die Unterlippe sehr kurz; zur Seiten schwarze Bartborsten, die kürzer als der Kopf sind. Vier kürzere Borsten stehen über jedem Auge und vier auf jedem Backen. Die obern Vorderzähne sind gelblich, die untern weißlich. Der vorderste Backenzahn in der obern Kinnlade ist etwas kleiner, als die übrigen, und konisch, und die hintersten sind oben und unten die größten. Alle größern Backenzähne sind fast, wie bey den Raubthieren, spitzzackig. Die schlaffen Backen haben Taschen. Die braunen oder schwarzen Augen sind groß und hervorstehend. Alle Theile des äußern Ohrs sind da, doch flach am Kopfe angedrückt und unter den Haaren verborgen, so, daß man statt der äußern Ohren nur einen dicken behaarten Wulst sieht, der das Ansehen hat, als ob die vorher abgeschnittenen äußern Ohren, sich wieder vernarbt hätten *). Der Körper ist lang, oben vorwärts ausgehöhlt, hinterwärts gewölbt; unten weniger bauchig, als beym Murmelthier. An der Daumenwarze ist eine konische, ziemlich hervorragende Kralle; die übrigen Zehen der Vorder- und Hinterfüße sind groß, schwarz und spitzig. Der etwas geringelte Schwanz ist gewöhnlich kürzer, als die Hinterfüße, und besonders zu beyden Seiten mit langen Haaren besetzt, die das Thier, wie das Eichhörnchen, ausbreiten kann.

*) Daß sie also, wie der Maulwurf, gar keine äußerliche Ohren hätten, ist ungegründet.

Die Haare sind weich, glatt, fast einen halben Zoll lang, am Kopfe etwas stärker, und haben zwischen sich noch ein anderes wolliges Haar, welches auf dem Rücken weiß und am Bauche bräunlich ist. Die Farbe ist gewöhnlich oben aschgrau und unten ziegelfarbig, doch finden sich sehr viele Spielarten, worunter folgende drey besonders merkwürdig sind:

a) Der gewässerte Ziesel, A. C. undulatus. (Taf. XIII. Fig. 2.)

Er ist oben weißlichgrau mit braun oder gelb wellenförmig gemischt. Der Scheitel ist gleichfarbig oder dunkler grau; der übrige Kopf, Hals und Füße röthlichgelb, um die Nase und Augen dunkler. Die untere Seite des Körpers ist blaßgelblich. Er ist groß, und hat einen längern stark behaarten und braun und grau gefärbten Schwanz. Er kömmt hauptsächlich an der Samara vor.

b) Der geperlte oder getiegerte Ziesel. A. C. leucopictus.

Er ist graubraun mit weißen Flecken, womit der Rücken ziemlich gleichförmig besäet ist. Die untere Seite und Fläche des Kopfs und Körpers ist weißgelblich; die Gegend zwischen der Nase und den Augen aber, so wie die Hinterfüße, hinterwärts gelbbräunlich. Die Augen sind weiß umfaßt. Der Schwanz ist kürzer, gelbbräunlich, und weniger behaart. Die Größe ist mittelmäßig. Sie wohnt um den Don in Casanischen, und an der Lena.

c) Die

c) Der gelbliche Ziesel. A. C. flavicans.

Er ist graubraun, entweder gleichfarbig, oder ein wenig gewässert oder gefleckt, unten schmutzig weiß, und am Kopfe dazwischen bräunlich. Der Schwanz ist gewöhnlich kurz und gleichfarbig. Er wohnt besonders in warmen Gegenden *).

Auch in der Größe sind diese Thiere verschieden, so daß man sie von der Größe eines Alpen-Murmelthiers bis zur Kleinheit einer Wasserratte antrifft.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Die Ziesel laufen hüpfend, schlüpfen durch alle Oeffnungen, wo nur der Kopf durchkommen kann, richten sich zuweilen auf den Hinterfüßen auf, um sich um zu sehen, spielen mit einander im Sonnenschein vor den Höhlen u. s. w. Sie schlafen mit zusammengeballten Körper, auf den Hinterfüßen sitzend, nicht nur die ganze Nacht, sondern auch bey Tage bey stürmischem Wetter und vollem Magen, sehr fest.

Der Laut des Männchens ist pfeifend und scharf, die Weibchen aber, die sich öfterer hören lassen, geben einen kläglichern und schwächern Ton von sich.

Verbreitung und Aufenthalt.

Diese Thiere sind jetzt in Oesterreich, Schlesien und Böhmen nur noch sehr selten anzutreffen.

*) Alter und Jahrszeit scheint mir an der Verschiedenheit der Farbe dieser Thierart, so wie bey allen Mäusen, sehr viel Antheil zu haben.

Sonst bewohnen sie in Europa Polen und Ungarn, gehen von der Wolga an bis nach Indien und Persien herab, verbreiten sich durch ganz Sibirien und die große Tatarey bis nach Kamtschatka und gehen von einigen dazwischen liegenden Inseln z. B. Kadjak bis aufs feste Land von Amerika.

Statt daß der Hamster fettes Erdreich liebt, so baut der Ziesel im freyen Felde in trockene, erhabene und gebaute Gegenden in rasigen oder leimigen Boden, nimmt auch sogar mit einem dürren, feuchten, salzigen, sandigen und felsigen Grunde vorlieb. Nur Wälder und Sümpfe vermeidet er.

Jedes dieser Thiere bewohnt seine eigene, selbst gegrabene oder von andern verlassene Höhle, und man findet in der Heckzeit die Weibchen oft anderthalb Klaftern tief unter der Erde. Die Höhlen selbst haben ohngefähr einen Schuh im Durchmesser, sind gewölbt, länglich rund und mit trocknem Grase ausgefüttert. Nach dem Alter des Thieres hat es mehr oder weniger Gänge, wovon aber nur einer geöffnet ist, die übrigen aber so mit Erde verschlossen sind, daß man sie kaum bemerkt. Der offne, enge, im Grase verborgene Gang dient ihm des Sommers zum Ein- und Ausgange. Im September, wenn es am fettesten ist, verschüttet es ihn aber mit Erde, gräbt sich anderwärts einen neuen aus der Höhle bis an den Rasen hindurch, und verschläft dann den Winter betäubt in seiner Höhle. Durch die Wärme des Frühlings, wenn der Schnee geschmolzen ist, erweckt,

bricht

bricht es dann den neuen Gang vollends durch, kömmt ſehr mager hervor, und macht dieſen zu ſeinem Aus- und Eingang den Sommer über. An den verſchütteten, nahe zuſammenliegenden Gängen kann man erkennen, wie viel Jahre das Thier dieſe Höhle bewohnt hat.

Es ſcheut das Waſſer, und bleibet auch beym Regen in ſeiner Höhle.

Nahrung.

Die Zieſel nähren ſich von Roggen, Waizen, Haſer, Erbſen, Leinſaamen, Hanf; von zärtern Kräutern, als Klee, Vogelwegtritt, Ruſſiſchen Linſenbaum (Cytisus volgensis L.) ſtrauchartiger Robinie (Robinia fruticosa L.), kriechender Rauſchbeere (Empetrum procumbens L.), Bärenbeerſtrauch (Arcutus Uva ursi. L.), und allerley Wurzeln. Auch freſſen ſie Mäuſe und Vögel.

Die zahmen genießen gern Fleiſch und Milch, und Getraide, Obſt und Brod. Sie trinken wenig und leckend; Milch trinken ſie im Uebermaaß, den Schnee aber lecken ſie nicht. Die kleinern Speiſen nehmen ſie, wie faſt alle Mäuſe mit dem Munde, die größern aber mit den Vorderpfoten auf. Nach der Mahlzeit kämmen und putzen ſie ſich ſehr artig mit den abgeleckten Vorderpfoten. Sie ſollen ſich im Herbſte einen Vorrath für den Winter ſammlen, beſonders von Wurzeln und dem Kraute des Löwenzahns (Leontodon Taraxacum.)

Fortpflanzung.

Sie begatten sich im März oder April und in den kältern Gegenden im May. Nach 25 bis 30 Tagen gebiert das Weibchen 3 bis 8 blinde, nackte, weißliche und ziemlich unförmliche Jungen, welche in einem Monate schon halb so groß als die Mütter sind, aber erst im Sommer dieselben verlassen. Sie vermehren sich sehr stark. Die Jungen werden, so wie die alten, die Weibchen ausgenommen, welche immer beißig und wild bleiben, in einem Tage so zahm, daß sie das Kettchen, und die Gesellschaft der Menschen gewohnt sind.

Feinde.

Die Iltisse, Marder, große und kleine Wiesel, verschiedene Falken und die Krähen setzen ihrer großen Vermehrung einigermaaßen Schranken.

Fang.

Sie werden in Schlingen und Fallen gefangen, oder ausgegraben, oder durch Wasser, das sie gar nicht leiden können, aus ihren Höhlen gejagt.

Nutzen.

Ihr Fleisch ist einigen sibirischen, den ungarischen Bauervölkern besonders im Herbst, wenn sie fett sind, eine sehr angenehme Speise, und selbst die vornehmen Kalmucken, die sie mit ihren Milchbranntwein zubereiten, und ihnen dadurch den Geschmack der Ferkel zu verschaffen wissen, genießen sie gern.

Die

Die Felle dieser Thiere werden als Pelzwerk zu Unterfutter, Mützen u. d. gl. genutzt, und sind wegen ihrer Leichtigkeit und Wärme in großem Werthe. Die ungarischen Bauern machen Geld- und Tabaksbeutel aus denselben.

Schaden.

Sie nehmen die jungen Vögel aus den Nestern, die sie auf der Erde antreffen, und sollen, wie die Hamster, Getraide in ihre Höhlen sammlen.

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Das Weibchen soll während sie den Trieb zur Fortpflanzung fühlt, Blutzeichen von sich geben.

2) Die warmen Eingeweide eines Ziesels sollen den Pferden den Dampf- und Keuchhusten curiren.

3) In Sibirien sollen sie den ganzen Winter durch auf den Kornböden nach Nahrung ausgehen. Ist wohl eine andere Art Mäuse.

Die ein und zwanzigste Gattung.

Schläfer. Myoxus.

Kennzeichen.

Die zwey Vorderzähne in der obern Kinnlade sind keilförmig, die zwey untern schmäler und spitziger.

Backenzähne sind oben und unten vier auf jeder Seite.

Die Füße sind von gleicher Länge. Die Vorderfüße haben vier Zehen nebst einem Daumenansatz, die hintern fünf Zehen.

Ein langer Schnurrbart.

Der Schwanz ist lang, platt, am Ende dicker und stark behaart.

Es sind zärtliche Thiere, die in allen ihren Bewegungen, vorzüglich im Klettern und Sprüngen auf den Bäumen sehr geschickt sind.

Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Früchten und Kernen. Sie pflanzen sich nicht häufig fort.

Sie erstarren in der Kälte und schlafen den ganzen Winter hindurch.

51. Der Siebenschläfer.

(Taf. XIV. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Rellmaus, Mauseichhorn, Billich, Schlafratte, Ratz, Schlafratz, Waldratze, Gebirgsmaus, Schrotmaus, graues schläfriges Eichhorn, Preußischer Tagschläfer, Greül, Grauwerk, Rasselmaus, Krainisch Pouh.

Myoxus Glis. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 155. n. 1.

Sciurus Glis. *Lin.* syst. nat. ed. 12. I. p. 87.

Loir. *Buffon* hist. nat. VIII. 158. t. 24. Ed. de Deuxp. II. T. 12. f. 1. Uebers. v. Martini IV. 270. Taf. 76.

Fat Dormouse. *Pennant* hist. of Quadr. II. 158. Meine Uebers. II. p. 477.

v. Schrebers Säugeth. IV. 825. Taf. 225.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 351.

Goeze's Fauna II. 292.

Donndorfs zool. Beytr. I. 519. n. 1.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist lang und dick behaart; der Körper oben aschgrau, unten weiß; die Ohren sind groß und dünn.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß Thier ist der Glis der alten Römer, welchen sie auf eine eigene Art *) mästeten, und als eine große Delikatesse verspeiseten. Der Körper ist 6 3/4 Zoll und der Schwanz 4 3/4 Zoll lang **). Der Kopf ist länglich eyrund; die schwarzen Bartborsten länger als der Kopf. Die zwey obern Vorderzähne stehen senkrecht, die untern etwas nach oben eingebogen, alle vier sind pomeranzenfarbig; auf jeder Seite in beyden Kinnbacken vier Backenzähne; zusammen zwanzig Zähne. Die Augen sind groß, hervorstehend und mit einem schwarzbraunen Ring umgeben; die Ohren abgerundet, dünn und nackt; der Körper stärker, als beym gemeinen Eichhorn; der Schwanz daumenbreit und etwas zottig. Die Vorderfüße sind, wie beym Eichhorn, aber stark, und haben vier Zehen, die hintern haben fünf Zehen und sechs Schwielenhäute.

Der Balg ist ungemein weich und schön, fast wie Grauwerk. Die Backen sind weiß; der Oberleib grau mit

*) In besondern Glirariis.

**) Par. Ms.: Körper 6 Zoll; Schwanz 4 1/2 Zoll.

mit schwarz und silberweiß vermischt, daher sehr schön aschgrau; der Unterleib weiß mit einem Silberglanz; der Schwanz grau.

Das Weibchen hat vier Säugwarzen an der Brust und sechs am Bauche.

Er hat viel Muth, vertheidigt sich aufs äußerste gegen seine Feinde, und beißt gewaltig um sich. — Er lebt über sechs Jahre.

Zergliederung *).

Die Leber liegt unter dem Magen ganz in dem rechten Seitentheile der falschen Ribben, und die Gallenblase hängt von außen an dem höckrigen Theil derselben.

Der Schlund geht mitten in den Magen hinein, und die Därme an eben dem Orte heraus.

Die ersten Därme, welche sonst die zärtesten sind, sind hier die stärksten. Der Blinddarm fehlt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Sein Vaterland ist der gemäßigste Theil von Europa und Asien, wo er sich in waldigen Gegenden, besonders in weniger gebirgigen Eichen- und Buchenwäldern

*) Perrault, Charras und Dodarts Abh. aus der N. G. II. S. 203. Taf. 67. 68.

wäldern aufhält. In Deutschland trifft man ihn in Niedersachsen, Böhmen, Oesterreich, Steyermark, Kärnthen, Krain, vielleicht auch noch in andern Gegenden, die mir nicht bekannt sind, einzeln an.

Er klettert auf die Bäume, und springt vermittelst seines zottigen Schwanzes von einem zum andern, wie das Eichhorn, nur nicht mit der großen Geschicklichkeit und Leichtigkeit, da er nicht so lange Beine, und dafür einen dickern Bauch hat und fetter ist. Den ganzen Winter bringt er in einer Erstarrung und Betäubung zu, welche von Erkältung des Bluts herrührt. Er sucht alsdann trockene Höhlen in Klüften, Felsen und Bäumen auf, gräbt sich auch selbst tiefe Löcher in die Erde, füttert sie mit weichem Moose aus, und kommt selten vor Ende des Aprils wieder zum Vorscheine, es müßte denn sehr warme anhaltende Witterung im Frühjahr einfallen *).

Nah-

*) Es ist bekannt, daß die Wärme des Menschen, und fast aller Säugethiere zu allen Zeiten über dreyßig Grade des Gefrierpunktes steigt. Man hat aber den Versuch gemacht und die Kugel eines kleinen Wärmemessers in den Leib des Siebenschläfers, der großen und kleinen Haselmaus gesenkt, und die Wärme niemals stärker, als bis zum zehnten Grade gefunden. Wenn also dieser geringe Vorrath von innerer Wärme nicht mehr durch die äußere warme Luft unterhalten wird, und wenn das Thermometer nicht höher als zehn oder eilf Grade über dem Gefrierpunkte steht, so müssen diese Thiere erstarren. Diese Erstarrung kann aber auch nicht länger dauern, als die Ursache,

Nahrung.

Seine Nahrung besteht in Bucheckern, Haselnüssen, Obst, Kastanien und andern wilden Früchten, und er bringt sie mit den Vorderpfoten sitzend zum Munde. Er beschleicht aber auch die Vogelnester, und frißt die Eyer und Vögel aus denselben.

Fortpflanzung.

Er begattet sich nach seinem Erwachen aus dem Winterschlafe sogleich und wirft im Junius in einem hohlen Baume oder in einer Erdhöhle drey bis sechs Junge, die sich nicht leicht zähmen lassen, sondern stets ihre Wildheit beybehalten. Da er sich vorzüglich in Bucheckerwäldern aufhält, so richtet sich seine Vermehrung nach der Fruchtbarkeit der Rothbuchen; giebt es viele Bucheckern, so giebt es auch viele Siebenschläfer und so umgekehrt. Gerade wie bey unserm Eichhorn, wenn es viel oder wenig Fichtensaamen giebt.

Feinde.

Ursache, welche sie hervorbrachte. Daher erstarren sie an hinlänglichen warmen Orten gar nicht, oder leben auch wohl gar im Winter oder Frühjahr im Freyen auf, wenn das Thermometer etliche Tage zwölf bis vierzehn Grade sieht. Daraus darf man aber nicht folgern, daß dieß Verhältniß der Wärme bey allen Arten der Winterschläfer einerley sey, welches auch der Erfahrung widersprechen würde, da die verschiedenen Winterschläfer zu verschiedenen Zeiten schlafen gehen und wieder aufwachen.

Feinde.

Der Baummarder, die wilde Katze und der Uhu sind seine gefährlichsten Feinde.

Fang.

In Italien macht man Gruben in den Wäldern, die man inwendig mit Moos bestreut, nachher wieder mit Stroh bedeckt, auf welches Bucheckern geworfen werden. Hierzu wählt man einen trocknen Ort gegen Mittag unter dem Abhange eines Felsen. Hier versammeln sich die Siebenschläfer in großer Anzahl, machen sich sehr fett, und werden gegen das Ende des Herbstes in ihrer Erstarrung angetroffen und weggenommen.

In Unterkrain (bey Lichtenwald) giebt es deren, wenn die Bucheckern gerathen, eine unzählige Menge, und die Einwohner fangen sie in der Mitte des Octobers, oder sobald es kalt wird, vor ihren Erdlöchern, die sie wissen, in eignen hölzernen Schnellfallen. Mancher Landmann fängt deren zwey- bis vierhundert Stück.

Nutzen.

Ihr Fleisch soll in Geschmack viel Aehnlichkeit mit dem Fleische des Meerschweinchens haben. Sie werden im Herbste besonders fett und wohlschmeckend.

In Unterkrain werden sie noch jetzt auf den Tischen der Reichen und Armen als eine Delikatesse verspeist, worauf besonders ein Trunk gut schmeckt.

Das

Das Fett, womit sie im Herbst so überzogen sind, daß man kein Gerippe fühlt, dient dem Landmann im Winter zum Schmelzen der Speisen, und hat einen bessern Geschmack als Butter. Es hat noch die merkwürdige Eigenschaft, daß es bey der größten Kälte flüßig bleibt, und wird daher als ein bewährtes Mittel gegen erfrorne Füße gebraucht. Ein fetter Siebenschläfer wird im Lande für zwey und drey Kreuzer verkauft, würde aber, wenn jemand damit eine Speculation nach großen Städten, z. B. nach Wien machen wollte, um zwanzig bis dreyßig Kreuzer verkauft werden können *).

Ihr Fell ist ein brauchbares Pelzwerk, und wird von den Kürschnern mit Kalk gewöhnlich schwarzfleckig gepeizt.

Schaden.

Die Bucheckern, Haselnüsse und Kastanien mag man wohl ihnen gönnen, aber dadurch bekommen sie doch den Namen schädlicher Thiere, daß sie die Nester der Vögel beschleichen, und was sie darin antreffen, fressen.

*) Anzeiger 1791. Nr. 142.

(36) 52. Der Gartenschläfer oder die große Haselmaus.

(Taf. XIV. Fig. 2.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Haselmaus, Eichelmaus, Schlafratte, Eichenmaus, weiße Ratte, Holzmaus und Eichelratze.

Myoxus Nitella. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 156. n. 3.

Mus quercinus, *Lin.* syst. nat. ed. 12. I. p. 84.

Lerot. *Buffon* hist. nat. VIII. 181. t. 25. Ed. de Deuxp. II. t. 12. f. 2. Ueberf. v. Martini IV. 281. Taf. 77.

Garden-Dormouse. *Pennant* hist. of Quadr. II. 159. Meine Ueberf. II. p. 479.

v. Schrebers Säugeth. IV. 833. Taf. 226.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 21.

Goeze's Fauna. II. 275.

Donndorfs zool. Beytr. I. 522. n. 3.

Kennzeichen der Art.

Der Schwanz ist lang und dichthaarig; durch die Augen geht ein schwarzer Streifen.

Beschreibung.

Dieser Schläfer wird in Thüringen nicht selten angetroffen. Die Länge des Thiers ist 6 Zoll, des Schwanzes 4 1/2 Zoll *), und die Höhe 2 1/4 Zoll. Der Kopf ist anderthalb Zoll groß, wie bey einer Ratte gestaltet, doch in eine etwas spitzigere Schnauze auslaufend. Die obern breiten Schneidezähne sind kurz und braun, und die untern längern, sehr spitzigen Vorderzähne weißgelb. In der obern und untern Kinnlade befinden sich auf jeder Seite vier am Rande eingekerbte, und in der Mitte vertiefte Backenzähne, oben der kleinere und spitzigere hinten, und unten vorne. Die Zunge ist dick und glatt. Die Augen sind groß, hervorliegend, schwarz ins bräunliche fallend; die Ohren 3/4 Zoll lang, eyrund und kahl. Von der Mundspitze bis zur Schwanzwurzel läuft das Thier immer nach und nach mit unmerklichem Halse stärker zu. Die kurzen Vorderfüße haben vier Zehen, einen kurzen Daumen, der tief sitzt und einen kleinen Nagel hat, und die Hinterfüße fünf Zehen. Die Nägel sind scharf und weiß. Der Schwanz ist dick behaart, breit, besonders beym Männchen, und hat nur mehrentheils die oben angegebene Länge; denn man findet nicht selten Haselmäuse, deren

*) Par. Ms.: Körper fast 5 1/2 Zoll; Schwanz 4 Zoll.

Schwanz fast die Länge des Körpers hat. Er wird gerade ausgetragen.

Die Farbe des Thieres ist folgende: Der Obertheil des Kopfs ist von der Schnauze an bis zur Stirn fuchsroth. Am Ende der langen, schwarz und weiß gezeichneten Barthaare über der Nase läuft durch die Augen und unter den Ohren weg ein schwarzer glänzender Streifen, der unter den Ohren nach dem Halse zu, wo er sich endiget, stärker wird. Hinter den Ohren befindet sich ein schwarzer Punkt, und diese Theile selbst sind fleischfarben. Von dem Halse bis zur Mitte des Schwanzes ist der Oberleib schmutzig rothbraun, wegen der hervorstehenden schwarzen Stachelhaare. Die Seiten fallen von dem Röthlichen ins Aschgraue ab, und der ganze Unterleib ist von der Nasenspitze an gelblichweiß. Vom Schulterblatt bis zum Fußgelenke läuft ein schwarzer abnehmender Streifen herab; eben so befindet sich an den Hinterschenkeln ein schwarzer Streifen, der bis an die Ferfen reicht. Vorder- und Hinterpfoten und Unterschwanz sind weiß. Die letzte Hälfte des Schwanzes ist schwarz und endigt sich in einen weißen Pinsel. Die ganze Maus bekommt von diesen verschiedenen Farben und besonders von dem schön gezeichneten Kopfe ein vortreffliches Ansehen.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch einen spitzigern Kopf, dünnern Leib und Schwanz und hat acht Säugwarzen.

Merk-

Merkwürdige Eigenschaften.

Diese Thiere können sehr geschickt klettern, und laufen und springen daher von einem Baume zum andern, wie die Eichhörnchen.

Sie leben nur für den Sommer; denn im Winter liegen sie in unthätiger Betäubung. Die Kälte ihres Bluts, dessen Wärme niemals die Temperatur der Luft übertrifft, ja oft noch geringer ist, verursacht ihren Winterschlaf, der jedoch nicht so fest ist, und so ununterbrochen fortdauert, wie beym Hamster. Denn nicht nur jede warme Witterung im Winter weckt sie, sondern auch bey jeder kleinen Wunde, die ihnen im festesten Schlaf gemacht wird, lassen sie Zuckungen sehen, und ein dumpfes Geschrey hören. Wenn man ihre Entwickelung zum neuen Leben beobachten will, so darf man sie ja nicht plötzlich zu nahe ans Feuer bringen, denn sonst ersticken sie, oder es zerspringen ihre zarten Blutgefäße und tödten sie, ohne daß sie sich bewegen.

Uebrigens sind es boshafte, zänkische und beißige Thiere.

Ihre Stimme ist zischend, und wird nur in den Leidenschaften des Zorns und der Liebe gehört.

Ihr Alter soll sich nur auf sechs Jahre erstrecken.

Verbreitung und Aufenthalt.

Das südliche und gemäßigte Europa und das südliche Rußland sind das Vaterland dieser Thiere. In Deutschland sind sie nicht selten.

Was ihren Aufenthalt anbetrifft, so leben sie sowohl in kleinen buschigen Feldhölzern, als auch in großen Tannen- Eichen- und Buchenwäldern, und in den Gärten, welche an die Waldungen gränzen. Im Sommer halten sie sich meistens, wenn sie nicht ihre Nahrung auf der Erde suchen müssen, auf den Bäumen auf, die sie mit Hülfe ihrer scharfen Nägel sehr geschickt zu besteigen wissen. Im Herbste aber kommen sie herab, und suchen eine Höhle in einem hohlen Baum, in einer alten Mauer, oder in einem Felsen auf, jagen auch nicht selten die Maulwürfe und Wasserratten aus ihren Wohnungen, legen ihr Wintermagazin daselbst an, und erstarren, in eine Kugel zusammengerollt, beym ersten harten Winterfrost und fallenden Schnee. Diejenigen, die in Gegenden sich aufhalten, wo nahe Gebäude liegen, schleichen sich sehr gern beym Anfang des Winters in dieselben, und bringen da in Scheunen, Ställen, und auf alten Böden, in abwechselnder Betäubung, den Winter zu. Sie gehen auch wohl in Kammern und legen sich in die Betten. Wenn sie im Bette liegen, so nagen sie an dem Parchent oben die Haare ab, und machen so die Höhle um sich herum zu.

Nahrung.

In Wäldern nähren sie sich von Haselnüssen (daher ihr Name Haselmaus), von Bucheckern, Fichten- und Tannen-

Tannensaamen, von allerhand Beeren und Beerkernen, auch, wo Felder in der Nähe sind, von Hafer und Waizen. Sie besteigen die Vogelbeerbäume, wenn die Beeren reif sind, und thun auch in Schneußen, wo sie dieselben abfressen, großen Schaden. In Gärten zernagen sie das süße Obst, um die Kerne herauszubringen, und stellen besonders den Pfirschen- Aprikosen- Wallnuß- und Pflaumenkernen sehr nach. Sie durchsuchen auch in ihrem Bezirke emsig alle Bäume und Sträucher, um junge Eichhörnchen, junge Vögel und Vogeleyer zu finden. Ihre vorzügliche Sommernahrung besteht aber aus Mistkäfern, daher man sie auch an den Orten in Wäldern, wo Viehhallen sind, am häufigsten antrifft *).

Sie sind jederzeit gut bey Leibe, vorzüglich aber des Herbstes, wo sie das Fett den Winter über nöthig haben, um den Abgang der Ausdünstungen ersetzen zu können. Sie sammeln sich auch zuweilen im Herbste einen Vorrath entweder in ihrer Winterwohnung, wo sie die Betäubung erwarten, oder in einem eigenen Magazine, und gehen ihn beym Erwachen in warmen Win-

*) Dieß scheint etwas paradox zu klingen; allein man öffne nur den Magen solcher Thiere im Julius und August, und man wird ihn das meistemal mit nichts, als Stücken von Roßkäfern vollgestopft finden. Ich habe auch bemerkt, daß sie in Häusern, die im Walde lagen, oder in welche sie mit den Holzwellen gefahren wurden, die Taubenhäuser und Schwalbennester besuchten und nach und nach allen jungen Schwalben und Tauben die Köpfe abfraßen.

tertagen oder zu Anfang des Frühjahrs an. Wenn sie ihre Nahrung genießen, so stellen sie sich meist auf die Hinterfüße, und bringen sie mit den Vorderfüßen zum Munde mit allerhand lächerlichen Gebeerden, wie die Eichhörnchen.

Fortpflanzung.

Der Trieb zur Fortpflanzung erwacht bey diesen Thieren im May, und sie begatten sich auf der Erde, nachdem ein oder mehrere Männchen das Weibchen mit beständigem Zischen und Pfauchen verschiedenemal Baum auf und ab gejagt haben. Die Mutter trägt drey und eine halbe Woche und gebiert fünf, selten vier oder sechs Junge in einem Neste auf einem Baume, das einem Eichhörnchen, Raben, einer Drossel, Amsel ꝛc. gehört, und daß sie entweder von diesen Thieren verlassen findet, oder ihnen abjagt. Bisweilen aber, wenn sie diese Bequemlichkeit nicht haben kann, ist sie auch genöthigt, selbst in einem dichten Fichtenbäumchen oder in einem zusammengelegten Scheidholz- und Reißighaufen, etliche Reißer, etwas Moos und Haare zusammen zu tragen, und sich ein Wochenbett mit einer Decke zu bereiten, das aber allezeit von wenig Geschick in der Baukunst zeuget. Die Jungen saugen lange, und verlassen die mütterliche Wohnung nicht vor sechs Wochen. Die Mutter trägt ihnen einstweilen genug Nahrung zu, und sie selbst gehen zuweilen in der Gegend ihres Nestes auf den Raub aus. Nach dieser Zeit haben sie schon beynahe die Größe ihrer Mutter erlangt; und dieß ist die Ursache, warum diese höchstens nur zweymal des Jahrs Junge zur Welt bringt.

Die

Die Jungen sehen auf dem Oberleibe aschgrau, und am Unterleibe weiß aus, doch haben sie die schwarzen Streifen am Kopf, an den Beinen, und eine weiße Schwanzspitze; und diese Farbe behalten sie bis zum folgenden Jahre *). Wenn ein Mensch einem solchen Neste zu nahe kommt, so pfaucht die Alte, wenn sie eben zu Hause ist, mit glühenden Augen und fletschenden Zähnen auf ihn zu, und springt ihm, wenn er sich nicht vorsieht, oder es unvorsichtig wagt, sie oder ihre Jungen zu beleidigen, nach Gesicht und Händen, und beißt sehr schmerzlich. So schön das Thier aussieht, und so reinlich es seinen Körper hält, so unreinlich hält es das Nest, worin die Jungen liegen, weil es den Unrath nicht, wie die andern Thiere, wegträgt. Der Gestank davon, der einen weiten Bezirk anfüllt, mag wohl einige seiner Feinde, den Marder und die wilde Katze, von seinen Jungen verscheuchen, verräth sie aber dagegen dem Jäger und den Hunden.

Fein-

*) Ich glaube daher, daß man Unrecht hat, wenn man die Haselmäuse in aschgraue und braunrothe eintheilt, oder aschgrau für ihre Hauptfarbe annimmt. Es ist wahr, man fängt und sieht im Herbste oft mehr aschgraue als braunrothe, die die Größe der Alten haben; allein diese alle haben noch ihr Jugendkleid an, das sie erst im folgenden Sommer nach der ersten Begattung ablegen. Eben solche aschgraue Haselmäuse sind wohl die Siebenschläfer (Myoxus Glis), die auch in unsern Gegenden gefunden werden sollen. Ich habe wenigstens den wahren Siebenschläfer in Thüringen nie angetroffen.

Feinde.

Ihre Verfolger sind die wilden Katzen, Baummarder, Wiesel und die Uhue, aber sie unterliegen diesen Mördern nur nach einem harten Kampfe.

Vertilgung.

Man vertilgt sie vorzüglich durch das Schießgewehr. Es wird aber eine besondere Geschwindigkeit dazu erfordert, sie zu erlegen, da sie bey Erblickung eines Menschen sich pfeilschnell in den Gipfel des Baums, auf welchem sie sich befinden, verfügen, und von da von einem Baum zum andern mit Hülfe ihres büschlichen Schwanzes springen.

In Häusern, oder in ihren sonstigen bekannten Schlupfwinkeln fängt man sie in eisernen Tellerfallen, die man mit Käse belegt, welchen sie besonders lieben, und um darzu zu gelangen oft starke Breter durchnagen.

Im Herbste fangen sich sehr viele in der Schneuß in den für die Vögel aufgestellten Schlingen, und man bekommt sie, wenn sie nicht Zeit haben, sich loszubeißen, auf diese Art sehr oft in seine Gewalt.

Nutzen.

Weder ihr Fleisch wird gegessen, noch ihr Balg benutzt, ob man gleich beydes könnte.

Schaden.

Schaden.

Sie schaden in Wäldern, Gärten und Häusern durch Aufsuchung ihrer Nahrung.

In der Schneuß fressen sie die Beeren ab, und zerbeißen die Vogelbänder.

(37) 53. Der Haselschläfer oder die kleine Haselmaus.

(Taf. XV. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Haselmaus, Schlafratte, kleine Schlafratze, Nußbeißer, rothe Waldmaus, auch Siebenschläfer.

Myoxus muscardinus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 156. n. 4.

Mus avellanarius. *Lin.* Syst. nat. ed. 12. I. p. 83.

Muscardin. *Buffon* hist. nat. VIII. 193. T. 26. Ed. de Deuxp. II. 271. T. 9. f. 7. Uebers. v. Martini IV. 285. Taf. 78.

Common Dormouse. *Pennant* hist. of Quadr. II. 160. Meine Uebers. II. p. 480.

v. Schre

v. Schrebers Säugeth. IV. 835. n. 4.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 355.

Goeze's Fauna. II. 285.

Donndorfs zool. Beytr. I. 524. n. 4.

Kennzeichen der Art.

Der Körper ist rothgelb oder braunroth, die Kehle weißlich; die innere Zehe der hintern Füße kaum halb so lang, als die andern und ohne Nagel.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß schöne, muntere Thierchen ist in Thüringen weit seltener als die vorige Art. Die Länge des Körpers beträgt drey, und des Schwanzes drey Zoll drey Linien *); es hat also die Größe der Hausmaus, ist aber dicker, und der Schwanz wird besonders von der Mitte bis zum Ende breit und dickhaarig. Der Kopf ist dick und breit; die Schnauze läuft stumpf zu. An derselben stehen auf jeder Seite zwanzig Wärzchen mit eben so viel schwarzen langen Barthaaren die weiße Spitzen haben. Die Augen sind groß, schwarz, blitzend, und stehen näher nach den Ohren als nach der Schnauze zu. Ueber und neben denselben stehen auf jeder Seite einzelne Barthaare.

*) Par. Ms.: Körper, wie Schwanz, fast drey Zoll.

haare. Die Ohren sind kurz, abgerundet, sehr dünn, auswendig und inwendig kurz behaart, und liegen breit am Kopf an. Das Gebiß ist, wie das bey der vorhergehenden Haselmaus, und eben so sind die Füße, außer daß an den hintern der Daumen ohne Nagel ist.

Der Körper ist oben bald hellfuchsroth, bald braunroth, bald rothgelb glänzend, und läuft nach dem Bauch weißgelb, und nach der Brust und Kehle zu weißlich ab. Im Winter ist der Balg mit schwärzlichen Stachelhaaren überlaufen, die besonders an der letzten Hälfte des Schwanzes sehr merklich werden. Der Schwanz hat etliche weiße Haare an der Spitze.

Es übertrifft in seinem Betragen alle Mäusearten, und ist an Artigkeit, Possierlichkeit und Munterkeit, so wie an Schnelligkeit, die Bäume und Stauden zu ersteigen, dem Eichhörnchen sehr ähnlich. Es giebt in Gefahr einen quickfenden und zischenden hellen Ton von sich, und soll über sechs Jahre leben.

Verbreitung und Aufenthalt.

Dieß Thierchen, das im neuern und gemäßigten Europa einheimisch, und in Italien sehr häufig ist, verdient eigentlich den Namen Haselmaus, da man es selten anderswo, als im Haselgesträuch antrifft, und zwar an schattigen Orten, hinter alten Mauern, Felsen, und Steinbrüchen. Es erstarrt noch leichter als die vorige Art, im Winter auch in temperirten Zimmern, und wenn es im Freyen in der Mitte des Octobers spürt, daß

daß sein langer fester Winterschlaf herannahet, so hüllt es sich in einen Steinritzen, unter den Wurzeln eines Baums oder Busches, unter dem Laube auf der bloßen Erde in eine Hülse, die es von Tannennadeln, Moos, Laub und Geniſt, zuweilen auch aus Eichen- oder Buchenlaub allein bereitet, und schläft bis in die Mitte des Aprils ununterbrochen fort. Wenn es erwacht, ist es noch eben so dick mit Fett überzogen, als da es sich schlafen legte.

Nahrung.

Die Nahrung dieser kleinen Haselmäuse besteht vorzüglich in Haselnüssen, welche sie sehr geschickt öffnen können, in Bucheckern, Eicheln und Baumsämereyen, Baum- und Staudenknospen, und in Kernen von allerhand Beeren und Obst. Im Herbste legen sie sich unter das Laub, in Ritzen und Klüfte von diesen Nahrungsmitteln ein kleines Magazin an, das sie im Frühjahr aufsuchen und auszehren. Sie fressen gezähmt auch Getraide und bringen, wie die Eichhörnchen, alle ihre Speisen mit den Vorderpfötchen zum Munde mit allerhand artigen Bewegungen und Mienen, im Freyen aber brechen sie die Haselnüsse nicht ab, sondern öffnen sie am Busche hängend, und nur die abgefallenen öffnen sie, indem sie sie zwischen die Vorderpfoten fassen.

Fortpflanzung.

Die Mutter bauet in einer schattigen Gegend, zwischen etlichen dichten Aesten einer Haselnußstaude, oder einer Fichte, ein kleines, schönes Nest von Laub, Moos, Gras und Farrenkraut, umwickelt es mit etlichen langen

Gras-

Grashalmen, so daß es wie ein Ball aussieht, und läßt zur Seite eine einzige Oeffnung; hat also mit dem Eichhörnchen einerley Kunsttrieb. In demselben bringt sie im August gewöhnlich vier blinde Junge zur Welt, die sie über einen Monat lang säugt. Diese schlüpfen im September oft aus diesem Neste, spielen auf den nahen Nußsträuchern herum, pflücken Nüsse, und laufen beym geringsten Geräusch wieder hinein. Sie sehen glänzend fuchsroth aus, und man zieht sie wegen ihres lustigen Betragens in Vogelkäfigen auf.

Feinde.

Ihre Verfolger sind wilde Katzen, Baummarder und Wiesel.

Fang.

Wenn man nicht ein Nest ausspürt, so kann man ihrer selten habhaft werden. Nicht leicht fangen sie sich in den Fallen, die man ihnen mit gewelktem Obst auf ihre Büsche stellt.

Nutzen.

Den uns bekannten Nutzen haben bis jetzo noch bloß ihre Feinde, denen sie zur Speise dienen.

Schaden.

Ihr unbeträchtlicher Schaden ergiebt sich aus ihrer Nahrung, den sie zuweilen in Gärten thun.

Die zwey und zwanzigste Gattung.

Eichhorn. Sciurus.

Kennzeichen.

Oben befinden sich zwey keilförmige Vorderzähne, und unten eben so viel schmälere und spitzigere.

Die vordern Füße haben (meist) vier Zehen mit einer Spur von Daumen, und die hintern fünf Zehen.

Vollkommene Schlüsselbeine.

Lange Bartborsten.

Der zottige Schwanz, den diese Thiere haben, und wovon die längsten Haare zu beyden Seiten hinaus stehen, unterscheidet sie von allen andern.

Ihre kurzen Beine und langen Pfoten machen sie zum Klettern sehr geschickt. Ihre Nahrung nehmen sie aus dem Pflanzenreiche, und zwar von Früchten, Nüssen und andern Gesäme. Sie pflanzen sich bey überflüssigen Nahrungsmitteln des Jahrs zweymal fort, und ihre Vermehrung ist dann sehr bemerklich. Die Jungen sind noch zu Ende des ersten Jahres mannbar.

(38) 54. Das gemeine Eichhorn.

(Taf. XV. Fig. 2.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Eichhorn, Eichhörnlein, Eichhörnchen, gemeines Eichhörnchen, gemeines Europäisches Eichhorn, Eckerchen, Eichhermelin, Springfuß, Eichkätzchen, Eichkatzle.

Sciurus vulgaris. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 145. n. 1.

Ecureuil. *Buffon* hist. nat. VII. 258. t. 32. Ed. de Deuxp. II. T. 8. f. 1. Ueberf. v. Martini IV. 208. Taf. 68.

Common Squirrel. *Pennant* hist. of Quadr. II. 138. Meine Ueberf. II. 455.

v. Schrebers Säugeth. IV. 757. Taf. 212.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 230.

Goeze's Fauna. II. 302.

Donndorfs zool. Beytr. I. 488.

Ridingers jagdb. Thiere. Taf. 20.

Kenzeichen der Art.

An den Spitzen der Ohren ist ein Haarbüschel *); Rücken und Schwanz sind gleichfarbig.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Das Eichhorn wird im Thüringer Wald in großer Anzahl gefunden. Im Klettern und Springen ist dieß Thier dem Marder und an Größe dem Wiesel ähnlich, doch ist es schöner gebaut. Es hat einen platten fast viereckigen, dicken, spitzig auslaufenden Kopf. Die Nase steht hoch. Die Oberlippe ist überragend, und die untere merklich kürzer. In jeder Kinnlade befinden sich zwey Schneidezähne; die obern sind keilförmig, die untern zusammengedrückt, schmäler, länger, spitziger, und beweglich zur Beförderung des Benagens sehr harter Speisen **). Auf jeder Seite stehen vier große gereifte Backenzähne, und vor diesen noch zwey kleinere: zusammen 22 Zähne. Die Lippen sind mit kurzen, steifen, weißen Haaren besetzt. Zur Seite der Nase stehen fünf Reihen schwarzer langer Bartborsten, und über den Augen und auf den Backen drey solcher Barthaare. Die Augen sind groß, rund, schwarzbraun, hervorstehend, und

*) Nach der Härung im Frühjahr fehlt er, und bey den Jungen findet man ihm vor Winters selten.

**) Diese Beweglichkeit kann man nur an lebendigen, und an todten, so lange sie noch warm sind, bemerken, außerdem sitzen sie so fest im Zahnfleisch, wie die andern.

und stehen etwas näher nach den Ohren, als nach der Schnauze zu. Der Hinterkopf ist erhaben. Die Ohren sind lang und aufgerichtet, mit sträupigen langen Haaren an den Spitzen bewachsen. Der Hals ist kurz; der Rücken immer gewölbt. Die ganze Größe des Körpers vom Kopf bis zum Schwanz ist neun Zoll; die Höhe vier Zoll und die Länge des Schwanzes acht Zoll, und bis zur Spitze der Haare zehn Zoll *). Das Haar steht in die Höhe und ist etwas zurückgebogen. Der Schwanz, des Thieres größte Zierde, ist zottig; die längsten Haare desselben stehen zur Seite hin, und geben ihm das Ansehen einer Schwungfeder; sitzend liegt er auf dem Rükken, laufend aber ist er ausgestreckt. Die kleinen aber starken Schenkel sind mit großen Füßen und dicken Zehen versehen. Die Vorderfüße enthalten vier mit scharfen grauen Nägeln besetzte Finger, und statt des Daumens einen stumpfen Nagel. Die Hinterfüße haben fünf Zehen. Das Eichhorn berührt, wie alle Nagethiere, die Erde mit seinen langen Fersen, weswegen es auch aufrecht sitzen kann.

Die gewöhnlichste Farbe des Eichhorns ist fuchsroth oder braunroth, und verliert sich an der Kehle und am Bauch sanft in einen breiten weißlichen Streifen. Der Grund ist immer aschgrau, und an dem Schwanze aschgrau und weiß gemischt. Schnauze und Augenlieder sind weißgelb. Das zweyjährige zieht im November einen Winterpelz an, wovon die hervorstehen-

*) Par. Ms.: Körper 8 Zoll; Schwanz 9 Zoll.

den stachlichen Haare, besonders an den Seiten, aschgrau, roth und weiß sind, und ihm ein graugesprenkeltes Ansehen geben. Im Alter behält es immer diese graurothe Farbe, doch mit rothem Schwanz, Füßen und Ohrbüscheln. Im Norden verwandelt sich die fuchs- oder braunrothe Farbe im Winter allezeit in ein schön melirtes Grau, welches das sogenannte Grauwerk (petit-gris) giebt (Sc. v. varius).

Eine zweyte Hauptvarietät in der Farbe, welche wir im Freyen fast eben so häufig als jene finden, machen die schwarzen Eichhörner aus. Sie haben gewöhnlich weiße Kehle und Bauch, und werden im Winter, wenn sie alt sind, mit einigen weißen Stachelhaaren überstreut, welches ihnen ein schwach bereiftes Ansehen giebt (Sc. v. niger).

Außerdem sind noch folgende Varietäten bey uns zu finden.

a) Das braunschwarze gemeine Eichhorn, mit fuchsrothem Bauch.

b) Das aschgraue gemeine Eichhorn, mit weißer Brust und Bauch, und röthlicher Einfassung des Unterleibes.

c) Das hellgraue gemeine Eichhorn, mit schmutzig weißer Brust und Bauch, und rothen Strich über den Rücken. Diese drey Varietäten sind die schönsten und scheinen aus der Vermischung der fuchsrothen und schwarzen zu entstehen. Sie sind aber nicht häufig.

d) Das

d) Das weiße gemeine Eichhorn, mit rothen Augen (Sc. v. albus)

e) Das gelbe gemeine Eichhorn. Entweder blaßgelb oder rothgelb.

f) Das roth und weiß gefleckte gemeine Eichhorn.

g) Das schwarz und weiß geschäckte gemeine Eichhorn.

h) Das fuchsrothe gemeine Eichhorn mit weißen Füßen.

i) Das schwarze Eichhorn mit ganz oder halb weißem Schwanze.

k) Das fuchsrothe Eichhorn mit weißem Schwanze. Dieß schöne Thierchen sah ich den 14ten September 1797 bey Reinhardtsbrunn (Taf. 15. Fig. 1.). Wenn diese so verschieden gezeichneten Spielarten unter einander Junge zeugen, so bekommen ihre Haare oft eine aus ihrer elterlichen Farbe zusammengesetzte Schattirung.

Das Weibchen ist kleiner als das Männchen, und sein Schwanz ist nicht mit so langen und dichten Haaren besetzt.

Merkwürdige Eigenschaften.

Gesicht und Geruch sind die schärfsten Sinne dieser Eichhörner, außerdem aber ist ihr feines Gefühl bey der Aenderung des Wetters zu bewundern.

Ihre Stimme ist in der Fröhlichkeit und Begattungszeit ein Pfeifen, bey Freude und Furcht ein Klatschen, und im Zorn, Schmerz und in der Gefangenschaft ein Knurren und Zischen.

Sie leben sechs bis sieben Jahre, wenn man sie zahm macht.

Das Betragen dieser so vortheilhaft gebildeten Geschöpfe zeichnet eine ins Possierliche fallende Unruhe aus. Wenn sie sich auf der Erde befinden, und einen Menschen oder Hund gewahr werden, so suchen sie geschwind einen Baum zu erreichen, laufen auf der entgegengesetzten Seite desselben hinauf, machen zuweilen Halt und schielen unvermerkt an der Seite des Baums hervor nach ihrem vermeynten Feinde, klatschen und zischen einigemal, und sobald dieser die Augen von ihnen weggewendet hat, so wissen sie ihm mit der größten List zu entwischen, indem sie sehr geschwind und unbemerkt den Gipfel des Baums zu erreichen suchen, und dann so leise als möglich von einem Gipfel zum andern springen. Sie sind im Stande mit Hülfe ihres zottigen Schwanzes zwölf Fuß weit entfernte Bäume zu erfliegen. Zum bloßen Gehen und langsamen Schreiten scheinen sie zu leicht gebaut, daher sie immer kleine Sprünge mit abwechseln-

den

den großen thun. Sie halten sich gerne reinlich und trocken, und sitzen daher immer auf ihren Hinterfüßen, putzen und lecken sich. Sie fliehen die Sonnenhitze und lieben den Schatten. In der Brunst- und Heckzeit sind sie sehr boshaft und leiden keinen von ihren Kameraden in dem Umkreise, von welchem sie einmal Besitz genommen haben, sondern verjagen ihn mit grimmigen Bissen. In der äußersten Verfolgung können sie sehr geschickt über einen Fluß oder Teich schwimmen, und brauchen wenigstens in Thüringen keines Bretchens, wie man vorgiebt, ja sie springen lieber bey Versuchen vom Bretchen ab, und schwimmen mit eingetauchtem Rücken und Schwanze.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die gemeinen Eichhörner wohnen in Wäldern und in Gärten, die in ihrer Nähe liegen. Man trifft sie in ganz Europa, in den nördlichen und gemäßigten Theile von Asien und wahrscheinlich bis nach Ceylan hinab an.

Sie bauen sich viele Nester, und zwar in Schwarzwäldern von dünnen Reisern und Moos, und in Laubhölzern von Reisern mit Blättern, oder dürren Reisern und dürren Blättern. Sie sind alle mit einer flach kegelförmigen Haube, wie die Aelsternester, versehen, in welcher sich ein Eingang, der dem Winde entgegen, oder gewöhnlich nach Morgen zu angebracht ist, befindet. Auf der andern Seite am Stamme des Baums, da diese Nester meist in der Mitte des Baums am Stamme angebracht

bracht sind, ist noch überdieß eine kleine Oeffnung gelassen, durch welche sie im Nothfall vor ihrem Feinde entschlüpfen können. Jedes Paar hat deren wenigstens vier, und zwey davon sind besonders groß, und ihre Hauptwohnungen. Auch beziehen sie die leeren Raben- und Aelsternester und richten sie nach ihren Bedürfnissen ein.

Sie sind Wetterpropheten, verrathen den Sturm durch ihr Pfeifen und Klatschen, und verstopfen den Eingang ihrer Wohnung an derjenigen Seite, wo der Wind herstürmen wird. Bey fürchterlichen Gewittern, starken Regengüssen und heftigen Winden verschließen sie sich ganz in dieselbe.

Nahrung.

Sie suchen ihre Nahrung meist in Gärten und Wäldern, deren Ertrag durch sie geschmälert wird. Sie fressen Obstkerne, Nüsse, Eicheln, Roth- und Weißbuchensaamen, Ahorn- und Maßholdersaamen, Tannen- und Fichtensaamen, Beerkerne, Baumknospen, Heidel- und Mehlbeerblätter und Schwämme. Ein Pärchen kann leicht in etlichen Tagen alle Birnen eines Süßbirnbaums zernagen, und die Kerne herausfressen. Die Früchte der Wallnußbäume können sie eben so bald abnehmen; und man muß ihre große Geschicklichkeit bewundern, wenn sie einen solchen Baum auskundschaften. Tagelang pflücken sie ununterbrochen Nüsse, und tragen sie fort. Sie machen weite Wege und zwar auf der Erde weg, um sich diese angenehme Kost zu verschaffen. Im

Win-

Winter und Frühjahr fressen sie abgefallene Nüsse, Eicheln, Bucheckern, Beerkerne, Laubknospen, Baumrinde und vorzüglich Tannen- und Fichtensaamen, deren Zapfen sie zu Mehl zermalmen, um diese Körner heraus zu holen; im Sommer und Herbste aber speisen sie Obstkerne und Nüsse. Von Nüssen und Eyerschwämmen legen sie sich ein Magazin in einem Neste, oder in einem hohlen Baume, oder auch in einem selbst gegrabenen Loche unter einem Busche oder Steine, an, dessen Vorrath sie aber nicht bis zum Winter sparen, sondern in regenhaften Herbsttagen schon angreifen und verzehren. Pfirschen- und Aprikosenkerne sind ihnen Gift.

Wenn sie fressen, sitzen sie auf den Hinterpfoten, bringen mit den vordern, als mit Händen, die Speise zum Munde, und man sieht oft an ihren freundlichen und lächerlichen Mienen, wie gut ihnen eine Nuß schmeckt.

Im Winter lecken sie statt des Wassers den Schnee gern.

Fortpflanzung.

Im März sind diese Thierchen zum erstenmal hitzig (läufisch), und es entsteht zu dieser Jahrszeit da, wo sie häufig sind, ein allgemeiner Krieg unter ihnen. Man sieht zuweilen zehn bis zwölf auf einem Baume im blutigen Kampfe um Gatten und Gattinnen streiten. Die Farbe macht in der Liebe keinen Unterschied, sondern es begatten sich schwarze und rothe zusammen und zeugen Junge. Das Männchen hat ein großes Zeugungsglied, und ist besonders sehr geil.

Das

Das Weibchen trägt beynahe vier Wochen und bringt im April oder May drey bis sieben blinde Junge in einem von ihren Nestern, das sonderlich gut mit Moos und Laub ausgefüllt ist, zur Welt. Den Jungen sind die Augen acht Tage verschlossen, und sie werden von der Mutter drey bis vier Wochen gesäuget, alsdann beklettern sie schon die Bäume, spielen unter sich, und mit dem Obst und andern Nahrungsmitteln, die ihnen die Alten herbey tragen. Während den ersten vier Wochen muß man also ihre Nester ersteigen, und die Jungen herausnehmen, wenn man sie zähmen will. Allein hierbey muß man diese Vorsichtsregel beobachten, daß man sie gleich zum erstenmal wegnimmt, weil sie die Eltern, wenn sie die Witterung von Menschenhänden durch ihren scharfen Geruch bey dem Wochenbette bemerken, in ein anderes Nest, das oft mehr als 1000 Schritte von diesem entfernt ist, tragen, und man sie alsdann nur mit der größten Mühe wieder finden kann. Man findet oft in einem Neste schwarze und rothbraune beysammen, wenn die Eltern, die sie zeugten, von verschiedener Farbe waren, ja es fallen auch, obgleich beyde Eltern rothbraun sind, schwarze aus *).

Man ernährt sie anfänglich mit Milch und weißem Brode, alsdann fressen sie Nüsse, Mandeln und Backwerk. So wild sie in der Freyheit sind, so zahm werden sie in menschlicher Gesellschaft. Ihre possierliche Stellungen machen den Liebhaber, obgleich ihr Harn sehr unangenehm riecht, viel Vergnügen; nur muß man ihnen die

*) Diese Bemerkung habe ich oft gemacht.

die Vorderzähne ausbrechen, und sie in ein eigen Häuschen anketten, damit sie durch ihren Biß und ihr Nagen nicht schaden können.

Sie begatten sich mehrentheils noch einmal im Jahr; allein diese zweyte Begattung ist mit keinem Kriege verbunden, wie die erste.

Die Jungen verlassen die Alten schon nach dem zweyten Monate und suchen sich ihre Nahrung selbst auf. Diejenigen aus dem ersten Wochenbette sind schon um Michaelis beynahe zu ihrer vollständigen Größe herangewachsen.

Krankheiten.

In sehr harten Wintern sterben sie, wenn der Fichten- und Tannensaamen mangelt und der Schnee zu tief und zu lange liegt, daß sie nicht auf der Erde ihre Nahrung in abgefallenen Nüssen und Kernfrüchten suchen können, Hungers und erfrieren. Man findet sie alsdann in ihren Nestern todt liegen, und in ihren Magen haben sie nichts als ein Bischen unverdauliche zernagte Holzrinde und Zweige *).

Fein-

*) Zu Anfange des Winters 1782 gab es eine solche Menge Eichhörnchen in Thüringen, daß dem Wanderer im Walde beynahe jede dreyßig Schritte ein solches Thierchen aufstieß. Den kommenden Frühling sah man sie nur noch sehr einzeln. Viele glaubten, sie wären wegen Mangel des Tannensaamens, ihres Hauptnahrungsmittels ausgewan-

Feinde.

Nur selten erschleicht der Fuchs ein Eichhörnchen, das sich auf der Erde befindet, desto mehrere aber fängt der Baummarder, dessen Hauptnahrung sie sind. Er jagt sie so lange von einem Baume zum andern, bis sie unter stätem Angstgeschrey ermüdet sich ihrem grausamen Feinde ergeben müssen. Die Jungen sucht er in ihren Nestern auf und trägt sie seinen Jungen zu. Auch die große Haselmaus beschleicht die Nester der Eichhörnchen, und schleppt die Jungen als Raub weg. Der Milan, verschiedene große Eulen und der gemeine Bussart schleppen sie zur Heckzeit ihren Jungen zu. Von Flöhen, und von Zangenläufen (Acarus) werden sie, so wie von Bandwürmern sehr geplagt.

Jagd.

Die Fährte der Eichhörnchen ist wegen ihrer langen Ferse sehr kenntlich (Taf. XXIV. Fig. 14.) Sie fez-

wandert; allein bey genauerer Untersuchung fand man, daß sie alle noch da waren, aber entweder erstarrt in ihren Nestern oder unter dem Schnee vergraben lagen. Die Jagdhunde, die diese Leichname ausspürten, machten diese Entdeckung zuerst, und fanden das ganze Frühjahr hindurch eine Menge derselben.

Anders verhält es sich in Sibirien, wo Hr. Pallas (Reise II. 660.) ihre Wanderungen zwischen dem Ob und Tamm bemerkt hat. Sie geschehen der Nahrung halber und sie schwimmen dann über die Ströme, kommen sogar in die Städte, und halten sich in den wüsten Gebäuden und Thürmen auf.

setzen mehrentheils alle vier Füße, je zwey und zwey, kurz hinter einander, oder auch wohl alle vier zusammen, so daß die hintern in den Spuren der vordern stehen, und die Zehen stehen sehr weit von einander. Ihre Füße müssen, da sie schädliche Thiere sind, der Obrigkeit von den Jägern ausgeliefert werden.

Man fängt sie in Schlingen, die man in ihre Gänge aufstellt, und auf Bäumen in Fallen, die aus zwey Bretern bestehen, woran das oberste auf leicht aufgestellten Hölzern beweglich ruht, so daß es bey Berührung der, an den kleinen Hölzern befestigten, Lockspeise, die aus Nüssen bestehen kann, niederfällt und sie erschlägt. Gewöhnlich aber werden sie mit der Flinte oder dem Blasrohre erlegt. Man muß sie sehr vorsichtig greifen, wenn sie nicht gänzlich getödtet sind, da sie mit einem einzigen Bisse ihrer scharfen und langen Zähne die ganze Hand durchbeißen können.

Nutzen.

Ihr Fleisch ist, da sie aus dem Pflanzenreiche sehr gute Speisen genießen, eßbar. Ein gebratenes Eichhorn hat fast den guten Geschmack einer gebratenen Henne, und die schwarzen sollen die wohlschmeckendsten seyn. Ich esse sie sehr gern, und alle diejenigen, welche vorurtheilsfrey sind, finden sie recht wohlschmeckend.

Die Bälge der deutschen Eichhörnchen werden nicht genug genutzt, ob sie gleich ein brauchbares Pelzwerk zu Mützen und Handschuhen abgeben. Diejenigen

Win-

Winterbälge aber, die unter dem Namen Grauwerk oder Wehe (petit-gris) bekannt sind, werden vorzüglich geschätzt. Aus Sibirien kommen die besten, und werden häufig zu Futter, Ausschlag und Müffen verarbeitet. Nach China gehen die großen grauen schönen Bälge aus der Gegend des Obi *).

Die Kirschner nennen die hellen, weißes Grauwerk, und die dunklern, schwarzes, obgleich weder die erstern ganz weiß, noch die letztern ganz schwarz sind. Der Rücken, welcher im vorzüglichsten Verstande dem Namen Grauwerk hat, wird eigentlich zu Unterfutter für Manns- und Weibskleider, die Wehwammen (Wehbam) oder die Bäuche, welche weiß und schwarz sind, aber zu den ansehnlichsten Futtern, zu Aufschlägen und Müffen, und die Ohren statt der Hermelinschwänze zu Auszierung der Unterfutter gebraucht.

Aus den Schwanzhaaren verfertigt man Mahlerpinsel.

Die Eichhörner sind lebendige Wettergläser, und empfinden die stürmische Witterung einen halben Tag vorher. Man sieht sie dann, wie rasend auf den Bäumen herum springen, hört sie verschiedene Töne von sich geben, und findet bey der Untersuchung ihrer Nester, daß sie den Eingang, wenn er auf der Seite war, wo der Sturm herkommen sollte, verstopft, und die andere Seite des Nestes geöffnet haben.

Die

*) Müllers Sammlungen Russ. Gesch. VII. 124.

Die große Munterkeit, Lebhaftigkeit, Leichtigkeit und Behendigkeit, mit welcher sie alle ihre Handlungen verrichten, und ihre Gelehrigkeit und Reinlichkeit hat sie auch in die Gesellschaft der Menschen gebracht.

Schaden.

Den größten Schaden thun diese Thiere in Gesellschaft der Mäuse an der Eichel- Roth- und Weißbuchensaat, indem sie den ausgestreuten Saamen aus der Erde wieder hervorscharren und fressen.

Außerdem beißen sie die Spitzen der Fichten- und Tannenzweige ab, und fressen die Knospen derselben, so wie die Baumknospen von verschiedenen Bäumen und Sträuchern.

Sie zernagen die Tannen- und Fichtenzapfen, die süßen Birnen und Aepfel.

Wallnüsse und Haselnüsse tragen sie in Menge weg. In den Gärten sind sie daher nicht zu leiden, in Wäldern aber werden sie nur da, wo der Saamen gebraucht wird, und sie in die Saaten gerathen, bey zu großer Menge schädlich. Man sollte sie im Herbst wie die Hasen schießen und benutzen, da wirklich ihr Fleisch einen recht angenehmen Geschmack hat.

Nur unter der grausamen Bedingung, daß ihnen die Zähne ausgebrochen werden, können sie zum Vergnügen der Liebhaber gezähmt werden, außerdem werden

sie durch ihr Nagen am Hausgeräthe und durch ihren giftartigen Biß schädlich *).

Irrthümer und Vorurtheile.

1) Büffon glaubt, daß unser Grauwerk von dem grauen Amerikanischen Eichhorn herkomme.

2) Sie sollen einen Winterschlaf haben.

3) Sie sollen sich absichtlich auf Baumrinde oder ein Brettchen setzen, wenn sie über ein Wasser schwimmen wollen.

4) Die alten Aerzte brauchten Fleisch, Fett und Gehirn als kräftige Arzeneymittel, und der Aberglaube unter den Landleuten schreibt noch immer einem in einen neuen Topf zu Pulver verbrannten männlichen Eichhorn in Krankheiten der Hengste, und einen weiblichen für kranke Stuten Wunderkräfte zu. Gaukler und Seiltänzer nehmen gegen den Schwindel das pulverisirte Gehirn ein, um auch so ohne Schaden klettern und springen zu können, wie die Eichhörner.

*) Das zahmste Eichhorn fühlt oft den Trieb nach seiner verlohrnen Freyheit in sich, besonders im Frühjahr zur Zeit der Begattung seiner freyen Brüder, es wird wild und beißt unversehens jeden, der sich ihm nur nähert, in diesem Paroxismus. Uns sind drey Beyspiele seit kurzem bekannt, wo sehr zahme und artige Eichhörnchen, die ihren Gebieterinnen sonst auf den Wink folgten, dieselben, ohne vorhergegangene Beleidigung, durch ihren Biß so stark verwundeten, daß das Gift desselben nicht geheilt werden konnte, sondern die Finger abgelöst werden mußten.

Die

Die drey und zwanzigste Gattung.

Hase. Lepus.

Kennzeichen

In beyden Kinnladen findet man zwey gefurchte Vorderzähne, doch sind die obern doppelt, so daß hinter den äußern größern noch zwey kleinere liegen.

Backenzähne sind auf jeder Seite sechs.

An den Vorderfüßen sind fünf, und an den Hinterfüßen vier Zehen, und die Fußsohlen sind behaart.

Der Schwanz ist kurz oder fehlt ganz.

Wegen der langen Hinterfüße können diese Thiere besonders bergan sehr geschickt und schnell laufen. Sie nähren sich bloß aus dem Gewächsreich, und zeugen eine zahlreiche Nachkommenschaft, die sich jährlich mehrmalen fortpflanzet und sehr früh mannbar wird.

Man sagt gewöhnlich von den Thieren dieser Gattung, daß sie einen natürlichen Uebergang von den nagenden zu den wiederkäuenden machten, weil man ihnen ein Wiederkäuen zuschreibt, ob sie gleich nur einen einfachen Magen haben.

(39) 55. Der gemeine Hase.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Hase, Feldhase, Waldhase und gemeiner Europäischer Hase.

Lepus timidus. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 160. n. 1.

Lièvre. *Buffon* hist. nat. VI. 246. t. 38. Ed. de Deuxp. II. T. 4. f. 1. Uebers. v. Martini III. 147. Taf. 50. 51.

Common Hare. *Pennant* hist. of Quadr. II. 98. Meine Uebers. II. p. 419.

v. Schrebers Säugeth. IV. 863. Taf. 233. A. B.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 214.

Goeze's Fauna. II. 329.

v. Mellins Anweisung zu Anleg. der Wildbahnen ꝛc. 180.

v. Wildungens Neujahrsgeschenk auf das Jahr 1798. S. 1. Taf. 1.

Donndorfs zool. Beytr. I. 537. n. 1.

Ridingers jagdb. Thiere. Taf. 13.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Die Ohren sind länger als der Kopf und an der Spitze schwarz; der kurze Schwanz hat eine schwarze Oberseite.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Der gemeine Hase ist in Deutschland und besonders in den Thüringischen Feldern und Wäldern sehr häufig zu finden. Seine Länge ist ein Fuß zehn Zoll, die Höhe zehn Zoll und der Schwanz (die Blume, Federlein) mißt drey Zoll *).

Der Kopf ist länglich, herunterwärts gebogen, nach der Spitze zu schmal und vom Munde bis zu den Ohren abgerundet. Die Schnauze ist dick und groß, mit langen Barthaaren besetzt; besonders ist der innere Theil der Lefzen mit Haaren bebrämt. Er hat oben vier Vorderzähne, nämlich zwey vorne, die durch einen Einschnitt getheilt zu seyn scheinen, und zwey hinter denselben, welches bloße Stifte sind; unten befinden sich nur zwey Schneidezähne; oben an jeder Seite sechs und unten fünf schmale Backenzähne; zusammen 22 Zähne. Die Nasenlöcher sehen wie ein zweyter Mund aus, welche Täuschung die Vertiefung der Nasenscheidewand verursacht. Man nennt eine solche Vertiefung eine Hasenscharte. Die Augen stehen zur Seite, sind groß, weit hervorragend, gelblich mit schwarzen Streifen

*) Par. Ms.: Körper 1 Fuß 8 Zoll; Schwanz 23/4 Zoll.

und blöde. Die Ohren (Löffel) sind lang, an der Spitze schwarz, und scheinen sich an ihrem Ursprunge zu berühren. Die Natur versagte ihm ein scharfsehendes Auge, gab ihm aber dafür ein scharfhörendes Ohr und eine feine Nase. Er hat einen starken Hals, eine enge fleischige Brust, einen langgestreckten und überall gleichdicken Leib. Die Vorderfüße (Vorderläufte) sind kurz, dünne und mit fünf Fingern versehen, und die Hinterfüße (Sprünge) sind länger, ohngefähr halb so lang als der Körper und haben vier Zehen. Beyde haben schwarze lange, spitzige und ausgehöhlte Nägel, und sogar die Fußsohlen sind mit Haaren dicht besetzt. Er geht auf dem ganzen Hinterfuß bis zur Ferse.

Die Farbe seines Balges, der mit welligen Haaren (mit Wolle) und einzelnen Stachelhaaren dicht besetzt ist, ist oben gelb und schwarz gesprengt, oder hasengrau, an der Seite weg und an der Brust röthlicher, oft hochfuchsroth und unten gelb und weiß oder gelblichweiß. Der kurze Schwanz steht in die Höhe gekrümmt, und ist oben schwarz und unten und zur Seite weiß.

Beyde Geschlechter, der Hase (Ramler) und die Hasin (der Setzhase, Mutterhase) haben noch besondere Kennzeichen, wodurch man sie von einander unterscheiden kann. Der Ramler ist kürzer gebaut, hat breitere Lenden, einen stärkern, rundern, welligern Kopf, einen längern und stärkern Bart, kürzere und breitere Ohren, ist röther auf den Schultern und Vorderblättern als die Häsin, und mit breitern und weißlichen Ohren, die er oben nahe zusammen und über dem Rücken neben

einander

einander hinhält, versehen. Der Setzhase hingegen ist langgestreckter als der Ramler. Die Wolle ist auf dem Rücken grau und fällt ins schwärzliche; die Seitenfarbe lichter; die Blume länger und nicht so weiß, und breit, als bey jenem, und er sperrt die Ohren weiter von einander, und legt sie an den Seiten hin.

Abweichungen und Varietäten.

Die Jäger theilen die Hasen in Feldhasen, in Berg- Wald- Holz- oder Buschhasen, und in Sumpfhasen ein. Es sind dieß nur verschiedene Benennungen, die den Ort, wo sich der von uns beschriebene Hase gewöhnlich aufzuhalten pflegt, bezeichnen. Freylich hat die Lebensart in so verschiedenen Gegenden auch einigen Einfluß auf das Naturel, und besonders auf das Wachsthum dieses Thiers, allein dieß ändert die Kennzeichen seiner Art nicht ab.

a) Der Berghase ist größer, dicker, hat ein dichteres, bräuneres und schwärzeres Haar, und ist mehr weiß unter dem Halse als der Feldhase. Da er im Walde nicht den großen Verfolgungen ausgesetzt ist, wie jener, also ein höheres Alter erreicht, und im Herbste und Winter gute Nahrung von Eicheln und Bucheckern hat, so findet man ihn oft von einer großen Schwere. Man hat in den Hinterbergen des Thüringerwaldes Berghasen achtzehn Pfund schwer geschossen.

b) Der Sumpfhase unterscheidet sich vom Feldhasen in nichts, als in Ansehung seines Aufenthalts, weil

er immer in morastigen und sumpfigen Gegenden und im Schilfe ist. Sein Fleisch ist weißlich, unschmackhaft und ungesund. Man hat bemerkt, daß es mehrentheils Ramler sind, die diesen Aufenthalt wählen.

c) Merkwürdig ist, daß man auch Hasen gefunden haben will, aus deren Stirnknochen ein Paar kleine Geweihe, wie Rehgehörn, gewachsen waren, gehörnte Hasen. Es ist dieß aber vermuthlich ein durch Kunst aufgesetztes Rehgehörn. So waren die wenigstens, welche ich gesehen habe.

s. Gesners Thierbuch S. 173.

Museum regium Hafniae nr. 48. t. IV.

Ich halte diese Hasenhörner nach den bis jetzt bekannten Erfahrungen für Rehhörner, die ausgebälgten Hasen unter der Haut eingesetzt worden sind. Sie haben vielleicht ihren Ursprung bloß einem Späschen zu verdanken.

Weiter giebt es folgende Farbenvarietäten:

d) Der weiße gemeine Hase. L. t. albus.

Entweder schneeweiß oder gelbweiß. v. Wildungen a. a. O. Taf. 1.

e) Der gelbe gemeine Hase. L. t. flavus.

Er ist rothgelb oder erbsgelb.

f) Der

f) Der schwarze gemeine Hase. L. t. niger.

Es ist rußschwarz oder grauschwarz.

Im vorigen Jahre schoß ich auch einen, der vier Ohren zu haben schien. Seine beyden Ohren waren ihm nämlich bis auf den Grund aufgeschlitzt. Ueberhaupt findet man in Hasennestern mancherley monströse Junge, z. B. Doppelhasen, die zusammengewachsen sind u. s. w. Auch machen sich Schäfer und Hirten, die sie jung finden, ein Vergnügen daraus, sie zu verunstalten, schneiden ihnen die Ohren ab u. s. w.

Zergliederung.

Um das leise Hören zu befördern hat der Hase in dem Gange des Ohrs, der in das felsenförmige Bein (os petrosum) führt, noch eine besondere beinerne Röhre, die ihre Richtung hinterwärts, wie ein natürliches Schallloch nimmt, damit auch der geringste und entfernteste Laut zu den Gehörwerkzeugen dringen kann.

Der Magen ist groß und einfach. Der Blinddarm ist ebenfalls sehr groß. Die Leber ist oft eine ordentliche Würmerwelt; und die Blasen, die sich an ihr und andern Theilen befinden, sind keine Hitz- oder Franzosenblattern, wie sie die Jäger nennen, sondern Behältnisse der Blasenbandwürmer.

Die Eingeweide überhaupt sind mit vielerley Arten von Würmern besetzt.

Die Gestalt der Gebärmutter macht, daß man dem Hasen eine Ueberfruchtung zuschreibt. Die Mutter-

scheide und die Mutter selbst gehen in einem fort, und man findet weder Mund noch Hals, sondern die Mutterhörner oder Trompeten haben jedes eine Oeffnung, welche bis in die Mutterscheide geht, und sich bey der Geburt ausdehnt. Diese beyden Hörner stellen also gleichsam zwey Gebärmütter vor, wodurch also der Hase geschickt seyn soll mit der einen zu empfangen und aus der andern zu setzen *).

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Der Hase hat die Augen stets offen und schläft sogar mit ganz oder halb offenen Augen, weil sie seine kurzen, gleichsam abgeschnittenen Augenlieder nicht bedecken können, und ihm die Augenwimpern fehlen. Er sitzt immer auf den Hinterfüßen, welches man ein Männchenmachen nennt, und spielt oft mit sich selbst, mit Feldmäusen, und mit seines Gleichen. Seine längern Hinterfüße verwandeln seinen Gang in ein stetes Hüpfen; und er ist auch aus diesem Grunde schneller, wenn er Berge besteigt, als wenn er herunter läuft.

Seine Stimme ist zur Zeit der Begattung ein dumpfes Murksen, und in der Noth und Todesstunde ein lautes ängstliches Geschrey, wie es die ganz kleinen Kinder hören lassen.

Sein Lebensziel hat er in acht bis zehn Jahren erreicht.

Ver-

*) S Goeze a. a. O. S. 343—348.

Verbreitung und Aufenthalt.

Der Hase bewohnt alle Theile von Europa, die meisten von Asien, Japan, Ceylon, auch in Afrika Aegypten und die Barbarey. Man trifft ihn in Feldern und auf niedern Anhöhen am meisten an.

Von Natur ist er furchtsam und schreckhaft, so daß ihm das geringste Geräusch, das zuweilen Frösche, Eidechsen und Schlangen verursachen, aus seinem Lager vertreiben kann. In Gegenden, wo er sich Sommer und Winter im Felde aufhalten muß, gräbt er daselbst mehrentheils auf die Mittelfurche des Ackers in Gestalt eines länglichen Ovals, so lang als er selbst ist, und so tief, daß sein Rücken noch etwas hervorsieht, und zwar im Sommer in solchen Gegenden, wo er die Nordluft, und im Winter, wo er die Sonne genießen kann, im Winter also nach Süden und im Sommer nach Norden zu. Er liegt darinnen wie ein Knauel, zusammengedrückt, die Vorderfüße dicht am Kopf angezogen, und die Hinterfüße unter den Leib verkürzt, und man hält ihn ohne die gehörige Kenntniß und Uebung für eine Erdscholle. So lange als das Getraide noch auf dem Halm steht, geht er nicht aus demselben, und bis zum Winter bleibt er in den Stoppeln. Alsdann aber sucht er in Gegenden, wo er Wälder und Feldhölzer in der Nähe hat, dieselben zu seinem Aufenthalte auf. Er steht nicht gern Regen, Hagel, Schnee, stürmische und kalte Winde, große Kälte und außerordentliche Hitze aus, und meidet besonders alle Gegenden, wo ihn im Winter die scharfen Ost- und

Nord-

Nordwinde treffen können, und wo er im Sommer der brennenden Sonnenhitze ausgesetzt wäre.

Um in seinem Wohnsitze vor seinen Feinden, besonders den Hunden sicher zu seyn, hat ihn die Natur gelehrt, ihnen die Spur durch Wiedergänge und Absprünge zu verwirren, daß sie ihn weder durch den Geruch noch durch die Verfolgung des Weges, den er genommen hat, finden können. Wenn er nämlich aus dem Felde in das Holz nach seinem Lager zurückkehrt, welches man im Winter sehr deutlich an der Fährte bemerken kann, so geht er in einiger Entfernung in gerader Linie eine ganze Strecke vor seinem Lager vorbey, wendet sich dann auf dem nämlichen Wege wieder zurück, thut, wenn er ein wenig gegangen ist, nach der Seite, wo sein Lager sich befindet, etliche Sprünge, geht wieder etliche Schritte, und springt wieder nach der Seite des Lagers ab, und dieß thut er noch etlichemal, bis er seinem Lager gerade gegenüber kömmt, wo er wiederum etliche Sprünge zur Seite thut, und dann mit einem großen Sprunge sich in dasselbe stürzt.

Wenn man zuweilen durch das Getraide ganzer Fluren schmale, schöne Wege von einem Fuß Breite findet, die die abergläubischen Leute den Bilsenmähern *) zuschrei-

*) Bilsenmäher sollen Hexen seyn, die durch die Flur gehen, mit der Sichel diese Wege schneiden, und das Getraide nach Hause tragen, welches denn ihr Patron der Teufel

schreiben, so sind es Hasenstraßen, die sogenannten Hexenstiege, auf welchen sie ihrer Nahrung und den Geschäfften der Liebe nachgehen.

Nahrung.

Die Hasen nähren sich von Getraide, besonders von Hafer, Kohl, Krautblättern und Krautfrüchten, von Wurzeln, Gras und Heu, und lieben besonders die Pflanzen, deren Saft milchartig ist. Im Winter thun sie der unter dem Schnee verborgenen Saat, welche sie durch Aufscharren entblößen und abfressen, großen Schaden, nagen die Rinde aller jungen Bäume, der Linden- und Erlenbäume ausgenommen, und die Spitzen des jungen Schlagholzes, und besonders des Schwarzdorns ab. Junge Gerstensaat *), Pappelrinde und Laub, Esparsette und Radischen, welche sie aus der Erde graben, sind ihre Lieblingsspeisen. In sehr harten Wintern werden sie von den Jägern mit Heu und Erbsenstroh gefüttert.

Der

Teufel so segnet, daß in den wenigen Garben so viel Körner stecken, als sie das ganze Jahr zur Leibes Nahrung und Nothdurft nöthig haben.

*) Besonders die junge handhohe Saat der vierzeiligen Gerste. Wenn man diese sichern will, so steckt man alle zwanzig Schritt ein Hölzchen, in welches man oben einen Ritz macht, worein ein Läppchen, eingetaucht in Franzosenöhl, gesteckt, und mit einer Eyerschaale gegen den Regen bedeckt wird; dieß erfrischt man nach vierzehn Tagen, so ist man vor Hasen und Rehen sicher.

Der Regel nach gehen sie nur mit einbrechender Nacht ihrer Nahrnng (Aesung) nach; in den längsten Sommertagen aber verlassen sie schon sechs Uhr ihr Lager, und im Winter, wenn zu tiefer Schnee liegt, und ihre Nahrung sparsam ist, gehen sie den ganzen Tag auf die Aesung. Auch die Häsinnen, welche Junge säugen, die sie abzehren, steigen am Mittage auf und befriedigen ihren Hunger ungescheut.

Da diese Thiere ihre Oberlefze stets bewegen, indem sie alles beriechen, so sagt man, aber vielleicht ohne Grund, sie käueten wieder *).

Fortpflanzung.

Die Hasen begatten sich (laufen, rammeln) bey warmem Wetter schon im Jänner und Hornung, im März aber sind sie am hitzigsten. Der Ramler ist zu dieser Zeit flüchtig, schwärmt allenthalben herum, wo es Häsinnen giebt, und spürt ihnen durch seinen guten Geruch auf der Erde, wie die Hunde, nach, wenn er sie verliert. Es folgen einer Häsin bey der ersten Begattung zuweilen drey bis vier Hasen mit einem steten Knurren nach, und kämpfen sehr heftig um sie, indem sie sich auf die Hinterbeine stellen, und mit den Vorderbeinen nach einander schlagen und beißen. Dem Sieger, oder demjenigen, welcher ihr am besten gefällt, ergiebt sie sich, und dieser hält sich denn mehrentheils den ganzen Som-

*) 3 Buch Mos. 11, 5 u. f.

Sommer hindurch allein zu ihr, und begleitet sie während ihrer Schwangerschaft allenthalben hin. Nach 30 oder 31 Tagen setzt sie das erstemal eins bis zwey, dann aber gewöhnlich drey bis vier Junge im Felde, entweder in ein flachgegrabenes und zuweilen mit ihren Haaren ausgefüttertes Nest, oder in einen Misthaufen, und im Walde in Moos zwischen junge Tannen, oder Sträucher, in abgefallenes Laub oder hohes Haidegras. Die Jungen werden mit offenen Augen gebohren. Wenn sie zuweilen fünf Junge zur Welt bringt, so erzieht sie doch meist nicht mehr als drey, und läßt die übrigen umkommen. Sie begattet sich den sechsten Tag, nachdem sie gebohren hat, schon wieder, und säugt die Jungen nur zwanzig Tage, verläßt sie alsdann, und diese müssen sich selbst ihre Nahrung suchen. Wenn sie die Mutter säugen will, so lockt sie dieselben um sich herum, indem sie die langen Löffel zusammenschlägt, welches ein Klappern verursacht.

Das Weibchen läßt das Männchen bis im Julius und länger zu, und kann in einem Jahre, wenn das Frühjahr ohne Schnee und der Sommer trocken ist, sehr viele Junge gebähren, woher die ungemein starke Vermehrung der Hasen entsteht. Der erste Satz geschieht im März; der zweyte im May; der dritte im Julius, und zuweilen ein vierter noch im September.

Man glaubt, daß die Häsin wegen des oben angegebenen sonderbaren Baues ihrer Geburtsglieder überschwän-

schwängert werden könnte, und daraus erklären die Jäger die Mißgeburten, die man nicht selten unter den jungen Hasen im Neste antrifft.

Die Jungen sind an der Stirn meistentheils mit einem weißen sternförmigen Fleck bezeichnet, den sie oft ein ganzes Jahr behalten, und sind ein ganzes Jahr durch auf dem Rücken heller grau, und an den Seiten nicht rostroth, sondern rostgelb. Sie verlassen die Gegend nicht, wo sie gebohren worden sind, leben aber einsam, und jedes macht sich sein besonderes Lager. Man kann sie mit Milch aufziehen, und sich an ihren Trommeln mit den Vorderfüßen, welches eine Art ihrer Vertheidigung ist, wodurch sie sich nicht allein gezähmt Hunden und Katzen, sondern auch in der Freyheit ihren sonstigen Feinden entgegen stellen, und an andern lächerlichen Possen, und ihren Schmeicheleyen vergnügen. Ihr vollkommener Wuchs ist in funfzehn Monaten vollendet, und sie begatten sich noch in demselben Jahre, da sie gebohren sind.

Sie zeugen mit den Kaninchen nach vielen Versuchen keine Bastarten.

Krankheiten.

In der Begattungszeit, und wenn sie zu sehr gehetzt werden, bekommen die Hasen wegen der übermäßigen Hitze an der Lunge, Leber, dem Herzen, Rücken und den Geburtsgliedern zuweilen Blattern, drüsenartige Geschwüre und verhärtete Beulen, die auch unter dem Namen Pocken, Finnen und Franzosen bekannt sind, und ihr Fleisch im Sommer ekelhaft machen.

Sie

Sie müssen sehr wohl von den oben angegebenen Behältern der Blasenwürmer unterschieden werden.

Wenn viele Mehlthaue fallen, bekommen sie die Leberfäule, und im Jahre 1789 fand man fast nicht einen, der nicht eine verdorbene Leber gehabt hätte.

Feinde.

Sie sind der gemeinste Raub der Raubthiere und Raubvögel; Wölfe, Luchse, Füchse, Hunde, Wiesel, Uhue, Habichte und Raben sind ihre Verfolger und Mörder. Die Raben-Krähen stoßen nur auf junge Hasen.

Von den Flöhen haben sie im Sommer viele Plage auszustehen. Auch machen ihnen die Bandwürmer, die Blasenwürmer, die man in der Leber und im Uterus findet, die Trichuriden, und die Zwirn- (Filaria) und Egelwürmer viele Unannehmlichkeiten.

Jagd.

An diesen Thieren machen Jäger und Jagdhunde die ersten Versuche. Der junge Märzhase wird schon als ein Leckergericht im Julius und August auf dem Anstande geschossen; die eigentliche Hasenjagd aber fängt sich in der Mitte des Septembers an, und dauert bis zum Februar, oder bis zu der Zeit, wenn sich der Hase wiederum begattet.

Die Fährte aller vier Füße ist, da er stets, langsam und geschwinde, gallopirt, wie ein Dreyeck gestaltet,

woran die Grundlinie, oder die Seite, wo die beyden Fährten gerade gegeneinander über stehen, dahin weiset, wohin er gelaufen ist, und woran die zwey Spuren, die hinter einander stehen, die Spitze des Dreyecks bilden. Die zwey vordern gegen einander überstehenden Spuren sind aber nicht von den vordern Füßen abgedruckt, sondern von den hintern, und die zwey Vorderfüße machen die Spuren, die nachstehen. Er hebt also, wie die mehresten Thiere, die auf der ganzen Ferse gehen, die zwey Hinterfüße zu gleicher Zeit auf, und schnellt sie über die vordern weg. Je geschwinder er gallopirt, desto weiter stehen die Spuren und umgekehrt. (Taf. XXIII. Fig. 12. a. b.)

Er wird im Herbste im Felde durch Jagdhunde aufgejagt und geschossen. — Man hetzt ihn mit Windhunden, denen er oft durch seine Queersprünge und geschickten Wendungen, entkömmt, und hierbey bemerkt man, daß ihm die Natur den Mangel seiner Vertheidigungswaffen durch seine langen Hinterläufte ersetzt hat, mit welchen er große Sprünge zu machen und besonders bergan sehr schnell zu laufen im Stande ist. Er steht im Laufen oft still, sieht sich aufgerichtet nach seinem Feinde um, und thut beym Stillstehn allzeit mit einem von seinen Hinterfüßen einen Schlag auf die Erde. Packt ihn sein Gegner, so schnickt und schreyt er bloß, ohne andere Gegenwehr.

Man erlegt ihn auf dem Anstande des Abends an Feldhölzern, aus welchen er in der Dämmerung, seine Nahrung im Felde zu suchen, kömmt.

Im

Im Winter wird er vermittelst des Treibjagens im Felde und vermittelst des Klapperjagens im Walde geschossen. Hierbey muß der Jäger in Rücksicht auf die Witterung gewisse Regeln beobachten. Denn da der Hase ein Wetterprophet ist, und schon 24 Stunden vorhero das Wetter fühlt, so wählt er auch darnach seinen Aufenthalt. Wenn es daher am Tage regnet, so findet man ihn auf trocknen und erhabenen Orten, in Steinbrüchen, an Orten, wo es viele hohe Distelbüsche giebt, in kleinen Haiden, und allezeit unter dem Winde; in kalten Nächten, bey Schnee- und Frostwetter hingegen muß man ihn im dicken Gesträuche aufsuchen.

Man fängt ihn auch, wiewohl nicht weidegerecht, in Schlingen, welche aus ausgeglüheten dünnen Drath, wie eine Haarschlinge, gemacht, und in seinen gewöhnlichen Gang, wo er durch eine Hecke oder unter einen Busch wegkriechen muß aufgestellt werden. In seinem Lager erschießt man ihn, indem man ihn umgeht. Es geschieht dieß, wenn man, bey seiner Erblickung im Lager, so lange immer engere Kreise gehend um ihn beschreibt, bis man ihm so nahe kommt, daß er erlegt werden kann. Er wird dadurch, da er den Jäger immer auf allen Seiten sieht und wittert, so verwirrt, daß er nicht weiß, an welchem Ende er entfliehen soll, und also liegen bleibt.

Er wird auch in Hasennetze getrieben, und wo er selten ist eingelappt. — Bey großem Schnee kann man ihn mit abgekochtem Kohl, den er sehr weit riecht, hinlocken, wohin man will.

An der Nase und hinter den Ohren ist er am empfindlichsten, und er kann an diesen Orten durch einen leichten Schlag getödtet werden.

Nutzen.

Das Fleisch (Wildpret) des jungen Hasen ist zart, leicht verdaulich und nahrhaft, und auch der alte Hase giebt gute Braten und Gerichte. Will man das Alter eines Hasen erkennen, so zieht man ihn die Ohren von einander; giebt das Fell nach, so ist er jung, hält es aber fest, so ist er alt; eben so sind die Glieder eines alten Hasen an den Vorderfüßen größer und stärker als an einem Jungen. Auch an der Farbe ist er zu unterscheiden.

In Rußland ißt man das Fleisch nicht, und die Hasen werden nur der Felle halber getödtet. Man schätzt, daß jährlich in Rußland überhaupt mehr als eine halbe Million Hasen gefangen werden, welche dem Reiche 50000 Rubel einbringen.

Der Winterbalg kann gefärbt werden, und dient zu allerhand Pelzwerk.

Aus den Haaren werden schöne Hüte, und gesponnen — Beinkleider, Handschuhe, Mützen, Strümpfe und Zeuge verfertigt. Die Bälge stehen dahero jetzt in einem sehr hohen Preise, und unsere Hutmacher bezahlen das Pfund Haare mit einem Ducaten. In Böhmen werden die schönsten Hüte aus Hasenhaaren gemacht, wozu jährlich 40000 Hasenbälge verbraucht werden.

den. Jedes böhmische Cammerguth lieferte sonst jährlich 1300 bis 1400 Stück; wovon das Hundert 20 bis 24 Gulden kostete.

Die Bälge werden für gut befunden, wenn sie an diejenigen Theile des Körpers angelegt werden, wo Flüsse sind, und verhindern auch das Wundliegen in langwierigen Krankheiten als Unterlagen.

Auch die Flöhe ziehen sich nach dem Hasenfelle gar gerne. Dieß weiß man in Dalerne in Schweden, wo es sehr viele Flöhe geben soll, sehr gut zu benutzen, um sie auf eine leichte Art zu fangen. Man bindet nämlich ein Stückchen Hasenfell auf die Brust, die Flöhe ziehen sich den Tag über vom ganzen Körper dahin, und des Abends sucht man beym Schlafengehen das Stückchen Fell ab.

Die abgehaarten Hasenfelle nutzt der Beutler, Schuhmacher, Siebmacher und Leimkocher.

Die Abgänge bey den Gerbern und Hutmachern geben einen guten Dünger.

Die Hinterfüße gebrauchen die Goldschmiede zu Glättung des Silbers, die Buchbinder um das Leder mit der Beize und dem Eyweiß zu überstreichen, die Physiker, wie den Fuchsschwanz, um den Elektropher damit zu reiben, und jedermann als einen kleinen Besen, um Kleinigkeiten damit abzukehren.

Den Hasensprung, das lange zugespitzte, oben mit einem Wirbel versehene Knöchelchen aus den Hinterfüßen braucht man zu einem Pfeifenräumer, als Ahle u. s. w.

Man bediente sich sonst aller Theile von Hasen in der Medicin, und noch jetzo erkennt man das Blut (den Schweiß) als ein wirksames Mittel bey den Blutflüssen der Frauenzimmer. Es wird ein reines Stück Leinewand in das frische Blut getaucht, und getrocknet, alsdann ein Stückchen, wie ein halber Laubthaler groß, in ein Glas weißen Wein gethan, und wenn es den Wein roth gefärbt hat, so wird er getrunken.

Das Fett braucht man um Schwären und Geschwüre zu erweichen und auffressen zu lassen, und zur Vertreibung großer Geschwulste.

Die Perser, bey denen noch viele Theile vom Hasen als Arzeney gebraucht werden, glauben, ein Narr bekäme durch den Genuß der Hasenleber und des Hasenfleisches seinen Verstand wieder.

Schaden und Mittel dagegen.

Der Hase schadet der jungen Saat, dem reifen Getraide, den Kohlfeldern, und den jungen Bäumen, deren Schale er abnaget. Wenn man um die Pflanzschulen herum Reife einsteckt, deren untere Seite alle 14 Tage mit Schweinefett und Schießpulver bestrichen wird, so werden sie da, wo sie nicht eine lange ruhige Hegung genießen, verscheucht.

Irr-

Irthümer und Vorurtheile.

Von den sogenannten Franzosen, von den Bilsenmähern und vom Wiederkäuen ist schon oben geredet worden.

Die Haare unter blutstillende Salben gemischt, hemmen alle Arten von Blutflüssen.

Den Hasensprung zu Pulver gestoßen und eingenommen dient wieder die Kolik, den Stein und das Seitenstechen. Wenn man ihn in den Trinkeymer der Pferde wirft, so verfangen sich diese nicht bey der größten Erhitzung.

Hasenblut über die Haut gestrichen, vertreibt die Sommerflecken und stillt getrocknet und pulverisirt den Durchlauf; warm in ein Tuch aufgelegt hilft für die Rose.

Mit dem Gehirne das Zahnfleisch der Kinder bestrichen befördert den Durchbruch der Zähne; dient wider das Zittern der Glieder, und mit Wein vermischt, hilft es denen, die das Wasser nicht halten können.

Kopf, Augen, Herz, Lunge, Leber, Galle, Nieren, Geilen, Uterus, Koth, Haare, Laab und der ganze zu Pulver getrocknete Hase wurden sonst in der Medicin als heilsam gebraucht.

Es ist eine alte Jägerbehauptung, daß es viel Zwitter unter den Hasen gebe, daß die Ramler zuweilen setzten,

ten, und daß es Setzhasen gebe, welche rammelten, ja daß sie sogar das Geschlecht veränderten. Die Ursach davon liegt darin, daß die Ramler in der Jugend keine sichtbaren Testikeln haben, die Schaam von beyden Geschlechtern fast nicht sichtbar, und die Eichel der weiblichen Ruthe so stark, als die der männlichen ist *).

56. Der veränderliche Hase.

(Taf. XVI. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Weiße Hase, Alpenhase, nördlicher Hase, Steinhase, Sandhase, weißer Steinhase, Berghase, Schweizerischer Berghase.

Lepus variabilis. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 161. n. 6.

Pallas novae Quadr. spec. e Glir. ordine. T. I. T. IV. f. 1.

Varying Hare. *Pennant* hist. of Quadr. II. 100. t. 69. f. 1. Meine Ueberf. II. p. 422.

v. Schre-

*) s. v. Heppe wohlredender Jäger. S. 158. Dieser will sogar einen Hasen gesehen haben, der ein starker Ramler war, auf dem Kopfe zwey feste Hörnchen zwischen den Löffeln stehen, und beym Auswerfen 4 junge Hasen in sich hatte, die in 8 Tagen gesetzt werden mußten.

v. Schrebers Säugeth. IV. 885. Taf. 235. B.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 335.

Donndorfs zool. Beytr. I. 543. n. 6.

Jetze von den weißen Hasen in Liefland. Lübeck, 1749.

Büffons vierf. Thiere von Martini. III. 166.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren sind kürzer als der Kopf und an den Spitzen schwarz; die Farbe ist veränderlich, im Winter ganz weiß; der Schwanz kurz und im Winter flockig.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Einige Naturforscher halten diesen Hasen für eine Varietät des Climas vom gemeinen Hasen, allein nicht nur die so sehr verschiedene Gestalt, die kürzern Ohren, kürzern und dünnern Gliedmaßen, und der kürzere, aus weniger Wirbeln bestehende Schwanz, sondern auch der Umstand, daß man ihn mit dem gemeinen Hasen zusammen in einer Gegend antrifft, setzen es außer Zweifel, daß er eine besondere Art ausmacht. Denn beyde Hasen sind in Sibirien, an den Ufern der Wolga und in der Stadthalterschaft Orenburg gemein. Der eine ändert seine Farbe nie, der andere aber wird allezeit im Winter schneeweiß; und diese Veränderung geht nur bloß in freyer Luft und im Stande der Freyheit

sich, sondern auch wenn er zahm ist und sich im Winter in geheizten Stuben oder andern Behältnissen aufhält.

Einige geben seine Länge um zwey Zoll größer, andere um zwey Zoll geringer an *); welches vielleicht keinen andern Grund als bey unsern Hasen auch hat, wo man größere und kleinere antrifft; gewöhnlich sagt man, er stehe in der Größe zwischen dem gemeinen Hasen und dem Kaninchen mitten inne; das Gewicht soll siebenthalb Pfund und drüber betragen.

Das weiche feine Haar ist im Sommer grau, etwas schwarz und gelbbraun gemischt; der Kopf röthlichgrau; der Nacken braungrau; die Ohren an den Rändern und Spitzen schwarz; die Seiten nach und nach weißgrau; der Bauch grauweiß; der Schwanz ganz weiß, sogar im Sommer; die Füße sehr dicht und warm gefuttert. Im Winter wird das Thier schneeweiß, ausgenommen an den Rändern und Spitzen der Ohren die schwarz bleiben. In Sibirien sind dann auch die Fußsohlen gelb und noch einmal so dicht gefüttert. Der Anzug des Winterkleides geht im September vor sich, und des Sommerkleids im April. Doch bleibt er in Grönland das ganze Jahr hindurch weiß, und in Lappland ist er nur die zwey heißesten Sommermonate falb, übrigens weiß, so daß sich der Farbenwechsel nach dem verschiedenem Clima richtet, und entweder ein Kleid länger oder kürzer getragen wird.

Varie-

*) Par. Ms.: Länge 1 Fuß 6 Zoll oder 1 Fuß 10 Zoll.

Varietäten.

a) Der schwarze veränderliche Hase. L. v. niger.

Glänzend schwarz oder auch blaß dunkelbraun. In Sibirien. Er ändert seine Farbe im Winter nicht. Vielleicht gar eine Varietät vom gemeinen.

b) Der graue veränderliche Hase oder Russak. L. v. hybridus.

Er hält das Mittel zwischen dem gemeinen und veränderlichen Hasen, und verliert nur im Winter zum Theil seine Sommerfarbe, denn nur die Seiten und äußern Theile der Ohren und Beine werden weiß und die andern Theile behalten ihre Hasenfarbe. Man trifft diese Rasse in den südlichen und westlichen Provinzen von Rußland an. Die Russen fangen sie in Menge in Schlingen und schicken ihre Bälge nach England und in andere Gegenden in Hutfabriken.

So schnell als der gemeine Hase kann der veränderliche nicht laufen, und er sucht gleich Zuflucht in Felsenklüften, wenn er verfolgt wird. Das Auffallendste in seinen Sitten ist, daß er gesellschaftlich und zwar in Heerden beysammen lebt.

Man kann ihn leicht zähmen, und dann ist er sehr kurzweilig, genießt aus dem Pflanzenreiche was man ihm vorhält, auch Brod und Käse, liebt den Honig, und frißt vor Ankunft eines Sturms seinen eigenen Mist.

Verbreitung und Aufenthalt.

Dieser Hase bewohnt die kältesten und gewöhnlich auch die höchsten Gegenden von Europa, Asien und Amerika, Norwegen, Lappland, Rußland, Island, Sibirien, Kamtschaka, die Ufer der Wolga und Hudsonsbay, Canada, Neuseeland, die Schottischen, Schweizerischen, Tyrolischen und Salzburgischen Alpen.

In Sibirien verlassen sie die hohen Gebirge, welche die südliche Gränze des Landes ausmachen, versammlen sich in unzählbare Heere, und ziehen in fruchtbaren Ebenen und waldige nördlichen Gegenden. Neben der Tungueska hat man nämlich Heerden von 4 bis 600 Stück schneeweiße Hasen angetroffen, die sich in wandernden Zustande befanden; alle Frühjahr ziehen sie in noch größern Heerden gegen Süden, und wenn die Tungueska zugefroren ist, so wandern sie zurück gegen Norden.

Von den Deutschen veränderlichen Hasen weiß man weder, daß sie in Gesellschaft beysammen leben, noch daß sie wandern. Die Geschichte dieser Thiere, die den Augen der Deutschen Naturforscher so sehr entrückt sind, ist überhaupt noch nicht so vollständig, als man sie wohl wünschen möchte.

Nahrung.

Davon ist ebenfalls noch wenig bekannt. Sie besteht aus Alpengräsern und Kräutern; in Grönland

von

von dem daselbst wachsenden weißen Mooße; im Winter fast allenthalben von Birkenknospen u. s. f.

Fortpflanzung.

Man sagt, sie setzten des Jahrs nur einmal zwey Junge.

Jagd.

In Deutschland schießt man sie auf dem Anstande und wenn man sie sonst bey gutem Balge im Herbst und Winter antrifft.

In andern Gegenden schießt und fängt man sie auf verschiedene Weise. In Lappland werden sie in auf der Erde ausgespannten Netzen gefangen, indem sie sich, wenn sie in den Gebüschen herumstreifen, darin verwickeln.

Nutzen.

Das Fleisch ist unschmackhaft, besonders im Winterbalge; doch essen es die Grönländer gekocht, und das im Magen befindliche Futter roh. Ihr Unrath giebt ihnen Dächte für die Lampen, und der weiche warme Pelz Kleider für ihre Kinder.

Die weißen Winterbälge sind wie bekannt, auch in unsern Gegenden eins der besten Pelzwerke, mit welchen die Russen allenthalben hin, selbst nach China großen Handel treiben. Man macht Säcke aus Hasenbäu-

bäuchen und Rücken, dergleichen auch aus den grauen Fellen, aus den gegerbten weißen Hasenohren mit schwarzen Spitzen, welche dem Hermelin ähneln. Sie werden vorzüglich zu Gebrämen benutzt, und die grauen zu Hüthen.

(40) 57. Das Kaninchen.

Lepus Cuniculus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 163. n. 2.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren sind meist unbehaart; der Schwanz mit dem Körper gleichfarbig; die Hinterfüße kürzer, als der Rumpf.

Beschreibung.

Das Kaninchen, welches dem Hasen an Gestalt und Betragen sehr ähnlich ist, unterscheidet sich von demselben vorzüglich dadurch, daß es kleiner ist, sehr dünnbehaarte Ohren, und kürzere Hinterfüße hat. Bey der Zergliederung findet man an den Hinterfüßen bey der Krümme des Schenkels einen starken Muskel, der den Hasen fehlt, und womit vermuthlich das Klatschen oder Niederschlagen auf den Boden, wenn es böse wird, oder in Gefahr ist, bewerkstelliget wird. Es scheint auch aus Bedürfniß mit mehr Naturtrieben begabt zu seyn, als

der

der Hase, indem es zu seiner Bequemlichkeit und Sicherheit tiefe Höhlen in die Erde zu graben pflegt. Es hat eben das Gebiß, eben die Gestalt des Kopfs, Lage der Augen und Ohren, (doch sind letztere mehr vorwärts gelegt) eben den kurzen Schwanz und die behaarten Fußsohlen, aber der Körper ist mit sanftern und nicht so langen Stachelhaaren besetzt. Es bedient sich eben der Nahrungsmitteln, wie der Hase, vermehrt sich aber stärker. Die Länge des Körpers beträgt ohngefähr einen Fuß sieben Zoll, des Schwanzes drittehalb Zoll*), und die Höhe siebenhalb Zoll, und das Weibchen ist allzeit etwas größer und stärker als das Männchen.

Wir kennen in Thüringen das zahme und wilde Kaninchen. Es machen beyde nur eine Art aus, welche jetzt die zwey verschiedenn Rassen bey uns gebildet haben. Das einfarbige wilde Kaninchen ist der Stammvater und durch die Zähmung ist das vielfarbige zahme entstanden, indem sich durch die Nahrung, die eingeschränkte Lebensart und den Auffenthalt, wie bey allen zahmen Thieren, die Farbe verändert hat. Mit den Hasen, mit denen diese Thiere doch so nahe verwandt, und die ihnen sogar ähnlich sind, begatten sie sich nach vielfältig angestellten Versuchen nicht, geschweige denn mit den Katzen, wie man vorgegeben hat. Nur in Gefahr lassen sie eine hellkreischende Stimme hören. Sie werden zehn Jahr alt.

Das

*) Par. Ms. Körper 1 Fuß 5 Zoll; Schwanz 2 Zoll.

A) Das wilde Kaninchen.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Lällen, Kanickel, Murtchen, Kaninchenhase, und das Männchen Ramler und Bock.

Lepus Cuniculus. *Gmelin Lin.* l. c.

Lepin sauvage. *Buffon* hist. nat. VI. 303. T. 50. 51. Ed. de Deuxp. II. T. 4. f. 2. Ueberf. v. Martini III. 206. Taf. 52.

Rabbet. *Pennant* hist. of Quadr. II. 103. Meine Ueberf. II. p. 425.

v. Schrebers Säugeth. IV, 891. T. 236. A.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I, 214.

v. Mellins Anweisung zu Anleg. d. Wildbah. 188. m. e. Fig.

Goeze's Europ. Fauna. II. 366.

Donndorfs zool. Beytr. I. 548. n. 2.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Das wilde Kaninchen, das aus den gemäßigten und warmen Strichen von Europa und in den wärmern Theilen von Asien lebt. Von Spanien soll es nach Ita-

Italien und Frankreich und von da nach Deutschland gekommen seyn, wo es sich in manchen Gegenden noch häufig findet. In Südamerika hat es sich, von Europa dahin gebracht, ganz außerordentlich vermehrt. In den Gegenden unsers Thüringens wird es nur da angetroffen, wo es nicht ausgerottet worden ist. Es bewohnet nur einige kahle Untergebürge des Thüringerwaldes und die gebirgigen Gegenden um Jena und Erfurt herum, ob es gleich sonst in Deutschland nicht selten ist.

Seine Unterscheidungszeichen von dem zahmen sind diese, daß es schwarze Ohrspitzen hat, kleiner und schlanker und von Farbe gewöhnlich röthlichgrau ist. Da nämlich die wollige Unterlage der Haare schmutzig weiß ist, und die steifen darzwischen stehenden Haare röthlich, schwarz und weiß gefleckt sind, so giebt diese Zusammensetzung eben diese röthlichgraue Farbe.

Der Augenstern ist nicht roth, sondern graulich.

Kältere Gegenden als unser Deutschland kann es in der freyen Luft nicht aushalten, und unterscheidet sich also darin von dem Hasen, welcher auch unter rauhem Himmelsstriche ausdauern kann.

Aufenthalt.

Diese Kaninchen halten sich in Gesellschaft zusammen, und graben sich mit ihren weißen langen scharfen Nägeln an den Zehen der Vorderfüße tiefe, winklich, wie

ein Ellenbogen, laufende Höhlen (Baue) mit verschiedenen Ausgängen (Röhren) in felsigen, am liebsten aber in sandigen Boden *), und jedes Paar, da sie in Monogamie leben, bewohnt seine eigene Wohnung, und macht sich dieselbe so bequem als möglich. In derselben befindet sich allezeit am Ende eine Kammer, deren Eingang so enge ist, daß ihnen der Fuchs, ihr Erbfeind, nicht nachkriechen kann, obgleich die vordern Röhren, durch das häufige Ein- und Ausgehen oft weit genug sind, daß er durch dieselben schlüpfen kann. In einem solchen Baue gräbt sich auch das Weibchen eine eigene geräumige Kammer, wo es seine Jungen gebiert (setzt). Wenn sie ausgehen, so bedecken sie oft die Röhren mit Sand, daß ihre Wohnungen nicht entdeckt werden sollen; und wenn sie an einem Orte Gefahr merken, so verlassen sie denselben; und wenn eine Familie auszuwandern anfängt, so folgen die andern alle nach.

Nahrung.

Die Nahrungsmittel sind die nämlichen, die der Hase zu seiner Sättigung bedarf. Sie fressen (äsen) Laub, Gras, Kräuter, Kohl, grünes und reifes Getraide und Rüben von aller Art, denen sie nachgraben. Im Winter scharren sie die grüne Saat auf, müssen aber auch bey hohem Schnee und starken Frost mit Knospen von Gesträuchen, mit der Schale des jungen Holzes und mit verdorrtem Grase vorlieb nehmen.

Fort-

*) Daher sie in großer Anzahl auf den sandigen Hügeln der Meeresufer, wie in Holland, gefunden werden.

Fortpflanzung.

Die Mutter wird, wie die Häsin, im Hornung oder März von dem Vater befruchtet (sie rammelt), geht vier Wochen tragend, und bringt alsdann auf einem Bette, welches sie sich von Grashalmen, und ihren eigenen ausgerupften Haaren bereitet hat, vier bis acht Junge zur Welt. Diese bleiben neun Tage blind und vierzehn Tage in ihrer Höhle; nach welcher Zeit sie mit der Mutter auslaufen, und ihre Nahrung zu suchen anfangen. Noch in den ersten vierzehn Tagen nach der Geburt wird die Mutter wiederum beschwängert, und läßt sich also nicht überschwängern, wie man von der Häsin glaubt, ob sie gleich eine eben so gestaltete Mutter hat, wie jene. Sie vermehrt sich mehrentheils viermal des Jahrs, wenn sie die eintretende kalte und feuchte Witterung nicht daran hindert. In England soll sie sich, wie Pennant sagt, 7mal des Jahrs fortpflanzen. Da sie ihre Kinder sehr sorgfältig ernähret und beschützet, sie nicht früher als vier Wochen, wo sie ausdauern können, sich selbst überläßt, so ist sie im Stande in einigen Jahren eine Bevölkerung von etlichen Tausenden zu bewerkstelligen. Da in warmen Ländern ihre Vermehrung weit stärker ist, als in andern, und sie sich also des Jahrs siebenmal mit acht Jungen vermehren, und diese sich schon in fünften Monate wieder fortzupflanzen geschickt sind, so kann ein einziges Paar in vier Jahren eine Population von 1274,840 Kaninchen hervorbringen. Man siehet daher auch oft in Deutschland mit großem Nachheil, da jedes Paar zu seinem Aufenthalte sich seine eigene Wohnung mit vielen Aus-

und Eingängen aushöhlt, daß sich eine Kolonie von vier bis sechs Stücken, denen man ein kleines Gebiet anwieß, in etlichen Jahren durch ihr beständiges Fortwühlen meilenweit ausgebreitet hat, und ihre Vermehrung alsdann nur mit Mühe durch die Jagd in engere Gränzen eingeschränkt werden kann.

Die Jungen sind schon im achten Monate zur Fortpflanzung tüchtig und im zwölften völlig auswachsen.

Feinde.

Die Füchse, Marder, Iltisse, Dachse, Wieseln, Kolkraben, Rabenkrähen, Nebelkrähen, und Raubvögel sind ihre Feinde, und schränken ihre Vermehrung an manchen Orten sehr ein.

Gelbe Milben und zwar oft in Menge finden sich auf ihrem Balge. In den Eingeweiden findet sich eine Art lanzetförmiger Bandwürmer.

Wenn sich ein Fuchs in eine Höhle dränget, und Zeit hat, den Eingang zur letzten Kammer zu erweitern, so ist die ganze Familie ohne Rettung verlohren.

Diese oder eine ähnliche drohende Gefahr geben sie sich einander durch das Aufschlagen mit den Hinterfüßen zu erkennen, auf welches Zeichen, die in der Nähe sich befindenden sogleich die Flucht ergreifen.

Jagd.

Ihre Fährte ist der Hasenfährte ähnlich, nur kleiner. Ob sie gleich nicht die Flüchtigkeit des Hasens haben,

ben, so machen sie doch allerhand krumme Sprünge, um ihren Verfolger, den Hund zu verwirren, und seiner Mordsucht zu entgehen. Wegen ihres feinen Gehörs und Geruchs (Witterung) kann man ihnen mit der Flinte nicht leicht beykommen, indem sie gleich nach ihrer Grube fahren; allein sie werden durch kleine Dachshunde und besonders durch Frettchen, die man dazu aufzieht und abrichtet, aus derselben herausgeholet. Das Frettiren ist eine Hauptjagd bey diesen Thieren. Man umstellt nämlich mit dem Hasengarne die Gegend des Baues, oder bedeckt mit einem, wie ein Sack gestalteten, Netze (Haube) eine Oeffnung der Grube, läßt das Frettchen mit einer kleinen Schelle am Halsbande, und mit durch ein Kettchen verschlossenem Munde zur Verhütung der Mordsucht, hinein, und verstopft die übrigen Gänge, und die Kaninchen flüchten gleich, wenn sie ihren Feind durch ihr Gehör, oder ihren guten Geruch bemerken, heraus, rennen in das aufgestellte Garn, und man schießt oder schlägt sie in demselben todt, oder fängt sie lebendig. Eben so verfährt man auch bey der Jagd mit dem Dachshunde, wo die Höhlen weit genug sind.

Sie werden auch in eisernen Fallen und Schlingen, die man vor ihre Wohnungen legt, gefangen.

Man giebt auch noch eine sonderbare Art, sich ihrer zu bemächtigen, an. Man soll nämlich in jede Höhle einen großen Krebs stecken und den Eingang mit obigem Netze belegen. Der Krebs, sagt man, schlich sich

in das Wohnzimmer der Kaninchen, kneipe sie, sie flöhen vor dem unbekannten Gast und würden in den vorgelegten Netzen gefangen.

Nutzen.

Ihr Fleisch, (Wildpret) das süß, wie Hühnerfleisch schmeckt, wird als gut gegessen, und giebt, da sie bey guter Nahrung fetter als die Hasen werden, trocken keine gute Braten, aber mit saurer Brühe ein desto besser Essen.

Ihr Balg wird als Pelzwerk besonders zu Unterfutter, da er eine längere Dauer, als der Fuchsbalg hat, verbraucht. Die Haare geben feine Hüte und mit Seide versetzt, schöne Strümpfe und Handschuhe. (s. weiter Nutzen des zahmen Kaninchens.)

Schaden.

Sie richten in fruchtbaren Feldern nicht nur durch ihr Wühlen, sondern auch durch Aufsuchung ihrer Nahrung, wo sie häufig sind, großen Schaden an, und werden daher an manchen Orten, wo man ihre Vermehrung nicht einschränkt, für den Landmann eine wahre Plage. Auch in Weinbergen werden sie auf diese Art schädlich. Es ist deshalb in solchen Gegenden auf ihre Verminderung, wo man ihre Ohren einliefert, apartes Schießgeld, wie für Raubzeug gesetzt.

In ältern Zeiten waren sie auf den Balearischen Inseln Majorka und Minorka so zahlreich geworden,

den, daß sich die Einwohner genöhigt sahen, eine Gesandschaft an den Kaiser August zu schicken, um ihn durch militarische Hülfe gegen diese lästigen Creaturen beyzustehen.

Da sich einmal in Frankreich die Kaninchen ganz ungeheuer vermehrt hatten, so fiel man darauf zu berechnen, daß ein Kaninchen, daß ohngefähr auf 12 Sous zu schätzen sey, durch den Schaden, den man an Wühlen und Aesung auf den Feldern und in Weingärten erlitte, wenigstens 1 Louisd'Or zur Unterhaltung koste, und daß sie den Besitzern einträglicher Grundstücke noch theurer kämen. Der Prinz von Conde' ließ sie also in seiner Provinz alle ausrotten, denn er hatte berechnet, daß die Menge dieser Thiere die Einkünfte seiner Ländereyen um die Hälfte vermindert hatte. Krünitz ökon. Encyclopädie. XXIV. 154.

Vorurtheile.

Durch das Gehirn eines Kaninchens verliert man das Gedächtniß und mit dem Fette verrichtet man Wunderkuren.

Einige haben sogar die Bälge für das aus Rußland kommende Grauwerk oder Vehbam gehalten.

B) Das zahme Kaninchen.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Kaninchen, zahme Hasen, Stallhasen, Kanickelchen, Kanützchen, Karnützchen, Lullen und Hasenkühlein.

Lepus Cuniculus domesticus. *Gmelin Lin.* l. c. β

Lepin domestique. *Buffon* l. c. Taf. 51. 52. Ed. de Deuxp. l. c. f. 4. Martini a. a. O. Taf. 53. 54.

v. Schrebers Säugeth. a. a. O. Taf. 236. B. u. s. w.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die zahmen Kaninchen sind ein wenig größer als die wilden, sonst haben sie beynahe eben dieselben Eigenschaften und Merkmale.

Man findet sie von allen Farben. Es giebt weiße, gelbe, rothe, braune, schwarze, graue, blaue, aschfarbene, schimmelfarbene, und mit allen diesen Farben verschieden gefleckte. Die Augen der hellfarbenen sind blutroth, und die der dunkelfarbenen bald grau, bald gelb, bald braun, bald blau *), die bunten aber, die aus der Ver-

*) Das silberfarbene Kaninchen (L. C. argenteus) welches man zu einer ganz besondern Varietät macht, und wel-

Vermischung von hell- und dunkelfarbenen Eltern abstammen, haben Augen bald von dem Vater bald von der Mutter. Sie sind mit einer Nickhaut versehen. Ihre dünnen Ohren sind auf der inwendigen Seite beynahe ganz kahl, und auf der auswärtigen mit kurzen sanften Haaren besetzt.

Sie werden gewöhnlich zum Vergnügen gehalten, weil sie wunderliche Sprünge machen, oft auf den Hinterfüßen gehen, mit den Vorderfüßen mit ihren Gesellschaftern, sonderlich, wenn sie noch jung sind, spielen, sich mit diesen Füßen, wie die Katzen putzen, als Männchen und Weibchen sehr zärtlich mit einander umgehen, und sonst artige, ja auch nützliche Thierchen sind. Sie werden so zahm, daß sie auf einem gewissen Ruf oder Pfiff aus ihren Höhlen hervorkommen, ihr Futter aus den Händen bekannter Personen nehmen, und sich vor ihnen kauern und streicheln lassen. Doch kratzen und beißen sie auch, ohngeachtet ihrer Zahmheit, bey Beleidigungen heftig.

Aufenthalt.

Man weiset ihnen gewöhnlich ihren Aufenthalt in den Ställen bey dem Rindvieh, den Pferden, Ziegen und Schafen an, damit sie sich von dem Ueberfluß dieser Thiere, und von dem Futter, daß diese umkommen

welches blaulich grau ist, wird in Thüringen sehr häufig gefunden. Allein es zeichnet sich durch nichts besonders aus. Le Riche. Buffon l. c. t. 52. u. f. f.

lassen, ernähren mögen. Allein hier muß die gehörige Vorsicht gebraucht werden, daß sie nicht zur Krippe und Raufe kommen können, welches sie immer durch ihr Klettern, wenn sie nur irgendwo mit ihren scharfen Krallen einhäckeln können, und durch ihr Springen, möglich zu machen suchen. Sie verunreinigen dann das Futter der Thiere nicht allein mit ihrem Unrathe, sondern auch mit ihren Haaren. Dieß verursacht oft unerklärbare Krankheiten, ja selbst den Tod des Viehes. Auch richten sie durch ihr Graben an solchen Orten allerhand verdrüßliche Unordnungen an. Es ist daher allerdings rathsam, um diese schädlichen Folgen zu vermeiden, die Kaninchen aus den Viehställen zu verbannen. Man giebt ihnen lieber gut ausgeschälte leere Schweinskoben, oder andere ausgemauerte oder ausgepflasterte leere Ställe ein, panzt zwey Fuß hoch Stroh in dieselben, und verfertigt ihnen hölzerne schmale, röhrenförmige Behältnisse mit einzelnen Zwischenbretern und Eingängen, die den Löchern der Taubenschläge ähneln, besetzt damit alle Wände der Ställe, und verstattet ihnen so ihren Trieben gemäß zu leben, weil sie es dann ohne Schaden thun können.

Die Reichen bauen auch in ihren Thiergärten Kaninchenberge, die sie mit Mauern oder Wasser umgeben, in welchen sie so wie die wilden, Sommer und Winter in selbstgebauten Höhlen wohnen und sich fortpflanzen.

Nahrung.

Sie begnügen sich mit allerhand Gras, Laub, Heu und Spreu, und die Blätter des Kopfskraut und seine Strün-

Strünke, Kohl und alle Arten von Rüben lieben sie vorzüglich. Mit Hafer gemästet werden sie sehr fett.

Fortpflanzung.

In einem engen Stalle bedarf man zu sechs bis acht Weibchen nur eines Männchens (Ramlers), welches sie alle gehörig befruchten kann. Seine Eifersucht wird auch nicht mehrere Nebenbuhler leiden, wenn sie ihm nicht an Alter und Stärke ganz gleich sind; denn ein jüngeres und schwächeres männliches Kaninchen findet hier fast allezeit seinen Tod; wobey diese merkwürdige Grausamkeit sich äußert, daß der Mörder seine Nebenbuhler zuerst nach den Hoden beißet, und ihm dieselbe abzureißen sucht *). Auch die Weibchen werden zornig und beißen nach ihren Gesellschafterinnen, wenn sie sich vor ihren Augen mit dem gemeinschaftlichen Männchen begatten wollen. Das Weibchen trägt dreißig Tage, und gebiert in einem besonders dazu verfertigten und mit allerhand weichen Materialien, die es in dem Munde herbey trägt, und mit seinen Haaren ausgefüttertem Loche vier bis eilf Junge **), welche neun Tage blind sind, und erst nach vierzehn Tagen hervor gehen. Es säuget sie sechszehn bis ein und zwanzig Tage und verstopft, wenn es dieselben, um seine Nahrung zu suchen, verlassen muß, sorgfältig den Eingang vor seinem Gatten und Schwestern, welchen oft die Lust ankömmt, sie zu verzehren.

Die

*) Eine Bemerkung, die ich selbst oft gemacht habe.

**) Im Jahr 1794 hatte ich ein weißes Weibchen, das zweymal 11 Junge hinter einander warf, die auch alle aufkamen.

Die Mutter läßt sich in den ersten acht Tagen wieder belegen, und heckt sechs bis siebenmal des Jahres im Sommer, und im Winter, wenn der Stall warm ist.

Im siebenten Monate sind die Jungen schon mannbar, und zur Fortpflanzung ihres Gleichen geschickt.

Krankheiten.

Die jungen Kaninchen bekommen von allzufetten, und durch Thau beschädigten Grase oft den Durchfall, welcher, wenn er nicht durch gutes Heu und Hafer, unter welchen man gestoßenes Malz mischt, gehemmet wird, in die Ruhr ausartet, wodurch die ganze Gesellschaft angesteckt wird und zu Grunde gehet. Sie bekommen auch die Raude oder Krätze, die man ihnen durch Einreibung ungesalzener Butter oft heilen kann.

Feinde.

Die Hunde, Katzen, Marder, Iltisse, Wiesel und Ratten sind vorzüglich Feinde der jungen Kaninchen, und die Bandwürmer sind ihnen beschwerlich.

Nutzen.

Das Fleisch der mit Hafer gemästeten Kaninchen ist schmackhaft, und eine Delikatesse, wenn man sie vorhero verschneidet und dann gehörig zurichtet.

Die Bälge der weißen, blauen und schwarzen sind ein gutes Pelzwerk, und werden zu Mützengebrämen, Aufschlägen, Fußdecken, Bettdecken, Müffen und Pelzen ge-

gebraucht, und der bunten ihre werden mehrentheils schwarz gefärbt, oder ihre Haare werden vom Huthmacher zu guten Hüten, und in Fabriken zu Strümpfen und Zeuchen verarbeitet. Die schönsten und mehrsten Felle kommen aus England, Moskau, Pohlen und Flandern; und unter den englischen werden besonders die schwarzen hochgeschätzt. Unsere Hutmacher bezahlen das Pfund Haare für 3 Rthlr. 8 Gr.

Ihr Mist düngt auch so gut als Ziegenmist.

Man hat ohnlängst den jährlichen Gewinn von einem Morgen des dürrsten Sandlandes, zu einem Kaninchenberge benutzt, auf 800 bis 1000 Rthlr. berechnet; welches aber gewiß sehr übertrieben ist.

Man kann die zahmen Kaninchen zu wilden umschaffen, wenn man sie in der Wildniß ansetzt, oder wenn sie sich selbst aus den Dörfern, die in gebirgigen Gegenden liegen, entfernen, und fortpflanzen. Die Jungen verwandeln nach etlichen Generationen durch ihren Aufenthalt und Nahrung völlig ihre Farbe, bekommen die röthliche oder graue Farbe der wilden, und werden wirklich in jene wilde Rasse umgeschaffen.

Schaden.

Diese Hausthiere verunreinigen in Viehställen das Futter des Viehs mit ihrem Unrathe und Haaren, und untergraben und durchbohren die Ställe.

Eine

Eine Hauptvarietät davon ist:

a) Das Angorische Kaninchen.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Seidenhase, Englischer Hase, Rupfhase, Königshase, Hasenkönig, Ungarisches, Moskowitisches Kaninchen und Seidenkaninchen.

Lepus Cuniculus Angorensis. *Gmel. L.* l. c. γ

Lepin d'Angora. *Buffon* l. c. Taf. 53. 54. Ed. de Deuxp. l. c. f. 5. Martini l. c. Taf. 55. 56.

Angora Rabbet. *Pennant.* l. c. Var. A.

v. Schrebers Säugeth. IV. Taf. 236. C. u. f. w.

Mayers Anweis. zur Angorischen oder Englischen Kaninchenzucht. Dresden 1789. Die veredelte Kaninchenerey durch Seidenkaninchen-Männchen als 2ter Theil zu Mayers Anweisung zur Angorischen Kaninchenzucht. Fortgesetzt von Riem. Dresden 1792.

D. Bährens Unterricht über die Cultur der Angorischen Kaninchen, ihren Krankheiten und die besten Methoden sie zu benutzen. Dortmund 1796.

Meine Spatziergänge VI. und VII. Theil. Braunschweig. 1792.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Kaninchen, die sich durch den großen Nutzen, den ihre Haare leisten, so sehr empfehlen, sind auch jetzt in Thüringen hinlänglich bekannt. Sie stammen, wie der Name schon besagt, eigentlich von der Insel Angora. Wegen ihrer Haaren wurden sie von da nach England, und ohngefähr vor zwölf Jahren von daraus nach Deutschland besonders in die Fränkischen Gegenden gebracht. Ein gewisser Herr von Mayersbach verpflanzte sie durch ein einziges Paar dahin. In zwey Jahren wurden sie fast allgemein, und alsdann nach allen Gegenden, selbst von da aus nach Holland verbreitet.

Sie sind etwas größer, als die gewöhnlichen zahmen, haben einen runden und dickern Kopf und kürzere Ohren. sie sind so verschieden an Farbe, wie die zahmen, und ihre seidenartigen Haare, welche oft fünf Zoll lang sind, sind etwas lockig. Man schätzt die bläulich grauen und rein weißen vorzüglich.

Das Naturel und die übrigen Eigenschaften haben sie mit den zahmen Kaninchen, von welchen sie eine Rasse oder Spielart ausmachen, gemein, und scheinen nicht über acht Jahre alt zu werden. Gewöhnlich werden sie blind, verliehren die Zähne, schwellen auf und sterben.

Aufenthalt.

Ihre Wohnung muß ein Platz seyn, der mit Holz ausgelegt, und, da sie die Nässe nicht vertragen können,

trok-

trocken ist, weswegen man ihnen auch Stroh einstreuen muß. Sonst können sie auch auf dem Speicher und in Kammern gehalten werden, und man macht ihnen eben solche Verschläge, wie den gemeinen Kaninchen. Ja ihre Haare werden überhaupt feiner und stärker, wenn sie mehr oben als unten logirt werden. Für die Jungen müssen sie schlechterdings einen Kasten oder eine Art von Höhlen haben, und jede Familie muß besonders wohnen, sonst tödtet der Vater, und wenn dieser erst den Anfang gemacht hat, auch die Mutter die Jungen und fressen sie.

Wegen der Länge und Breite ihrer Füße, Länge und Härte ihrer Nägel sind sie die größten Minirer und thun in Ställen und Scheunen Schaden.

In den kältesten Tagen des Winters, wenn ihr Aufenthalt nicht gegen die Strenge desselben geschützt ist, wurde ihnen in unsrer Gegend sonst etwas eingeheizt; allein dieß ist nicht nöthig, und ich habe gefunden, daß diejenigen, welche nicht so zärtlich gewöhnt sind, weit dauerhafter, größer und stärker werden, auch bessere und reichlichere Haare tragen, als die, welche man zu warm und zu eingeschlossen hält.

Nahrung.

So wie ihr Aufenthalt nicht sehr von dem Aufenthalte der gemeinen Kaninchen verschieden ist, so ist auch die übrige Verpflegung fast dieselbige und sie fordern, ob sie gleich Abkömmlinge aus wärmern Gegenden sind, auch nicht mehr Aufmerksamkeit. Ihre Erhaltung ist auch

nicht

nicht kostspielig, da sie feuchtes und trocknes Futter, als Klee, Gras, Kohlblätter, Heu, Abfälle von Gemüßen, eingeweichte Kleye, und Ueberbleibsel von gekochten Speisen verzehren. Das Gras und die Blätter, welche sie im Sommer bekommen, dürfen niemals naß seyn, und sie bedürfen überhaupt so wenig des Wassers zur Löschung des Durstes als die Hasen. Erdkohlrüben, rothe Rüben, Linsen, Wicken und andere Körner, auch Brod lieben sie sonderlich, und nehmen es aus der Hand. Bey einem Gemische von Hafer, Kleye und Wasser befinden sie sich vorzüglich wohl. Das Gras und Heu giebt man ihnen gern auf kleinen Raufen, und füttert sie des Tages dreymal.

Wenn man sie ohne Nachtheil bey dem Viehe z. B. in Pferdeställen halten kann, wo sie das Ueberbleibsel verzehren, so bringen sie den meisten Vortheil; und auf diese Art sind sie dem gemeinen Mann zu empfehlen, der sie alsdann statt der andern Hauskaninchen, die weniger einbringen, halten kann.

Fortpflanzung.

Wenn man Junge haben will, so läßt man das Weibchen an einem besondern Orte zum Männchen. Man hat nicht mehr als ein Männchen nöthig, und wenn man mehrere hat, so dürfen sie doch weder unter einander, noch mit den Weibchen eher zusammen gelassen werden, als bis diese belegt werden sollen. Sie sind in kurzer Zeit belegt, und beyde Geschlechter trennen sich von selbst wieder.

Die Mutter bringt nach vier Wochen sechs und mehrere Junge, und man kann sie nach acht Tagen wieder zum Männchen lassen. In einem Jahre bekömmt man von ihr zwanzig bis acht und zwanzig Junge. Diese bekommen den sechsten Tag ihre Haare und bleiben bis zum neunten blind. Das erstemal kommen die Jungen ohne besondere Aufsicht nicht leicht davon; auch sterben sie leicht nach den drey ersten Monaten, wenn ihnen nicht zu dieser Zeit die Haare genommen werden, die sich alsdann verfilzen und ihnen tödtlich werden. Wenn bey der Brut mehrere Männchen sind, so muß man sie nach dem zweyten Rupfen verschneiden, oder besser, wie die Bocklämmer der Schafe vermittelst des Unterbindens castriren, weil sie alsdann mehrere und bessere Wolle tragen.

Krankheiten.

Eine gewöhnliche Krankheit, das Aufschwellen, das mehrentheils die Jungen befällt, deren Unterleib bey fortdauernder Eßlust allmählich dicker wird, und wo sie in kurzer Zeit dahin sterben, schränkt ihre Vermehrung, wenn man ihr nicht entgegen arbeitet, gar sehr ein. Die Leber ist, wenn man sie öffnet, gröser, als gewöhnlich, verhärtet, und enthält harte Körner. Verwahrung gegen einen feuchten Wohnort und nasses Futter, und überhaupt obige Behandlungsart in Rücksicht auf Aufenthalt und Nahrung, baut diesem Uebel gewöhnlich vor.

Sie werden auch krank, wenn sie zu enge eingesperrt sind, und nicht reinlich genug gehalten werden. Sie

werden

werden vorzüglich im vierten Monate krank, wenn der zweyte Haarwuchs eintritt. Der erste Haarwuchs muß ihnen zu der Zeit abgenommen werden, sonst wird die Ausdünstung vermindert und der Wuchs der Knochen gehemmt. Geschieht es nun dabey, daß sie faule, nasse, von Thau und Regen durchnäßte Nahrungsmittel erhalten, so bekommen sowohl Junge als Alte die Wassersucht. Der Kopf schwillt auf und das Thier wird dick. Wenn die Lunge dabey angeht, so ist dieß eine Folge der Wassersucht. Sobald man diese Krankheit spürt, muß das kranke Kaninchen abgesondert werden und nichts als trockene Waizenkleyen erhalten, die es gewiß wieder herstellt, wenn das Uebel nicht schon zu weit eingerissen ist. Bey den inländischen Kaninchen rührt diese Krankheit von zu nassen und fetten Nahrungsmitteln her, welche sie gar nicht vertragen können.

Die Geschwüre an den hintern Schenkeln können sich nur in solchen Ställen zeigen, wo diese Thiere naß und unreinlich gehalten werden.

Feinde.

Diese haben sie mit den andern zahmen Kaninchen gemein.

Nutzen.

Diese Thiere verdienen einen vorzüglichen Platz unter den nützlichen Hausthieren, und es wäre der Mühe werth, sie an unser kälteres Clima mehr zu gewöhnen,

nach und nach gemeiner und ganz einheimisch zu machen. Außer daß ihr Fleisch eßbar, obgleich etwas eckel, ist, so sind ihre weichen, seidenähnlichen Wollenhaare, die alle vierzehn Tage mit einem Frisirkamm ausgekämmt und alle zwölf Wochen ausgerupft (denn abscheeren darf man sie nicht) werden können, von entschiedenem Werthe *). Die Thiere, denen die dicken Haare eine Last sind, lassen sie sich gern abnehmen. Die allerfeinsten findet man in den Nestern, die man also wegnehmen muß, sobald die Jungen auslaufen. Sie geben das feinste Garn zu Strümpfen, Mützen und Handschuhen, das vortrefflichste Gewebe mit Spanischer Wolle, Seide, Baumwolle, auch Werg und Flachs vermischt, und die schönsten Hüte. Wenn die Haare allein, oder in Ver-

mi-

*) Man nimmt sie am gewöhnlichsten mit dem Frisirkamm ab. Allein wer diese Thiere selbst besitzt, wird wissen, daß dieß nicht nur eine langweilige, sondern auch unnütze Arbeit ist. Denn wenn man die Kaninchen reinlich und ordentlich hält, so nimmt der engste Läusekamm die Haare nicht gehörig weg, und die größten bleiben stehen. Ich habe zwey Ställe voll und mache es so. Alle vierzehn Tage kämme ich sie, um die Haare in Ordnung und vor dem Verfilzen zu erhalten, und aller zehn bis zwölf Wochen rupfe ich sie, fasse erst die längsten Haare an den Spitzen an und rupfe sie aus, alsdann, wenn ich herum bin, greife ich immer tiefer, so bleibt zuletzt das kürzeste Haar am Leibe, wie dünne Wolle egal stehen, und das Thier wird nicht entblößt und nicht geschunden. Auf diese Art sind meine Seidenhasen zweyrupfig, das heißt, ich nehme allezeit das alte Haar, und das noch nicht reife bleibt bis zur folgenden Rupfung stehen u. s. w.

mischung mit einem Drittel Schaf- oder Baumwolle kartätscht und gesponnen sind, können daraus leichte und warme Zeuche und besonders alle Arten von Strumpfweberwaaren verfertigt werden. Auch sind der Abfall und die kurzen Haare zu feinen Hüten brauchbar. Die Strümpfe und Handschuhe haben wirklich den Preiß der seidenen, und die Tücher werden den besten Englischen gleich geschätzt. Es werden auch wirklich die feinsten Englischen Tücher daraus verfertigt, wie z. B. im Weimarischen.

Die Bälge werden auch als Rauchwerk benutzt, worin sie alles andere übertreffen, und die Festigkeit der Winterhaare ist besonders groß. Haare von allen möglichen Farben unter einander gemengt geben das vortrefflichste Biberhaar, welches seine natürliche Farbe nie ändert, sondern durch den Gebrauch verschönert wird. Ein großer Vorzug vor andern gefärbten.

Ein gut gepflegtes Kaninchen wiegt acht bis zwölf Pfund, und giebt in einem Jahre sechs bis acht Unzen Haare. Welcher Vortheil, besonders wenn man auf ihre Pflege und Nahrung, in andern Viehställen, nicht besonders zu achten hat!

Schaden.

Nur durch ihr Graben, worin sie den wilden nichts nachgeben, werden sie in den Häusern schädlich.

Dritte Ordnung.

Thiere mit Flughäuten. Chiroptera.

Diese Thiere nützen im Haushalte der Natur bloß durch ihre Nahrungsmittel, da sie viele schädliche Insecten verzehren.

Die vier und zwanzigste Gattung.

Fledermaus. Vespertilio.

Kennzeichen.

In beyden Kinnladen stehen Vorderzähne, und in der untern mehr als in der obern, und zwischen letztern ist eine Zahnlücke.

Mehrere Eckzähne, der erste aber ausgezeichnet groß.

A. Oben vier und unten sechs Vorderzähne.

(41) 58. Die langöhrige Fledermaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Langohr, Großohr, ohrige, großöhrige, gehörnte Fledermaus, kleine gemeine Fledermaus.

Vespertilio auritus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 47. n. 5.

Oreillar. *Buffon* hist. nat. VIII. 118. T. 17. f. 1. Ed. de Deuxp. II. T. 10. f. 2. Uebers. von Martini V. 38. m. e. Fig.

Longeared Bat. *Pennant* hist. of Quadr. II, 320. Meine Uebers. II. p. 633.

v. Schrebers Säugeth. I. 163. Taf. 50.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 411.

Goeze's Fauna. I. 53.

Donndorfs zool. Beytr. I. 70. n. 5.

Frisch Vögel Deutschlands. Taf. 103.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren und der Schwanz sind fast so lang als der Leib; die Nase ist einfach; der Ohrdeckel lanzetförmig.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Fledermaus, welche in Deutschland hin und wieder lebt, und in Thüringen nicht selten ist, unterscheidet sich von den andern besonders dadurch, daß ihre Ohren doppelt belappt und weit größer sind, als der Kopf. Ihre Größe vom Kopf bis zum Schwanz beträgt 2 Zoll 3 Linien und der Schwanz ist 2 Zoll lang. Die ausgespannten Flügel klaftern 11 1/2 Zoll *), wovon die Breite des Körpers 1 1/2 Zoll ausmacht. Der Kopf ist klein, 9 Linien und die Ohren sind 1 Zoll 6 Linien lang. Sie hat eine einfache, breite, eingedruckte Nase; die Schnauze ist lang und in der Mitte von den weit aufgetriebenen Backen erhaben. Die kleinen Nasenlöcher fangen sich auf einem erhöheten Rande an der Seite mit einer Ritze an, und endigen sich in einer horizontalliegenden runden Oeffnung oben auf der Schnauze. Der Mund steht weit bis zu den Ohren offen. In der obern Kinnlade stehen vorne auf jeder Seite, weit von einander entfernt, zwey Vorderzähne, davon der erste lang ist, mit einer kleinen Nebenspitze und der zweyte kaum größer als die Nebenspitze des erstern ist; darauf folgt ein langer eingebogener Eckzahn mit einem spitzigen Ansatz, und zuletzt drey Backenzähne, jeder mit drey großen und zwey kleinen Spitzen. In der untern Kinnlade findet man sechs geriefte, stumpfe Vorderzähne, dann

*) Par. Ms.: Körper 2 Zoll; Schwanz 1 Zoll 9 Linien; Breite 10 Zoll 3 Linien.

dann zwey Eckzähne auf jeder Seite, der erste hervorstehend mit zwey Nebenspitzen, der zweyte allein, endlich drey Backenzähne mit einer großen und drey kleinen Spitzen. Die Augen sind mittelmäßig, länglich, schwarz, und liegen zwischen zwey dicken Augenliedern. Ueber denselben liegt eine Erhöhung, wie eine Blase, die, so wie die Augenlieder, mit schwarzen, steifen Haaren besetzt ist. Die Ohren sind pergamentartig, durchsichtig, eyrund, tief gewölbt, an der inwendigen Seite mit einem Rande versehen, der sich oberhalb auswärts, und nahe am Kopfe wieder schneckenförmig einwärts krümmt, und hier an der Stirne eine spitzige Vorragung macht. Vor dem Gehörgange, welcher drey horizontale Bedeckungen hat, steht ein halb Zoll langes, perpendikuläres, lanzettenförmiges Blättchen, welches ein eigentlicher Ohrendeckel ist, und doppelte Ohren zu bilden scheint. Sie trägt die Ohren im Fluge und im Gehen gerade und vorwärts; sitzend aber in Falten gelegt, und an der Spitze so nach dem Rücken zu gekrümmt, daß sie die Gestalt der Widderhörner bekommen; hierbey aber sind die zwey Ohrendeckel und zwey Vorragungen wie vier Hörner horizontal vorwärts gekehrt. Sobald sie etwas hören will, so schlägt sie die großen Ohren vorwärts und die Ohrendeckel zurück. Diese Gehörwerkzeuge sind bey allen Arten, so wie die Schnauze, wachend in steter Bewegung. Der Kopf verliert sich im Leibe, welcher, außer daß er kürzer, dem Leibe einer Maus nicht unähnlich ist. Die Brust ist breit und muskulös, und der Unterleib um die Lenden eingezogen. Die Hände laufen außer dem Daumen, der senkrecht in die

Höhe steht, drey Linien lang, nach Verhältniß größer, als bey den übrigen Arten ist, und einen scharfen Nagel hat, in vier lange umwebte Finger, deren mittelster der längste ist, ohne Nägel aus, und die Flughaut hat an der Spitze des zweyten und dritten Fingers eine Kerbe. Die Hinterfüße haben fünf parallelstehende Zehen, an deren äußerstem die Flughaut unmittelbar befestigt ist, mit scharfen weißen Nägeln. Sie braucht sie, um sich an andere Körper anzuhäkeln und dadurch auszuruhen. Auf der Handwurzel der langen Vorderarme, deren Haut sich in eine doppelte Falte dicht zusammen legt, und auf den Hinterfüßen, der Brust und dem Bauch sitzt sie, und rutscht darauf fort, indem sie die Hinterfüße widerstämmt, und die Vorderarme auf einmal vorwärts hebt. Sie kann sehr geschwind laufen, und noch geschwinder klettern. Da sie auf den Vorderarmen, welche den größten Theil ihrer Flughaut einnehmen, sitzt, so kann sie nicht mit Leichtigkeit von der Erde auffliegen, sie läuft daher gewöhnlich schnell nach einer Wand, häkelt sich mit ihren Hinterfüßen ein, läßt sich, wenn sie hoch genug geklettert ist, los, die Luft fängt sich im Fallen unter ihren Flügeln, und so flattert sie denn schwankend in der Luft fort. Sie bedient sich des Schwanzes als Ruder, um ihrem Fluge die nöthige Richtung zu geben. Ihre Flügel bestehen aus einer doppelten dünnen Pergamenthaut, zwischen welcher die Arme, und der gelenkige Schwanz, dessen Spitze etwas vorragt, mit den gehörigen Muskeln, Sehnen und Adern liegen. Diese Flügel sind fett, bleiben daher immer geschmeidig, nehmen kein Wasser an, sind zusammengelegt dem Kopfe

gleich,

gleich, und die einzelnen Stücke derselben sind am Rande allezeit ausgeschweift *).

Die Farbe der Ohren und Flügel ist hell aschgrau, der Backen und Schnauze schwärzlich. Die Grundfarbe der Leibhaare ist schwarz, in der Mitte werden sie gelblichweiß, und so bleiben sie auch am ganzen Unterleibe; auf dem Rücken aber endigen sie sich in rauchfarbene Spitzen, daher der Oberleib rauchfahl oder schwarzgrau aussieht. Die Ruthe ist beym Männchen bloß und hervorhangend, und das Weibchen unterscheidet sich noch dadurch von ihm, daß es nicht so langgestreckt ist.

Im Affecte geben diese Thiere einen hellpfeifenden Ton von sich, wie die Spitzmäuse.

Ihr Alter ist unbekannt. Man kann sie auch, wie alle einheimische Arten, zähmen.

Verbreitung und Aufenthalt.

Europa ist das Vaterland dieser Fledermäuse.

Ihre Wohnung schlagen sie in Städten und Dörfern in den Ritzen und Klüften der alten steinernen und hölzernen Gebäude, zwischen den Breterverschlägen, hinter den Fensterladen, unter den Dächern, in Schwalbennestern

*) Diese Beschreibung gilt, im Ganzen genommen, von allen einheimischen Arten von Fledermäusen. Die Abweichungen werden bey jeder Art besonders angegeben werden.

nestern und am liebsten in den Klüften der Lehmwände auf. Im Freyen aber, als in Gebürgen und Gärten, suchen sie die Felsenritzen und hohlen Bäume auf. Diejenigen, die in Gebäuden wohnen, hängen sich bey heißen Mittagen im Sommer an die erwärmten Dachziegeln, und erquicken sich an der Wärme, die sie sehr lieben, schwärmen auch, wenn die Böden dunkel sind, herum und spielen mit einander; andere aber, die dieß nicht haben können, ruhen zu dieser Zeit in ihren Höhlen ebenfalls eingehäkelt, meist paarweise aus. Dunkle Klüfte und Höhlen sind auch die Oerter, worin sie ihren abwechselnden Winterschlaf abwarten. Wenn er sie ergreift, hüllen sie sich ganz in ihre Flughaut, wie in einen Mantel ein, so daß nur die Spitze der Schnauze zwischen einer Ritze, welche die vorne zusammengelegten Flügel lassen, durchsieht, und hängen sich in einer Kluft an den Hinterfüßen fest ein (vergl. Taf. II. Fig. 2.). Sie erstarren bey der ersten starken Kälte, erwachen aber und fliegen herum, sobald warme Witterung eintritt, welches oft im Jänner und Februar geschieht. Sie begeben sich bey wieder einfallender Kälte abermals zur Ruhe, und nur die anhaltende warme Frühlingswitterung erhält sie erst fortdauernd wach. Wenn im Frühjahr ein sehr warmer Tag einfällt, der sie aus ihrem Winterschlafe plötzlich weckt, so sieht man sie gewöhnlich auch am Tage, wie taumelnd, herumfliegen. Sie sind gerne lustig und gesellschaftlich (und zwar fast alle inländische Arten unter einander); denn sie necken sich nicht nur einander in ihren Höhlen, in welchen oft, wenn sie Raum haben, etliche hundert beysammen wohnen, sondern

dern vergnügen sich auch im Ausfliegen, indem sie sich durch allerhand sonderbare Schwenkungen und Wendungen einander jagen. Diese Art kömmt des Abends später aus ihrem Aufenthalte hervor, als die übrigen, und wenn man in dunkler Nacht noch Fledermäuse herum flattern sieht, so sind sie gewöhnlich von dieser Art.

Nahrung.

Da diese Fledermaus, wie alle inländische Arten, lichtscheu, und darzu bestimmt ist, den Ueberfluß der Abendinsekten zu vermindern, so geht sie auch in der Abenddämmerung, und nur im Nothfall in der Morgendämmerung ihrer Nahrung nach. Diese besteht aus Käfern, Mücken *), Schaben, Fliegen und besonders kleinen Nachtschmetterlingen. Sie findet diese immer so häufig, daß sie in einer halben Stunde sich auf 24 Stunden und länger völlig sättigen kann. Die Fliegen, die sich an Gebäuden angesetzt haben, weiß sie besonders sehr geschickt wegzufangen, weswegen man sie des Abends so oft an die Wände flattern sieht. Sie bricht allen Insekten die Flügel erst ab, ehe sie sie verzehrt.

Ihr Revier, wo sie jagt, erstreckt sich gewöhnlich nicht über etliche hundert Schritte, wo sie beständig hin und her fliegt, und die zu ihrer Nahrung angewiesenen Insekten

*) Deshalb sieht man sie auch sehr häufig über den Teichen schweben.

Insekten wegfängt; welches sie mit allen einheimischen Thieren dieser Gattung gemein hat.

Sie kann, wie alle Fledermäuse, lange hungern, denn sie muß nicht nur ihre Nahrung den ganzen Winter hindurch, sondern auch etliche Tage im Frühjahr, wenn kalte, windige, und im Sommer, wenn regenhafte Tage einfallen, entbehren *).

Fortpflanzung.

Diese Thiere, so wie alle Arten der Fledermäuse, leben in Monogamie. Die Begattung geschieht zu Ende des Aprils oder Anfang des Mayes, und zwar so, daß sich das Weibchen irgendwo an einer Dachsparre oder Ziegel mit den Hinterfüßen anhängt, den Schwanz mit seiner Flughaut sehr weit zurückschlägt, das Männchen sich etwas drüber an dem nämlichen Orte einhäkelt und sich mit dem Weibchen, indem dieses den Hintertheil des Leibes nach ihm zu krümmt, begattet. Beyde fallen denn gewöhnlich mit einander bis beynahe auf die Erde in der Betäubung herab **).

Die befruchtete Mutter trägt vier Wochen ***), und legt legt alsdann ihre zwey Jungen in eine Ritze, die sie ents

*) Wenn man kleine Steinchen des Abends, wenn sie herumfliegen, in die Luft wirft, so fliegen sie darnach, weil sie sie für Insecten halten, und machen dabey sehr artige Schwenkungen.

**) Diese Beobachtung kann man in einzeln liegenden großen alten Gebäuden, die hohe Böden mit Klüften haben, in den heißen Mittagsstunden immer machen.

***) So lange verstrich bis ich die Jungen bemerkte, seit der ersten Begattung, die aber beynahe acht Tage lang immer wieder-

entweder schon zubereitet findet, oder sich in Gebäuden mit ihrem scharfen Gebiß in Lehmen oder Kalch naget, bloß hin. Diese hängen sich gleich nach der Geburt mit ihren scharfen Daumennägeln an, und werden von der Mutter, wenn sie in ihrem Bette gestört wird, fliegend, an ihren Brüsten klebend, von einem Orte zum andern getragen und etliche Wochen gesäuget.

Zur Begattungszeit kämpfen die Männchen so sehr, daß sie oft in der Hitze aus der Luft herabfallen und die Erde berühren *).

Feinde.

Die Eulen vermindern ihre mäßige Fruchtbarkeit, und die Katzen fressen sie auch sehr gern. Außerdem werden sie von einer Art Milbe, Fledermausmilbe genannt (Acarus Vespertilionis), die sich in den Flügelfalten aufhält, von Blasenwürmern (Vesicaria) und Egelwürmern (Fasciola) geplagt.

Vertilgung.

Da diese Fledermäuse in unsern Gegenden, so viel man weiß, ganz unschädlich, ja im Haushalte der Natur so

wiederholt wurde, unterdessen ein immerwährendes Zischen der beyden Gatten, die hinter einer Fensterlade wohnten, Tag und Nacht gehört wurde.

*) Es ist dieß also nicht ihre Begattungsart, wie man gewöhnlich glaubt.

so gar nützlich sind, so hat man nicht so große Ursache auf ihre Verminderung zu denken, wie in wärmern Ländern, wo andere größere Arten dieser Gattung sich so stark fortpflanzen, daß sie ganze Wolken in der Luft bilden, und auf verschiedene Art so schädlich werden, daß man sie für eine Landplage ansieht. — Auf den Böden, wo man ihre Höhlen weiß, kann man sie am Tage mit einer Ruthe aus denselben jagen, und dann, wenn sie wieder hineinfliegen wollen, mit einem breiten Besen leicht zu Boden schlagen.

Sie fliegen in den kühlen Abenden zu Ende des Augusts und im September, wenn sie Mangel an Nahrung leiden, bey offnen Fenstern auch gern in die Häuser, wo man sie alsdann leicht fangen kann.

Mit der Flinte, die mit klaren Schroten (Dunst) geladen ist, kann man sie aus der Luft schießen, und sie brauchen kaum berührt zu werden, so fallen sie und sind todt. Allein wozu dieß alles?

Sowohl ein sehr kalter als zu schnell in der Witterung abwechselnder Winter ist ihnen tödtlich, besonders, wenn sie so unvorsichtig gewesen sind, ihre nicht gehörig verwahrte Wohnung der rauhen Morgenluft auszusetzen.

Nutzen.

Den größten Nutzen hat die Eule und durch Zufall die Katze von ihnen. Außerdem tödten sie viele Nachtschmetterlinge und Käfer, deren Raupen den Gewächsen schaden.

Scha-

Schaden.

Sie nagen Löcher in die Wände, aber nur an solchen Orten, wo vorher eine Kluft ist, in welcher sie sich verbergen können.

Irrthümer und Vorurtheile.

Giftig sind diese so wie alle Fledermäuse ganz und gar nicht; ihr Urin und Blut ist nicht einmal so scharf, daß er an verwundeten Orten Entzündungen verursachte, wie man vorgiebt.

Die verbrannte Fledermaus galt sonst wider das Podagra, und das scharfe Blut wider die Glatze auf dem Kopfe.

Nur ein sehr alter ungebildeter Jäger mußte es seyn, der das Herz bey Gießung der Flinten- und Büchsenkugeln brauchte, um allezeit gewiß zu treffen.

Sonst schrieb man dieser Fledermaus doppelte Ohren zu.

(42) 59. Die rattenartige Fledermaus.

Vespertilio Myotis.

Namen und Abbildungen.

Großes Mauseohr, Nachtschatten, große gemeine Fledermaus, Hexe, Gespenst, weiße Fledermaus und Flederratze.

Das große Mäuseohr. Meine N. G. Deutsch. I. Vorige Ausg. 169. noch als Varietät aufgeführt.

Götze's Europäische Fauna. I. 36. Nach mir als Art getrennt. Eben so:

Borkhausens deutsche Fauna. I. 80.

Frisch Vögel Deutschlands. Taf. 102. Weibchen.

Kennzeichen der Art.

Mit langer, breiter Nase, dicker Schnauze mit hängenden Oberlippen, Ohren fast von der Länge des Kopfs, lanzettförmigen Ohrdeckeln, bis an die Stirn nacktem Gesichte und langen aus der Flughaut vorragendem Schwanze.

Gestalt, und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Ich habe diese und die folgende Fledermaus in der vorigen Ausgabe meiner Naturgeschichte

te Deutschlands als bloße Varietäten der gemeinen Fledermaus (Vespertilio murinus) aufgeführt, weil ich in Aufstellung neuer Arten zu vorsichtig bin, da oft zu wenig gemachte Beobachtungen und Erfahrungen dem Naturforscher leicht irre führen, und die auffallendsten Verschiedenheiten zuweilen in einer zufälligen Ursache ihren Grund haben können. Wenn man daher zu Kennzeichen der Art: Ohren fast so lang als der Kopf und Schwanz fast so lang als der Leib annimmt; so passen sie freylich auf beyde, auf diese und die folgende. Allein nach genauer Prüfung haben sich wesentliche Kennzeichen entdeckt, wonach sich diese Thiere als verschiedene Arten erkennen lassen.

Ich sagte in der vorigen Ausgabe S. 164. „Von dieser Art finden sich sehr große, und kleine Fledermäuse, die, ob sie gleich obige Kennzeichen der Art völlig mit einander gemein haben, doch in Ansehung der Größe gar sehr von einander unterschieden sind. Ich wage es noch nicht, sie weder als Rassen, noch als besondere Arten zu trennen, ob ich gleich fast gänzlich überzeugt bin, daß sie nicht ein und eben dieselbe Art ausmachen. Denn wie bekannt, so pflanzen sich die wilden Thiere und also auch die Fledermäuse nur erst alsdann fort, wenn man sie für ausgewachsen halten kann; allein ich habe hier von der merklich kleinern Art sowohl als von der größern Junge gefunden. Ferner giebt es auch im Frühjahre, so wie zu allen Jahrszeiten, diese kleinern Fledermäuse, daß sie also weder Junge von der größern Art, da zu dieser Jahrszeit noch keine vor-

Handen sind, noch Unausgewachsene, da sie nur ein halbes Jahr zur Erreichung ihres vollkommnen Wuchses nöthig haben, seyn können. Die übrigen Unterscheidungsmerkmale, in Ansehung ihres Körperbaues und ihrer Lebensart, werden in folgender getrennten Beschreibung bemerklich:"

Die rattenartige Fledermaus ist die größte Fledermaus in Thüringen und nicht gar selten.

Die Länge ihres Körpers beträgt 3 Zoll 8 Linien, des Schwanzes 2 1/2 Zoll, und die Breite der ausgespannten Flügel 1 Fuß 7 Zoll *), wovon der Körper 2 Zoll einnimmt. Der Kopf ist 1 Zoll 3 Linien; die Ohren sind 10 Linien lang.

Der Kopf ist lang, breit; die Schnauze dick, lang, breit; die Nase breit mit halbmondförmigen kleinen Nasenlöchern. Zur Seite der Nasenlöcher werden die Backen sehr dick, wie aufgeblasen und durch einen Riefen der Länge nach, wie getheilt. Der Mund öffnet sich weit, bis hinter die Augen. Die Lippen sind dick; die Mundecken weit, faltig, und senken sich etwas herab, wie beym Bullenbeißer. Bis zur Stirn ist das Gesicht fast ganz nackend, und nur auf einigen schwarzen Wärzchen an der Ober- und Unterlippe und auf den Backen stehen einzelne schwarze Barthaare.

Das

*) Par. Ms.: Körper 3 Zoll 3 Linien; Schwanz 2 Zoll 3 Linien; Breite 1 Fuß 4 Zoll 11 Linien.

Das Gebiß ist sehr scharf und stark. In der obern Kinnlade ist vorne eine kleine Leere; dann folgen zu beyden Seiten zwey verbundene kleine runde stumpfe Vorderzähne, jeder mit einem kleinen Nebenzäckchen; hierauf in einiger Entfernung drey gerade Hundezähne, wovon der mittlere sehr klein, die beyden äußern aber lang und stark sind; zuletzt drey spitzige Backenzähne, die in einem scharfen Zickzack an einander hängen, und wovon der letztere kleiner und stumpfer ist, als die übrigen. In der untern Kinnlade stehen sechs kleine oben eingekerbte Schneidezähne; darauf drey Eckzähne, wovon der erstere sich vorwärts an die Vorderzähne anlegt und stumpf ist, der mittlere, der eine dünne Nebenspitze von gleicher Höhe zur Seite hat, kleiner, spitziger und gerade ist; zuletzt drey Backenzähne, die mit den großen Eckzähnen gleiche Höhe und fünf Spitzen haben. Die Zunge ist groß, glatt und dick. Die Augen sind groß, schwarzblau, liegen in dicken Augenliedern, und in der Mitte zwischen Nasen und Ohren. Die Ohren sind eyrund, oben abgerundet, auswärts gebogen, mit einem schmalen lanzettenförmigen Blättchen, den dritten Theil der Ohren lang, versehen. Bey zusammengelegten Flügeln, welche nach Verhältniß breiter sind, als an den übrigen Arten, steht die Handwurzel der Schnauze gleich *). Arme, Beine und Zehen sind sehr stark, und die Nägel

*) Das Zusammenlegen der Flügel und andere Kennzeichen und Eigenschaften siehe bey der erstern Art, weil sie darinne alle übereinstimmen.

fang, weiß und sehr scharf. Der starke Schwanz ist an der Wurzel dick behaart.

Was die Farbe betrifft, so ist der Kopf röthlich; die Achseln sind schwärzlich; der Grund des übrigen Leibes blaulich, oben heller, als unten; die Spitzen der Haare aber oben hell mausefahl, und unten weiß; daher der Oberleib hell mausefahl oder weißgrau, und der Unterleib weiß aussieht.

Das Männchen unterscheidet sich nicht nur durch sein großes, hervorhangendes, kahles Zeugungsglied vom Weibchen, sondern auch durch die Farbe, indem bey jenem das Mausefahle des Oberleibes etwas ins Röthliche spielt.

Zergliederung.

Alle Fledermäuse sind sich in ihrem innern Bau ähnlich. Die innern Theile sind bey dieser Fledermaus meist wie bey einer andern Maus beschaffen. Doch hat der Uterus zwey Hörner und einen doppelten Eyerstock. Gehirn und Herz sind groß; die Därme kurz, wie bey grasfressenden Thieren und der Blinddarm fehlt. In den Eingeweiden findet man wenig Würmer; bloß den kleinen langgliedrigen Mäusebandwurm. Die Jungen sind im Mutterleibe artig in ihre zarten Flügelmäntel gehüllt und schwarzbläulich von Farbe, da hingegen alle Europäische Säugethiere im Mutterleibe schneeweiß aussehen. Goeze a. a. O. S. 38.

Andere

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Diese Art Fledermäuse ist sehr beißig und zornig. Sie verfolgt nicht nur die kleinen Fledermäuse, und beißt sie oft so sehr, daß sie zur Erde niederfallen, wenn sie sich in ihr Revier, das sie alle Abend durchfliegt, begeben, oder ihr gar einen Käfer, auf welchen sie Jagd macht, wegzuschnappen wagen, sondern wehrt sich auch grimmig gegen Hunde und Katzen, und zernagt alles, was ihr vorgehalten wird, unter beständigem Zischen und abgebrochenen dumpfen Tönen. Wenn sie herumfliegt läßt sie oft einen klatschenden Ton von sich hören, wie man ihn mit der Zunge machen kann.

Sie riecht so stark und angenehm nach Bisam, wie ein Baummarder, welches vermuthlich von ihrer Nahrung herrührt. Sie fliegt schwer, aber mit mannichfaltigen Schwenkungen, daß man ihr gern zusieht.

Ihr Alter ist unbekannt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Diese Fledermäuse wohnen in Europa und namentlich in Deutschland.

Sie lieben die Gesellschaft nicht so sehr, wie die übrigen Arten, und man findet sie daher immer nur paarweise unter den Bretterverschlägen alter einzeln liegender Gebäude, in Gärten in hohlen Birn- und Apfelbäumen, und in Wäldern in hohlen Eichenbäumen.

In Gebäuden kann man ihre Wohnung leicht wegen des starken Bisamgeruchs ausspüren.

Ihr Winterschlaf ist unterbrochen *).

Nah-

*) Den ersten Weihnachtstag 1794, wo es eine außerordentliche Kälte war, flog mitten unter der Predigt in der Mittagskirche zwischen 1 und 2 Uhr eine solche Fledermaus in der Waltershäuser Kirche eine halbe Stunde herum. Ich würde dieß so erklären, daß sie gerade hinter einer Fensterscheibe gelegen hätte, durch welche die Sonne auf sie hätte scheinen können, da eben einige Sonnenblicke geschahen, wenn nicht ein Paar Tage vorher auch eine, wo die Kälte noch stärker war, in einer Schlafkammer bey einem meiner Freunde herum geflogen wäre. In diese konnte keine Sonne scheinen, da sie gegen Mitternacht lag, auch war es nicht warm in derselben, denn die Fenster und andere Sachen waren sehr stark gefroren, und die Kälte noch stärker als den ersten Weihnachtsfeyertag. Auf Neujahr 1795 flogen bey noch größerer Kälte in der Frühkirche, ohne daß die Sonne an die Fenster scheinen konnte, zwey dergleichen Fledermäuse herum. Es ist mir dieß eine auffallende Erscheinung. Diese Fledermäuse flogen so regulär und schön von einer Emporkirche zur andern, wie wenn es mitten im Sommer in einer Abenddämmerung wäre. Sollte etwa eine gar zu große Kälte auf die Erwachung der Fledermäuse eben die Wirkung thun, wie warmer Sonnenschein? Wenn man sagen wollte, die Wärme der Ausdünstung von den Kirchleuten hätte sie aufgeweckt, so kann dieß nicht der Grund seyn, da man von dergleichen wärmender Ausdünstung auf der obern Emporkirche nichts spürte, auch bey der großen Kälte zu wenig Leute in der Kirche waren, als daß eine solche

Nahrung.

Sie nähren sich vorzüglich von Maikäfern, Aaskäfern, Roßkäfern und Dämmerungsschmetterlingen; im Mai und Junius von Maikäfern; im Julius und August aber fast allein von dem großen Weidenschwärmer *), daher vielleicht auch ihr Bisamgeruch. Verzehren sie einen Mai- oder Mistkäfer, wenn sie über oder neben einem hinfliegen, so hört man das Knistern vom Zerbeißen der harten Flügeldecken sehr deutlich.

Fortpflanzung.

Sie bringen mehrentheils nur ein Junges zur Welt, das in vier Wochen schon die Größe der folgenden Art hat.

Feinde.

Die Fledermausmilbe (Acarus Vespertilionis), eine eigene braungelbe Fledermauslaus (Pe-

solche Wirkung hätte hervorgebracht werden können. Wenn es keine täuschende Beobachtung ist, so wollte jemand am Neujahrsmorgen in der Dämmerung in der Stadt eine Fledermaus herumfliegen gesehen haben. Das Thermometer stand die Tage über, da die Fledermäuse flogen, auf 27 bis 31 Grad unter 0, und im Walde fand ich Schwanzmaisen und im Felde Hänflinge, Rabenkrähen und Dohlen erfroren.

*) Sphinx Convolvuli, Lin. Bisamvogel, Windig, Liguster, welcher bisamartig riecht.

diculus Vespertilionis), eine Art gelber Flöhe, die, außer daß sie nicht springen können, an Größe und Gestalt den gemeinen Flöhen gleich sind, die gewöhnliche Erd- oder Käsemilbe (Acarus Caleoptratorum), die Holzböcke (Acarus Ricinus) sind diejenigen Insekten, die sie plagen, und sich von ihnen ernähren. Die erste nährt sich von dem Fette ihrer Flügel, in deren Falten sie leben, die andern genießen ihr Blut und andere Säfte. In den Eingeweiden lebt eine Art Bandwurm. Goeze a. a. O. S. 45.

Fang.

Mit Vogeldunst kann man sie leicht, wenn man sie nöthig hat, aus der Luft schießen, und in ihrer Wohnung lassen sie sich am Tage mit Vorsicht fangen.

Nutzen.

Sie verzehren viele schädliche Insekten.

Schaden.

Nach gemachten Versuchen fliegen sie nur im höchsten Nothfall, bey kühler Witterung, wenn ihnen ihre eigentliche Nahrung fehlt, nach Fettigkeiten.

(43) 60. Die mäuseartige Fledermaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Gemeine Fledermaus, Mäuseohr, kleines Mäuseohr, kleine Fledermaus, kleines gemeines Mausohr, und Schockmaus.

Vespertilio murinus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 48. n. 6.

Chauve-souris. *Buffon* hist. nat. VIII. 113. t. 16. Ed. de Deuxp. II. T. 10. f. 1. Ueberf. von Martini V. 76.

Common Bat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 319. Meine Ueberf. II. p. 632.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 412.

v. Schrebers Säugeth. I. 165. Taf. 51.

Goeze's Europ. Fauna. I. 36.

Borkhausens deutsche Fauna. I. 81.

Donndorfs zool. Beytr. I. 72. n. 6.

Kennzeichen der Art.

Mit langer, breiter und stumpfer Schnauze, Ohren fast von der Länge des Kopfs, kleinen spitzigen Ohr-

Ohrdeckel, und ganz in die Flughaut eingewebtem Schwanze.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieß ist diejenige Fledermaus, welche einzeln fast in ganz Europa, und in Thüringen sehr zahlreich angetroffen wird, und unter allen am geschicktesten und geschwindesten fliegen kann.

Ihr Körper ist von der Mundspitze bis zur Schwanzwurzel 2 Zoll 8 Linien, der Schwanz 1 Zoll 9 Linien lang, und die ausgespannten Flügel sind 1 Fuß 2 Zoll *) breit, wovon der Körper 1 Zoll 4 Linien einnimmt. Der Kopf ist 6, die Ohren sind 5 Linien lang. Die Schnauze ist lang, breit, abgestumpft, und die Nase breit. Der Mund, welcher sich bis zu den Ohren öffnet, ist oben vorne leer; dann folgen zu beyden Seiten zwey eingekrümmte lange, spitzige, von einander getrennte Vorderzähne; hierauf in einer kleinen Entfernung ein merklich größerer spitziger Eckzahn mit einer kleinen Nebenspitze und endlich vier Backenzähne, wovon der erste zwey, die zwey folgenden vier, und der vierte, etwas abstehende, nur drey Spitzen hat. Die äußersten Spitzen, die im Zickzack an einander hängen, sind größer, als die innern. In der untern Kinnlade stehen vorne sechs kleine breite, geriefte,

*) Par. Maas: Körper 2 Zoll 5 Linien; Schwanz 1 Zoll 7 Linien; Breite 11 1/2 Zoll.

gerieffte, stumpfe Vorderzähne; dann auf jeder Seite ein auswärts gekehrter spitziger Eckzahn, nebst zwey dreyeckigen Seitenzähnen; zuletzt auf jeder Seite drey breite Backenzähne mit fünf ungleichen Spitzen.

Die Augen sind sehr klein, schwarz, liegen bloß und erhaben, nahe an den Ohren. Die Ohren sind kahl, häutig, eyförmig, nach der Außenseite bis zur Mundöffnung übergekrümmt, und vor der Gehöröffnung mit einem über zwey Linien langen, schmalen, spitzigen Blättchen oder Deckel versehen. Die zusammengelegten Arme stehen dem Kopfe gleich. Der Schwanz ist oberhalb bis in die Mitte mit Haaren besetzt und ganz in die Flughaut verwebt.

Die Farbe des Thieres überhaupt ist hellaschgrau oder mausefahl. Sie wechselt aber folgendermaßen am Körper ab. Schnauze, Ohren, Füße und Flughaut sind schwärzlich, und die scharfen Nägel der Finger weiß. Die Haare des übrigen Oberleibes sind im Grunde rauchfarben und an den Spitzen weißgelb, und am ganzen Unterleibe haben sie obige Grundfarbe und weiße Spitzen.

Beyde Geschlechter unterscheiden sich merklich von einander. Das Männchen ist etwas länger und schlanker als das Weibchen, da hingegen das Weibchen breiter ist, und immer etwas längere Ohren hat. Weiter ist das Weibchen allezeit auf dem Rücken dunkler aschgrau ins schwärzliche fallend und das Männchen heller ins bräunliche spielend.

Man

Man entdeckt den Aufenthalt dieser Thiere sehr leicht, weil sie unabläßig, wo sie in Gesellschaft wohnen, einen zischenden Ton von sich geben.

Im Sommer haben sie einen widrigen Bisamgeruch.

Ihr Alter ist unbekannt.

Aufenthalt.

Sie wohnen ebenfalls in den Ritzen alter Gebäude, und vorzüglich da, wo zwey Wände, die zusammenstoßen, eine Kluft lassen. Im Walde suchen sie die hohlen Bäume, hohlen Wurzeln, verfallene Bergwerksstollen, und andere Erdklüfte auf.

Es leben viele Familien zusammen verträglich an einem Orte, und vertreiben sich am Tage, wenn sie nicht schlafen, die Zeit, indem sie mit einander spielen, sich necken, jagen, oder ein zischendes Concert halten.

Sie liegen eben so wenig, wie die vorige Art, den ganzen Winter hindurch, dem Hamster gleich, in einer ununterbrochenen Betäubung, sondern erwachen auch in den Wintermonaten, sobald warme Tage eintreten.

Nahrung.

Da der Winterschlaf dieser Fledermäuse noch unterbrochener ist, als bey den rattenartigen, indem sie jede gelinde Witterung aufweckt, so ist es nöthig zu dieser Jahrszeit, wo es gewöhnlich noch sehr wenige Insekten giebt, von

welchen

welchen sie sich nähren könnten, an Orten, wo sie sich aufhalten, die Speisekammern zuzuhalten, weil sie sehr leicht das fette Fleisch durch ihren scharfen Geruch auswittern, Löcher in den Speck und die Schinken fressen, und wohl gar ihren Winterschlaf, wenn sie die Kälte auf ihrem Raube ergreift, in diesen fetten Höhlen vollends endigen. Sie lieben alle Fettigkeiten, und besuchen daher zuweilen solche Oerter, wo Talg, Schmeer, Butter, Oel, Käse u. dergl. aufbewahrt wird. Man hat sogar Beyspiele, daß die Mütter Löcher in den Speck gefressen, und ihre Jungen darin zur Welt gebracht haben. Sie sind besonders diejenigen Fledermäuse, die im May so große Niederlagen unter den Maykäfern anrichten, und viele Nacht- und Dämmerungsfalter wegfangen. Sonst besteht ihre gewöhnliche Nahrung aus Fliegen, die sie, wie fast alle Arten, an den Wänden der Häuser wegfangen.

Fortpflanzung.

Sie begatten sich zu Ende des Aprils oder Anfang des Maies, und das Weibchen legt nach drey Wochen auf ein unzubereitetes hartes Lager ihre zwey Jungen hin, die sie drey Wochen säugt, und alsdann allein ausflattern und ihrer Nahrung nachjagen läßt. Die Jungen haben das erste Jahr eine dunklere Farbe als die Alten. Diese Art begattet sich des Jahrs zweymal.

Feinde.

Ihre Feinde sind die Eulen, Katzen und Wiesel. Von der Fledermausmilbe, und von einer

Art

Art gelber Flöhe, werden sie sehr geplagt; ja die Menge der letztern Insekten verursacht ihnen oft den Todt.

Vertilgung.

Diese Art ist eben so leicht zu fangen, wie die vorige. Da sie sehr gern nach dem Licht fliegt, so kann man sie an solchen Orten, wo sie sich aufhält, durch die Helligkeit eines Lichts, das man in ein Fenster stellt, in ein geöffnetes Zimmer locken.

Sie läßt sich auch beym Mondenschein mit einer mit Dunst geladenen Flinte leicht aus der Luft schießen.

Sollte sich ein ungebetener Gast von ihnen in einen Schornstein oder in eine Speisekammer wagen, so darf man ihm nur an die Fleischstangen statt des Fleisches mit Mehl bepuderte Kletten hängen. Diese sieht er für Schmetterlinge an, fliegt lieber nach ihnen, als nach dem Fleisch und bleibt an den Stacheln derselben hängen.

Das bekannte giftige Vertilgungsmittel, wo man eine Speckschwarte mit Arsenik bestreut, oder mit in Oel aufgelöstem Arsenik bestreicht, und an solche Orte hinhängt, wo man diese Fledermaus des Abends am öftersten herumfliegen sieht, ist verwerflich, weil diese Thiere mit ihrem giftigen Speichel den Speck in Schornsteinen und Fleischkammern, wenn sie sich gleich nach der vergifteten Mahlzeit dahin begeben sollten, schädlich machen können.

Nuz-

Nutzen.

Man läßt diese, so wie überhaupt alle Arten von Fledermäusen in unserer Gegend, gern leben, wenn man sie nicht zur Erweiterung seiner Kenntnisse in der Naturgeschichte nöthig hat; denn ihr Nutzen in der Natur ist sehr groß, indem sie nicht allein einigen Raubthieren und Raubvögeln zur Speise dienen, sondern auch viele schädliche Käfer und Nachtschmetterlinge vertilgen.

Wenn sie sich zuweilen im Winter in Kellern sehen lassen, so kann man nach sichern Beobachtungen den Schluß machen, daß es kalter werde; denn bey der Abnahme der Wärme der äußern Luft, nimmt die Wärme in den Kellern zu, und macht, daß das kalte Blut dieser Thiere erwärmt wird, und geschwinder fließt. Eben so sollen sie schönes Wetter anzeigen, wenn sie des Abends häufig herumfliegen.

Schaden.

Ihr Schaden, den sie zufälligerweise in Schornsteinen und Fleischkammern thun, ist nur zufällig, kann leicht verhindert werden, und kommt gar nicht in Betracht gegen den großen Nutzen, den sie leisten.

61. Die blasse Fledermaus.

(Taf. II. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Sie heißt auch Spätling.

Vespertilio Serotinus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 48. n. 11.

Serotine. *Buffon* hist. nat. VIII. 129. T. 18. f. 2. Ed. de Deuxp. II. T. 10. f. 5. Ueberf. von Martini V. 82. m. e. Fig.

Serotine Bat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 317. Meine Ueberf. II. p. 631.

v. Schrebers Säugeth. I. 176. Taf. 53.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 413.

Goeze's Fauna. I. 65.

Donndorfs zool. Beytr. I. 75. n. 11.

Kennzeichen der Art.

Die kurzen breiten und ausgerandeten Ohren haben einen kleinen rundlichen Ohrdeckel.

Beschreibung.

Diese Fledermaus, welche in Fankreich zuerst entdeckt worden ist, in den Felsenhöhlen am Fluß Argum, jenseits des Sees Baikal wohnt, wird auch hin und wieder in Deutschland angetroffen.

Ihre Schnauze ist länglich, und der Mund enthält oben vier Vorderzähne, und unten sechs. Die Ohren sind kurz und breit mit einem kleinen Ausschnitte auswendig unterhalb der Abrundung. Der Ohrdeckel ist klein und rundlich. Der Rücken hat eine lichtbräunliche Farbe, und ist mit rothfahl überlaufen. Der Bauch spielt aus dem hellgrauen ins gelbliche. Die Flughaut ist schwärzlich. Die Länge des Körpers ist fast drey Zoll, und der Schwanz halb so lang als der Leib.

Aufenthalt, Fortpflanzung, Nahrung u. s. f. ist noch nicht bekannt genug.

Sie lebt gesellschaftlich in Höhlen z. B. Felsenhöhlen.

B. Oben zwey und unten sechs Vorderzähne.

(44) 62. Die Speck-Fledermaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Speckmaus, große Speckmaus, nächtliche Fledermaus, große Fledermaus, Fledermaus mit dem Mäusekopfe, und Nächtling.

Vespertilio Noctula. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 48. n. 10.

Noctule. *Buffon* hist. nat. VIII. 128. T. 18. f. 1. Ed. de Deuxp. II. T. 10. f. 4. Ueberf. von Martini. V. 81.

Noctule Bat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 317. Meine Ueberf. II. p. 630.

v. Schrebers Säugeth. I. 166. Taf. 52.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 412.

Goeze's Fauna I. 60.

Donndorfs zool. Beytr. I. 75. n. 10.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren sind kürzer als der Kopf, mit einem kleinen ovalen Ohrdeckel.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese große Europäische Fledermaus ist in Thüringen eben keine Seltenheit.

Die Länge ihres Körpers beträgt drey Zoll, des Schwanzes zwey Zoll und die Breite der ausgespannten Flügel einen Schuh vier Zoll *), wovon der Körper anderthalb Zoll einnimmt. Der Kopf ist ein Zoll und die Ohren sind acht Linien lang.

Der Kopf ist breit und flach; die Schnauze dicker, kürzer und breiter, und die Stirn weniger erhaben, als an der vorigen Art. Die halbmondförmigen Nasenlöcher liegen auf einer Erhabenheit, und neben denselben wird die Schnauze so dick, daß sie aufgeblasen scheint. Diese ist auch bis zu den Ohren, das Kinn mit eingeschlossen, kahl, mit einzelnen schwarzen und braunen Borstenhaaren besetzt, von denen einige längere an der Stirne weg auf zehn Wärzchen stehen. Die Unterlippe hat in der Mitte eine kleine Furche. Im Oberkiefer liegen in einiger Entfernung vier Vorderzähne, auf jeder Seite ein großer gebogener mit einem sehr viel kleinern (eigentlich zwey Vorderzähne, jeder mit einer großen und kleinen Nebenspitze); dann ein großer einwärts gebogener Eckzahn, der inwendig platt ist; und endlich drey im Zickzack liegende, weniger gezackte Backenzähne. Im

*) Par. Ms.: Körper 2 Zoll 8 Linien; Schwanz 1 Zoll 9 Linien; Breite 1 Fuß 2 Zoll 3 Linien.

Unterkiefer vorne sechs kleine breite hinter einander geschobene Schneidezähne; dann ein Eckzahn, der kürzer und stumpfer, als der obere ist, und fünf Backenzähne, wovon die zwey vordern einspitzig, und eigentliche Seitenzähne, die übrigen aber scharf gezackt und größer sind, als die obern. Der Mund öffnet sich weit, doch aber nicht bis zu den Ohren, wie bey den andern Fledermäusen. Die Zunge ist lang, dick und glatt. Die Augen sind mittelmäßig, schwarz, liegen in einer Vertiefung hinter der aufgeblasenen Oberlippe in dicken Augenliedern, und stehen weit von einander. Die Ohren sind kurz, breit, oben abgerundet, nach außen umgebogen, halb durchsichtig und mit einem zwey Linien langen Ohrendeckel versehen, der gewöhnlich oben breit, halbmondförmig abgerundet ist, zuweilen aber auch etwas spitziger zuläuft *). Am untern Theil des innern Randes, nahe bey

*) Dieß letztere gerade wie bey der folgenden Art. Ich fand nämlich in einem Scheitholzhaufen ein Männchen mit abgerundeten, und ein Weibchen mit etwas spitzigern Ohrendeckel zusammensitzend, und schloß daher auf diese Abänderung, weil diese Art gewöhnlich nur paarweise lebt. Dieses Weibchen, das ich noch ausgestopft besitze, hat fast ganz die nämlichen Ohren der folgenden Art, und ist also nur von jener durch die hier angegebene Größe verschieden. Daher die Benennung große Speckmaus. Wenn mir die gar zu auffallende Verschiedenheit der Größe zwischen dieser und der folgenden Art nicht im Wege stünde, so würde ich dieß Weibchen für eine Bastartart, die aus der Vermischung beyder Arten entstanden sey, halten. Vielleicht ist es eine ganz besondere Art, die ich aber noch nicht genauer anzugeben vermag, da ich keine Gelegenheit gehabt habe, sie genauer nach Gestalt und Lebensart zu beobachten.

bey dem Auge befindet sich eine kleine Ausschweifung, wie ein abgerundetes Läppchen; der äußere Ohrlappe aber hat seine gehörige Bildung und läuft bis zum Mundwinkel herab. Der Hals ist viel deutlicher zu bemerken, als an den übrigen Arten, und der längliche Körper hat mehr die Form einer Maus. Arme, Schwanz und Beine sind stark, und letztere kürzer, als an der rattenartigen Fledermaus, daher auch die Flügel schmäler sind. Die Schwanzspitze ragt ein klein wenig vor der Flughaut hervor, welche inwendig und auswendig bis zum ersten Gelenke behaart ist. Bey zusammengelegten Flügeln steht das Handgelenke der Schnauze gleich.

Der Pelz ist schmutzig braun, graubraun oder hell umbrafarbig, oben dunkler als unten, ohne eine andere Grundfarbe. Schnauze, Kinn, Flughaut, Beine und Füße sind glänzend schwarz — die Ohren etwas heller — die Nägel weiß.

Das Männchen hat eine sehr lange fast kahle Ruthe, und ist schlanker gebaut, als das Weibchen.

Sie haben einen unangenehmen süßlichen Geruch. Ihre Stimme ist starkpfeifend — ihr Alter unbekannt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Außer Europa bewohnen diese Fledermäuse die großen Russischen Steppen in Menge.

Sie scheinen nicht so gesellig, als die übrigen Fledermäuse zu seyn. Sie halten sich mehrentheils nur

Paar und Paar in einer Höhle allein auf, und wählen dazu nicht sowohl Klüfte in Felsen und Gebäuden, als vielmehr zusammengelegte Holzhaufen in Wäldern, Höhlen in Feld- und Waldbäumen, und zwar da, wo Teiche in der Nähe sind.

In England will man sie in der Dachrinne eines alten Gebäudes des Queen College zu Cambridge doch in Gesellschaft zu zweyhunderten angetroffen haben *).

Sie scheinen einen festern Winterschlaf zu haben, als die vorigen Arten, da man sie selten eher, als in den warmen Frühlingstagen herumflattern sieht.

Nahrung.

Ihre vorzüglichste Nahrung machen Mücken, Bremsen, Schnaaken, Käfer, Nacht- und Dämmerungsfalter aus. Man sieht sie, um erstere zu bekommen, beständig um den Teichen schweben. Sonst fliegen sie gewöhnlich hoch in der Luft, und nicht so nahe über der Erde weg, wie die andern Arten.

Nur das Ohngefähr macht sie in Speisekammern durch das Benagen fetter Sachen schädlich.

Fortpflanzung.

Sie pflanzen sich eben so, wie die übrigen Arten, fort. Die Jungen haben im ersten Jahre eine dunklere Farbe, und einen dickern Kopf, als wenn sie älter werden.

Fein-

*) S. Pennant a. a. O.

Feinde.

Der Uhu allein wagt sich an diese beißigen Thiere. Sie sind überall mit kleinen weißen durchsichtigen Läusen, wie Bücherläuse groß und gestaltet, besäet.

Vertilgung.

Man muß sie mit Vogeldunst aus der Luft schießen. Außerdem bekommt man sie nur durchs Ohngefähr in seine Gewalt, indem man sie am Tage irgendwo angehängt und schlafend findet.

Nutzen.

Diese Fledermaus ist ein sehr nützliches Thier, da sie sehr viele Nacht- und Dämmerungsfalter, die als Raupen den Gewächsen in Wäldern und Gärten schädlich sind, und viele Mücken, die Menschen und Vieh plagen, vertilget.

Schaden.

Sie ist fast ganz unschädlich; denn nur der Zufall macht, daß sie zuweilen in Feldmühlen an Fettigkeiten sich vergreift.

(45) 63. Die Zwerg-Fledermaus *).

Namen, Schriften und Abbildungen.

Zwerg, kleine Speckmaus und kleine Fledermaus.

Vespertilio Pipistrellus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 48. n. 12.

Pipistrelle. *Buffon* hist. nat. VIII. 129. T. 19. f. 1. Ed. de Deuxp. II. T. 10. f. 6. Ueberf. von Martini V. 83. m. e. Fig.

Pipistrelle Bat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 318. Meine Ueberf. II. p. 631.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 413.

v. Schrebers Säugeth. I. 167. Taf. 54.

Goeze's Fauna. I. 65.

Donndorfs zool. Beytr. I. 177.

Kennzeichen der Art.

Die Ohren sind so lang als der Kopf, eyförmig und ausgerandet, und der Ohrdeckel schmal, oben abgerundet, fast bis in die Mitte des Ohrs reichend.

Gestalt

*) Auch diese Fledermaus hat fast alle Kennzeichen der Art, und den ganzen Körperbau, die Größe und Farbe ausgenommen, mit der Speck-Fledermaus gemein.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Fledermaus wird in Frankreich, im Casanischen und sehr häufig in Thüringen angetroffen. Ihre Länge beträgt beynahe 1 Zoll 10 Linien, des Schwanzes 1 Zoll 7 Linien, und die Breite 9 Zoll *).

Der Kopf ist klein; die Schnauze kurz, und mit einzelnen längern und kürzern weichen Barthaaren besetzt. Die längern stehen in die Höhe gerichtet über der Nase an der Stirn hin. Die Nase ist breit und die halbmondförmigen Nasenlöcher stehen auf erhabenen Rändern. Die Oberlippe ist an den Seiten bis zu den Augen dick aufgeworfen. Das Gebiß ist fast das der raitenartigen Fledermaus. In der obern Kinnlade ist vorne ein leerer Raum, zu dessen Seiten zwey spitzige Vorderzähne, oder vielmehr nur einer mit einer Nebenspitze stehen. Dann folgen auf jeder Seite ein einwärts gebogener großer Eckzahn und drey Backenzähne, wovon jeder auswärts zwey scharfe Spitzen, und inwendig tiefer zwey stumpfere hat. In der untern Kinnlade stehen vorne sechs Schneidezähne, auf jeder Seite ein kurzer auswärts gebogener scharfer Eckzahn, und drey Backenzähne, die fünfspitzig sind. Die Zunge ist rund und dick. Die Augen sind klein, schwarz, liegen in dikken Augenliedern, und unter den dicken Stirnhaaren, wie

*) Par. Ms.: 1 Zoll 8 Linien: Schwanz 1 Zoll 6 Linien; Breite 8 Zoll 2 Linien.

wie bey der gemeinen Spitzmaus, verborgen. Die Ohren sind fast so lang, als der Kopf, nämlich vier Linien, oval, auswendig in der Mitte merklich ausgeschweift, gegen über, auf der inwendigen Seite in einer abgerundeten Ecke etwas ausgebogen, haben drey Näthe, und einen schmalen, oben abgerundeten Ohrendeckel, der fast bis in die Mitte des Ohrs, an den Anfang der Ausschweifung reicht. Beine und Zehen sind kurz. Die Flughaut läßt die dünne Schwanzspitze unbedeckt, und ist am Schwanze bis den Fußzehen gegen über oben und unten mit Haaren bewachsen. Die Ruthe des Männchens ist haarig.

Die Farbe ist dunkel. Der Grund schwarz. Männchen und Weibchen unterscheiden sich aber sehr merklich in dieser Rücksicht von einander. Das Männchen nämlich ist auf dem Rücken bräunlich schwarz, fast kaffebraun, und das Weibchen blaulich schwarz. Am Unterleibe sind beyde Geschlechter etwas blässer, als auf dem Rücken. Die undurchsichtigen Ohren, Schnauze, Beine und Flughaut sind sehr dunkel schwarzbraun und glänzend, die zusammengelegte Flughaut kohlschwarz.

Sie fliegen sehr geschwind und niedrig, und geben einen leisen heisern Ton von sich.

Man kann sie auch zähmen.

Aufenthalt.

Sie halten sich vorzüglich in Wäldern in hohlen Bäumen, und in Gebäuden, die daselbst, und im Felde einzeln

einzeln liegen, zwischen den Bretterverschlägen paarweise auf.

Ihr Winterschlaf dauert nicht so lange, als bey den andern Arten, und sie können auch mehr Kälte und Regen vertragen; daher man sie oft, wenn die andern zu schlafen gezwungen sind, herum flattern sieht.

Nahrung.

Ihre Nahrung besteht aus kleinen Käfern und Schmetterlingen, die des Abends herum fliegen, und aus Mücken.

Fortpflanzung.

Sie pflanzen sich, wie die andern Arten fort.

Feinde.

Die Eulen stellen ihnen nach.

Vertilgung.

Man erlegt sie des Abends mit der Vogelflinte und Dunst. Es ist wegen der schnellen Bewegungen ein künstlicher Schuß.

Nutzen.

Sie tödten schädliche Insekten, und zeigen im August und September, wenn sie des Abends häufig herum schwärmen, schönes Wetter an.

Schaden.

Sie sind ganz unschädlich, wenn man das Zernagen alter morscher Breter in ihrem Aufenthalte ausnimmt.

(46) 64. Die rauhflügliche Fledermaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Rauhflügel, rothe oder fuchsrothe Fledermaus, und Fledermaus mit behaarten Fittigen.

Vespertilio lasiopterus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 50. n. 22.

v. Schrebers Säugeth. I. Taf. 58. B.

Meine getreuen Abbildungen naturhist. Gegenstände. 2s Hundert. S. 35. Taf. 22.

Kennzeichen der Art.

Schnauze und Ohren sind kurz, der Ohrdeckel ist klein und nierenförmig und von der Schulter bis an den Daumen läuft inwendig an den Flügeln ein deutlicher Streifen von gelbbraunen Haaren hin.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Bey der Herausgabe des ersten Bandes der vorigen Auflage kannte ich diese schöne Fledermaus noch nicht,

oder hielt sie vielmehr, da sie im äußern Ansehen so viel ähnliches mit der Speck-Fledermaus, die ich zuweilen unter den Flügeln (besonders in der Jugend) auch etwas haarig gefunden habe, hat, für eine Varietät derselben, bis ich durch wiederholte Beobachtungen und durch Vergleichung mit der Abbildung im Herrn von Schrebers Werke über die Säugethiere in der Folge überzeugt wurde, daß sie eine besondere Art ausmache. Als diese habe ich sie auch alsdann im dritten Bande dieser Naturgeschichte Deutschlands S. 742 im Anhange beschrieben.

Ich habe sie nicht selten in den Thüringischen Schwarzwäldern, besonders in den tiefern gebirgigen Gegenden derselben angetroffen, auch in großen Gebäuden. Sie wohnt auch in den obern Gegenden Deutschlands, z. B. am Rhein.

An Größe gleicht sie einer Hausmaus, an Gestalt aber der Speck-Fledermaus, und gehört also zu den großen Fledermäusen. Die Länge von der Mundspitze bis an die Schwanzwurzel ist drey Zoll und zehn Linien; der Schwanz mißt zwey Zoll vier Linien, und die Flügel klaftern einen Fuß, fünf bis sechs Zoll *). Der Kopf ist zehn Linien lang, die Ohren sieben und einen halben, der kleine nierenförmige Ohrdeckel zwey, die Mundspalte sieben, das Achselgelenke neun Linien, das Ellen-

*) Par. Ms.: Körper 3 1/2 Zoll lang; Schwanz 2 Zoll, und Breite der Flügel 1 Fuß 2 1/2 Zoll.

Ellenbogengelenke aber an den vier Linien langen Daumen zwey Zoll, drey Linien, und der erste Finger bis an die Flügelspitze drey Zoll, zehn Linien. Das Bein mißt bis an das Fußblatt zehn Linien, der Fuß bis an die Ferse vier Linien und die gleich langen Zehen vier Linien.

Die Schnauze ist kurz und dick, die Nasenlöcher sind aufgeblasen und haben zur Seite eine runde Oeffnung; noch aufgeblasener sind die Backen; sowohl auf dem Mundrande als auf den Backen stehen einzelne feine röthliche Haare. In der obern Kinnlade ist vorne ein leerer Raum, hierauf folgen auf jeder Seite ein einzelner spitziger Vorderzahn, auf diesen ein großer spitziger Eckzahn und darauf drey scharfschneidige im Zickzack laufende nach vorn zu in die Höhe gespitzte Backenzähne; die untere Kinnlade enthält vorne sechs kurze, stumpfe, dicht in einander geschichtete Vorderzähne, darauf auf jeder Seite einen breitern und schärfern Eckzahn als in der obern Kinnlade, der an alten Thieren eine Nebenspitze nach vorne hat, und in den Zwischenraum der obern vordern Zähne und des Eckzahns eingreift, alsdann vier dreyzackige scharfgespitzte Backenzähne. Die ganze Schnauze ist schwarz, bey jungen schwarzbraun. Die Ohren sind ebenfalls schwarz und stumpf kegelförmig gestaltet, oben sehr abgerundet, haben unten auf der äussern Seite einen weit eingebogenen Rand, und ein nierenförmiges, oben stark abgerundetes Ohrendeckelchen. Die Flügel sind zusammengelegt schwarz, ausgebreitet, wegen ihrer Durchsichtigkeit heller. Von den Schultern

bis

bis an den Daumen läuft inwendig ein halb Zoll breiter Streifen von braungelben Haaren hin; auch sind die Seiten der Flügel neben dem Bauche drey Viertel Zoll weit damit dicht besetzt. Neben den Beinen, die mehr zur Seite schief herausstehen, als bey andern Fledermäusen, läuft auch ein, aber wenig bemerklicher, Haarstreifen hin; sonst ist der Schwanz kahl und die Spitze steht eine Linie weit uneingefaßt vor. Die Nägel sind weiß, die des Vorderdaumens nicht wie gewöhnlich scharf, die der Füße aber sehr spitzig und scharf.

Der ganze Balg ist oben und unten gelbbraun oder schmutzig fuchsroth, kurz und feinhaarig. Er sticht sehr schön gegen die schwarze Gliederfarbe ab.

Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, auch etwas schmutziger von Farbe. Man muß aber beyde Geschlechter beysammen haben, wenn man diesen Unterschied gewahr werden soll.

Die Jungen sehen das erste Jahr über schmutzig gelbbraun aus. Ihre Farbe nimmt sich daher nicht so gut aus, wie die der Alten.

Aufenthalt.

Diese Fledermaus hat eigentlich ihren Aufenthalt in waldigen Gegenden. Hier wohnt sie in alten hohlen Bäumen, und vorzüglich zwischen dem aufgeklafterten Scheitholze. Auch besucht sie alte Stollen, und Schachte, große und alte Gebäude. Sie hält einen un-

terbrochenen Winterschlaf. Sie fliegt deshalb, wenn die größte Kälte ist, zuweilen des Winters in den Kirchen herum. So hieng den vierten Advents-Sonntag 1796 eine in der Waltershäuser Kirche an dem Kanzelvorhang, und fieng an zu zwitschern, wie die Kanzel geöffnet wurde. Es ist die abgebildete.

Nahrung.

Ihre Nahrung besteht in allerhand Käfern und besonders Abend- und Nachtfaltern; sie wird daher durch Vertilgung des schädlichen Fichtenschwärmers, der Nonne, des Fichten- und Kiefernspinners, der Borkenkäfer u. s. w. sehr nützlich, und verdient unsere Schonung auf eine vorzügliche Weise.

Fortpflanzung.

Sie bringt im Mai zwey Junge zur Welt; kann sich aber deshalb nicht sonderlich vermehren (denn sie bleibt immer selten), weil ihre Brut und sie so oft zerstöhrt und vertilgt werden. Denn sie klebt mehrentheils mit den Jungen an der Brust in den Holzhaufen, wenn diese alsdann nach Hause gefahren werden, so wird sie gewöhnlich von den Holzmachern oder Fuhrleuten mit und ohne Vorsatz getödtet.

Nutzen.

Da ich sie vorzüglich in Nadelwäldern angetroffen habe, so ist sie für diese durch Vertilgung mancher schädlicher Schmetterlinge sehr nützlich, wie ich schon oben angeführt habe.

Die

Die fünf und zwanzigste Gattung.

Flugmaus. Noctilio.

In der obern Kinnlade stehen keine, in der untern aber vier Vorderzähne.

(47) 65. Die große Hufeisen-Flugmaus.

Noctilio ferum equinum.

Diese sogenannte Fledermaus mit der Hufeisennase, von welcher man in Deutschland eine große und eine kleine kennt, trenne ich wegen der merklichen Abweichung in der Gestalt, so wie bey der gemeinen Fledermaus (Vespertilio murinus) in zwey verschiedene Arten; und beschreibe daher erst die große Hufeisen-Flugmaus.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Hufeisen, Hufeisennase, große Hufeisennase, große Fledermaus mit der Hufeisennase, Wundernase und Maske.

Vespertilio ferrum equinum, maior. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 50. n. 20. *a.*

v. Schrebers Säugeth. I. 174. Taf. 62. oben.

Goeze's Fauna. I. 66. A.

Borkhausens deutsche Fauna. I. 84.

Schriften für diese und die folgende Art:

Fer à Cheval. *Buffon* VIII. 131. T. 17. f. 2. 132. T. 20. Ed. de Deuxp. II. T. 10. f. 2 8. Uebers. von Martini V. 87. *Daubenton* Mem. de l'Acad. de Paris 1759. p. 382. T. 2. f. 4.

Horse-Shoe Bat. *Pennant* hist. of Quadr. II. 316. Meine Uebers. II. p. 629.

v. Zimmermanns geogr. Zool. II. 417.

Donndorfs zool. Beytr. I. 82.

Kennzeichen der Art.

Mit einer hufeisenähnlichen Nase, vier Säugwarzen, und rothgrauer Farbe.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Diese Fledermaus, welche in Frankreich am Caspischen Meere und in Deutschland wohnt, und in Thüringen sehr gemein ist, bekommt, wegen ihrer wunderbar gebildeten Nase, ein gar eignes Ansehen.

Die

Die Länge des Körpers ist 2 Zoll, des Schwanzes 1 Zoll 2 Linien; die Breite der ausgespannten Flügel 11 Zoll *), davon der Körper 1 1/4 Zoll beträgt; der Kopf ist 9 Linien, und die Ohren sind 8 Linien lang. Der Mund hat in der Ober- und Unterlippe eine kleine Kerbe, öffnet sich sehr weit, und enthält in der obern Kinnlade vorne einen leeren Raum, dann zur Seite einen großen spitzigen Eckzahn mit einem kleinern neben sich, und vier Backenzähne, wovon jeder drey Spitzen hat, die nach innen zu einen hohlen Schneckengang bilden. In der untern Kinnlade liegen vorne sechs kleine Vorderzähne dicht an einander; zu deren Seite stehen drey Eckzähne, wovon der mittlere kleiner ist, und dann drey Backenzähne, jeder mit vier Spitzen. Die Zunge ist fleischig und rund. Die obere Kinnlade hat äußerlich eine horizontale Lage bis zu den Augen. Die Nase bildet gleich über dem Munde ein häutiges Hufeisen, dessen Oeffnung rückwärts ist, oder wenn man lieber will, zwey halbe Monde, die vorne an der Mundspitze in einer Kerbe zusammen stoßen. In der Oeffnung dieses Hufeisens liegen die eyrunden kleinen Nasenlöcher; hinter denselben eine kleine Muschel horizontal; hierauf erhebt sich an des Hufeisens Ende ein kleiner zusammengedrückter Sattel oder Hühnerkamm, dessen hinteres Ende wieder etwas einwärts gebogen herunter geht, zu beyden Seiten eine Höhle bildet, wovon die obern Enden wieder in einer scharfliegenden Stirnbinde zusammenlaufen;

*) Par. Ms.: Körper 1 Zoll 11 Linien; Schwanz 1 Zoll 1 Linie; Breite 9 Zoll 10 Linien.

und endlich steht über dieser in der Mitte zwischen den Ohren noch eine dreyeckige Pyramide. Die halben Monde, oder die zwey Theile des Hufeisens scheinen in der Mitte durch eine Nath getheilt, die Spitzen derselben senken sich etwas, und schließen an das hintere Ende des Sattels mit einer kleinen Ausbeugung an. Alles dieses besteht aus einer hellaschgrauen, mit sehr einzelnen langen, weißen Haaren besetzten, dünnen Haut. Dieser wunderbare Nasenbau, womit die Natur diese Fledermaus ausgezeichnet, hat vermuthlich noch einen ganz eignen Zweck, der aber nicht bekannt ist. Um den äussern Rand des Hufeisens herum stehen auf zehn Warzen einzelne lange, weiße Barthaare, und am Rande der untern Lippe auf vier Wärzchen ebenfalls. Die kleinen schwarzen Augen liegen zur Seite der Stirnbinde, und ihre Augenlieder haben dicke weiße Ränder. Wenn das Thier das untere Augenlied in die Höhe zieht, so erscheint ein Ritz mit einer dünnen Haut, durch welche man das Auge erkennen kann *). Am innern Augenwinkel geht eine kleine Höhlung in den Kopf, und am äußern öffnen sich die Ohren. Diese sind kahl, häutig, weit offen, laufen am Ende spitzig aus, und haben unten zur Seite

*) Vielleicht verdunkelt sich diese Fledermaus, die mehr als die andern Arten am Tage auf den Böden herumfliegt, das Tageslicht dadurch, daß sie das untere Augenlied in die Höhe hebt, und durch die dünne Haut derselben sieht. Wenn das Auge geschlossen ist, so glaubt man, sie hätte auf jeder Seite zwey Augen, weil man zwey Ritzen bemerkt.

Seite einen Einschnitt, der den untern Theil gleichsam in einen Ohrdeckel verwandelt, der dieser Art sonst fehlen würde. Die Hinterfüße haben, wie gewöhnlich, fünf Zehen, die gleich lang sind, einzelne harte Häärchen, und sehr scharfe, glänzende, weiße Krallen haben; vermittelst derselben können sie sich nicht nur an die innern Dachziegel, sondern auch an die glatteste Wand anhängen. Das Achselgelenke der zusammengelegten Flügel ragt über den Kopf hervor. Der Schwanz endigt sich mit der Haut und ist sehr dünne und kahl.

Die Farbe der Füße und Flügel ist schwärzlich, der Nase und Ohren aber hellaschgrau, doch an den Spitzen der letztern bräunlich. Im Grunde sind die Haare am ganzen Leibe weißlich, und endigen sich am Oberleibe in rothgraue, oder hellbräunliche, am Unterleibe aber in schmutzig gelbweiße Spitzen; daher die Rückenfarbe rothgrau oder hellbräunlich, und die Bauchfarbe gelblich weiß ist.

Die hervorragende Ruthe des Männchens ist nicht kahl, wie an den übrigen Arten, und das Geburtsglied des Weibchens ist wegen seiner dreyeckigen Gestalt merkwürdig.

Das Weibchen hat dem Anschein nach vier Säugwarzen, zwey an der Brust, und zwey vor dem Geburtsgliede am Bauche *).

*) Diese zwey untern habe ich allezeit so welk und kahl gefunden, als wenn die Jungen an denselben, wie an den obern, gesogen hätten.

Wegen ihrer langen Flügel kann diese Fledermaus sehr schnell fliegen, und leichter als die übrigen vom Boden sich in die Höhe schwingen, indem sie ihre lange Finger von sich streckt, dadurch die Flughaut ausspannt, sich auf die Füße richtet, und auf diese Art sich in die Luft schwinget.

Sie giebt bey ihren Spielen, und wenn sie in Noth ist, einen hellzischenden Laut von sich.

Wie alt sie wird, weiß man nicht.

Aufenthalt.

Sie liebt die Gesellschaft der langöhrigen und der mäuseartigen Fledermaus, und wird noch häufiger, wie jene zwey Arten, bey uns und in dieser Gesellschaft angetroffen, aber in Thüringen selten im Walde und Gärten, denn sie schlägt ihre Wohnung lieber in Gebäuden hinter Bretterverschlägen und zwischen den Klüften der Lehmwände auf.

Ihr Winterschlaf ist sehr unterbrochen, und man sieht sie daher im Winter bey gelinder Witterung herumflattern, und sich lustig machen, wenn die andern gleich noch völlig todt sind. Im Frühjahr ist sie zuerst wach, und scheut die Kälte nicht so sehr, wie die andern Arten.

Nahrung.

Da ihr Gebiß sich von den andern Arten unterscheidet, ihr Winterschlaf nicht so fest, und ihr Geruch auch

sehr

sehr fein zu seyn scheint, so mögen ihnen wohl auch außer der gewöhnlichen Fledermäusekost, noch andere Nahrungsmittel von der weisen Natur angewiesen seyn, die aber noch nicht völlig bekannt sind.

So viel ist gewiß, daß sie Spinnen aufsuchen, stets über den Teichen schweben, wie die Schwalben, mit dem Kopfe ins Wasser tauchen und die Larven der Mücken und des Uferaases wegfangen *), niemals aber in Feuermauern am Specke angetroffen werden.

Fortpflanzung.

Die Begattung geschieht auf eben die Art, und zu eben der Zeit, wie bey den übrigen Fledermäusen. Die Mutter gebiert nach drey wochenlanger Schwangerschaft gewöhnlich zwey Jungen, die sie in einer Ritzen, besonders in einer Lehmwand hinlegt. Diese können sich gleich nach der Geburt anhängen, weswegen auch die Vertiefung, wo sie liegen, oft sehr flach ist.

Feinde.

Den Eulen, Wieseln und Katzen dienen sie zur Speise, und letztern sind sie eine besondere Delikatesse. Große und kleine Holzböcke (Acarus Ricinus) plagen sie gar sehr, und halten an ihnen Winterschlaf.

Vertilgung.

Man fängt sie, wie die langöhrige Fledermaus, und zwar noch leichter. Man darf nur auf einem Boden,

*) Vielleicht ist zu diesem Eintauchen des Kopfs ihnen ihr wunderbarer Nasenbau nothwendig.

auf welchem Fledermäuse verspürt werden, in warmen Tagen an den niedrigen Dachziegeln suchen, wo besonders die Männchen fast den ganzen Tag hängen und schlafen; bey einer geringen Berührung mit einem Besen fallen sie zur Erde und sind todt.

Sie lassen sich auch des Abends schießen.

Nutzen.

Sie vertilgen manche schädliche Insekten.

Schaden.

Sie nagen Löcher in die alten Lehmwände; allein deswegen ist ihre Vertilgung nicht nothwendig.

(48) 66. Die kleine Hufeisen-Flugmaus.

Noctilio Hipposideros.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Die kleine Hufeisenfledermaus, das kleine Hufeisen, und die kleine Hufeisennase.

Vespertilio ferrum equinum minor. *Gmelin Lin.* 1, c. β.

v. Schrebers Säugeth. I. 174. Taf. 62. untere Fig.

Fer-

Ferner die bey der vorigen Art im allgemeinen angeführte Schriften.

Kennzeichen der Art.

Mit einer hufeisenähnlichen Nase, nur zwey Säugwarzen an der Brust, hellaschgrauen Rücken und schmuzzig weißem Bauche.

Gestalt, Farbe und Lebensart des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Länge des Körpers beträgt einen Zoll acht Linien; des Schwanzes einen Zoll; die ausgespannten Flügel klaftern neun Zoll *).

Die Grundfarbe der Haare ist weißlich, und Ohren Kopf und Rücken sehen hellaschgrau, der Bauch aber schmuzigweiß aus.

Dem Weibchen fehlen über dem Geburtsgliede allezeit die zwey Säugwarzen, die man an der vorigen Art bemerkt.

Uebrigens kömmt diese Art, die horizontalere Lage der hintern häutigen Theile der Nase ausgenommen, in allen Stücken mit der vorigen überein.

Sie liebt eben den Aufenthalt, wird häufig in jener Gesellschaft angetroffen, pflanzt sich eben so fort, doch

*) Par. Ms.: Körper 1 Zoll 7 Linien; Schwanz 11 Linien; Breite 8 Zoll 1 Linie.

doch allezeit mit ihres Gleichen, und nicht mit der grö-ßern Art gepaart, und genießt vielleicht auch eben die Nahrungmittel. Sie hat einerley Nützlichkeit und einerley Feinde. Sie kann außerordentlich schnell fliegen und giebt beständig einen zischenden Laut von sich. Man sieht sie an dunkeln Orten, auf Böden, Gewölben ꝛc. gern oben gerade an der Decke herabhängen; da andere Fledermäuse lieber eine Seitenwand suchen.

Vierte Ordnung.

Thiere mit Flossenfüßen. Palmata.

Erster Abschnitt.

Mit Zehenabtheilungen. Lobata.

Sie sind fisch- und kräuterfressend, und nützen vorzüglich durch ihr Fell und Fett.

Die sechs und zwanzigste Gattung.

Robbe. Phoca.

Kennzeichen.

Spitzige Vorderzähne sind in der obern Kinnlade sechs, die ungleich weit stehen und wovon die äußern stufenweise länger und breiter als die innern sind; in der untern vier, wovon die beyden äußern die mittlern an Größe um etwas übertreffen, zwischen welchen sich eine kleine Lücke befindet.

Die Eckzähne stehen einzeln, abgesondert, merklich gekrümmt, spitzig, sind ohngefähr noch einmal so lang als die Vorderzähne; die zwey untern gehen schief auswärts.

Die

Die Backenzähne sind dreyspitzig, fünf bis sechs an der Zahl.

Die Zunge ist gespalten.

Die äußern Ohren fehlen meist.

Die kurzen Füße haben fünf Zehen mit einer Schwimmhaut, und die hintern sind so verwachsen, daß sie einem horizotalem Fischschwanze ähnlich sehen, daher der Gang dieser Thiere schleppend, doch ziemlich geschwind ist.

Der Leib ist an der Schulter dick, und verdünnt sich nach und nach gegen den Schwanz zu.

Unter dem Wasser können sie nicht lange aushalten, entfernen sich auch nicht weit vom Lande. Sie wohnen fast in allen Meeren, nähren sich besonders von Fischen, leben in der Polygamie, und das Weibchen gebiert eins, selten zwey Junge.

67. Der Kalbsrobbe oder gemeine Seehund.

(Taf. XVIII. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Seehund, Seekalb, Meerkalb, Hundsrobbe, Robbe, gemeine Robbe, Roppe, Sühlhund, auch Saalhund, Seewolf, Dickkopf und Brauner.

Phaca

Phaca vitulina. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 63. n. 3.

Phoque. *Buffon* hist. nat. XIII. 333. *t.* 45. Ed. de Deuxp. VI. T. 12. f. 1. Ueberf. von Otto. XVI. 184. m. e. Fig.

Common Seal. *Pennant* hist. of Quadr. II. 270. Meine Ueberf. II. p. 581.

Der gefprenkelte Seehund Fabricius in den Schriften der naturforfch. Gefellfch. zu Copenhagen. I. 2. S. 91.

Der gemeine Seehund. v. Schrebers Säugeth. III. 303. Taf. 84.

v. Zimmermanns geogr. Zool. I. 248.

Perrault, Charras und Dodarts Abh. aus der N. G. I. 219. Anatomifche Befchr. Taf. 28. 29.

Donndorfs zool. Beytr. I. 137. Nr. 3.

Kennzeigen der Art.

Der Kopf ift glatt, die äußern Ohren fehlen gänzlich; der Leib ift fchwarz und weißlich gefprengt.

Geftalt und Farbe des männlichen und weiblichen Gefchlechts.

Diefer Robbe wird nicht felten in der Oftfee gefunden, und an den Küften von Deutfchland, der Infel Rügen

gen ꝛc. gefangen; daher wir ihn mit Recht unter die Deutschen Säugethiere rechnen. Er erreicht eine Größe von sechs bis sieben Fuß, und scheint im dritten Jahre ausgewachsen zu seyn.

Der Kopf ist oben flach gedrückt, an der Schnautze rund, dann dick und mittelmäßig groß der äußern Gestalt nach dem Kopfe eines kurzschnauzigen Budels nicht unähnlich; daher auch sein Name. Das Maul ist aufgeworfen, der Gaumen scharf runzlich, die Zunge ein wenig gespalten. Die Zähne sind so gereihet, daß die achtzehn obern gerade in die Fugen der sechszehn untern einschließen, und so spitzig und scharf, daß er einen armsdicken Stock ohne Mühe in Stücken beißen kann. Von den obern sechs Vorderzähnen sind die mittelsten vier die kleinsten, kegelförmig, scharf und etwas nach innen gekrümmt, die beyden an den Seiten länger und etwas nach außen gebogen; die vier innern Vorderzähne sind kürzer und stumpfer, stehen zwey und zwey an jeder Seite, und lassen in der Mitte einen leeren Raum; die vier Eckzähne sind lang, krumm und spitzig; von den zwanzig Backenzähnen sind die zehen in der obern Kinnlade mit zwey, und die übrigen zehn in der untern mit drey Spizzen versehen und breiter. Die Augen sind groß, schwarz, nicht hervorragend, aber im Wasser funkelnd. Die äußern Ohrlappen fehlen gänzlich, und der Gehörgang ist bloß mit einer Klappe verschlossen. Um die Nase herum stehen lange starke flach gedrückte, an den scharfen Seiten gewellte Bartborsten, und so auch über den Augen fast immer vier. Der Hals ist mäßig lang, ziemlich schlank,

auf-

aufgeschwollen, voll Runzeln, und er kann ihn lang ausstrecken, und wieder einziehen. Im Nacken, wo der erste Halswirbel anfängt, ist er durch eine niedrige Grube etwas eingedrückt, daher der Kopf höher als der Hals sitzt. Der Leib ist länglich, dick, rund, fast wie ein Kegel gestaltet, um die Brust stark, über den Schultern etwas hochrückig, und nach hinten zu ablaufend dünner. Die beyden Vorderfüße sitzen gleich hinten am Kopfe, sind kurz, weil die Arme mit den Ellenbogen unter der Haut liegen, haben fünf Zehen von ungleicher Länge, mit drey Gelenken, und langen schwarzen rinnenförmigen Klauen, die auf der Haut liegen, welche nach denselben im Rande eingeschnitten sind. Die vorderste Zehe ist der längste, die folgenden nehmen stufenweise ab, und die hinterste ist die kürzeste. Die Hinterfüße machen mit den kurzen und platten Schwanze ein Stück aus, haben fünf lange Zehen, von denen die beyden äußersten länger als die mittlern, und unter diesen die mittelste, die kleinste ist. Alle vier sind mit einer lederartigen, haarigen Haut verbunden, oder Schwimmfüße.

Der ganze Leib ist mit kurzen, starken glänzenden Haaren besetzt. Die Farbe ist überall schwarz und weiß gesprengt, auf dem Rücken hat die schwarze, und am Bauche die weißliche Farbe die Oberhand. Die Einjährigen haben eine schöne schwarze Farbe, welche den größten Theil des Rückens einnimmt, mit kleinen weißen Flecken eingesprengt und einem ganz weißen Bauche, die halbjährigen sind mehr fahl, so daß die weißen Flecken weniger hervorstehen. Man findet auch lichtgelbe mit,

schwarzen, größern oder kleinern Flecken in der Ostsee, ganz schwarze oder weiße aber niemals; obgleich die alten immer heller erst dunkelbraun und weiß gesprengt und zuletzt ganz weißgraulich werden.

Varietäten.

Diejenigen, welche am See Baikal, also im süßen Wasser wohnen, sind kleiner, aber sehr fett, besonders im Herbst so fett, daß sie ein bloßer ungestalteter Fleischklumpen werden. Ihre Farbe ist silberweiß, doch trifft man auch gelbliche an, die einen großen dunkelbraunen Fleck auf dem Hintertheile des Rückens haben, der fast den dritten Theil des Körpers einnimmt (Ph. v. Sibirica.) Wahrscheinlich ist dieß eine besondere Art und vielleicht die haasenhaarige Robbe (Phoca leporina).

In dem Caspischen Meere werden sie in ungeheurer Menge angetroffen, sie variiren aber gar sehr in der Farbe. Einige sind ganz weiß; andere schwarz; noch andere gelblichweiß: wieder andere mäusefarben, und so gar einige wie ein Leopard gefleckt (Ph. v. caspica). Vielleicht sind dieß auch verschiedene Arten.

Bey der Zergliederung dieses Robben hat Hr. Hofrath Blumenbach *) einen sehr merkwür-

*) S. dessen Handbuch der Naturgeschichte 5te Ausgabe S. 92. Nota; oder besser: Commentationes societat. scient. Goetting. Vol. VII.

würdigen Augenbau bemerkt, wodurch er im Stande ist die Axe des Auges nach Willkühr zu verlängern oder zu verkürzen, um im Wasser eben so gut als in der Luft sehen zu können. Dieß wird durch den Druck der überaus starken Augenmuskeln auf die äußere Haut des Augapfels bewirkt, welche letztere an verschiedenen Stellen von verschiedener Dicke ist. Die durchsichtige Hornhaut nämlich ist dünn und nachgiebig; von der harten weißen Haut hingegen ist der zunächst an die Hornhaut anstoßende Theil, so wie auch der Hintergrund dick und knorpelartig, ihr mittlerer Gürtel aber wieder dünn und geschmeidig; so daß wenn das Thier durch die Luft sehen will, es den Augapfel in die Augenhöhle zurückzieht, und dadurch den Hintergrund desselben etwas flach drückt, mithin der Crystalllinse näher bringt ꝛc. wie es die starke Brechung der Lichtstrahlen erfordert, die dann aus der dünnen Luft in das dichte Auge gehen. Unter dem Wasser hingegen lassen die Augenmuskeln nach, damit die Augenaxe wieder verlängert werde.

Andere merkwürdige Eigenschaften.

Der Seehund ist ein neugieriges und beherztes Thier. Aus Neugierde streckt er den Kopf immer aus dem Wasser, um zu sehen, was neben ihm vorgeht. Ja er schwimmt und spielt sogar um die Schiffe und Boote herum, und zeigt keine Furcht *). Andere hingegen sagen, daß er furchsam und vorsichtig sey und den Men-

*) Dieß hat vielleicht zur Entstehung der Fabel von den Seejungfern oder Syrenen Anlaß gegeben.

schen scheue, daß man ihn daher selten auf dem Wasser hingestreckt liegen sehe, sondern daß er stets mit in die Höhe gehobenen Kopfe schwimme, den er vor und rückwärts drehe, um sich um zu schauen. Dann gleicht er einem schwimmenden Hunde. Wenn er wieder ins Wasser geht, so schießt er vorn über und läßt den Rücken sehen. Gewöhnlich schwimmt er einzeln, denn im Wasser sammlet er sich nicht gern in Haufen zusammen, auf dem Eise oder Lande hingegen liegen oft mehrere beyeinander. Er soll den Blitz und Donner so sehr lieben, daß er bey Gewittern ans Land gehet. Durch Geschrey, oder den unvermutheten Anblick eines Menschen erschrickt er und ergreift die Flucht. Unterwegens speyt er beständig Wasser aus dem Munde, um sich den Weg schlüpfrig zu machen, und wirft mit den Hinterfüßen nach Beschaffenheit des Bodens Sand, Steine, Schlamm ꝛc. hinter sich, ja spritzt sogar bey harter Verfolgung einen sehr übelriechenden, gelben Unrath von sich. In die Enge getrieben, setzt sich das Männchen zuweilen zur Gegenwehr, sperret den Rachen auf und beißt und schlägt um sich. Dieß soll es auch in der Begattungszeit thun. Das Weibchen ist furchtsamer und rührt sich nicht einmal, wenn ihm das Junge genommen wird. Sie streiten auch unter einander, mit heftigen Brüllen um die Weibchen, und um die bequemsten Ruheplätze auf den Steinen und Eisschollen. Hier muß der schwächere allezeit dem stärkern weichen, und daher rühren die Narben, die man zuweilen in ihren Fellen antrifft. Ihre Schwimmfüße machen sie mehr zum Schwimmen als Gehen geschickt, daher ihr Gang auch mehr eine Art von geschlängeltem Kriechen ist,

ob

ob sie gleich in der Flucht fast so geschwind als ein Mensch zu laufen im Stande sind. Wenn sie sich auf die Vorderfüße hingestellt haben, so machen sie von vorn angesehen eben keine unangenehme Figur, dahingegen laufend, sie eben nicht den angenehmsten Anblick gewähren.

Die Stimme der Alten ist ein heiseres Bellen; und die Jungen mauen, wie die Katzen. Bey Beraubung der Jungen oder in der Gefangenschaft sollen sie häufig Thränen vergießen. In ihrem Elemente sind sie immer lustig.

Ihr Alter ist unbekannt.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die Kalbsrobben bewohnen fast alle vier Welttheile, aber in der größten Menge gegen Norden und Süden, nahe am Arktischen Kreise und in den untern Theilen von Südamerika in beyden Weltmeeren, nahe am südlichen Theile von Terra del Fuego, auf, sogar unten unter den Eisflössen. Man trifft sie auch im Caspischen Meere, in dem See Aral, Baikal und Oron an. Hier in diese süße Wasser müssen sie entweder durch eine revolutionäre Veränderung des Erdballs oder durch andere außerordentliche und seltene Zufälle gekommen seyn; denn gewöhnlich versteigen sich diese Thiere nicht weit vom Ocean in die Flüsse *).

*) S. Pallas Reise III. 290.

Vielleicht daß es auch verschiedene Arten sind, denn die Untersuchung ist noch nicht genau genug gemacht worden.

Sie halten sich an den Küsten der Meere, an den Mündungen der großen Flüße und Bayen auf. Im Sommer sind sie gern auf dem Laude, oder in den Eißmeeren auf dem Eiß, und bringen den größten Theil der Zeit auf den Klippen, die aus dem Wasser hervorragen, oder auf den Eißschollen mit Schlafen an der Sonne zu. Die Nase ist allemal nach der See hinaus gerichtet. Ihr Schlaf ist sehr fest, sie wachen aber oft auf, und sehen sich mit aufgerichten Halse um. Dieß bemerkt man oft am Strande der Ostsee, wo ihrer 300 Schritte vom Lande oft eine solche Menge auf den hervorragenden Steinen liegen, und sich sönnen, daß nicht für alle Platz genug da ist. Man hat sie auch fern vom Lande in der See schwimmend schlafen gesehen. Im Winter sind sie mehr in der See, und da sie in der Scheidewand des Herzens zwischen beyden Herzkammern das eyrunde Loch der Amphibien haben, welches andern Säugethieren, die im Wasser leben, z. B. dem Fischotter mangelt, so können sie sehr gut unter dem Wasser aushalten. Wenn sie schwimmen, tragen sie den Kopf meist über dem Wasser empor. Da sie unter dem Eiße, ohne Luftlöcher zum Athemhohlen und zum Durchgang zu haben, nicht leben können, so machen sie sich dergleichen nach einigen, durch ihren warmen Athem, und nach andern, durch ihre scharfe Krallen; und zwar jene unten weit, oben aber ganz enge, so daß sie nur den Kopf oder auch bloß die Nase herausstecken können, diejenigen aber, durch welche sie aus- und eingehen, weiter. Sie sind im Stande solche Löcher von unten hinauf durch das dickste Eiß zu machen, nicht aber von oben hinunter und wenn es auch noch so

dünn

dünn ist. Sie halten sich auch gern in den Höhlen an den Küsten auf, in welche die See hineingeht, und begeben sich oft ihrer Nahrung halber auf den Flüßen landeinwärts. So hat man vor nicht gar langer Zeit einen aus der Nordsee gekommenen in der Elbe gefangen.

In der Ostsee will man bemerkt haben, daß sie im Frühjahr dem Eiße nachzuziehen pflegten, um sich das ausfallende Haar daran zu reiben. Sie begeben sich auch des Nachts bey stillem Wetter aufs trockne Land, doch nicht weit von der See.

Nahrung.

Sie nähren sich von mittelmäßigen und kleinen Fischen, von Salmen (Salmo Carpio) und kleinen Barschen (Perca Norvegica) und verfolgen besonders die Heringszüge. Man findet auch Seeinsekten in ihrem Magen. Die Möwen jagen ihnen oft ihren Raub ab. Sie sollen aber auch allerley Arten von Meergraß freßen, und man will auch fingerlange Würmer, wie Spulwürmer in ihren Magen, als ein Nahrungsmittel angetroffen haben.

Fortpflanzung.

Die Begattung ist an keine gewisse Zeit gebunden, doch soll sie am gewöhnlichsten im April geschehen, und die Jungen sollen alsdann im Herbst fallen. Man trifft aber auch im Winter und im Frühjahr Junge an. Im Grönland sollen sie sich im September begatten und als-

dann sollen die Jungen im Junius fallen. Die Begattung wird auf dem Strande oder Eiß vollbracht und das Weibchen liegt auf dem Rücken. Ein Männchen hat seine gewisse Weibchen zwey oder mehrere, und letztere bringen auf einem Steine oder dem Eiße, am liebsten in einer unbewohnten Gegend am Ufer eins höchst selten zwey Jungen zur Welt. Diese werden ohngefähr sieben Wochen lang auf Felsen, oder in Höhlen oder auf den Eiße sitzend, oder wie man bemerkt haben will, in der See stehend, an den nach Gefallen zum Ein- und Ausziehen angerichteten Säugwarzen an der Brust gesäuget und von der Mutter von allen andern sehr genau unterschieden. Sie sollen lange wollige weiße oder sehr gelbliche Haare haben wenn sie gebohren werden. Diese müssen aber in den ersten Wochen zuerst auf dem Kopfe und an den Hinterbeinen ausfallen, und sich in die oben beschriebene Farbe verwandeln, weil man sie gleich schwarz antrifft. Sie lassen sich zähmen und folgen ihren Herrn, wie Hunde, auf den Ruf. Sie zeigen dann viel Gelehrigkeit und ein sanftes Naturell. Man hat Beyspiele, daß sie so zahm gemacht sind, daß sie alle Winke ihrer Herrn befolgt haben, und aus den Kübel gegangen sind, wenn es ihnen befohlen wurde, schrien wenn man es wollte, sich streichen ließen, ja die Leute küßten, und sogar Worte nachgesprochen haben sollen z. B. Mamma, Papa u. s. w.

Feinde.

Der kleinäugige Kachelot (Physiter Microps), der Hundshay (Squalus Cacharias) ver-

fol-

folgen sie, und sie sollen sich dann, wenn es möglich ist, aufs Land zu flüchten. Hier paßt den kleinen und Jungen der Fisch-Adler (Falco Albicilla) auf. Der Eisbär (Ursus maritimus) ist aber ihr größter und ärgster Feind.

Fang.

Der Robbenfang geschieht auf verschiedene Art. Es gehen alle Jahre etliche Schiffe von Holland und Hamburg im April und März darauf aus. Die Robbenschläger suchen sie bey Spitzbergen auf dem Eiße, wo sie in ganzen Heerden liegen und schlafen, zu umringen, erschrecken sie mit Schreyen, und wenn sie die Köpfe hervorrecken, und bellen, geben sie ihnen mit einen mit Eisen beschlagenen Stock einen derben Schlag auf die Nase, daß sie hinstürzen. Auf diese Art können auch die unglücklichen Wallfischfänger ihre Schiffe mit Seehundsspeck und Fellen beladen.

Die Nordländer fangen sie mit Harpunen, oder Wurfpfeilen, in Gruben oder Netzen, die sie um die Steine stellen, auf welchen sie liegen, oder vor die Buchten und Meerengen, welche sie zu besuchen pflegen. Die Isländer sollen in einem Tage 60 bis 200 Seehunde fangen können.

In der Ostsee paßt man ihn mit Kugelbüchsen auf, wenn sie auf den Klippen am Ufer liegen, und erschießt sie, und sonst gieng an manchen Orten ein Mann, mit einem weißen Hemde bekleidet, so tief in die See hinein,

und so nahe an den auf einer Klippe liegenden Seehund, als er nur konnte, und warf alsdann eine Harpune nach demselben, ließ die Schnur so geschwind als möglich nach, und wartete bis er sich todt verblutet hatte, um ihn nach sich zu ziehen.

Nutzen.

Das Fleisch der Seehunde ist die vornehmste und liebste Speise der Einwohner der nördlichen Länder, und sonst wurde es auch in Norwegen und England selbst auf den Tafeln der Vornehmen gegessen. Die Seereisenden müssen es oft essen. Das alte ist schwarz und zähe, das junge aber schmeckt gut.

Der Speck wird sowohl zur Speise als zum Thranbrennen gebraucht. Ein fetter Seehund giebt 50 bis 60 Pfund. Den von alten braucht man zum Brennen in Lampen und in Gerbereyen; der von jungen ist so gut, wie Baumöl auf dem Salat.

Die Milch ist weiß, fett, schmeckt thranig und wird gekocht zu Käse. Die Bauern in Island hängen die mit Milch gefüllten Magen der Jungen in den Schornstein, wo sie sich in Oehl verwandeln soll, das man in Lampen brennen kann.

Die Nordländer brauchen fast alles von ihnen, Magen, Därme, Knochen, Sehnen, zu Werkzeuchen, Kleidung u. d. g. und sie sind ihnen nützlicher als uns die Schafe.

Aus

Aus dem Blute machen die Ostbothnier Blutwürste und die Grönländer Suppen.

Die rauh gahrgemachten Felle werden von den Kürschnern zu Jagdmüffen, Reisekleidern, Pferdedecken, Tabaksbeuteln, für Podagristen zu Stiefeln und Pantoffeln, von den Sattlern zum Ueberziehen der Koffer und zu Reisetaschen gebraucht, und die Engländer überziehen mit dem feinhaarigen Fell der Jungen Tobacksdosen, Uhrgehäuse und Messerhefte. Auch bereitet man aus den Häuten eine zu Schuhen und Stiefeln taugliche Art Saffian.

Die Grönländer machen Kleider, Stiefeln u. s. w. davon und mit den ältesten beziehen sie inwendig die Zelte.

Aus den Fellen der Jungen, ganz abgestreift, macht man auch Robben-Blasen, an welchen durch ein Seil die Harpune, womit man die Robben wirft, befestigt ist, und die sie nicht weit hinabzuziehen im Stande sind.

Die Eckzähne können zu schöner Drechsler- und eingelegter Arbeit gebraucht werden.

Wenn die Seehunde oft aus dem Wasser hervorsehen, so soll es Ungewitter anzeigen.

Schaden.

Sie verzehren eine große Menge Fische, verderben die Fischernetze, worin sie auch oft in der Ostsee gefangen werden, zerreißen die Angelschnüre, um

sich

sich der daran hängenden Pomuscheln, welche sie beym Kopfe abbeißen, zu bemächtigen: und in Island sind sie dem Lachsfange sehr schädlich.

68. Der graue Robbe *).

(Bothnischer Seehund, wahrscheinlich auch die rauhe Robbe, Buchten-Robbe oder der Buchten-Seehund).

Phoca cinerea.

Phoca vitulina botnica. *Gmelin Lin.* l. c. β

Neue Schwedis. Abh. V. 1784. 1s Viertelj. S. 82. (Ein Aufsatz von Oedmann über die Seehunde der Ostsee.)

Linne' hat diesen Seehund als eine Spielart vom gemeinen betrachtet, allein er ist nicht nur in der

*) Hr. Fabricius macht es in den Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Copenhagen l. 2. p. 89. wahrscheinlich, daß dieß der Buchten-Robbe Phoca hispida. Gmelin. Lin. l. 1. p. 64. n. 7. v. Schrebers Säugeth. III. 312. Taf. 86. sey. Hiernach würde er bey Grönland häufig angetroffen, wo er sich am liebsten in großen und tiefen Meerbusen aufhält, wo sich das Eiß länger und fester anlegt. Die Grönländer benutzen Fleisch, Speck, Eingeweide und Felle wie von den Seehunden, theils zu Speisen, theils zu Kleidungen und Hausgeräthe.

der Lebensart von jenem verschieden, und also als eine verschiedene Art zu betrachten.

Kennzeichen der Art.

Der Kopf ist glatt; die äußern Ohren fehlen; die Nase ist breiter und länger als an dem Kalbsrobben; die Farbe grau.

Beschreibung.

Im Ganzen ist dieser Robbe der Gestalt den vorhergehenden gleich; doch hat er eine breitere Nase und längere Klauen als jener. Seine Farbe ist meist dunkelgrau, zuweilen, vorzüglich in der Jugend gelblich. Seine Größe soll nach einigen die der vorigen Art übertreffen, nach andern merklich kleiner seyn *). Der Unterschied der Größe, wo er nach Oedmann so groß als ein Schwedischer Ochse werden soll, liegt wohl im Alter.

Er wohnt in der Ostsee, aber nicht an einerley Stellen mit dem vorhergehenden.

Seine Begattung fällt um Johannistag, und das Weibchen wirft zu Ende des Hornungs auf dem Eise im Bottnischen Meerbusen ein Junges. Dieses ist 8 Tage nach der Geburt ganz weiß oder gelblich; nach dies-

*) So war der, welcher im Winter 1789 bey Greifswalde gefangen wurde kleiner, und nicht viel grösser als der kleine (geöhrte) Robbe (Phoca Pusilla, Gmelin Lin.

diesem fallen die Haare aus, und zwar zuerst auf dem Kopf und den Vorderfüßen, die helle Farbe verdunkelt und es entstehen größere oder kleinere Flammen oder Flecken, und nach und nach werden sie ganz schwarzgrau. So lange die Jungen noch klein sind, wagen sie sich nicht ins Wasser, sondern rufen, wenn sie hungern, die Mutter durch Blöcken unter dem Eiß hervor.

Gegen Ende des Märzes, wenn die Jungen ihre Nahrung schon selbst suchen können, zieht er aus dem Bottnischen Meerbusen in die Ostsee herunter. Er nimmt seinen Weg gerade gegen Süden, und pflegt keiner Landspitze oder Klippe auszuweichen, sondern darüber wegzugehen.

Er hat gleiche Feinde mit den vorhergehenden, vorzüglich ist er den Verfolgungen des Fischadlers ausgesetzt.

Das Fleisch desselben hat einen ranzigern Geschmack als vom gemeinen. Die Felle sind wie bey dem vorhergehenden zu brauchen *).

*) Oedmann giebt am angezogenen Orte noch vier Arten von Robben aus der Ostsee an; die sich auch an den Deutschen Küsten sehen lassen. Ihre Beschreibung ist aber noch zu unvollkommen, als daß sich etwas Bestimmtes darüber sagen ließe, ob es gleich so gut als ausgemacht zu seyn scheint, daß sie keine Varietäten des Kalbsrobben sind. Um meine Leser das, was bis jetzt davon bekannt ist, mitzutheilen, bemerke ich folgendes:

*) Der

a) Der Staatsrobbe.

Er wird weiß gebohren, und behält diese Farbe so unveränderlich, daß sie höchstens ins perlfarbige fällt, wenn er völlig ausgewachsen ist. Er wird nicht so groß als der graue Robbe, und ist scheuer und vorsichtiger.

b) Der graue Strandrobbe. Er bringt graue Junge zur Welt.

c) Der schwarze Strandrobbe. Er heckt bloß schwarze Junge. Diese beyden Arten von Strandrobben unterscheiden sich von den bereits angeführten dadurch, daß sie ans Land kriechen, um zu schlafen, dahingegen die andern, welche gemeiniglich Seerobben genannt werden, aufrecht im Wasser stehen, mit dem Kopfe über der Oberfläche des Wassers und so hart schlafen, daß man sich ihnen sicher so sehr nähern kann, um sie mit dem Robbeneisen zu tödten. Sie nähren sich vorzüglich von einer Art Stachelbärschen, die sie im Herbste bis in die seichten Meerbusen verfolgen, wohin diese Fische alsdann zu Millionen kommen. Niemals sieht man den Seerobben an diesen Fischen Antheil nehmen. Die Strandrobben sind auch allezeit fetter, schwimmen oft, wenn sie todtgeschlagen sind, oben, welches man bey den Seerobben niemals sieht. Sie gehen ins Netz, das man zu ihrem Fange auslegt.

d) Der Morunge-Robbe ist eine kleinere Robbenart, welche schäckig, und mit Flecken getiegert ist. Die größten Robbenjäger versichern, daß diese Art fast gänzlich ausgerottet wäre. —

Wie ich neulich aus einem Schreiben aus Greifswald erfuhr, so ist ohnlängst ein Robbe an dem Ufer der Ostsee gefunden worden, der der Beschreibung nach wohl Pennants schäckiger Robbe (Pied Seal. Pennant hist. of Quad. II. 273. Meine Uebers. II.

Vergl.

Vergl. auch Phoque a ventre blanc. Buffon hist. nat. Suppl. V. 310. Taf. 44. Ueberf. durch Otto XVI. 133. m. 2 Fig.) seyn möchte. Allein da die Beschreibung zu unvollkommen war, so will ich dieß Thier, da es noch ungewiß ist, ob es unter die Deutschen zu zählen oder nicht zu zählen ist, hier nicht näher beschreiben. Mit der Zeit werden wir auch hierüber mehrere Aufschlüsse erhalten.

Zwey-

Zweyter Abschnitt.

Ohne Zehenabtheilungen. Cetacea.

Fisch- und wurmfressend.

Sie nützen vorzüglich durch ihr Fett, das zu Thran geschmolzen wird.

Die Thiere dieser Ordnung fehlen meistentheils in Deutschland, weil sie das große Weltmeer, besonders um den Nord- und Südpol herum bewohnen. Unter ihnen werden die größten Thiere des Erdbodens angetroffen. Die wenigen, welche für uns Deutsche interessant sind, und sich den Deutschen Küsten und Flüssen nähern, sind folgende.

Die sieben und zwanzigste Gattung.

Narwall. Monodon.

Kennzeichen.

In der obern Kinnlade befinden sich zwey gerade, sehr lang aus dem Munde hervorstehende, meist spiralförmig gewundene Zähne.

Die Spritzröhren sind im vordern und obern Theil des Schädels.

Der Kopf ist klein und an dem großen Körper unmerklich unterschieden.

69. Der gemeine Narwall *).

Namen, Schriften und Abbildungen.

Er heißt auch: Narwal, Narwhal, Narhual, Einhorn, Einhornfisch, Seeeinhorn und Meereinhorn.

Monodon Monoceros. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 222. n. 1.

Franz. Le Narvhal.

Engl. Unicorn-fish or Narwal.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 330.

Egede Beschr. von Grönland. 99. Taf. 5.

Schneiders zool. Beytr. S. 252.

Donndorfs zool. Beytr. I. 755. n. 1.

Kenn

*) Narwal oder Naarhual heißt eigentlich Walfischaas, von Naar eine Leiche und Hual der Walfisch.

Kennzeichen der Art.

Mit einem weißen Bauch, oft schwarzgeflecktem Rücken, keiner Rückenflosse, aber zwey kleinen Brustflossen.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Man beschreibt von dieser Gattung nur eine einzige Art, ob man gleich Narwalle mit gewundenen und glatten, und noch andere Verschiedenheiten zeigenden Zähnen antrifft; allein die Geschichte dieser und der meisten Seethiere liegt so sehr im Dunkeln, als daß man mit Gewißheit etwas angeben könnte. Das ganze Thier findet man von 20 bis 60 Fuß Länge *) und 8 bis 12 Fuß Breite. Der Kopf ist klein und spitzig; der Mund klein und weit unten sitzend; die Unterlippe dünn und kurz; die Zunge breit; der inwendige Mund ohne Zähne; nur bloß der Rand desselben rauch und hart. Aus beyden Seiten des Unterkiefers gehen durch die Oberlippe zwey 6 bis 8 Fuß lange, zweyfach schraubenförmig gewundene, weiße, hinten oft armsdicke, vorn spitzig zulaufende, mit dem Körper gerade und gleich ausstehende Zähne, wovon gewöhnlich einer fehlt, der entweder im Kampfe mit andern Thieren oder beym Durchbrechen des Eises, oder auf andere Art abgebrochen wird. Oft findet man einen Stumpf davon, oft auch keinen, doch sitzt

*) Par. Maaß fast eben so.

der andere Zahn allezeit auf einer Seite und nicht auf der Mitte, daß man sieht es fehlt einer. In der Jugend findet man auch gewöhnlich beyde Zähne noch an dem Thiere, obgleich nicht von einerley Größe, auch wohl noch einen in der Zahnzelle des Oberkiefers versteckt, da nicht allezeit beyde zugleich zum Durchbruch kommen. Es erhellet aber daraus doch hinlänglich, daß die Meynung derer, welche glauben, sie würfen die Zähne jährlich ab, wie der Hirsch sein Geweyh, ungegründet sey. Die Materie der Zähne ist dicht und fest und inwendig sind sie hohl. Vorn auf dem Kopfe befindet sich eine doppelte Spritzröhre, die gleichsam mit Fleisch ausgefüttert und mit einer Klappe versehen ist, die geöffnet und geschlossen werden kann. Die Augen stehen niedrig, sind klein und mit einer Art von Augenliedern versehen. Der Körper ist oval, mehr dick als länglich und hat mit dem Stöhre einige Aehnlichkeit. Die zwey Finnen oder Flossenfüße auf der Brust sind klein. Der Schwanz liegt horizontal und ist in der Mitte etwas ausgeschnitten. Die Haut ist glatt, entweder schwärzlich oder olivengrau, auch weiß mit vielen schwarzen Rückenflecken, am Bauche aber allezeit weiß. Der in der Elbe gestrandete war weiß mit kleinen bräunlichen Flecken. Der ganze Leib ist mit Speck überzogen.

Das Weibchen hat eben sowohl Zähne als das Männchen.

Der Narwal schwimmt mit außerordentlicher Schnelligkeit, wozu ihm vorzüglich sein Schwanz, so wie die Brustfinnen, die statt des Steuerruders dienen, beförderlich

sich sind. Wenn sie nicht schaarenweise zögen, würde man daher selten einen fangen oder schießen können; so aber versperren sie sich oft selbst, wenn sie durch Verfolgung ins Gedränge kommen, mit den Zähnen den Weg, und können weder geschwind genug nach den Grund zu gehen oder sonst entfliehen. Gewöhnlich legt auch, wenn sie zu dichte kommen, einer den andern seinen Zahn auf den Rücken, dadurch werden die hintern in der Flucht gehindert und gefangen oder geschossen.

Verbreitung und Aufenthalt.

Die eigentliche Heymath dieser fischartigen Säugethiere ist der nördliche Ocean von Europa und Amerika. Man will sie auch in den Indischen Gewässern gesehen haben. Bey Island und am Norwegischen Strande findet man die Zähne häufig, sieht aber das Thier selten. Sie nähern sich auch zuweilen unsern Deutschen Küsten, und werden dann durch hohe Fluthen in die Flüsse verschlagen. So strandete einer im December 1736 bey Hamburg in der Elbe nach erfolgter Ebbe *). Seine Länge betrug 11 Fuß, 8 Zoll; der Zahn war 6 Fuß, jede Flosse 9 Zoll lang und der Schwanz 3 Fuß 2 1/2 Zoll breit **). In der Davisstraße versammeln sie sich haufenweise um die Luftlöcher in den Eisfeldern. Da er aus einer Gegend in die andere zieht, und also ein Zugthier zu seyn scheint, so sehen die

*) Hamburgisches Magazin. XVI 178.

**) Eine Abbildung von demselben s. in Blumenbachs Abbildungen naturhist. Gegenstände. 5tes Heft Taf. 44.

Grönländer und die Wallfischfahrer in jenen Gegenden seine Ankunft als einen Vorboten der Wallfische an, und machen sich zur Jagd auf diese fertig

Nahrung.

Man sagt, sie lebten bloß von Schollen und großen Seeqvallen (Actiniis). So viel ist gewiß, daß sie ihre Nahrungsmittel zuweilen auf den Meeresboden holen müssen, weil ihre Zähne beständig mit Seegräsern und mit andern Unreinigkeiten bedeckt sind.

Fortpflanzung.

Hiervon ist nichts näheres bekannt.

Nutzen.

Man erlegt den Narwal seines Specks und seiner Zähne wegen. Er liefert zwar nur wenig Speck, allein der Thran daraus ist dünn und nicht so übelriechend, als vom Wallfisch. Das Fleisch wird auch von den Grönländern gegessen. Den Zahn, welchen man, bis die Grönländische Fischerey aufkam, für das Horn des fabelhaften oder schlecht beschriebenen Einhorns*) hielt, und dem man, wie allen unbekann-

*) Das Reem (רְאֵם) der Bibel (4 B. Mose Cap. 23, 22. Cap. 24, 8. 5 B. Mose 33, 17. Psalm 22, 22. 29, 6. 92, 11. Hiob 39, 12—15. Jesaias 34, 7 ist wahrscheinlich nichts anders, als das einhörnige Nas-

kannten und seltenen Naturproducten, geheime Kräfte zuschrieb, bezahlte man sonst mit 1000 Rthl. Jetzt kostet aber das Pfund nicht mehr als ein Paar Gulden und der ganze Zahn 8 bis 20 Rthl. Da er eine schöne Weiße, größere Schwere und Härte und ein feineres Gewebe, als das Elfenbein hat, so wird er auch eben so, wie dieses zu allerhand Kunstsachen verarbeitet.

In einigen Apotheken wird er auch noch wie das Elfenbein oder Hirschhorn zubereitet.

Die Grönländer brauchten die Zähne sonst in Ermangelung des Holzes zu Sparren unter ihre Hütten.

Nashorn (Rhinoceros unicornis). Auf dieß passen alle angegebene Eigenschaften. Man darf keine genaue naturhistorische Beschreibungen von den Alten erwarten, geschweige denn von Poeten, wie alle die Verfasser sind, die seiner erwähnen.

Beym Plinius (hist. nat. VIII. 21.), Aristoteles (hist. an. II. c. 1.) und Aelian (hist. anim. XVI. 20.) wird entweder unter den Namen Monoceros, Nyscoon oder fera monoceros eben dasselbe Thier nach der Tradition gemeynt, man fabelte ihm eine andere Gestalt und andere Eigenschaften noch bey, daher es der Indische Esel mit den Hörnern wurde u. s. w. Siehe weitläuftig über diesen Gegenstand Meyers zool. Archiv II. S. 75—254, wo aber ein anderes unbekanntes Thier dafür ausgegeben wird, welcher Meynung ich nicht beytreten kann. Mehrere Schriften sind angegeben in Donndorfs zool. Beytr. I. 760.

Die acht und zwanzigste Gattung.

Wallfisch *). Balaena.

Die Zähne fehlen in beyden Kinnladen; statt deren liegen in der obern hornartige Blätter, Baarten genannt.

Auf dem Kopfe sind zwey Spritzröhren.

Die folgenden Thiere sind nicht bloß für uns Deutsche deswegen merkwürdig, weil wir so gut wie andere nördliche Völker auf den Wallfischfang ausgehen, sondern auch deswegen, weil man sie an den Deutschen Küsten, ja sogar Junge an den Mündungen der Deutschen Flüsse, z. B. der Elbe und Oder gefangen hat.

*) Wallfisch kommt her von dem Nordischen, oben schon angegebenen Hual, welches die Norwegen auch Qual aussprechen. Es sollte also eigentlich Hualfisch geschrieben werden. Im Altdeutschen ist noch die Spur des Ursprungs in Guallfisch. Andere leiten es von Wal, der ersten Silbe des lateinischen Balaena ab. s. Schneiders zool. Abh. S. 177.

70. Der gemeine Wallfisch.

(Taf. XX. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Wallfisch, Grönländischer Wallfisch, eigentlicher oder rechter Wallfisch, großer Wallfisch, gemeiner Grönländischer Wallfisch, und rechter oder eigentlicher Grönländischer Wallfisch.

Balaena Mysticetus. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 223, n. 1.

Franz. Balein de Groenland.

Engl. Greenland Whale.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 332.

Schneiders zool. Abhandl. S. 193.

Egede Beschreib. von Grönland. 48. Fig.

Martens Spitzberg. Reise. 98. Taf. Q. F. a. b,

Cranz Histor. von Grönland. 141.

Donndorfs zool. Beytr. I. 762. n. 1.

Abbildungen der Wallfische bey Homanns Erben, in Landchartenformat Fig. 1. 2.

Kenn-

Kennzeichen der Art.

Mitten auf dem Vorderkopf befinden sich zwey wie ein lateinisches S gebogene Spritzröhren, und der Rücken ist glatt ohne Finne.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Es ist wahrscheinlich das größte aller bekannten Thiere; denn sonst, ehe der Wallfischfang so stark betrieben wurde, traf man dasselbe von 120 Fuß an, jetzt aber, da es selten sein vollkommenes Wachsthum erreicht, hat es nur noch 50 bis 80 Fuß Länge und 40 bis 50 Fuß Dicke. Sein größtes Gewicht schätzt man auf 100,000 Pfund. Der Kopf ist ungeheuer und macht fast den dritten Theil seiner Länge aus. Er ist oben etwas flach, und die Spritzröhren liegen auf einer Erhöhung. Der Rachen ist groß und lang, und läuft in Form eines lateinischen S gebogen bis unter die Augen. Oben und unten sitzen an den Kinnladen schwarze kurze Haare, die in einander greifen, wenn sich das Maul schließt; die untere Kinnlade ist am breitesten, besonders in der Mitte. Im Oberkiefer sitzen auf beyden Seiten die Baarten, welche sich etwas schief unterwärts in die Unterlippe als in eine Scheide senken und die Zunge von beyden Seiten umfassen. Auf ihrer scharfen Seite sind sie mit Zotten, Fasern und Haaren versehen, welche Zunge und Lippe vor dem Einschneiden und Verletzen sichern und die eingeschluckten und zwischen den Baarten zerquetschten Würmer als ein Netz auffangen und anhalten, bis sie zum

Ver-

Verschlingen tüchtig sind. Sie sitzen auf beyden Seiten in Gestalt der Orgelpfeifen, vorn und hinten die kleinen und in der Mitte die größten von 10 bis 20 Fuß Länge und bestehen aus sichelförmigen, wie Reife gekrümmten Bogen, die mit den Flächen über einander liegen, mit der breiten Seite nach außen, mit der scharfen nach innen zu gekehrt sind, und mit der breiten Wurzel in einem weißen Knorpel stecken. An großen Fischen wiegen sie sämmtlich 800 bis 1000 Pfund. Man zählt ihrer gewöhnlich 700, allein 500 haben nur die erforderliche Länge und geben das bekannte Fischbein. Ihre Farbe ist schwarz, braun, auch gelb und weiß, und bey den Jungen bläulich. In der untern Kinnlade befinden sich zwey große Knochen, welche das Zermalmen der Baarten befördern. In derselben sitzt auch die Zunge, als ein großes weiches, weißes, an den Seiten schwarzgeflecktes Stück Speck; das 6 bis 20 Pfund Thran giebt. Sie ist eine sehr angenehme Speise der Schwerdfische, weshalb diese die Wallfische sehr verfolgen. Die Augen sind nicht größer als Ochsenaugen, stehen sehr niedrig fast am Ende der Kiefern und Anfang der Flossen, haben bewegliche Augenlieder, auch Augenbraunen, und die Crystallfeuchtigkeit hat die Größe einer Erbse, ist sehr hell, durchsichtig und weiß. Das Gehör ist scharf, ob man gleich weder äußeres Ohr noch Oeffnung gewahr wird. Statt deren finden sich aber, wenn die obere Haut weggenommen wird, hinter den Augen zwey kleine Röhren, welches Gehörwerkzeuge sind, die so dick wie Schreibfedern sind und vier Fuß tief hinab gehen. Durch selbige stoßen die Schiffsleute mit einem Bootshaken bis

auf

auf einen besondern Gehörknochen, der das Wallfischohr heißt, und ziehen denselben heraus. Mitten auf dem Kopfe stehen die zwey Spritzröhren dicht neben einander, und haben eine schlangenförmig gebogene 1 1/2 Fuß breite Oeffnung. Sie dienen statt der Nasenlöcher und der Wallfisch stößt aus denselben mit gewaltigem Brausen, das fast eine Meile weit zu hören ist, zwey große Fontainen hoch in die Luft. Die Flossen an der Brust haben fünf gegliederte Finger und ordentliche Hand- und Armenknochen, die in einigen Reihen mit Muskeln und Sehnen umzogen, mit einer dicken Haut überkleidet, aber ohne Spur von Nägeln sind. Man zeigt sie in Kabinetten unter dem Namen von Meermenschenhänden. Sie sind 5 bis 8 Fuß lang, und schwarz mit weißen Streifen, wie marmorirt. Der Rücken ist ohne Finne, nach dem Schwanze zu scharf, nach dem Kopfe zu aber rund. Der Schwanz ist etwas gabelförmig, 3 bis 4 Klaftern breit, liegt horizontal und ist auf beyden Seiten etwas aufgekrümmt. Wenn der Wallfisch auf der Seite liegt, so kann er so damit schlagen, daß das stärkste Boot zertrümmert wird. Er rudert damit, seiner ungeheuern Größe ohngeachtet, sehr schnell fort, und bedient sich auch der Brustflossen zum Umwenden. Im Schwimmen hinterläßt er einen Streifen mit vielen Wirbeln im Meer, und tobt und schlägt damit vor einem Ungewitter, daß es stäubt. Die Haut ist glatt, nur hin und wieder dünn behaart, von Farbe schwarz, am Bauche weiß. Doch trifft man auch ganz weiße, schwarz und gelb gefleckte und ganz sammetschwarze Wallfische an. Die Oberhaut ist dünn wie Pergament; unter derselben liegt

eine

eine fingerdicke Schwarte, und unter dieser sitzt der Speck, der gemeiniglich 6 bis 12 Zoll dick und schön gelb ist. Wenn man die Haut abzieht, welches sich leicht thun läßt, wenn sich der Wallfisch erhitzt hat, und sie gegen die Sonne hält, so wird man die Schweislöcher gewahr. Auf der Haut sitzen meist Seepflanzen, Schnekken, Muscheln und Corallen. Das Fleisch ist mager und von hochrother Farbe. Die Knochen sind hart und fest wie an großen Landthieren, löcherig wie ein Schwamm und mit Mark und Thran angefüllt. Das Zeugungsglied des Männchens ist 6 bis 8 Fuß lang, hinten 7 bis 8 Zoll dick, und nach vorn zu so zugespitzt, daß es einen Zoll hält. Es zieht sich in den Leib, wie in eine Scheide ein, und die Oeffnung ist mit Muskeln fest verschlossen, damit es im Meeresgrunde nicht verletzt wird. Das Geburtsglied des Weibchens ist wie bey den Landthieren beschaffen und ebenfalls fest verschlossen. An jeder Seite desselben sitzt ein Euter, das gewöhnlich fest anliegt, allein zur Säugezeit für die Jungen 6 bis 8 Zoll in die Länge, und 10 bis 12 Zoll in die Rundung von der Mutter herausgedrängt werden kann, weiß oder auch schwarz und blau gefleckt ist.

Das Weibchen ist größer als das Männchen.

Um die Verhältnisse und Theile eines Wallfisches kennen zu lernen, will ich noch die Ausmessungen desjenigen hersetzen, welcher im Jahr 1763 nach Olaffens Angabe an das Ufer von Seltiarmenes auf Südisland getrieben wurde *).

Die

*) Olaffens Island I. 287. Schneider a. a. O.

Die Länge war 56 Fuß, und die Dicke in der Mitte 41 Fuß 8 Zoll. Die unterste Kinnlade maß 13 Fuß. Baarten saßen an einer Seite 368 Stück, wovon 41 sehr groß waren. Der Schlund war vom Halse bis in den Magen 8 Fuß lang und 7 Zoll weit. Die Länge der Eingeweide vom Magenende bis zum After 354 Fuß und die Weite derselben 6 Zoll. Die Luftröhre vom Halse an, bis zur Theilung 3 Fuß lang, und dicht unter dem Kehldeckel 12 Zoll weit.

Der Rückgratswirbel waren 63, und an den 14 hintersten fehlte, so wie an den drey ersten, der Fortsatz (processus dorsalis). Die Augenhöhle war 10 Zoll lang und 7 1/2 Zoll breit.

Verbreitung und Aufenthalt.

Der gemeine Wallfisch wohnt am häufigsten um den Nordpol herum, besonders um Grönland und Spitzbergen, Novazembla u. s. f., und man trifft daher selten einen, der verschlagen worden ist, an den Deutschen Küsten der Ost- und Nordsee an. Gewöhnlich sind dieß Junge. Außerdem findet er sich auch im Atlantischen Ocean, und im stillen Meere, wo er von den alten Peruanern angebetet wurde. In der Höhe von 77 bis 79 Graden finden sich die Wallfische, die gesellschaftlich leben, von vorzüglicher Menge, so daß sie von ferne wegen der Wasserstrahlen, die sie aus ihren Spritzröhren stoßen, einer Stadt mit rauchenden Schornsteinen ähnlich sehen. Sie thun große Reisen, gehen

am

am Ende des Jahres westwärts, und im Frühjahr ostwärts.

Nahrung.

Diese besteht aus weichen Seethieren, Polypen, Seesternen, Meduſenköpfen, kleinen Insekten, vorzüglich Krebsen, allerley Seewürmer, z. B. dem Wallfischaas, das so groß wie Erbsen und schwarz von Farbe ist, in Heringen, und andern kleinen Fischen, die ihnen aufstoßen. Sie schlürfen ihren Fraß mit einem starken Athemzuge ein, und geben das eindringende Wasser zwischen den Baarten und durch die Spritzröhren wieder von sich. Ihr Auswurf sieht zinnoberroth aus.

Fortpflanzung.

Von dieser weiß man wenig Gewisses. Die Grönlandsfahrer sagen, daß sich bey der Begattung beyde Geschlechter auf ihre breite Schwänze senkten, mit gerade aufgerichteten Körpern gegen einander rückten, mit den Brustfinnen sich aneinander schlössen und gleichsam umarmten, und so stehend sich begatteten. Hingegen andere sagen, daß das Weibchen sich auf den Rücken werfe, das Männchen sich auf dasselbe lege und mit den Flossen von jenen angehalten werde. Alle zwey Jahre soll die Fortpflanzung vor sich gehen, die Mutter 10 Monate tragen und im April ein Junges selten zwey werfen. Die Jungen sind gegen zwanzig Fuß lang, schwarz oder grau marmorirt. Um die Heckzeit ist die Mutter am fettesten, zur Säugezeit am magersten, wo alsdann das Junge

sehr

sehr fett, so fett ist, daß es 50 Fässer Thran giebt. Wenn die Frucht 17 Zoll lang ist, so soll sie schon völlig ausgebildet seyn, die Jungen sollen ein ganzes Jahr lang saugen und die Mutter soll sich dazu auf die Seite werfen.

Man rühmt die außerordentliche Sorgfalt, welche letztere gegen die Jungen heget. Wenn es verfolgt wird, so soll sie dasselbe zwischen die Flossen nehmen und so mit sich fortschleppen, und wenn sie sich auf den Grund begiebt, so kommt sie, ohne Gefahr zu scheuen, doch um des Jungen willen bald wieder herauf, da dieß nicht so lange ohne Athem zu holen, unter dem Wasser ausdauern kann. Sie verläßt dasselbe nie, und man sticht auf dem Fange erst das Kalb an, tödtet es aber nicht eher als bis sie in Sicherheit gebracht ist, sonst würde sie so wüthend werden, daß man ihr nichts anhaben könnte.

Feinde.

Ihre vorzüglichsten Feinde sind der Sägefisch (Squalus pistris), der dicke Delphin (Delphinus Orca), welche sie truppenweise anfallen, auf den Strand jagen, ihnen große Stücken aus dem Leibe reißen, und sie tödten. Ersterer geht vorzüglich den Jungen nach. Auf dem Leibe plagt ihnen die sogenannte Wallfischlaus (Oniscus Ceti), welche sich vorzüglich an den Brustflossen, Ohren, Nabel und um die Zeugungsglieder aufhält, und sich so fest einhäkelt, daß sie ohne Wunde nicht loszureißen ist.

Fang.

Den Wallfischfang begannen im Anfange des vorigen Jahrhunderts die Biscajer und Norweger denen hierauf die Holländer, Engländer, Schottländer, Spanier, Franzosen, Dänen, Schweden, Russen, von den Deutschen die Hamburger, Bremer, Lübecker und Emder folgten, und Schiffe zu diesem Fange ausschickten. Die Gesellschaft, welche Schiffe zu diesem Fange ausrüsteten, hießen Grönlandfahrer. Die Schiffe, welche nach Grönland gehen, laufen im April, diejenigen aber, welche nach der Davisstraße bestimmt sind, schon im März aus. Der Fang ist vom Mai bis Julius am besten. Um Spitzbergen findet man alsdenn 200 bis 300 Schiffe von allen Nationen, die an 2000 Wallfische fangen, und wovon der größte 6000 Rthlr. werth ist. Man nimmt zu diesem Fange große und starke Schiffe, deren jedes 5 bis 6 Schaluppen hat. Von diesen werden zwey bis drey mit beherzten Matrosen abgeschickt, sobald man in der Ferne einen Wallfisch erblickt. Man rudert dem Fische so nahe als möglich, und in einer Weite von ohngefähr 30 Fuß wirft der Harpunierer demselben eine sehr spitzige Harpune (Pfeil mit zwey starken Widerhaken) von fünf bis sechs Fuß Länge in den Leib. An dieser ist ein hundert Klaftern langes Seil befestigt, das sich von einer

*) Tramplers Beschreibung des Grönländischen Wallfischfanges. Leipzig 1771. Schneiders zool. Abh. S 259.

ner Winde löset, wenn der verwundete Wallfisch sehr schnell in die Tiefe eilet. Da das Seil oft nicht lang genug ist, so ist oben ein leerer und wohlverstopfter Kürbiß oder ein anderer schwimmender Körper angemacht, zum Zeichen, wo der Wallfisch ist. Dieser wird alsdann so lange verfolgt und mit Harpunen geworfen, bis er sich verblutet und matt wird; alsdann wird er mit Lanzen vollends getödtet. Todt schwimmt er mit dem Bauche oben, und wird mit Stricken am Schwanze zum großen Schiffe gezogen. Es besteigen ihn dann Leute mit Sporen, hauen den Speck, der bey einem großen an manchen Stellen drey Viertel Ellen dick ist, und wie bey dem Schweine zwischen Haut und Fleisch steht, und die Baarten aus dem Rachen aus, und lassen das Gerippe den Seevögeln und Eisbären übrig.

Die eingebohrnen Amerikaner, die ihn von der Straße Davis an bis zur äußersten Spitze des südlichen Amerika, bey den Falklandsinseln aufsuchen, fangen ihn auf folgende Art: Einer springt aus der Barke den Fisch auf den Kopf, und schlägt ihm einen hölzernen Pflock in das eine Blaseloch, worauf der Fisch mit ihm unter das Wasser geht, aber gleich wieder hervorkömmt, um Luft zu schöpfen. Sobald er das Wasser aus der andern Röhre ausgespritzt hat, schlägt er auch in diese einen Pflock, wodurch der Fisch nothwendig ersticken muß.

Die Elutaren fangen nach Steller *) die Wallfische in Netzen, welche aus Wallroßhäuten verfertigt sind.

*) Dessen Kamtschatka. S. 104.

sind. Diese setzen sie gegen die Mündung der Meerbusen und beschweren das eine Ende mit großen Steinen. In diesen Netzen verwickeln sie sich mit dem Schwanze, ermatten und sterben, worauf man sie herausholt und zerstückelt.

Nutzen.

Den Kamtschadalen und nordwestlichen Amerikanern sind diese Thiere für ihre mehresten Bedürfnisse von außerordentlicher Wichtigkeit; die Europäer aber benutzen nur vorzüglich den Speck und die Baarten.

Da man bis jetzt nicht mehr so große Wallfische wie sonst antrifft, so rechnet man auch auf zwey bis drey nicht mehr als hundert Tonnen Speck, welche neunzig Tonnen oder hundert und dreyßig Quartelen Thran geben. Ein Quartel hält sechs Anker und anderthalb Ohmen, und kostet 40 Gulden und drüber. Sonst bekam man von Einem hundert Tonnen Thran und drüber. Derjenige Thran, welcher von selbst aus dem Specke fließt, ist der beste und theuerste, hat eine hellgelbe Farbe, ist klar, und wird weißer Thran oder Kronthran genannt, und an Weißgerber und Carduanbereiter verkauft. Der ausgekochte oder ausgebrannte ist schlechter und hat eine braune Farbe. Man braucht ihn in Lohgerbereyen, in Lampen, zu Einschmierung der Lederwaaren, zur Vorbereitung der Baumwolle, wenn sie soll Türkischroth gefärbt werden und die Eskimos auch zur Speise. Man brennt ihn gewöhnlich in Kesseln aus;

die Kamtschadalen aber verrichten es in erhitzten Gruben. Die beym Schmelzen zurückgebliebenen Hefen werden von den Seifensiedern gebraucht. Es sind Grieven, die die Japaner auch zu essen pflegen. Die mittlern Baarten, welche auch Maaßbaarten heißen, liefern das sogenannte Fischbein. Bey uns benutzen es, wenn es in eignen Fabriken zerrissen ist, die Schneider besonders in Frauenzimmerkleidungen u. s. w. Es wird auch zu chirurgischen Instrumenten, zu Messerschaalen, Schachteln und Spatzierstöcken verbraucht, und Hrn. de Lucs neuere Hygrometer werden von sehr dünnen Streifen Fischbein verfertigt. Aus schmalen Streifen machen die Grönländer Stricke zum Fischfange, und die Kamtschadalen Fischernetze, Fuchsfallen und Eimer; auch dient er ihnen zur Verfügung ihrer Schiffe. Die Japaner machen davon kleine Geld- und Silbergewichte.

Die getrocknete Ruthe läßt sich auch wie Fischbein spalten, und eben so benutzen.

Das Fleisch wird von vielen nördlichen Völkern, als Grönländern, Isländern, Samojeden, Kamtschadalen, auch von den Japanern gegessen. Es ist grob, hart, roth und trocken und soll dem Rindfleische ähnlich seyn. Man schätzt vorzüglich das Fleisch der Jungen, der Zunge und des Schwanzes, welches letztere nicht so trocken ist, und sich weich kochen läßt. Die Isländer bringen es erst in saure Milch, die Japaner salzen es ein, und die Kamtschadalen trocknen es.

Aus dem Schwanze und den Finnen wird Leim gekocht.

Die Haut wird von den Japanern eingesalzen und gegessen, von den Karäken und Kamtschadalen aber im Rauche getrocknet, geschlagen und zu Lederarbeiten, vorzüglich zu Sohlen und Riemen gebraucht, die so stark sind, daß sie sehr lange Zeit halten.

Die Japaner brauchen die zartern knorpelartigen Knochen frisch gekocht zur Speise und geschabt zum Rindviehfutter.

Die vom Unterkiefer werden nach abgesonderten Thrane in Holland und Grönland zu Thorwegen und zu Brücken und Kirchstühlen gebraucht. Die Kamtschadalen machen Schlittenkufen, Messerhefte, allerhand Ringe und Riegel zu ihrem Hundegeschirre daraus. Die Isländer nehmen Ribben oder andere Knochen zu dem Kiel ihrer Boote und die Tschuktschen verbrennen sie als Holz. Der Rückenwirbel bedienen sich die Kamtschadalen als Mörser.

Die Eingeweide werden von den Japanern eingesalzen und gegessen. Die Tschuktschen und Kamtschadalen machen aus den Gedärmen Schläuche und allerley Gefäße, jene auch Hemden.

Letztere brauchen die Sehnen zu Schnüren und statt des Bindfadens, die Japaner zu den Saiten für die Fachbögen zur Bearbeitung der Baumwolle. Die

Grön-

Grönländer brauchen sie zum Nähen, und man flicht auch Peitschen daraus.

Die zinnoberrothen Exkremente, welche von einigen aus den Gedärmen genommen und gepülvert werden, sollen zum Rothfärben der Leinewand gebraucht werden können.

Als eine Varietät wird hierher gerechnet:

Der Eiswallfisch.

Balaena Mysticetus islandica. *Gmelin Lin.* l. c. β.

Balaena glacialis. *Klein* miss. pisc. II. p. 12.

Er wird auch Nordkaper genannt, und kommt mehr als die andern Arten in der Ostsee, wo er den Dorschen nachgeht, vor.

Chemnitz in den Schriften der Berliner Gesellsch. naturforsch. Freunde. V. 463.

Schneiders zool. Abh. S. 210.

Er ist dem vorigen sehr ähnlich. Kopf und Leib sind schmäler und kleiner. Der Kiefer ist rundlich; die Haut weißlich; die Baarten kleiner, und der Speck schlechter und nicht so stark.

Man trifft ihn am häufigsten am Nordkap, dem nördlichsten Vorgebirge in Norwegen, zwischen Neu-

see-

seeland und Island an; auch an den Küsten von Afrika und den Antillischen Inseln wird er gefunden.

Seine vorzüglichste Nahrung besteht aus Heeringen, fliegenden Fischen; er jagt die Kabeljaue und Schellfische nach dem Holländischen Strande und geht in der Ostsee nach den Dorschen. Die Heeringe soll er mit seinem Schwanze zusammentreiben und tonnenweise in seinen Rachen hineinziehen.

Da er weit schneller, lebhafter, immer in einer unruhigen Bewegung ist, und lauter krumme Sprünge macht, so ist er nicht bloß beschwerlicher, sondern auch gefährlicher zu fangen, als der obige Wallfisch. Er muß daher aus einer weiten Entfernung harpunirt, und durch einen tief eindringenden Widerhaaken festgehalten werden. Die Isländer fangen ihn, wenn er bey Verfolgung der Heeringe an untiefe Stellen oder Bänke geht.

Thran und Fischbein wird eben so, wie von dem obigen benutzt.

Die neun und zwanzigste Gattung.

Kachelot. Physiter.

Kennzeichen.

Bloß in der untern Kinnlade stehen Zähne.

Die Spritzröhre ist nur einfach, und steht entweder weiter hinter oder weiter vor auf dem Kopfe.

Fleischfressend.

Es können wohl mehrere fischartige Säugethiere aus dieser Gattung an die Deutschen Küsten kommen, als der folgende, allein von diesem ist es mir nur bekannt.

71. Der kleinäugige Kachelot.

(Taf. XX. Fig. 1.)

Namen, Schriften und Abbildungen.

Kleinauge, dritter Pottfisch, kleinäugiger Kaschelot, und krummzähniger kleinäugiger Kachelot.

Physiter Microps. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 228. n. 3. *a.*

Franz.

Franz. Cachelot à dents en faucilles.

Engl. Crooked toohted Whale.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 339.

Andersons Nachrichten von Island. 248.

Schneiders Abhandl. zur Zool. 225.

Donndorfs zool. Beytr. I. 778. Nr. 3.

Kennzeichen der Art.

Der Kopf ist sehr groß; der Oberkiefer etwas länger als der Unterkiefer; auf dem Rücken steht eine scharf zugespitzte Finne.

Gestalt und Farbe des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Länge dieses Kachelots beträgt 40 bis 70 Fuß; die Höhe ist alsdann ein Viertel der Länge und der Umfang drey Viertel. Der Kopf ist sehr groß, fast halb so lang als der ganze Leib ohne Schwanz, und dicker als der Leib; die untere Kinnlade etwas länger als die obere und so wie die obere unter oder über ein Fuß breit; in der untern Kinnlade stehen 24 bis 42 und mehr runde, etwas zusammengedrückte, lange und sichelförmig gekrümmte Zähne, welche unten an der Wurzel dünne, in der Mitte dicker sind, nach oben wieder dünne und nach und nach spitzig werden; sie sind gewöhnlich 7 Zoll lang und drüber, 2 Pfund schwer, am untern Ende 7 Zoll in

der

der Rundung, und geben der Kinnlade ein sägenförmiges Ansehen. Einige haben nebst diesen Vorder- und Seitenzähnen auch noch 5 Zoll lange Backenzähne, die in der Mitte 5 Zoll im Umfang und oben mehrere Spitzen haben. Andere haben vorne auf der Schnauze auch nur einen einzelnen Zahn und alsdann auf jeder Seite 25 Zähne. In der Oberkinnlade sind eben so viel Vertiefungen, als unten Zähne sind, in welche diese bey Schließung des Mundes passen; doch will man auch Backenzähne gefunden haben. Die Augen sind kleiner, als am Wallfisch und gelb; die anderthalb Fuß breite Spritzröhre steht nicht ganz in der Mitte des Scheitels nach vorn zu. Die zwey Flossen vorn an der Brust sind 4 Fuß lang und drüber und 1 1/2 Fuß breit; der Höcker oder die zugespitzte, dornartig auslaufende Rückenfinne, ist 4 Fuß lang und 1 1/2 Fuß hoch; der etwas mondförmig ausgeschnittene Schwanz ist 12 Fuß breit und drüber. Die Länge des männlichen Gliedes ist 5 bis 6 Fuß, die Dicke 1 1/2 Fuß und es liegt 3 Fuß vor dem After, welcher 14 bis 16 Fuß vom Schwanz entfernt ist. Die Zunge ist rund und zugespitzt. Der Schlund groß und weit. Die Haut glatt, fingersdick und braunschwarz. Der Speck dick und so weiß, wie Schweinespeck.

Verbreitung und Aufenthalt.

Der nördliche Ocean ist die Heymath dieser Thiere. Sie gehen aber beym Verfolgen ihres Raubes weit herunter, so daß sie an die Ost- und Nordsee kommen.

Nah-

Nahrung.

Er ist ein furchtbares Raubthier, das große und kleine Fische, z. B. Häyfische verschluckt, und besonders den stumpfschnauzigen Delphin so sehr verfolgt, daß dieser bis ans Land getrieben wird. Auch mehrern Robbenarten geht er nach.

Fortpflanzung.

Hiervon ist nichts bekannt.

Fang.

Wie der Wallfisch. Er wird auch geschossen.

Nutzen.

Der Speck, welchen man von diesem Thiere erhält, liefert 40 bis 50 Tonnen Thran, welcher heller, fester und besser ist, als vom Wallfisch, den man auch ohne Gestank und Dampf in Lampen brennen kann.

Man bekommt auch vier bis fünf Tonnen Wallrath (Sperma Ceti) aus ihm, welcher in Gestalt eines milchweißen Oehls, theils im Speck, theils aber in besondern Canälen im Kopfe neben dem Gehirn gefunden wird, nicht aber das Gehirn selbst ist, wie man sonst wohl glaubte *). In der Luft erhärtet er zu einem halb-

*) s. Campens Zergliederung eines Kopfs vom langköpfigen Kachelot (Physiter macrocephalus), welcher den meisten Wallrath giebt, in den Schriften der Berliner

halbdurchsichtigen Talge, und wenn er aufs Wasser geschüttet wird, so gerinnt und läuft er wie Käse zusammen. Er wird von den Grönlandsfahrern roh mitgebracht und in Holland, Lübeck und an andern Orten gereinigt. Wenn er glänzendweiß, durchscheinend, von milden Geschmack und ohne Thrangeruch ist, so hat er seine gehörige Güte. Wenn er ranzig ist, so kann man ihn durch Lauge wieder gut machen. Man braucht ihn vorzüglich zu Lichtern, Pomade und Schminke, auch giebt er mit Laugensalzen eine Seife.

Aus den fehnigen Theilen, die nach Abkochung des Thrans zurückbleiben, siedet man einen guten Leim.

Das Fleisch wird nur von nördlichen Völkern wohlschmeckend gefunden. Es ist hart und fest.

Die Zähne können von Drehern und Messerschmieden zu Heften verarbeitet werden.

Von diesem Kachelot giebt man als Varietät folgende an, die aber eine besondere Art zu seyn scheint:

Der

liner Gesellschaft naturforschender Freunde. III. 396. Vom Wallrath s. ferner: Schneiders zoolog. Abhandl. S. 237 u. f.

Der geradzähnige kleinäugige Kachelot.

Physiter Microps. *Gmelin Lin.* l. c. β.

Franz. Cachelot à dents pointues.

Anderson a. a. O. 246.

Er wird 70 bis 100 Fuß lang. Der Kopf ist fürchterlich groß; die viel kürzere Unterkinnlade hat 52 große gerade in die Höhe stehende und spitzig zulaufende Zähne, die wie die Zähne einer Säge stehen, und in die Höhlen der obern Kinnlade passen. Oben auf dem Rücken steht ein hoher Höcker und in geringer Entfernung vom Schwanze ein anderer in Gestalt einer Finne. Die Haut ist hart und fest, oben dunkelgrau, am Bauche weißlich; sie ist nur an einigen Stellen, z. B. hinter den Flossen mit der Harpune zu durchdringen.

Er hat mit dem vorhergehenden einerley Aufenthalt und Nutzbarkeit.

Die dreyßigste Gattung.

Delphin. Delphinus.

Kennzeichen.

In beyden Kinnladen sind spitzige Zähne vorhanden.

Oben auf dem Kopfe ist eine einfache Spritzröhre.

Der Körper ist gestreckt und schuppenlos, mit vier Flossen besetzt, zwey an der Brust, eine auf dem Rükken und Schwanze.

Das Männchen hat ein Zeugungsglied, und das Weibchen zwey Säugwarzen.

Es sind fleischfressende Thiere, die oft in ganzen Gesellschaften erscheinen.

72. Der stumpfschnauzige Delphin.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Braunfisch, Meerschwein, kleines Meerschwein, kleiner Delphin; Taumler und Tummler bey den Fischern; Nise, Niser, und Springer, weil er bey Ankunft eines Sturms aus dem Wasser springt.

Del-

Delphinus Phocaena. *Gmelin Lin.* I, 1. pag. 229. n. 1.

Franz. Marsouin.

Engl. Porpes. Porpoisse.

Klein Miss. pis. I. 24. II. 26. T. 2. A. B. 3. B.

Blochs Fische Deutschlands. II. 119. Taf. 92.

Andersons Nachricht von Island. 253.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 242.

Donndorfs zool. Beytr. I. 281. n. 1.

Kennzeichen der Art.

Der Körper ist fast kegelförmig; der Rücken breit; der Rüssel etwas stumpf.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Dieser Delphin wird 6 bis 9 Fuß lang *). Der Kopf ist vorne abschüssig, plump und stumpf. Die Schnauze ragt hervor und ist einem Saurüssel ähnlich. Die Kiefer sind oben und unten mit 46 kleinen, scharfen und spitzigen Zähnen bewaffnet. Die Augen sitzen ohnweit der Mundöffnung, sind klein, rund, und ihr schwarzer

*) Par. Maaß: 5 bis 8 Fuß.

zer Stern steht in einem weißen Ringe. Vor denselben ohnweit der Schnauze stehen die kleinen Nasenlöcher, und hinter denselben ist die Gehöröffnung, als ein rundes Loch. Oben auf dem Kopfe zwischen den Augen steht das mondförmige Spritzloch, dessen Ausschnitt nach vorne zu gekehrt ist, das die Haut umher ziemlich verschließt, und welches etwa so weit ist, daß man einen Finger hineinstecken kann. Der Körper ist kurz, dick, nach dem Schwanze zu schmal. Fast in der Mitte des Rückens steht eine große dicke Flosse, welche nach dem Schwanze zu wie ein halber Mond ausgehöhlt ist. Unten nicht weit vom Kopfe liegen zwey fleischige, mit einer schwarzen Haut bedeckte Flossen, welche durch Knochen gegliedert sind. Die Schwanzflosse steht, wie bey andern Fischen, senkrecht, und besteht gleichsam aus zwey nebeneinander liegenden großen Flossen. An dem Bauch ist ein kleines Nabelloch, und weiter hinten eine Spalte, in welcher beym Männchen das Zeugungswerkzeug verborgen ist, und weiter nach hinten der After.

Die Haut ist glatt, dünn, lederartig, oben schwärzlichblau, an den Seiten braun, und unten weiß.

Er schwimmt mit großer Schnelligkeit, auch sogar gegen den Wind, und beugt dabey den Kopf und Schwanz immer nach unterwärts; daher man auf der Oberfläche des Wassers den Rücken nur allein sieht. Sobald er aber todt ist, bekommt er eine gerade Richtung. Schlafend soll er den Kopf aus dem Wasser halten und schnarchen. Gefangen giebt er einen stöhnenden Laut von sich, und bleibt sechs bis acht Stunden außer dem

dem Wasser am Leben. Manchmal wälzt er sich über dem Wasser herum, scheint alsdann eine dreyeckige Gestalt zu haben, und kann in diesem Zustande leicht erschossen werden.

Verbreitung und Aufenthalt.

Man trifft diesen Delphin in den Europäischen Meeren an. Er ist nicht selten in der Ostsee und an den Küsten Deutschlands, besonders der Insel Ruhan. In letzter Gegend sieht man ihn nicht nur oft, sondern fängt ihn auch lebendig oder er wird vom Sturm und Eis todt an den Strand geworfen.

Er ist überall in seiner eigentlichen Heimath in Menge zu sehen, sonderlich bey starkem Winde, wo er sich haufenweise um die Schiffe versammelt.

Nahrung.

Er lebt vom Raube anderer Fische, und jagt und verfolgt die Heeringe in die Bayen und Meerbusen.

Fortpflanzung.

Die Begattung geschieht im August. Es folgen gewöhnlich zehn bis funfzehn Männchen einem Weibchen, gerathen dabey oft auf den Strand und können leicht gefangen werden. Das Weibchen trägt neun bis zehn Monate, und bringt im Junius gewöhnlich ein Junges, das, so lange es säugt, der Mutter beständig folgt.

Fang.

Da er nach Andersons Angabe im Sommer durch Vorwachsung eines Häutchens vor die Augen blind seyn soll, so scheuchen und treiben zu der Zeit die Isländer eine große Menge derselben auf den Strand, und fangen sie. Sie können sechs bis acht Stunden außer Wasser leben.

Wenn er die Heeringe verfolgt, und in die Bayen und Meerbusen treibt, so stellt man unten her Garne vor, und fängt ihn und die Heeringe zugleich.

Nutzen.

Das Fleisch der Jungen von sechs bis sieben Pfunden ist besonders gut. Die Alten sind grob und zähe, von unangenehmen Geschmacke, und werden von den nordischen Völkern eingesalzen und geräuchert, sind aber schwer verdaulich.

Der zwey bis drey Finger dicke Speck giebt guten und vielen Thran.

Das Blut, das bey Verwundungen warm und in großer Menge ausströhmt, soll wider den Scharbock dienen.

73. Der gemeine oder langschnauzige Delphin.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Tümler, Tummler, Delphin, eigentlicher Delphin, Meerschwein, Saufisch, Springer und Seevarken.

Delphinus Delphis. *Gmelin Lin.* I. 1. p. 230. n. 1.

Franz. Dauphin.

Engl. Dolphyn.

Klein miss. pisc. II. 24. T. 3. A.

Andersons Nachricht von Island. 254.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 343.

Bocks Naturgeschichte von Preußen. IV. 252.

Donndorfs zool. Beytr. I. 784. n. 2.

Kennzeichen der Art.

Mit länglichen, fast runden Körper, und verlängerter spitzig zulaufender Schnauze.

Gestalt, Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts.

Die Schnauze steht mehr hervor als am vorhergehenden, ist schnabelartig, vorne dick, hinten schmal.

Die Oeffnung des Mauls ist groß, und geht bis an den Rücken. Die Kiefer haben oben und unten kleine scharfe, spitzige und strahlenförmig zusammenlaufende Zähne. Ueber die Schnauze geht eine breite Binde oder Queerstrich. Er hat zwey Spritzlöcher, die oben durch eine einfache, mondförmige Oeffnung über der Stirn zusammengehen, und aus welcher nur ein großer, hoher Strahl mit einem Pfeifen herausgestoßen wird. Seine Länge hat 10 bis 12 Fuß *), der Durchschnitt der Dicke an 2 1/2 Fuß; der Schwanz ist 2 1/2 Fuß breit; die Rückenflosse 1 3/4 Fuß lang und 13 bis 14 Zoll breit; die zwey Seitenflossfedern 16 bis 18 Zoll lang und 10 bis 12 breit. Er ist größer als der vorhergehende und kleiner als der folgende.

Die Haut ist ganz glatt, auf dem Rücken schwarz, am Bauche weiß.

Bey der Zergliederung eines weiblichen Delphins dieser Art fand man, daß die Eingeweide der Brust gerade wie bey den Landthieren waren, also auch die nämliche Art des Athemholens statt hatte. Das Herz lag zwischen den beyden Lungen, die bis zum Zwerchfell reichen, an welches die Leber von unten her anstößt. Der große Magen war stumpf kegelförmig; oberhalb desselben war die Gekrösdrüse und unterhalb zu beyden Seiten eine aus Drüsen zusammengesetzte große Niere. Die Eyerstöcke waren klein, 1 Zoll lang und eines Federkiels dick.

Dieß

*) Par. Maaß: 9 bis 10 Fuß.

Dieß ist derjenige Delphin, den schon die Alten nach Plinius *), Aelian **) und Aristoteles ***) kannten.

Er zeigt sich oft über dem Meer, schwimmt mit großer Geschwindigkeit, und springt bey bevorstehendem ungestümen Wetter.

Verbreitung und Aufenthalt.

Man trifft ihn in den Europäischen Meeren, auch im stillen Meere an.

In der Ostsee bekam man zu Anfang dieses Jahrhunderts im Putziger Winkel, 1734 im Kurischen Hafen, 1738 auf dem Strande bey Fischhausen einen, von den Fischern sogenannten, Tümler. Er läßt sich aber nicht bloß an den Preußischen, sondern auch an den Deutschen Küsten der Ostsee sehen. In seiner eigentlichen Heimath geht er haufenweise, und die Jungen gehen voran. Er geht um die Schiffe herum.

Nahrung.

Er verfolgt die Fische, und setzt unter dem Tropik den fliegenden nach. Er wagt sich sogar an die Wallfische.

*) Plinii hist. nat. IX. c. 7. 8. etc.
**) Alianus an. l. c. 18. etc.
***) Aristoteles hist. anim. I. c. 5. etc.

Fortpflanzung.

Das Weibchen trägt zehn Monate und gebiert eins bis zwey Junge.

Fang.

Wie beym vorhergehenden. Zu Tabago fängt man ihn mit Angeln.

Nutzen.

Speck und Thran sind gut zu brauchen.

Das Fleisch soll auch schmackhaft seyn.

Er kommt ganz nahe an die Schiffe, und verkündigt den Schiffen Sturm und Wind, wenn er sich bey stillem Wetter sehen läßt.

74. Der dicke Delphin.

Namen, Schriften und Abbildungen.

Gradfinniger dicker Delphin, Butzkopf, Nordkaper, Speckhauer, Pottfisch, Buttkopf und Sturmfisch.

Delphinus Orca. *Gmelin Lin.* I. 1. pag. 231. n. 3.

Franz. Epaulard.

Engl. Grampus.

Klein

Klein miss. pisc. II. 22. T. 1. f. 1.

Andersons Nachricht von Island. 252.

Bocks Naturgesch. von Preußen. IV. 250.

Schneiders zool. Abhandl. S. 247.

v. Schrebers Säugeth. Taf. 340.

Abbildungen der Wallfische bey Homanns Erben. Taf. 3.

Donndorfs zool. Beytr. I. 786.

Kennzeichen der Art.

Mit längern Unterkiefer und aufwärts gerichteter Schnauze, in der Mitte sehr dickem Leibe und langer Rückenfinne.

Farbe und Sitten des männlichen und weiblichen Geschlechts und Aufenthalt.

Auch dieser Bewohner des nordischen Oceans, und Norwegischen Meers erscheint zuweilen, wiewohl höchst selten, in der Ostsee, und es wurde im Pautzker Winkel einer aufgebracht, dessen Hirnschädel auf der Danziger Rathsbibliothek aufbewahrt wird.

Der Kopf ist stumpf, und die Oberlippe geht in eine aufgeworfene Spitze aus. Beyde Kinnladen haben

stumpfe Vorderzähne, und in jeder befinden sich 40 derselben. Sie sind breit. Die Augen sind klein. Im Nacken ist eine Spritzröhre, die flach und durch eine Scheidewand getheilt ist, und wodurch er das Wasser so hoch, wie der Wallfisch, ausspritzt. Nicht weit vom Schwanze befindet sich oben und unten eine kleine längliche Finne. Die gerade, dornartige Rückenfinne ist 3 bis 6 Fuß lang. Der Leib, der oben braun und unten weiß ist, hat eine Länge von 24 bis 25 Fuß und eine Breite von 12 bis 13 Fuß.

Nahrung.

Er nährt sich fast bloß von Heeringen, die er tonnenweise verschluckt, indem er sie mit dem Schwanze in einen Wirbel zusammentreibt. Man sagt auch, daß er in Gesellschaft die Wallfische anfalle, in einem beständigen Kriege mit den Robben lebe und diese mit Schlägen seines Schwanzes und der Rückenfinne von den Klippen werfe. Er tödtet und frißt auch die größten Schollen (Pleuronectes).

Fang.

Wie die vorigen Arten. Die Norweger treiben die Jungen mit ihren kleinen Fischerschiffen auf den Strand und erschlagen sie.

Nutzen.

Er giebt funfzehn und mehr Tonnen Speck zu Thran, welcher feiner und flüssiger, als der von den Wallfischarten ist.

Man

*) Par. Ms.: Länge 20-22 Fuß; Breite 10 — 11 Fuß.

Man giebt von dieser Art noch eine Varietät an, welches aber auch wohl eine verschiedene Art seyn kann.

Der säbelsinnige dicke Delphin.

Sägedelphin, Schwerdfisch, Sägefisch, Säbelfisch, Speckhauer, Wallfischtödter, Mörder, Killer.

Delphinus Serra.

Delphinus Orca. *Gmelin Lin.* l. c. β.

Franz. Epée de mer.

Engl. Saw-Fish.

Andersons Nachricht von Island. 255.

Die 4 bis 5 Fuß hohe Finne ist oben säbelförmig gekrümmt, aber dick und stumpf. Sie ist weich und besteht aus lauter Fett. Der Delphin wird 20 bis 30 Fuß lang und 10 bis 15 Fuß dick, und ist ein abgesagter Feind der Wallfische, die er in Gesellschaft mit seinem Gebiß anfällt. Der Wallfisch thut sehr ängstlich, wenn er diese Delphine erblickt.

Sie haben viel Speck, der guten Thran giebt.

Schlußanmerkung.

Aus diesen Beschreibungen ergiebt sich, daß in Deutschland, so viel als mir bekannt ist, 74 Säugethiere gefunden werden. Unter diesen 74 Arten werden 47 gewöhnlich und häufig angetroffen; 13 selten, 10 davon sind wild, nämlich die Gems, der Wolf, Rothluchs, Landbär, Biber, das Alpen-Murmelthier, der veränderliche Hase, die blasse Fledermaus, der graue und Kälberrobbe, und 3 zahm, nämlich der Büffel, das Frettchen und Meerschweinchen; 10 sehr selten, nämlich der Steinbock, Vielfraß, die Rüsselmaus, das ohrlose Murmelthier, der Narwall, der Wallfisch, kleinäugige Kachelot, der stumpfschnauzige, langschnauzige und dicke Delphin, und 4 sind ungewiß, nämlich die weißzähnige, gestreifte, verkehrtschwänzige und Spitzmaus mit dem vierseitigen Schwanze.

Wie groß die Anzahl derselben in Thüringen, und wie viel derselben, gewöhnlich, selten und sehr selten sind, wird aus obigem und den Beschreibungen selbst sehr leicht ersehen werden können.

Erster Anhang.

Säugethierkalender,

worin nicht nur der veränderliche Aufenthalt und die Fortpflanzung der Thiere dieser Classe, sondern auch einige besondere Bemerkungen für Jäger und Oekonomen nach den Monaten kürzlich angegeben werden.

Januar.

Aufenthalt.

Der Wolf streift zuweilen durch den Thüringerwald.

Der Fuchs schleicht jetzo mehrentheils seiner Nahrung halber des Nachts um den Dörfern herum, weil der Schnee hier nicht so tief ist, als auf dem Hochwald. Er liegt dann gewöhnlich am Tage in Vorhölzern und Dickungen. Bey Sturm und Wind aber ist er beständig im Bau.

Die wilde Katze zieht sich gern nach den zugefrornen Teichen und hält sich im Schilf oder unter den hohlen Ufern auf, besucht auch zuweilen die Dörfer um Hühner und Tauben zu stehlen.

Der Hase macht sein Lager nach der Sommerseite, d. i. gegen Mittag hin, wo er die Sonnenwärme genießen kann. Doch wechselt er nach dem kalten Windstrich.

Einige

Einige Feldmäuse ziehen sich noch nach der Wintersaat, die andern bleiben auf den eingeerndeten Haferäckern.

Der Hirsch, das Reh und Schwein suchen in Gesellschaft in tiefen Gebürgen die Dickige auf, wo sie vor Schnee, Eiß, Kälte und Stürmen sicher sind.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Große Hunde; alte Wölfe; Vielfraße.

Erste Hälfte des Monats: wilde Schweine.

Zweyte Hälfte: wilde Katzen; Luchse; Baummarder; Hasen bey warmer Witterung.

b) Geburt der Jungen.

Der Bär setzt seine Jungen; zahme Kaninchen und Mäuse, die warm wohnen, bringen ebenfalls Junge.

Nahrung *).

Beson-

*) Diese Rubrik bleibt noch bis jetzt leer. Dasjenige, was bis hieher von der Nahrung der Thiere nach den größern Veränderungen der Jahrszeiten bekannt ist, findet man bey der Beschreibung jedes Thieres angegeben. Da das Verzeichniß derjenigen Nahrungsmittel, die jede Thierart in kleinern Zeiträumen des Jahrs oder in jedem Monate zu sich nimmt, noch zu unvollkommen ist, ich dasselbe aber für eine höchst wichtige Sache halte, weil nicht nur die Naturgeschichte an sich dadurch sehr vervollkommet, sondern auch überhaupt ein großes Licht über die weise Oekonomie der Natur verbreitet werden könnte u. s. w., so möchte ich die Ausfüllung dieser Rubrik den Jägern beson-

ders

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die großen Hunde müssen belegt werden.

Die Fährten der Füchse, wilden Katzen, Wieseln, Marder, Iltisse, Fischottern werden aufgesucht und da die Bälge dieser Thiere jetzt gut sind, so werden sie gefangen und geschossen.

Die Hasenjagd wird geschlossen, wenn warme Witterung einfällt, weil sich dann diese Thiere schon begatten.

Das Rothwild wird mit Heu und Gerstenstroh und das von der Brunst abgemattete Schwarzwild mit Feldobst, Eckern, Bucheckern, Abgängen von Kraut, Kohl und Rüben, und der Hase mit Heu oder Erbsenstroh gefüttert.

Star-

ders zur Aufgabe machen, da sie diejenigen Personen sind, welche allein und so leicht der Naturgeschichte diese Vollkommenheit verschaffen, und so wichtige Bewegungsgründe zur Verherrlichung des Schöpfers der Natur durch tiefere Blicke in die weise Einrichtung und Regierung derselben an die Hand geben können. Ich meines Theils werde mein möglichstes zu dieser wichtigen Sache beytragen, bitte zugleich meine Freunde und andere Personen aus diesem Stande ein Gleiches zu thun, und mir ihre Bemerkungen mitzutheilen. Dieß könnte dann vielleicht einen wichtigen Beytrag zu einem nützlichen und vollständigen Thierkalender abgeben.

Einen einzigen aber schönen Beytrag hiezu hat seit der ersten Ausgabe Hr. Forstmeister von Borcholder in der von mir herausgegebenen Diana oder Zeitschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur- Forst- und Jagdkunde. 1. S. 65 - 73. von der Nahrung des Rehes gegeben, wofür ich ihm hier nochmals öffentlich danke.

Starke Bachen, Rehböcke, auch gelte Thiere und Rieken kann man noch schießen.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Um seines eigenen Nutzens halber müssen die Schafe auch in diesem Monate gut, d. h. nicht mit bloßem Stroh gefüttert werden. — Ihrer Gesundheit halber besprengt man das Futter zuweilen mit Salzwasser. — Wenn man ihnen jetzt bitteres Erlenlaub vorlegt, und sie husten darauf oder lassen es gar unberührt liegen, so haben sie einen innerlichen Fehler und sind mehrentheils mit der Lungensucht behaftet. — Auch in den Schafställem müssen die Dunstschornsteine geöffnet werden, damit die Schafe, die ihnen zur Gesundheit und guten Wolle so nöthige frische Luft nicht entbehren; allein sie dürfen auch nicht zu kalt stehen, wie einige neuere Oekonomen, die Extreme lieben, wollen, weil dieß nicht bloß der Gesundheit, sondern auch und vorzüglich den Wollenwuchs nachtheilig ist.

Die trächtigen Stuten müssen gut gewartet und gefüttert, auch bey gelinder Witterung einen Tag um den andern ausgeführt werden. Die Pferde, die sich zu Ende dieses Monats häären, müssen sehr reinlich gehalten, und fleißig gestriegelt werden.

Das Mastvieh, dessen Fleisch eingepökelt, und geräuchert in den Sommermonaten verbraucht werden soll, wird meist in diesem Monate geschlachtet.

Man stellt auch noch Schweine zur Mast auf.

Februar.

Aufenthalt.

Unter den Fledermäusen sieht man schon die langöhrige, gemeine und rauhflüglige, aus dem Winterschlafe erwacht, bey gelinder Witterung, auch wohl als ein noch nicht völlig erklärbares Phänomen bey der allerstrengsten Kälte herumfliegen.

Der Wolf, Fuchs und die übrigen Raubthiere sind noch immer unstät.

Die Bärin bleibt noch im Winterlager, obgleich die jungen bey gelindem Wetter und Sonnenschein vor der Höhle spielen.

Der Dachs erwacht aus seiner Betäubung und geht bey Thauwetter, obgleich Schnee liegt, häufig aus.

Die Hirsche ziehen bey einbrechendem Thauwetter wieder in höhere Gebirge und lagern sich an die Sommerseite, um warm zu liegen.

Das Reh behält seinen Aufenthalt, so wie das wilde Schwein.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Kleine Hunde; Fischottern; Hasen.

Erste Hälfte: Junge Wölfe; wilde Katzen; Luchse; Baummarder.

Zweyte Hälfte: Zahme Katzen; Steinmarder; Iltisse; wilde Kaninchen *).

b) Ge-

*) Die zahmen Kaninchen begatten sich, wo sie warm wohnen, zu allen Jahreszeiten.

b) Geburt der Jungen.

Dachse; gemeine Seehunde; Kälber; Ferkel.

Zweyte Hälfte: Graue Robben; Lämmer; Füllen.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die kleinen Hunde werden belegt.

Die Bälge der Raubthiere hören mit diesem Monate auf gut zu seyn.

Wölfe, Füchse, Luchse und Wieseln verfolgen die Rehe, die in ihrem Laufe durch den mit einer Eisrinde überzogenen Schnee aufgehalten werden, und tödten sie.

Das Wild muß bey kalter Witterung und hohem Schnee gefüttert werden.

Die stärksten und besten Hirsche werfen das Gehörn ab, und die Rehböcke haben das ihrige wieder vollkommen aufgesetzt.

Die Mittel- und niedere Jagd ist zu Ende, und überhaupt auch alles Bürschen und Schießen des Hoch- und Schwarzwildes lieber einzustellen. — Auch müssen die Nachmastschweine ausgenommen werden.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Die Schafe müssen besonders vor und nach der Lammzeit gut gefüttert werden und man hört mit diesem Monate auf, sie auf die Saat zu treiben.

Die

Die Lungensucht der Schafe bricht deutlich aus.

Man fängt an das Vieh gegen die Pflüge- und Kalbzeit besser zu füttern; nur darf man den kalbenden Kühen nicht Kleye und Träber allein geben, welches die Milch vermindert, sondern muß es mit Kleeheu vermengen und brühen, woraus das milchreichste Futter entsteht. Ihnen vor den Kalben Roggen und Linsen gekocht vermehrt die Milch ungemein und erweitert die Milchadern.

Haferstroh ist allen milchtragenden Vieh schädlich.

Die Ochsenkälber der fleischreichen und milcharmen Kühe bindet man zu Zugochsen und die Kuhkälber der magern und milchreichen Kühe zu Zuchtkühen an.

Die Ferkel müssen sehr warm gehalten werden.

Die Mästung des Viehes dauert noch fort; aber die letzten Speckschweine werden geschlachtet, und das letzte Fleisch für den Sommer eingepökelt und geräuchert.

Die Beschälerpferde müssen gut gehalten werden, damit sie muthig zum Springen werden, die Stuten aber, die besprungen werden sollen, darf man nicht überfüttern. — Auf diejenigen, denen das Euter zu wachsen anfängt, muß man fleißig Acht haben, weil sie bald fohlen. Vier und zwanzig Stunden vor der Fohlzeit tritt eine zähe gelbliche Materie aus den Säugwarzen, die sich, so oft man sie wegnimmt, wieder an der Oeffnung sammlet.

März.

Aufenthalt.

Der Wolf und die übrigen Raubthiere suchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt wieder. Besonders hält sich der Fuchs wegen Abgang des Schnees in dicken Hölzern auf, um daselbst zu mausen.

Die meisten Wiesel verlassen die Gebäude und ziehen ins Feld oder Holz.

Der Bär verläßt seine Höhle, und schleppt seinen Jungen lebendigen Raub in dieselbe.

Die grauen Seehunde kommen in der Ostsee an.

Der Igel geht aus seinem Winterquartiere.

Die Hasen begeben sich ins Feld in die Sturzäcker, nicht weit von der grünen Saat.

Die großen und kleinen Feldmäuse fangen an sich zu vertheilen.

Der Hamster besucht die Oberfläche der Erde wieder.

Der Hirsch und das Reh begeben sich in ihre alten Stände, und die Dammhirsche besonders suchen die Dickige auf.

Die wilden Schweine schweifen in einem gewissen Bezirke bis zu ihrer Setzzeit ihrer sparsamen Nahrung halber allenthalben herum.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Zahme Katzen; ohrlose Murmelthiere; Hasen, besonders

sonders diejenigen, welche sich zum erstenmal begatten; Kaninchen; Eichhörnchen.

Erste Hälfte: Wieseln; Iltisse.

Zweyte Hälfte: Maulwürfe; Igel; Hausratten; Wanderratten; Hausmäuse; kleine Feldmäuse, und Hamster *); Pferde; zahme Schweine.

b) Geburt der Jungen.

Hunde; Wölfe von alten Eltern; Biber; Hasen; Ziegen; Lämmer; Kälber.

Zweyte Hälfte; Baummarder; wilde Kaninchen; Steinböcke.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die jungen Hunde müssen mit Fleiß vor der Kälte geschützt werden.

Die jagdbaren Hirsche werfen das Gehörn ab, und die verlohrnen Stangen werden aufgesucht.

Den ersten März wird alle Jagd geschlossen, und die Salzlecken werden frisch geschlagen.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Die Maulwurfshaufen müssen zerstreut, und wo möglich alsdann die Wiesen mit Wasser überschwemmt werden, damit diese Thiere ersaufen. Außerdem müssen sie jetzt auf eine andere Weise vertilgt werden; denn zu

*) Die meisten Mäusearten begatten sich bis zum September, und wo sie der Wärme nicht entbehren müssen, das ganze Jahr hindurch.

geschweigen, daß jetzt ihr Balg gebraucht werden kann, so steht die Vertilgung eines einzigen im März mit der Vertilgung von sechsen in den Monaten Junius und Julius im Gleichgewicht.

Die Zugschornsteine und Fenster müssen auch der Lämmer wegen jetzt Tag und Nacht offen seyn. — Der Schäfer muß die Schafe untersuchen, ob sie den Ausschlag haben, und sie davon heilen. — Sowohl die jungen Stöhrlämmer, die geschlachtet werden sollen, als auch die einjährigen Bocklämmer, die man als Hammel halten will, und die alten Schafböcke, welche nicht mehr zur Fortpflanzung tüchtig gefunden werden, hammelt man. — Wenn es das Wetter leidet, daß die Schafe ausgeführt werden können, so müssen sie sorgfältig von sumpfigen und feuchten Orten abgehalten werden.

Man sucht unter den zweyjährigen Ochsenkälbern die besten zu Bullen aus, und kastrirt die übrigen.

Die dreyjährigen Fohlen, welche im Stalle gefüttert sind, werden gewallacht. — Auf die trächtigen Stuten muß man Tag und Nacht achten.

April.

Aufenthalt.

Die Fledermäuse verlassen alle ihre Schlupfwinkel, in welchen sie den Winterschlaf abwarteten, und flattern des Abends herum.

Der Hirsch tritt wegen seines wachsenden zarten

Ge-

Gehörns in niedrige Gehäue, und geht des Nachts weit nach Quellkräutern, und nach der Saat.

Die Gemse gehen wieder auf die höchsten Gebirge.

Die Sau sucht sich ein sicheres Lager in düstern Gebüschen zum Setzen auf.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Maulwürfe; gemeine Seehunde; Waldmäuse; Brandmäuse; Wassermäuse; Hamster; Alpen- ohrlose Murmelthiere; Pferde.

Zweyte Hälfte: Fledermäuse; Wasserspitzmäuse; Kühe; Schweine.

b) Geburt der Jungen.

Von jungen Wölfen; wilden Katzen; Wieseln; Hasen; Kaninchen; Ziegen; Füllen; Esel; Ferkel der wilden Sauen.

Erste Hälfte: von großen Hunden; Baummarder.

Zweyte Hälfte: von kleinen Hunden; Steinmarder; Iltissen; Hausratten; Wanderratten; Eichhörnchen; Gemsen.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Den Hirten muß aufgelegt werden, die Hunde an Stricken zu führen, damit sie keine jungen Hasen fangen.

Wenn

Wenn das Laub ausschlägt, müssen die Salzlekken zurecht gemacht werden.

Die gemeinen Hirsche werfen das Geweih ab. — Wo viele Hirsche sind, werden einzelne Kolbenhirsche für die Küche und Apotheke gebürschet.

Das Wild verliert die Engerlinge.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Auf die Maulwürfe muß noch ernstlich Jagd gemacht werden.

Die Schafe und Kühe werden auf die Weide getrieben; der Schäfer und Hirte aber muß jetzt besonders auf die Witterung Acht haben. Vorzüglich werden die großen Nebel dem Vieh schädlich; wenn es zu früh ausgeführt wird. — Man fängt auch an manchen Orten an, die Kühe in der Mitte dieses Monats dreymal zu melken, so wie am Ende desselben die Winterwolle der Schafe abzuscheeren. — Das Rindvieh, das sich nun häret, muß man gut warten und reinlich halten.

Die Schweine werden ausgetrieben, wenn sie vorhero gewaschen, und mit Spießglas und weißer Nieswurz purgirt worden sind.

May.

Aufenthalt.

Die alte Füchsin sucht ihr voriges Sommerquartier wieder auf, und die junge ein neues an einem Orte, wo sie besonders genugsame Nahrung für die Jungen in einer nicht zu weiten Entfernung finden kann.

Die

Die Hirschkühe und Rehe begeben sich an stille und sichere Oerter zum Setzen.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Spitzmäuse; Igel; Alpen- und ohrlose Murmelthiere; Hasen; Kaninchen; Eichhörnchen; Kühe; Pferde; Esel.

Erste Hälfte: Fledermäuse; Wasserspitzmäuse; große Haselmäuse.

b) Geburt der Jungen.

Luchse; Fischottern; Maulwürfe; Hasen; Kaninchen; Eichhörnchen; Mäuse; Kälber von alten Hirschkühen, von Rehen; Eselfüllen; Ferkel.

Erste Hälfte: Füchse; zahme Katzen; Gemse.

Zweyte Hälfte: Fledermäuse; Spitzmäuse; Wasserspitzmäuse.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Ob es gleich gewöhnlich ist, in diesem Monate schon mit den Leithunden zu ziehen, so darf es doch nicht geschehen, weil das Wildpret noch färbt, und von seinen Haaren an den Hecken hängen läßt, wodurch diese Hunde für die Fährte verdorben werden. Man führt sie aber dafür in den jungen Saamen, den sie gern genießen, der ihnen sehr gesund ist, und wie die Jäger sagen, statt einer Purganz dienet.

Die jungen Füchse werden gegraben.

Das Wildpret muß von jetzt an, wegen der Setzzeit gehegt werden; deswegen wird den Holzmachern der Wald Walburgistag verboten und den Eigenthümern der Bauernhunde in Waldörtern befohlen, dieselben anzulegen, damit sie die jungen Hirsch- und Rehkälber nicht beunruhigen.

Eben deshalb darf auch das weidende Vieh den jungen Schlägen nicht zu nahe kommen.

Die geringen Hirsche werfen endlich das Gehörn ab. — Die jagdbaren pflegen schon gebürscht zu werden.

Die Rehe hären ab und farben roth.

Die Salzlecken, welche jetzt fleißig besucht werden, frischet man wieder auf, weil das Salz das Wild jetzt beym Verfärben auf den ganzen Sommer hin gut erhält und verbessert.

Besonderr Bemerkungen für Oekonomen.

Die Maulwürfe und Wassermäuse muß man zu vertilgen suchen, in Gärten und auf Wiesen.

Das Schafvieh bleibt in Horden auf dem Felde.

Die Kühe dürfen nicht eher auf die Weide geführt werden, bis die Sonne den Thau abgetrocknet hat, und müssen zur Vorsicht vor dem Austreiben ein Schnitt Brod mit Theer und Salz bekommen.

Die Kuhmilch ist jetzt wegen der jungen Maykräuter sehr gesund und die gute Maybutter wird bey schönem, heitern Wetter eingesalzen und eingedruckt.

Die

Die Pferde werden gewallacht. Die Stuten und Füllen werden auf die Weide geführt, weil sich in der Hälfte dieses Monats die Beschälzeit endigt.

Junius.

Aufenthalt.

Der Wolf und Fuchs schweifen weit um ihrem Wohnsitze herum, ihren Jungen Raub zu verschaffen.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Bäre; Spitzmäuse; Hasen; Mäuse; Esel.

Erste Hälfte: zahme Katzen zum zweytenmal; Kühe.

b) Geburt der Jungen.

Spitzmäuse; Wasserspitzmäuse; Siebenschläfer; große Haselmäuse; Hamster; Hasen; Kaninchen; von jungen Hirschkühen; Dammhirsche; Rehkälber; Kälber; Delphine.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die Arbeit mit den Leithunden nimmt ihren Anfang.

Der Jäger besucht die Fuchsbaue seines Reviers, und sieht zu, ob die Fährten von jungen Füchsen, die jetzt vor denselben spielen und sich in die Sonne legen, zu spüren sind, und gräbt sie aus.

Die hohe Jagd geht für die Vasallen den ersten Trinitatis auf, und man schießt schon für die Hofküche junge Rehe und Hasen.

Der Hirsch verfärbt sich, und schlägt das Bast von seinem reifen Gehörn an Bäumen und Stauden ab.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Die Wollschur der einschürigen Schafe fällt in Thüringen in diesen Monat.

Julius.

Aufenthalt.

Der Hase sucht die Brachäcker auf.

Der Hirsch tritt des Abends zeitig mit seinem vollen Gehörne in die Felder; hält sich gern in dichten Feldhölzern, ja oft in der hohen Winterfrucht auf, um vor dem Ungeziefer sicher zu seyn.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Spitzmäuse; kleine Haselmäuse; Hasen; Kaninchen.

b) Geburt der Jungen.

Spitzmäuse; Igel; Hasen; Kaninchen.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die jungen Märzhasen werden aufgesucht und geschossen.

Das

Das Holz geht mit dem Anfang dieses Monats, oder gewöhnlich mit Maria Heimsuchung auf, d. h. wird nicht mehr geheeget, weil das junge Wild schon ziemlich erwachsen ist.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Schäfer und Hirte müssen bey heißem Sonnenschein im Schatten Mittag halten, um verschiedene Krankheiten des Rind- und Schafviehes zu verhüten, und die Schweine müssen von Flachsfeldern zurück gehalten werden, weil ihnen dieß Kraut tödtlich ist.

Dem Rindvieh darf man kein neues Heu, Stroh oder Getraide vorlegen, und es nicht in solchen Gegenden weiden lassen, wo der Melilotenklee häufig wächst, weil dieser fast den ganzen Monat hindurch mit Mehlthau befallen ist.

Schweine und Pferde müssen oft geschwemmt werden.

Die Füllen werden aus-, aber ehe der heiße Mittag eintritt, wieder eingetrieben.

August.

Aufenthalt.

Die Hirsche bedienen sich verschiedener Stände und Wechsel.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Delphine.

b) Ge-

b) Geburt der Jungen.

Hasen; Kaninchen; kleine Haselmäuse; Ferkel.

Erste Hälfte: zahme Katzen; Igel.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die jungen Raubthiere ziehen ihr wollenes Jugendkleid aus, und einen neuen guten Pelz an. Die jungen Bäre behalten aber einen weißen Ring um den Hals, welcher sich erst später verliert.

Zu Ende dieses Monats wird angefangen die Dachse zu graben.

Mit der zweyten Hälfte geht die Hirschfeiste an, den 24sten geht die hohe Jagd auf, und es tritt die rechte Zeit ein, wo die Hirsche mit den Leithund aufgesucht, gejagt und geschossen werden. Jetzt werden also auch die Hauptjagden angestellt.

Der Jäger muß aufmerksam seyn, wenn Rothwild in diesem Monate fällt, ob die Knotenkrankheit die Ursache ist, um die gehörigen Maaßregeln dagegen treffen zu können.

Der junge Rehbock beschlägt die Rieke aus Geilheit, doch ohne Befruchtung.]

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Man fängt an die schädlichen Hamster durch Ausgraben zu vertilgen.

Sep-

September.

Aufenthalt.

Die Wölfe und Füchse, und viele der gröſsern Thiere, die sich nur einmal im Jahre fortpflanzen, jagen die Jungen von sich, und diese müssen sich einen neuen Aufenthalt wählen, oder neue Wohnungen zu verschaffen suchen.

Der Dachs entfernt sich weit von seiner Wohnung in die Felder der Rüben und in die Gärten des abgefallenen Obstes halber.

Die Feldmäuse ziehen, wo möglich, aus dem Felde in den Wald.

Die Hasen sind bey trockenem Wetter in den Haferstoppeln, bey feuchtem aber in den Hecken und Sträuchern.

Das hin und wieder vertheilte Hirschwild zieht sich wegen der Brunft zusammen, und begiebt sich in groſse Wälder und Gehäge, und jedes Stück sucht seinen gewöhnlichen Brunftplatz auf.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Waſsermäuse (Erdwölfe); Ackermäuse, und diejenigen Mäuse, welche in den Häusern warm wohnen.

Der starke feiste Hirsch tritt wüthend auf die Brunft.

Zweyte Hälfte: Schafe.

b) Geburt der Jungen.

Mäuse.

Nah:

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Da der Dachs in die Felder und Gärten geht, so ist ihm am besten des Nachts mit Hunden beyzukommen.

Die Mittel- und niedere Jagd geht den ersten September auf *). Die Dammschaufler erlangen ihre gehörige Vollkommenheit, und noch bis in die Mitte des Septembers werden die Brunfthirsche geschossen; die Schmalthiere und Kälber aber länger.

Den Schaf- und Rindviehhirten werden die Masthölzer verboten.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Man nimmt den Schafen, die man gemolken hat, die Milch nicht mehr, und in der ersten Hälfte des Monats ist die Schurzeit der zweyschürigen Schafe.

Man hört auf die Kühe dreymal des Tags zu melken.

October.

Aufenthalt.

Die Wölfe begeben sich, da das Feld leer und lichte ist, in dichte Wälder, Brüche und Moräste.

Die

*) Die Jagderlaubniß der Jäger wird im allgemeinen nach folgenden Tagen bestimmt: Hasen von Jacobi bis Matthäi; Füchse von Michaeli bis Lichtmeß; Dachse von Laurentii bis St. Thomä.

Die jungen Füchse und Dachse fangen an sich Baue zu graben.

Die Hasen gehen auf die Kraut- und Rübenäcker.

Die Haselmaus sucht sich eine Wohnung zu ihrem Winterschlaf aus.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Junge Hirsche; Dammhirsche; Gemse; Steinböcke; Ziegen; Schafe; zahme Schweine.

b) Geburt der Jungen.

Wasserratten; kleine Feld- und andere Mäuse, die in Häusern vor der Kälte geschützt sind.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die Bärenjagd fängt an, weil besonders die Jungen jetzt fett sind und gute Bälge haben.

Die Hirschlecken müssen, nachdem das Laub abgefallen ist, erneuert werden.

Die wilden Sauen werden geschossen. — Sie ziehen nach den Bucheckern und Eicheln.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Die Schafe schlafen nicht mehr des Nachts auf dem Felde in Horden, sondern werden alle Abend nach Hause getrieben.

Der bösen Nebel halber muß das Aus- und Eintreiben des Viehes mit Vorsicht geschehen.

Man wallacht die auf der Weide erzogenen Fohlen.

Die Mastschweine werden in die Eckermast geschlagen, und es wird der Anfang gemacht, die Speckschweine zur Mast einzustecken, indem man ihnen anfangs nüchtern ein halb Loth Spießglas (antimonium crudum) in saurer Milch giebt, welches die Finnen vertilgen und die Mast befördern soll.

November.

Aufenthalt.

Die Fledermäuse verbergen sich in ihre Schlupfwinkel, und kommen nur zuweilen noch bey warmen Abenden zum Vorschein.

Die Füchse gehen weit ins Feld auf die Mäusejagd.

Die Wiesel suchen die Gebäude auf.

Der Dachs fängt an, nicht alle Tage mehr auszugehen.

Der Igel gräbt sich ein Loch, worin er seinen Winterschlaf abwarten will.

Der Hase zieht nach den Feldhölzern und Gebüschen.

Die kleine Feldmaus begiebt sich auf die grüne Saat.

Der Hamster verscharrt sich in seine Winterwohnung und beginnt den langen Winterschlaf.

Das

Das Hirschwild trennt sich wieder.

Die Rehe gehen paarweise auf große Haiden und in die großen Wälder.

Die Gemse verlassen die höchsten Berggipfel und suchen niedrige und dichte Waldungen zu ihrem Winteraufenthalte auf.

Das wilde Schwein bleibt im Walde.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Ziegen; Dachse; Rehe.

Zweyte Hälfte: wilde Schweine.

b) Geburt der Jungen.

Kaninchen und Mäuse, die warm wohnen.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Alle wilde Raubthiere, Füchse, Ottern, Marder, Iltisse sind nun gut behaart und können gefangen und geschossen werden, und die Klapperjagd nimmt bey Frostwetter ihren Anfang.

Jetzt ist die rechte Zeit zur Hasenjagd und Schweinshetze.

Der Rehbock wirft sein Gehörn ab, und wird geschossen, weil die Rieke sich allezeit einen andern holt.

Der abgemattete Hirsch sucht die Ameisenhaufen auf, zerscharrt sie, und scheint sich durch den geistigen Geruch derselben zu stärken.

Für die Vasallen endigt sich die hohe Jagd mit dem letzten November.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Es werden immerfort Mastschweine aufgestellt.

December.

Aufenthalt.

Der Luchs streift zuweilen durch den Thüringerwald.

Der Iltiß zieht sich nach den Gebäuden, besonders nach denen, welche im Felde oder Walde liegen.

Der Flußotter fängt an allenthalben herum zu streifen und die Bäche und Teiche auszufischen.

Der Bär baut sich sein Winterlager.

Der Dachs liegt fest in seinem Bau.

Die Wanderratte zieht in die Häuser.

Der Zug der Feldmäuse nach der Wintersaat und den Hölzern dauert noch fort.

Der Hase macht sein Lager gegen Mittag der Sonne halber.

Fortpflanzung.

a) Begattung der Alten.

Rehe.

Erste

Erste Hälfte: wilde Schweine.

b) Geburt der Jungen.

Kaninchen und Mäuse, die warm wohnen.

Nahrung.

Besondere Bemerkungen für Jäger.

Die Bälge der Raubthiere und Hasen sind am besten.

Mit diesem Monate endiget sich gemeiniglich das Bürschen der Schmalthiere und Kälber, die Schweinemast geht zu Ende und die Nachmast fängt an, wenn die Bucheckern und Eicheln nicht ganz aufgezehrt sind. Sie richtet sich allezeit nach der günstigen oder ungünstigen Winterwitterung.

Besondere Bemerkungen für Oekonomen.

Man stellt noch Schweine zur Mast auf.

Zu Ende dieses Monats wird schon Fleisch für den Sommer eingepöckelt und geräuchert.

Die Schafe werden bey flachem Froste auf die stark gewachsene Saat getrieben.

Zweyter Anhang.

Kurze Anleitung für diejenigen, welche dieß Buch zum Unterricht bey Kindern brauchen wollen, nebst einem Beyspiele.

Man fängt gewöhnlich der Unterricht der Naturgeschichte mit der Eintheilung in die drey Reiche, in das Thier- Pflanzen- und Steinreich an. Von jedem dieser drey Reiche giebt man dann weiter die verschiedenen Classen, Ordnungen, Gattungen und Arten an. Hierbey geht man also den Weg der synthetischen Methode, d. h. man bestimmt für die Classen sowohl, als für die Ordnungen, Gattungen und Arten gewisse Kennzeichen und Merkmahle, und dann zählt man dem Schüler z. B. alle die Thiere der Reihe nach auf, welche die festgesetzten Kennzeichen an sich tragen, und also zu einer Classe, zu einer Ordnung, zu einer Gattung, und zu einer Art gehören. So lernt z. B. der Schüler den Iltis alsdann erst kennen, wenn er weiß, wodurch sich die drey Naturreiche von einander unterscheiden, was Säugethiere, Vögel u. s. w. sind; wie viel Ordnungen unter den Saugethieren vorkommen; wie viel derselben zur ersten, zweyten Ordnung gehören; wodurch sich die Thiere dieser Ordnung nach ihren Gattungskennzeichen und Charaktern der Art unterscheiden, und nur alsdann

erst,

erst, wenn die Reihe an die zweyte Ordnung der Säugethiere, an die Raubthiere, und in dieser an die Gattung Marder kommt, so erfährt der Schüler die Geschichte des Iltis (s. Uebersicht der Säugethiere nach ihren Ordnungen und Gattungen.)

So brauchbar diese Methode immer an sich seyn mag, so hat doch die Erfahrung gelehrt, daß beym Elementarunterrichte der Kinder die analytische allerdings den Vorzug verdiene. Sie besteht darin, daß man den Kindern zuerst aus allen drey Reichen der Natur mehrere Gegenstände vorzeigt, sie auf die verschiedenen, am meisten in die Augen fallenden Kennzeichen und Unterscheidungsmerkmahle aufmerksam macht, und ihnen die ganze Geschichte der einzelnen Naturalien in so weit erzählt, als sie ihrer Fassungskraft und andern Verhältnissen angemessen ist. Wenn sie sich hierdurch schon einen ansehnlichen Vorrath von naturhistorischen Kenntnissen anschaulich gesammelt, schon mehrere einzelne Thiere sinnlich kennen gelernt haben, welche lebendige Junge zur Welt bringen, vier Füße und Brüste haben, an welchen sie dieselben säugen können; wenn sie schon mehrere Thiere aus der Erfahrung kennen, welchen die Natur einen Schnabel, Federn und zwey Füße gab; wenn sie aus eigner, vorhergegangener Beobachtung wissen, was ein haakenförmiger, und was ein kegelförmiger Schnabel ist; was Füße und Zehen mit einer Schwimmhaut verbunden, und was Fischflossen sind; was die Thiere für ein Gebiß haben, die Fleisch fressen, und wie das Gebiß derjenigen beschaffen ist, die sich von

Gras und Kräutern nähren; wenn sie schon mehrere Gewächse und Mineralien gesehen haben u. s. w.; dann macht man ihnen erst die verschiedenen Haupt- und Nebenabtheilungen bekannt, und führt sie nun an, die Naturalien zu classificiren und zu ordnen.

Die Anwendung dieser Methode soll jetzt an einem Beyspiele gezeigt werden, wo der Lehrer nun den Anfang macht, seine Schüler mit der Classification bekannt zu machen, indem er ihnen die Geschichte eines Thiers erzählt. Ich werde die für den Lehrer hierbey nöthigen Anmerkungen in Klammern einschließen.

L. Wißt ihr schon, Kinder, wie das Thier heißt, das ihr hier seht?

(Ein Lehrer, der pädagogische Talente hat, wird hier im Stande seyn, immer etwas neues zu erfinden, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu spannen, und sie rathen zu lassen, wie das Thier heiße?)

K. Nein!

L. So will ich es euch sagen, gebt Achtung, und merkt es. Es heißt Iltiß, oder in Thüringen der Ratze (s. S. 779.) Bey Gelegenheit dieses Thieres, will ich euch denn heute auch wieder etwas neues lehren.

Besinnt ihr euch noch, wie man alle Körper, die sich auf unserer Erde, und in derselben befinden, eintheilt?

Alle. O ja! in Naturalien und Artefacten.

(Man sehe hier nach S. 3. wo, wie ich glaube, dieß alles deutlich auseinander gesetzt ist.)

L. Was sind denn Naturalien?

K. No-

K. Naturalien sind Körper u. s. w.
(s. die angezogene Stelle.)

L. Aber solche Körper ꝛc. werdet ihr wohl noch nicht gesehen haben?

K. (Einige) O ja, sehr viele: Hunde, Tannen, Sandsteine. (Andere) Es gehören ja dahin alle Thiere, alle Pflanzen, und alle rohen Steine.

L. Habt ihr denn auch wohl ein Hauptunterscheidungsmerkmahl bemerkt, wenn ihr Thiere, Pflanzen und Steine mit einander verglichen, oder von einander unterschieden habt, wodurch ihr das Thier von der Pflanze und dem Steine, die Pflanzen vom Steine und vom Thiere u. s. w. unterscheiden könnet?

(Kinder, die vernünftig unterrichtet worden sind, werden hier verschiedene Merkmahle angeben, die theils ganz, theils nur zur Hälfte passen; man kann ohngefähr folgenden Hauptunterschied gelten lassen.)

K. Die Thiere wachsen, wenn sie ihre Nahrung durch den Mund zu sich nehmen, die Pflanzen durch die Wurzeln, und die Steine haben keinen Mund und keine Wurzeln, sondern wachsen und werden größer, wenn sich von außen immer Theilchen ansetzen und anhängen.

L. Gut! Es giebt noch verschiedene Hauptmerkmahle, wodurch sich die Thiere, Pflanzen und Mineralien von einander unterscheiden; aber dieses ist schon hinlänglich. Faßt also den Unterschied so:

Die Thiere nähren sich und wachsen dadurch, daß sie Nahrungsmittel durch eine einzige Oeffnung,

den Mund, zu sich nehmen; die Pflanzen nähren sich durch viele solcher Oeffnungen, durch die Wurzeln; und die Mineralien nähren sich durch keine solcher Oeffnungen, sondern wachsen dadurch, daß sich Theilchen von außen anhäufen. Da es nun, wie ihr wißt, sehr viele Thiere, Pflanzen und Mineralien giebt, so hat man sie, um sie leichter zu übersehen, geordnet, und überhaupt erst in das Thierreich, Pflanzenreich und Mineralreich abgetheilt, so, daß alle Thiere zum Thierreich, alle Pflanzen zum Pflanzenreich, und alle Mineralien zum Mineralreich gezählt werden. Wohin wird also nun der Iltiß gehören?

K. Ins Thierreich.

L. Ihr habt Recht ꝛc. Sind aber alle Thiere Iltisse?

(Eben so, wenn sie der Lehrer die Eintheilung des Pflanzen- und Mineralreichs kennen lehrt.)

K. (lachen) O nein. Da müßte es auch Iltisse mit Federn geben, welche Eyer legten — denn die Vögel sind doch auch Thiere!

L. Also ein zweybeiniger Vogel wäre ganz etwas anders als dieser vierfüßige Iltis. Und so werden wohl auch die Geschöpfe mit Floßfedern und Schuppen —

K. (Einige) O die Fische, die Fische sind auch keine Iltisse — (Andere) haben keine vier Füße — (Andere) Sind aber auch keine Vögel.

L. Und außer diesen, dünkt mich, kennt ihr ja noch Thiere, die davon den Namen haben, daß sie auf der Erde und im Wasser zugleich leben können.

K. Die

K. Die Amphibien: diese sind wieder etwas anders, als Fische, Vögel und vierfüßige Thiere.

L. Der Frosch z. B. Dann habt ihr ja auch Käfer, Schmetterlinge, und andere Thierchen, die nicht mehr vier, sondern sechs und wohl noch mehrere Füße haben, diesen Sommer genug gefangen? und das waren keine Amphibien, keine —

K. (Alle) Das waren Insekten.

L. Recht! Und nun wären noch übrig?

K. Die Würmer.

L. Wer weiß mir einen Wurm zu nennen?

K. (Einige) Der Regenwurm. (Andere) Die Schnecken, der Spulwurm.

L. Seht, Kinder, diese sechs verschiedene Arten von Thieren, in welche alle bekannten Thiere abgetheilt werden, heißt man Classen. Es giebt also eine Classe der Vögel, eine Classe der Fische u. s. f.

(s. Classification der Thiere, wo man auch ein Erläuterungsexempel finden wird. Andere werden jedem Lehrer leicht von selbst beyfallen.)

Wohin wird aber nun der Iltiß zu rechnen seyn? Unter die Vögel u. s. f?

K. Unter die vierfüßigen Thiere.

L. Wo der Frosch z. B. hingehört?

K. Nein; der legt ja Eyer und ist eine Amphibie.

Der Iltiß gehört unter die Classe der Säugethiere.

L. Gut! Was nennst du denn aber ein Säugethier?

K. Ein Thier, das vier Füße hat und lebendige Junge zur Welt bringt —

L. Welche Jungen die Mutter an ihren Brüsten eine Zeitlang ernahrt; woher eben das Wort Säugethier entstanden ist.

Der Iltiß ist also ein Säugethier. Wenn ihr nun dieß alles recht gefaßt habt, so wollen wir einige Schritte weiter gehen.

(Hier ist eine kleine Pause nöthig, um die Kinder das eben gelehrte erst durch eine Menge Fragen und Exempel recht einzuprägen, und alsdenn erst auf das folgende aufmerksam zu machen.)

L. Was bemerkt ihr denn aber an den Füßen?

K. (Alle) Zehen.

L. Gar recht. Der Iltis hat Zehen, und keinen Huf, wie die Pferde oder Kühe.

K. Oder Schafe und Ziegen.

L. Eben so. Allein sehet nun aber jetzt einmal das Gebiß des Iltis recht an! seht wie er die Zähne fletscht! was wird er wohl fressen?

K. (Alle) Fleisch, Fleisch! (Einer) denn er hat ja ein so scharfes Gebiß, wie ein Marder.

(Hier könnte nun die Rubrik von Nahrung eingeschaltet werden; allein um die Kinder in keiner gewissen Ordnung bey Beschreibung der Thiere zu erhalten, verspare ich sie bis weiter unten.)

L. Sollte es auch wohl Säugethiere geben, die kein Fleisch, sondern irgend etwas anders z. B. Gras und Kräuter fräßen?

K. Den Ochsen, das Schaf. Diese Thiere haben kein so scharfes Gebiß, als dieser Iltis, denn es fehlen ih-

ihnen ja die obern Vorderzähne. Ein anderes: Sie haben ja auch Hufe, oder gespaltene Klauen.

L. Recht gut! — Werden denn der Ochs und das Schaf die Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen, auch wohl so klar und fein kauen können, wie hier dieser Iltis, der ein so scharfes Gebiß hat?

K. O nein! Jene müssen das Gras und Heu, das sie verschluckt haben, noch einmal kauen.

L. Und wie heißt man sie denn eben dieser Eigenschaft wegen?

K. Sie heißen wiederkäuende Thiere. Deswegen haben sie ja auch vier Mägen, in welchen die Speisen, die sie mit den Zähnen nicht genug zermalmen können, immer nach und nach kleiner gemacht, und verdauet werden, wie sie uns neulich an der geschlachteten Kuh zeigten.

L. Richtig. Nun zählt mir aber doch einmal die Vorderzähne an dem Iltis.

K. Er hat oben und unten sechs Vorderzähne und in jeder Kinnlade zwey spitzige, ei! wie spitzige Eckzähne.

L. Halt —, und wohl aufgemerkt! Alle Thiere, die sechs Vorderzähne oben und unten haben, nennt man Raubthiere. Und weswegen wohl?

K. Doch wohl deswegen, weil sie andere Thiere rauben und fressen.

L. Ja, weil sie andere lebendige Thiere fangen und verzehren. Das Kennzeichen der Raubthiere ist also?

K. Sechs Vorderzähne in beyden Kinnladen.

L. Rich-

L. Richtig. Also seht ihr, lieben Kinder, und ich wünsche daß ihr dieß recht wohl behalten möget!) daß die Thiere nicht bloß nach ihren Füßen u. s. w., sondern auch in Rücksicht ihres Gebisses verschieden sind.

Es giebt Säugethiere, die Zehen an den Füßen statt der Hufen, und ein sehr scharfes Gebiß, sechs Vorderzähne in der obern Kinnlade, und sechs in der untern haben. Der Iltis ist also ein Säugethier, das deutliche Zehen und sechs Vorderzähne oben und unten im Munde hat, oder nun bestimmter und besser: Der Iltis gehört unter die Classe der Säugethiere, und zwar unter denselben in die Ordnung der Thiere mit Zehen; denn die Abtheilungen, die man wieder der Deutlichkeit und Ordnung halber unter den Säugethieren macht, nennt man Ordnungen. Könnt ihr denn wohl schon mehrere Ordnungen unter den Säugethieren als die Raubthiere?

K. O ja die Thiere mit Hufen.

L. Gut! Da es aber nun viele Thiere mit Zehen giebt, so werden die Menge derselben wieder nach der Gestalt und Anzahl der Zähne abgetheilt. Und eine solche Abtheilung nennt man einen Abschnitt. Der Iltis gehört also unter die Ordnung der Thiere mit Zehen und in den Abschnitt der Raubthiere.

Kennt ihr denn auch mehrere solcher Thiere, die man unter die Raubthiere rechnen könnte?

K. Doch wohl die Katze?

L. Rich-

L. Richtig. Wie viel Vorderzähne würden wir also an dieser, wenn wir sie fiengen, und ihr Gebiß betrachteten, finden.

K. (Alle) Sechs oben und sechs unten.

L. Getroffen!

(So viel zum erstenmal, damit man ja die Kinder nicht überlade. In der Folge lehrt man sie auch die andern Ordnungen und Abschnitte kennen, zeigt ihnen Kennzeichen derselben und macht ihnen so die ganze Classifikation nach und nach bekannt.)

L. Nun beschreibt mir aber den Iltis einmal!

(Der Lehrer läßt sich nun das Thier nach der Anleitung im Buche selbst beschreiben, und verbessert nach demselben die Fehler der Kinder.)

L. Ob er wohl auch eine Stimme hat? was meynt ihr?

K. (Einige) Ja.

L. Allerdings. Zu manchen Zeiten knurrt er, und wenn man ihn gefangen hat, oder wenn er böse ist, so knefft er, wie ein junger Hund. —

Wo hält er sich denn aber wohl auf? Im Walde, oder auf dem Felde, oder in Häusern?

K. (Einige) Auf dem Felde; (andere) in Häusern.

L. Er hält sich auf dem Felde, in Häusern und im Walde auf; in Scheunen, in Holzhaufen, unter den Wurzeln der Bäume, hinter den hölzernen Verschlägen

der Flüsse und Teiche, in dicken Hecken und Büschen. Weil er in den Häusern sich auch vergräbt, und in Kellern und Scheunen zuweilen große Haufen, wie ein Maulwurf, aufwirft, so heißt er an manchen Orten Hausunk. — Wo wird er sich wohl im Winter hinmachen?

K. In die Dörfer.

L. Ja er zieht aus dem Walde und Felde mehr in die Städte und Dörfer, vorzüglich in die einzeln im Felde liegenden Mühlen. Warum thut er wohl das? was glaubt ihr?

K. Weil es im Winter kalt ist.

L. Und weil er im Winter im Walde und auf dem Felde nicht viel zu fressen findet. Was wird er wohl fressen?

K. (Einige) Hühner, Tauben.

L. Er lebt vom Fleisch der Vögel. Im Sommer geht er, und zwar bloß des Nachts, in Feldern und Hölzern umher, und sucht die Lerchen, wilden Enten, Wachtel- und Rebhühnernester auf, frißt die jungen Vögel, und trägt die Eyer in seine Wohnung. Im Winter besucht er die Hühner- und Taubenhäuser, und frißt da, was er antrifft; beißt Hühner, Tauben, auch wohl Gänse todt, und schleppt sie in seine Höhle. Wenn er aber nun keine Vögel bekommen kann, und es hungert ihn doch, was wird er wohl da machen?

K. Da frißt er etwas anders.

L. Was frißt er aber wohl noch? Was leben denn noch für Thiere in Feldern und Wäldern, die er fangen kann? Hasen, Rehe, Hirsche, nicht wahr? da wird er wohl manchmal einen Hirsch verzehren?

K. Nein,

K. Nein, den kann er nicht bezwingen.

L. Nun was giebt es denn für kleinere Thiere noch im Felde? Wie heißen denn die Thierchen, die meist in der Erde leben? die auf den Wiesen so große Haufen aufwerfen?

K. (Alle) Maulwürfe, Maulwürfe, (und auch einige) Wassermäuse.

L. Seht, die frißt er auch noch. Er fängt Hamster, Mäuse, Ratten, und im Sommer auch Frösche, welche ihm vorzüglich gut schmecken, und wovon er sich oft einen großen Vorrath in seiner Höhle sammelt. Man trifft ihn oft an, daß er in seiner Höhle einen ganzen Kranz Frösche um sich herum gelegt hat. Auch Kaninchen, Gartenschnecken und Heuschrecken frißt er; und endlich noch Thiere, die im Wasser leben?

K. (Alle) Fische.

L. Und zwar Forellen. — Worunter wollt ihr nun wohl den Iltiß zählen, unter die nützlichen, oder schädlichen Thiere?

K. Unter die schädlichen. Er tödtet ja so viele Vögel.

L. Ist er denn aber bloß schädlich? gar nicht nützlich?

K. O ja! Er fängt ja Maulwürfe, Ratten, Hamster und andere Mäuse weg.

L. Und sein Balg —, der wird wohl weggeworfen?

K. O nein!

L. Nein, den brauchen die Kürschner. Aus den langen Haaren seines Schwanzes macht man sehr gute Malerpinsel. Auch läßt er sich zur Kaninchenjagd abrichten. Einige Leute essen auch das Fleisch. Im gemeinen Leben aber wird er doch unter die schädlichen Raubthiere gerechnet. — Ob es wohl viel Iltisse giebt?

K. Nein! denn wir haben ja schon lange einen zur Lehrstunde bestellt gehabt, und keinen bekommen können.

L. Du hast Recht. Sie vermehren sich nicht sehr. Das Weibchen heckt des Jahrs nur einmal, und nicht mehr als vier, selten sechs Junge. Die Heckzeit ist im April, und die Jungen sind anfangs blind. Ihr Nest macht die Mutter von Stroh, Heu und Moos, und zwar am liebsten in Holz- und Reißighaufen. Die Jungen lassen sich zahm machen.

(Hier kann das Geschichtchen, das in der Note unter der Rubrik: Fortpflanzung S. 786. angeführt ist, erzählt werden, das besonders zur Erhaltung der Aufmerksamkeit sehr geschickt seyn wird.)

Da aber schon ein Iltiß vielen Schaden thun kann, so stellt man ihnen auch noch auf allerhand Weise nach, und sucht ihre Anzahl immer wieder zu vermindern. Wie wird man dieß wohl machen?

K. Man

K. Man stellt Fallen auf.

L. Man fängt sie in eisernen und hölzernen Fallen, stellt vor ihre Höhlen Netze, sucht sie in ihren Wohnungen auf, erschießt und erschlägt sie. Wenn sie sich nur mit einem Beine in einer eisernen Falle gefangen haben, so beißen sie sich solches ab, und laufen davon. Noch eine ganz eigne Art sie zu tödten hat man: Sie können das Wetzen eiserner Instrumente auf Steinen nicht vertragen; man nimmt daher ein Messer, wetzt es auf einem Stein vor ihrer Höhle, die Iltisse kommen hervor, und dann erschießt oder erschlägt man sie.

K. Das ist doch sonderbar.

L. Wie weiß man denn aber, wo man die Fallen hinlegen soll?

K. Das wird man ja wohl an ihrer Fährte sehen.

L. Richtig. Wenn man im Winter, wo sie sich doch nur mehrentheils in die Häuser schleichen und Schaden thun, eine solche Spur, wie diejenige, welche ich dahin zeichne, sieht, die so ziemlich einer Hasenfährte, die ihr doch alle kennt, gleichkömmt, nur daß sie etwas kleiner ist, so geht man derselben nach, und stellt die Falle in den Winkel, wo das Thier hinein gekrochen ist.

(Da ich bemerkt habe, daß die Kenntniß der Fährten den Kindern auf Spatziergängen große Freude, und vorzüglich Lust zur Naturgeschichte ge-

macht hat, so scheint es mir nöthig, daß der Lehrer sich dieselben nach Anleitung der Zeichnungen bekannt mache, welches er für sich sehr leicht im Stande ist, und worin ihm auch jeder Liebhaber der Jagd nachhelfen kann.)

Wenn nun der Lehrer so weit mit der Geschichte zu Ende ist, so kann er ein anderes Thier nehmen, und die Kinder beyde mit einander vergleichen und von einander unterscheiden lassen, kann sie die Eigenschaften und Fertigkeiten aufsuchen und sie davon etwas anschreiben und auswendig hersagen, oder sie auch einen Deutschen, Lateinischen und Französischen Aufsatz im Zusammenhange nach den oben in den Beschreibungen angegebenen Rubriken ausfertigen lassen, welches ich für das nützlichste halte u. s. w.

Dieß, glaube ich, wird genug seyn, um den Lehrer einen Wink zu geben, wie er, nach meinen Einsichten, die Naturgeschichte mit seinen Schülern am nützlichsten treiben könne; und ich habe weiter nichts hinzu zu setzen, als daß ich bey dieser Lektion Kinder von sechs bis acht Jahren vor Augen habe; daher ich, was Fortpflanzung und Fang betrifft, nur ganz kurz und im Vorbeygehen berührt, und Begattungszeit ganz übergangen habe. Sind die Kinder erst erwachsener, dann kann man auch davon weitläuftiger sprechen, und die Fallen durch Zeichnungen ihnen verständlich machen. Dann muß man aber auch, um ihnen recht deutliche Begriffe davon zu machen,

die

die gewöhnlichsten Fallen in Natur haben, und ihnen zeigen, wie solche gebraucht werden.

Eben so scheint es mir auch nicht nothwendig, daß man bey Kindern von diesem Alter das Längenmaaß und andere Dinge so genau, wie sie in der Beschreibung befindlich sind, anzugeben nöthig habe. Die Vergleichung mit dem Fuchs kann der Lehrer eben so wenig brauchen, wenn seine Zöglinge noch keinen Fuchs gesehen haben.

Systematisches Register

der Deutschen Säugethiere.

Ordnung I.

Säugethiere mit Hufen.

A. Einhufige.

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
I. Pferd.	1.	Gemeines	226
		a. wildes	230
		b. zahmes	230
		a. Arabisches	230
	2.	Esel	232
		a. wilder	283
		b. zahmer	284
		a. Maulthier	292
		b. Maulesel	292

B. Zweyhufige.

a. Mit Hörnern.

α. Mit bleibenden Hörnern.

II. Ochs.	3.	Büffelochse	298
	4.	Gemeiner	304
		a. Wilder (Auerochs)	305
		b. zahmer	305

Gattung.	Nr. Art.	Seite.
III. Schaf.	5. Gemeines	355
	a. wildes (Argali)	357
	b. zahmes	357
	a. Spanisches	363
	b. Englisches ꝛc.	364
IV. Ziege.	6. Alpenziege	400
	7. Gemeine	408
	a. wilde (Bezoarziege)	409
	b. zahme	409
	a. Angorische	424
V. Antilope.	8. Felsen	429
	β. Mit abfallenden Hörnern.	
	* Mit schaufelförmigen Geweyhe.	
VI. Hirsch.	9. Damhirsch	445
	a. weißer	448
	b. schwarzer	448
	c. gefleckter ꝛc.	448
	** Mit runden Geweyhe.	
	10. Rothhirsch	453
	a. weißer	457
	b. Bläßwildpret	457
	c. geschäcktes	458
	d. silberfarbnes	459
	11. Reh	487
	a. schwarzes	491
	b. dunkelbraunes	491

Gattung	Nr.	Art.	Seite.
		c. geschäcktes	491
		d. weißes	491
		e. Bastartreh	491
		b. Ohne Hörner.	
		a. Mit Vorderzehen in der obern Kinnlade.	
VII. Schwein.	12.	Gemeines	505
		a. wildes	528
		b. zahmes	506
		a. Ungarisches	510
		b. stachelhäariges	510
		c. einhufiges ꝛc.	510

Ordnung. II.

Säugethiere mit Zehen.

A. Raubthiere.

VIII. Hund.	13.	Gemeiner	544
		a. Haushund	550
		a. Pommer	551
		b. Haidehund	551
		c. Wolfshund	551
		d. Fuchsspitz	551
		e. Sibirischer Hund	552
		f. Isländischer	552
		g. Schäferhund	552

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
		b. Bullenbeißer	554
		a. Mit Schwimmfüßen	555
		b. Rundkopf	555
		c. Englischer Hund	556
		d. Metzger:	556
		e. Saufinder	557
		f. Saurüden	557
		g. Mops	558
		h. Bastardmops	558
		i. Alikantisches Hündchen	559
		k. Artoistischer Hund	559
		c. Jagdhund	559
		a. Leithund	561
		b. Schweißhund	563
		c. Hühnerhund	564
		d. Wasserhund	566
		e. Parforce: Hund	566
		f. Stöberhund	567
		d. Budel	568
		a. kleiner	568
		e. Seidenhund	569
		a. kleiner	569
		b. Bouffe	570
		c. kurzhaariger Bologneserhund	570
		d. Pyrame	570
		e. langhäariger Bologneserhund	571

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
		f. Löwenhündchen	572
		f. Großer dänischer Hund	572
		a. Harlekin	573
		g. Neufoundländischer Hund	573
		h. Gemeiner Windhund	574
		a. kleines Windspiel	576
		b. Irländischer Windhund	576
		c. Curshund	577
		d. nackter Hund	577
		e. Türkisches Windspiel	578
		i. Dachshund	578
		a. krummbeiniger	579
		b. geradbeiniger	580
		c. zottiger	580
		d. Hündchen von Burgos	580
	14.	Gemeiner Wolf	608
		a. weißer	612
		b. schwarzer	612
		c. Hauswolf	612
	15.	Gemeiner Fuchs	624
		a. Brand	627
		b. Kreuz	628
		c. weißer	628
		d. gelber	628
		e. schwarzer	628
		f. grauer	628

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
IX. Katze.		† Mit langem Schwanze.	
	16.	Gemeine	648
		a. wilde	670
		b. zahme	651
		a. Angorische	653
		b. Spanische	653
		c. Kartheuser	654
		d. Cyper	654
		* * Mit kurzem Schwanze	
	17.	Rothluchs	678
		a. Gemeiner Luchs?	679
X. Bär.	18.	Landbär	695
		a. schwarzer	698
		b. brauner	699
		c. rother	700
		d. weißer	701
		e. geschäckter	701
		f. Bastardbär	702
	19.	Vielfraß	718
		a. schwarzer	721
		b. gelbbrauner	721
		c. weißer	721
XI. Dachs.	20.	Gemeiner	729
		a. weißer	733
		b. bunter	733

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
XII. Wiesel	21.	Steinmarder	755
		a. weißer.	759
	22.	Baummarder.	769
	23.	Gemeiner Iltis	779
		a. weißer	782
	24.	Kaninchen-Iltis	791
		a. kastanienbrauner	793
		b. schäckiger	793
	25.	Großes Wiesel	798
		a. weißes	802
		b. gesflecktes	802
		c. aschgraues	803
		d. verkehrtes	803
	26.	Kleines Wiesel	812
		† Boccamele?	819
XIII. Otter.	27.	Flußotter	822
		a. weißer	826
		b. gelber	826
	28.	Sumpfotter	833
		B. Schrotthiere.	
XIV. Maulwurf.	29.	Gemeiner	846
		a. weißer	850
		b. geschäckter	850
		c. grauer	850
		d. gelber	850

Gattung.	Nr. Art.	Seite.
XV. Spitzmaus.	30. Gemeine	861
	a. aschgraue	863
	b. röthliche	863
	c. weiße	863
	31. Wasserspitzmaus	872
	a. weiße	875
	32. Grabende	879
	33. Weißzähnige	882
	34. Mit dem vierf. Schwanze	883
	35. Verkehrtschwänzige	884
	36. Gefurchte	885
XVI. Igel.	37. Gemeiner	888
	a. weißer	892
	C. Nagethiere.	
XVII. Halbkaninchen.	38. Gemeines	903
XVIII. Biber.	39. Gemeiner	910
	a. weißer	912
	b. röthlicher	913
	c. bunter	913
XIX. Maus.	* Rattenschwänzige	931
	40. Hausratte	931
	a. weiße	934
	b. aschgraue	934
	c. gefleckte	934
	41. Wanderratte	944
	a. Bastard.	950
	42. Ge:	

Gattung.	Nr. Art.	Seite.
	42. Gemeine Hausmaus	952
	a. weiße	955
	b. gelbe	955
	c. gefleckte	955
	d. schwarze	955
	43. Feldmaus	963
	a. weiße	963
	b. bunte	966
	c. mit weißem Kopfe	966
	d. schwarze	966
	44. Brandmaus	972
	a. weiß gestreifte	975
	b. gefleckte	975
	45. Rüsselmaus	978
	** Haarschwänzige.	
	46. Wassermaus	980
	a. schwarze	984
	b. gefleckte	985
	c. weiße	985
	d. weißgraue	985
	47. Ackermaus	996
	a. weiße	998
	*** Mit Backentaschen.	
	48. Gemeiner Hamster	1005
	a. schwarzer	1009
	b. geschäckter	1009
	c. weißer	

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
		c. weißer	1009
		d. gelber	1010
XX. Murmelthier.	49.	Alpen-Murmelthier	1027
		a. getiegertes	1029
		b. schwarzes	1030
		c. weißes	1030
	50.	Ohrloses	1043
		a. gewässertes	1046
		b. geperltes	1046
		c. gelbliches	1047
XXI. Schläfer.	51.	Siebenschläfer	1053
	52.	Gartenschläfer	1060
	53.	Haselschläfer	1069
XXII. Eichhorn.	54.	Gemeines	1075
		a. schwarzes	1078
		b. braunschwarzes	1078
		c. aschgraues	1078
		d. hellgraues	1078
		e. weißes	1079
		f. gelbes	1079
		g. geflecktes	1079
		h. geschäcktes	1079
		i. mit weißen Füßen	1079
		k. mit weißem Schwanze	1079
XXIII. Hase.	55.	Gemeiner	1092
		a. weißer	1096

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
		b. gelber	1096
		c. schwarzer	1097
	56.	veränderlicher	1112
		a. schwarzer	1115
		b. grauer	1115
	57.	Kaninchen	1118
		a. wildes	1120
		b. zahmes	1128
		a. angorisches ꝛc.	1134

Ordnung III.

Säugethiere mit Flughäuten.

* Oben vier, unten sechs Vorderzähne.

XXIV. Fledermaus.	58.	Langöhrige	1143
	59.	Rattenartige	1154
	60.	Mäuseartige	1163
	61.	Blasse	1170

** Oben zwey, unten sechs Vorderzähne.

	62.	Speck-Fledermaus	1172
	63.	Zwerg-Fledermaus	1178
	64.	Rauhflügl. Fledermaus	1182

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
XXV. Flugmaus	65.	Große Hufeisen-Flugmaus	1187
	66.	Kleine Hufeisen-Flugmaus	1194

Ordnung IV.

Säugethiere mit Flossenfüßen.

A. Mit Zehenabtheilungen.

XXVI. Robbe.	67.	Kalbsrobbe	1198
		a. weißer	1202
		b. gelblicher	1202
		c. grauer	1202
		d. gefleckter	1202
	68.	Gräuer	1212

B. Ohne Zehenabtheilungen.

XXVII. Narwall.	69.	Gemeiner	1218
XXVIII. Wallfisch.	70.	Gemeiner	1225
		a. Eiswallfisch?	1238

Gattung.	Nr.	Art.	Seite.
XXIX. Kachelot.	71.	Kleinäugiger	1240
		a. Geradzähniger?	1245
XXX. Delphin.	72.	Stumpfschnauziger	1246
	73.	Langschnauziger	1251
	74.	Dicker	1254
		a. säbelflinniger?	1257

Alphabetisches Register

der vornehmsten Namen und Sachen.

	Seite
Abänderungen	176
Abschnitte	776
Ackermaus	972.996
Adamsapfel am Halse	127
Adern	123
— zurückführende	123
Affe	198
Afterhase	903
Afterkaninchen	903
Afterkriechen	576
Afterzehe	87
Afrikaner	193
Ai	208
Albinos	197
Alpenbock	400
Alpenhase	1112
Apenmaus	1027
Alpenratze	1027
Alpenziege	400
Alter der Säugethiere	155
Ambos im Ohr	96
Ameisenbär	695.698
Ameisenfresser, großer	209
Amerikaner	193
Ammon	357.632
Amphibien	47
Analytische Methode	1285
Anc	282
Angelmaus	861
Anleitung für Lehrer der Naturgeschichte	1284
Anodontia	208
Antilope Rupicapra	429
Antilope	185
Felsen-	429
Apophyse	107
Arctomys	1026
— Citellus	1043
— Marmota	1026
Argali	357
Aries	555
Aristoteles	45. 177
Art	176
Artefakten	4
Arterien	123
Asiaten	193
Als	282
Auerochsen	222. 305
Aufenthalt der Säugethiere	155
Augen, äußere	73
— böse der Hunde	597
— innere	91
Augenbraunen	73

	Seite
Augenbutter	153
Augendecke, innere	74
Augenkrystall	93
Augenlieder	73
Augenstern	73. 92
Augenwimpern	73
Ausdünstung	37
Ausstopfen	171
Avellanarius	1169
Aves	47
Bache	528
Backentaschen	78
Backenzähne	109
Badger, common	729
Bär	694. 699
Bär, schwarzer in Amerika	702
Balaena glacialis	1238
Balaena Mysticetus	1225
Balein de Groenland	1225
Bärenbeißer	554
Bärenhund	554
Bärenjagd	167
Bardeau	292
Barbet	568
Bart	40
Bastarten	26
Bastartbär	491
Bastartmops	558
Bastartreh	491
Bastartziege	427
Bat longeared	1143
— common	1163
Bedeckung der Säugethiere	69
Bauch	82
Bauchfell	119
Baummarder	769
Baumratze	963
Bay-cat	678
Bear, black	698
— brown	695
Beaver	414
Begattung	133
Beguts	235
Behängzeit	200
Beine	85
Beinhaut	109
Belette	812
Belier	355
Belluae	179
Berghase	1112
Berghirsch	561. 584
Bergratze	1027
Bestätigungsjagd	166
Beulen der Schweine	767
Beutelthier, Molluckisches	202
Betze	543. 624
Bewegung, willkührliche	36. 39
Bezoarziege	409
Biber	909
— gemeiner	910
— fette, frische, getrocknete	913
Bibergeil	918
Biche	454
Bilgmaus	1043
Billich	1053
Bilsenmäher	535
Bimanus	193
Birschhund	563
Birkfuchs	624

	Seite
Bisammaus	861
Bisamthier, Tibetisches	180
Biſon	305
Bisulca	297. 183
Blaireau	729
Bläßwildpret	458
Blattern der Schafe	387
Blinddarm	118
Blumenbachs Syſtem	180
Blut und deſſen Umlauf	141
Blutader	123
Blutgeſpenſt	212
Blutpiſſen der Kühe	340
— der Pferde	270
— der Schafe	385
Bock	408
Boccamele	818
Bockhirſch	584
Bodenhund	564
Boeuf	304
Bologneſer, langhaariger	569. 571
— kurzhaariger	570
Bologneſerhündchen	571
Bonaſus	305
Borke des Gehirns	100
Borſten	69
Bos	297
— Bubalus	299
— Taurus	304
Botanik	8
Bouffe	570
Bouc	408
Bouquet	531
Bouquetin	400
Bradypoda	207
Bradypus tridactylus	308
Bräune der Hunde	214
— der Schweine	520
Brandfuchs	627
Brandhirſch	458
Brandmaus	972
Braunfiſch	1246
Brebis	355
Bruſt	82
Bruſtbein	82
Brüſte Anzahl, Lage	66
Bruta	179
Buch (Magen)	66
Buchmarder	755. 769
Budel, großer	568
— kleiner	568
Buffle	299
Buffalo	299
Buffon	156
Büffelochſe	298
Bull	205
Bullenbeiſer	554
— mit der Haſenſcharte	555
Buntſing	779
Buſchmarder	769
Buttkopf	1254
Butzkopf	1254
Cachelot à dents en faucilles	1241
— pointus	1245
Camelopardalis Giraffa	184
Camelus Dromedarius	186
Camera obscura	53
Campagnol	469

	Seite
Canis	143
— Alopex	627
— aureus	546
— crucigera	250
— familiaris	544
— Lupus	608
— Lycaon	612
— Vulpes	624
Capra	400
— Aegagrus	409
— Hircus	408
— Ibex	400
Cartheuserkatze	654
Castor	909
— Fiber	910
Castoreum	318
Cat domestic	651
— Wild	670
Catus	647
Cavia	902
— Cobaya	904
Cavia restlefs	403
Cerf	454
Cervus Dama	440
— Capreolus	487
— Elephas	454
Cetacea	180. 216. 1217
Chamois	430
Chat domestique	651
Cheval	226
Chevre	408
— d'Angora	424
Chevreuil	487
Chevrette	487
Chien	540
Chiroptera	210. 1142
Christwurz	657
Circulation des Bluts	143
Citellus	500
Classen der Thiere	47. 176
Classification der Säugethiere	175
Classis	176
Coati	203
Cobaya	903
Cochon	506
— lait	506
— d'Inde	903
Curshund	577
Cyperkatze	654
Dachmarder	577
Dachs	728
Dachsbär	729
Dachsfinder	578
Dachshund	578
Dachskriecher	578
Dachsschleifer	578
Dachswürger	578
Damhirsch	445
Dain	445
Daman Israel	206
Dänische Tücher	113
Därme	117
Darm, krummer	318
— leerer	118
Darmfell	119
Darmgicht der Pferde	268
— des Rindviehs	341
Daffelbeulen der Kühe	700
Dasypus tricinctus	208
Dauphin	1251
Delphin	1246
— dicker	1254
— gemeiner	1251
— langschnauziger	1251
— stumpf-	

	Seite
— stumpfschnauziger	1246
Delphinus Delphis	1251
— Orca	1254
— Phocaena	1247
— Serra	1257
Deer, Fallow	445
Diaphragma	67
Dickkopf	1198
Didelphis Opossum	202
Digitata	191
Dissemination	16
Dog	556
Dog faithfull	544
Dolphyn	1251
Dondós	197
Dormouse common	1069
— fat	1053
Dormouse Garden-	1060
Drehkrankheit d. Schafe	389
— der Ziegen	623
Druse	263
Drüse, große	120
Drüsen, Beschaffenheit, Nutzen	128
Drüsensäfte	138
Dunstschornsteine	372
Durchfall der Hunde	595
— der Kaninchen	1132
— der Pferde	269
— des Rindviehs	341
— der Schafe	390
— der Schweine	521
Durst	115
Dypus Iaculus	206
Eber	506
Eckzähne	109
Eckerchen	1075
Ecureuil	1075
Edelmarder	769
Eichelmaus	1060
Eichhorn	1074
— aschfarbenes	1079
— gemeines	1075
— graues	1079
— schäckiges	1079
— schwarzes	1079
— weißes	1079
Eichkätzchen	1075
Einhorn	1218
Einhornfisch	1218
Einhorn der Bibel	189
Eiswallfisch	1238
Eintheilungen der Thiere, verschiedene	177
Elbthier	779
Elenthier	222
Elephant	190
Elephas maximus	190
Ellenkatze	779
Elske	779
Eltis	779
Empfindung der Thiere	36. 41
Englisiren	259
Entzündung	271. 341
Epaulard	1254
Epée de mer	1257
Epigenesie	18
Epiphyse	107
Equus Asinus	282
Equus As. Hinnus	292
Equus As. Mulus	292
Equus Caballus	226
Erbsmaus	972

	Seite
Erdfahren	996
Erdratte	944
Erdschlüffel	980
Erdwolf	980
Erdzeisel	996
Erhitzung der Schafe	386
Erinaceus	887
Ernährung der Thiere	37
Erweiterung des Herzens	—
Erxleben	193
Erzeugung, zufällige	11
Esel	282
— wilder	283
Eskimos	193
Espenmarder	769
Evolution	13
Europäer	193
Eustachianische Röhre	96
Eyerstock	133
Eyrunde Fenster im Ohr	96
Fährten	157
Fallow Deer	445
Faltenmagen	113
Familiae	176
Familien	176
Faon de Cerf	454
Fat-squirrel,	1053
Faulthier	208
Federlappen	158
Feivel der Pferde	271
Feldfuchs	624
Feldgeis	640
Feldhase	1092
Feldmaus, gelbbraune	963
— große	963. 880. 1005
— kleine	996
Feldmarder	769
Feldratte	944
Feldratze	980
Feldwiesel	812
Felis Catus	648
— Lynx	679. 685
— rufa	678 684
Felsenantilope	429
Felsengeis	429
Fenster, eyrunde im Ohr	96
— runde	97
Fer à cheval	1188
Ferae	180. 200
Ferkelmaus	905
Ferret	791
Fett	149
Feuer des Rindviehs	340
— der Pferde	271
— der Schafe	386
Feuchtigkeiten des Auges	93
— gläserne	93
— kryſtallene	93
— wässerige	93
Fichtenmarder	769
Fieber der Hunde	586
Field Rat	963
Filaria	344
Finnen der Schweine	521
Fischdieb	822
Fische	48
Fischotter	822
— kleiner	822
Fischottermarder	822
Fischotternetz	163
Fitchet	779
Fix	—
Flatterthier	213
Fledermaus	213. 1142

	Seite
Fledermaus, blasse	1170
— gemeine	1154. 1163
— große	1154. 1172
— großöhrige, gehörnte	1143
— kleine	1178
— langöhrige	1143
— mäuseartige	1163
— mit dem Mäusekopf	1154. 1163. 1172
— nächtliche	1172
— mit der Hufeisennase	1187
— rattenartige	1154
— rauhfüßliche	1182
— rothe	1182
— Speck-	1172
— weiße	1154
— Zwerg-	1178
Fledermatze	1154
Fleisch	26
Fleischerhund	156
Fließwasser	141
Flugfüße	88
Flugmaus	213. 1187
— große Hufeisen-	1187
— kleine	1189
Flußotter	822
Flußpferd	189
Foina	762
Foine	755
Fortpflanzung	131
Fossilien	10
Fox,	624
Franzosen des Rindviehs	342
Frauenzimmerpferd	237
Frett	791
Frettchen	791
Frettele	791
Frettmarder	791
Frischling	528
Frucht	134
Fuchs, gemeiner	624
Fuchsnetz	163
Fuchsspitz	551
Füchse	624
Füße	86
Furo	791
Furet Putois	791
Fußkrankheit der Kühe	336

Gais	408
Galle	117. 140
Gallsucht der Schweine	513
Gangfüße	88
Garden-squirrel	1076
Gartenmaus	972
Gartenschläfer	1076
Gattung	176
Gazelle	185
Gebärmutter	132
Gedärme	117
Gefühl	100
Gehirn	150
Gehör	95
Gehörgang	95
Gehörnerve	97
Gekröse	120
Gekrösdrüsensaft	140
Gelbsucht der Schafe	390
Gelenke	180
Gelenkschmiere	180
Gelsen	506
Gemse	429

	Seite
Genus	176
Geruch	98
Geschlecht	176
Geschmack	99
Geschmackkörner	99
Geschwulst am Euter der Kühe	342
Gesicht	91
Gespenst	212. 1154
Gestüte	250
Gewächsreich	8
Geweihe	444
Gicht der Hunde	587
Giraffe	184
Gliedmaßen, äußere	85
Glires	179 204
Glis	999
Gluton	718
Gnouzhia	718
Goat Angora	424
— domestic	408
— wild	409
Goldmarder	769
Goldwolf	546
Grabfüße	88
Gräber	872
Gräving	729
Grampus	1254
Grasebär	695
Gratthier	429. 439
Grauwerk	1053. 1127
Grentsch	1005
Greül	1053
Grimmdarm	118
Größe der Menschen	993
Großohr	1145
Grutschel	1005
Gürtelthier mit drey Gürteln	208
Gurgel	82
Haare, elektrische	69
— Farbe, Veränderung	68
— Verschiedenheit	69
Haarschwänzige Mäuse	980
Hallen, System	178
Hare, common	1092
— varying	1112
Hände	89
Hängseil	562
Halbfuchs mit kurzem Schwanze	729
Halbkaninchen	902
— gemeines	903
Hals	81
Hammer im Ohr	998
Hamster, gemeiner	1005
— orientalischer	1043
Hamstermaus	1005
Hamstermäuse	1005
Harlekin	573
Harn	154
Harnblase	130
Hase, gemeiner	1092
— gehörnter	1096
— nördlicher	1096
— veränderlicher	1112
— weißer	1096. 1112
Haselmaus, große	1066
— kleine	1069
Hasen, englische	1134
Hasenkönige	1134
Hasenkühlein	1128

	Seite.
Hasennetze	103
Haube	66
Haumaus 694.	983
Hauptjagd	164
Hauseſel	282
Haushund	550
Hausmarder	755
Hausmaus, gemeine	952
— Varietäten	955
Hausmäuſe, große	941
— kleine	952
Hausratten	931
Hausratzen	eb.
Hausunke	779
Hauswolf	612
Hauswieſel	812
Hausziege	409
Haut	50
— farbige des Auges	91
— harte	eb.
— ſchwarze	eb.
Hedge-hog common	888
Heerdenmaus	996
Heermännchen	812
Heermaus 973.	996
Haidemaus	551
Hengſt	226
Herisson	888
Hermann	400
Hermelinmarder	798
Hermelinwieſel	798
Hermine	798
Herz	121
Herzbeutel	122
Herzblut des Rindviehs	339
Herzkammer, linke, rechte	123
Herzkröte des Rindviehs	340
Herzohr, linkes, rechtes	123
Hetzhund	575
Hexe	1154
Hinnus	752
Hipolithos	271
Hippopotamus amphibius	189
— terrestris	190
Hircus	616
Hirſch	444
— gemeiner	453
Hirſchbezoar	476
Hirſchnetze	162
Hirſchluchs	678
Hoden 129.	131
Hodenſack	132
Hören 76.	97
Hörner	79
Hofhund	544
Hog wild	528
— common	505
Hohlader, große	124
Honigbär	699
Holzmaus	1076
Hordenfütterung	358
Hornhaut	92
Horſe generous	226
Horſe-ſhoe Bat	1118
Hornviehſeuche	331
Huf	89
Hufeiſennaſe, große	1187
— kleine	1194
Hund	543
— angoriſcher	570
— Artoiſiſcher	559
— eigentlicher	544
— engliſcher	556
— gemeiner	555

	Seite.
— großer dänischer	572
— Isländischer	552
— kleiner	552
— Neufoundländischer	473
— nackter	577
— Sibirischer	552
— türkischer nackter	553
— wilder	445
Hundsrobbe	1198
Hundedachs	733
Hundeigel	891
Hundeseuche	589
Hundezähne	110
Hüfte	86
Hündchen, Alikantisches	559
— Spanisches	570
— von Burgos	586
Hünerhund	564
Hunger	115
Hyäne, gestreifte	201
Hyaena striata	201
Hystrix cristata	205

Jagd, verschiedene Arten der	156 u. f.
— hohe	167
— mittlere	—
— niedere	—
Jagdhund	595
— deutscher	560
— englischer	560
— französischer	—
— polnischer	—
Jagdpferd	239
Jagdzeuch	164
Järf	718
Ibex	400
Igel	887
— gemeiner	888
Ilk	779
Illing	779
Iltis, gemeiner	779
Iltismarder	779
Individuum	176
Insekten	48
Irrgang	95
Juften	349
Jumare	249
Individuum	176

Kachelot kleinäugiger	1240
Kackerlacken	197
Kälberluchs	678
Kämeelgarn	427
Kalbsrobbe	1198
Kalender (Magen)	113
Kameel, einbuckliges	186
Kameelgarn	427
Kameelparder	184
Kammerhund	556
Kammern	164
Kampagnol	996
Kanäle, halbcirkelförmige im Ohr	95
Kanickelchen	1120. 1128
Kaninchen	1118. 1128
— angorisches	1134
— moskowitisches	—
— ungarisches	—
— wildes	1120
— zahmes	1128
Kaninchenhase	1128
Kaninchenjäger	791
Kaninchen-Iltis	791
Kaninchenwiesel	791
Karnützchen	1128

	Seite.
Katze	647
— Angorische	653
— Cyper	654
— Kartheuser	654
— spanische	651
— wilde	670
— zahme	651
Katzenluchs	678
Kehldeckel	82
Kehle	82
Kennzeichen	177
Kesseljagd	166
Keuler	528
Kiefermarder	769
Killer	1257
Kinn	79
Kinnladen	—
Klein, System	178
Klauen	86. 84
Kletterfüße	88
Klopfjagd	162
Klapperjagd	—
Knochen	103
— äußerer, innerer Bau	105
Knöchelchen, rundliche im Ohr	96
Knorpel	105
Knotenkrankheit der Hirsche	461
— der Kühe	310
— der Rehe	490
Köchlani	232
Königshasen	1134
Körper, künstliche	3
— natürliche	3
Koller	270
Kopf, dessen Theile	72
Koppeljagd	167
Kornferkel	1105
Kornhamster	1005
Kornmaus	972
Krebs der Hunde	592
Krebsotter	838
Kreislauf des Bluts	143
Kreuzfuchs	628
Kriegspferd	240
Kretsch	1005
Kritsch	1043
Kröpfe	127
Kröte des Rindviehs	340
Küllen	1120
Kuh	304
Kulan	283
Kutschenpferd	240
Krystallinse	91
Labyrinth im Ohr	95
Landbär	695
— rother	700
— schwarzer	698
— brauner	699
— weißer	701
— geschäckter	701
Landhirsch	446
Landotter	822
Langohr	1143
Lapin	1120
Lappen	165
Lauf	165
Laufhund	566
Laufjagd	166
Leber	117
Leberfäule der Schafe	385
Lehre der allmähligen Bildung	12
— Entwickelung	13

	Seite.
— Verwandschaft	16
— der beyden Prinzipien	20
— vom Bildungstriebe	22
Leithund	561
Lemur Mongoz	200
Lenden	86
Lendenblut des Rindviehs	339
Lendenblut der Schafe	385
Lepus	1091
— Cuniculus	1118
— timidus	1092
— variabilis	1112
Lerot	1076
Lichtmarder	769
Liebe der Alten gegen die Jungen	137
Liévre	1092
Ligamente	66
Linne'	46
Linneisches System	179
Lippen	77
Löserdörre	332
Löwenhündchen	572
Lobata	214
Loir	1053
Loup	608
Loup-Cervier	629
Loutre	822
Luchs	679
Luchskatze	678
Luftröhre	126
Luftröhrenknopf	127
Lunge	125
Lungenblutader	124
Lungenfäule der Schafe	385
Lungenpulsader	124
Lungenseuche des Rindviehs	335
Lupus	680
Lutra	821
— minor	838
— vulgaris	822
Lymphe	142
Lynkur	631
Lynx	679
Mähne	70
Magen	113
Magensaft	239
Maltheserhündchen	571
Mager	150
Maki	199
Mammalia	47
Mammalogie	50
Manati	215
Mannichfalt (Magen)	113
Manis macroura	209
Maccassin	528
Mark	152
Marksaft	—
Marder	755
Marmot alpine	1027
— earless	1044
— german	1009
Marmotte	1027
Marsouin	1247
Marte	769
Martin	755
Maske	1187
Mastdarm	179
Maulesel	892
Maulsucht des Rindviehs	338
Maulsucht der Schafe	386

	Seite
Maulthier	292
Maulwurf	846
— gelber	850
— gefleckter	850
— gemeiner	846
— grauer	850
— kleiner	861
— weißer	850
Maulwurfsgrillen zu vertreiben	861
Maus	29
— amphibiſche	988
— braune	944
— gemeine	952
— norwegiſche	944
— polniſche	1043
— rothe	963
Mauseichhorn	1053
Mauſeohr großes	1154
— kleines	1162
Meadow Rat	996
Meereinhorn	1218
Meerfärdel	903
Meerferkel	903
Meerkalb	1198
Meerfäulein	903
Meerſchwein	1246
Meerſchweinchen	903
Meerſchweinslaus	908
Meles Taxus	739
Menk	838
Menſch	191
Menſchenraſſen	195
Methode	177
Metzgerhund	556
Milchadern	121
Milchbehältniß	121
Milchbruſtgang	141
Milchſaft	141
Milz	115
Mineralien	7
Mineralogie	8
Mineralreich	8
Minx	538
Miſtbellerle	1027
Mißgeburten	24
Mitjagd	167
Mitteltücher	164
Modermarder	838
Mole european	846
Moll	846
Monda: aigia	341
Monodon Monoceros	1218
Mongus	200
Mops	558
Morunge: Robbe	1213
Moſchus moſchiferus	186
Mouſe	952
Mufflons	257
Mühlzähne	110
Mule	292
Mulet	—
— petit	—
Mulot	963
Multungula	188
Mulus	292
Mund	77
Müger	861
Mütze (Magen)	113
Mützer	861
Mures	929
-- buccati	1005
-- cuniculariі	979
-- myosuri	980

	Seite.
Murmelmaus	1027
Murmelthier	1004
— deutsches	1005
— straßburgisches	1005
— ohrloses	1043
Murmeutle	1027
Mus agrarius	173
-- amphibius	980
-- arvalis	996
-- avellanarius	1069
-- citellus	1043
-- cricetus	1006
-- decumanus	944
-- Daubentonii	394
-- fodiens	394
-- Glis	506
-- gregarius	996
-- marmotta	1027
-- musculus	952
-- palutosus	980
-- Porcellus	411
-- quercinus	1060
-- Rattus	931
-- rutilus	973
-- sorocinus	978
-- sylvaticus	963
-- terrestris	980
Musaraigne	861
- d'eau	872
Muscardin	1069
Muskel	51
Mustela	754
-- Boccomela	818
-- Erminea	698
-- Foina	755
-- Furo	791
-- lutreola	838
-- Martes	769
Mustela nivalis	814
-- Putorius	779
-- vulgaris	812
Myoxus	1052
-- Glis	1053
-- Nitella	1060
-- muscardinus	1079
Nyrmecophaga jubata	209
Nacken	91
Nächtling	1172
Nachtschatten	1154
Näthe	70
Nagende Thiere	179 204. 902
Nagethiere	902
Nahrungsbrey	142
Nahrungssaft	142
Narwall, gemeiner	1218
Nase, äußere	74
— innere	98
Nasenlöcher	75
Nasenschleim	98. 153
Nashorn	188
Natur	3
Naturalien	5
Naturalienkabinet	171
Natürliche Körper	3
Naturgeschichte, was sie sey?	5
Nebenhoden	132
Nebennieren	130
Nerven	41
Nervenhaut des Auges	91
Nervenwärzchen	91
Netze, verschiedene Arten	162.

	Seite
Netz	119
Netzhaut	92
Nickhaut	74
Nielmaus	963. 996
Nieren	129
Nießwurz	—
Nise	1246
Nisus formativus	22
Noctilio ferrum equinum	1187
— hipposideros	1194
Nölling	779
Nörz	838
Nordkaper	1254
Nordländer	193
Nußbeißer	1069
Nutzen der Säugethiere	168
Nycteris	213
Nyctimene	213
Ochs	297
Ochsen, Böhmische	309
— Dänische	307
— Fränkische	308
— Friesländische	308
— gemeine	304
— Polnische	307
— Schweizerische	308
— Thüringische	309
— Ungarische	307
Ohr, äußeres	75
— inneres	138
Ohrendrüsen	139
Ohrenschmalz	153
Opossum	202
Ordnung	176
Ordo	176
Oreillar	1143
Organisirte Körper, was sie sind?	5. 14
— Entstehung	11
— Ernährung	27
— Fortpflanzung	32
— Leben	7
— Structur	6
— Tod	34
— Wachsthum	29
Ornithorhyngus paradoxus	203
Osteologie	104
Ostindianer	195
Otter	821
— greater	822
— lesser	838
Ovis Ammon	357
— Aries	355
Ours	605
Ox	297
Palmata	214
Panzerthier	208
Pansen (Magen)	113
Parforcehund	566
Parforcejagd	166
Parforcepferd	239
Patogonen	193
Pauke im Ohr	95
Pecora	179
Pennantsches System	181
Petit-gris	1075
Pferd	225
--- Arabisches	282
--- Barbarisches	233
--- Dänisches	234
--- Deutsches	226
--- Englisches	234

	Seite
Pferd, Friesländisches	234
--- gemeines	226
--- Hollsteinisches	235
--- Isländisches	236
--- Meklenburgisches	236
--- Neapolitanisches	235
--- Polnisches	235
--- Russisches	235
--- Spanisches	233
--- Thüringisches	237
--- Türkisches	235
--- Ungarisches	235
--- wildes	230
--- für einen Oekonomen	240
Pferdebär	694
Pferdehirsch	453
Pflanzenreich	9
Phoca caspica	1202
— cinerea	1212
— hispida	1212
— leporina	1202
— pusilla	1213
— sibirica	1202
— vitulina	1109. 1212
Phoque à ventre blanc	1216
Phoque	1199
Physiter microps	1340
Pine-Martin	769
Pipistrelle	1178
Pisces	48
Pocken der Schafe	387
Polecat	—
Pommer	551
Porpes	1247
Pottfisch	1254
Poul	1053
Primaten	179
Primates	179
Prachtpferd	240
Prellnetze	165
Psalter (Magen)	113
Pteropus	212
Pürschen	157
Pürschhund	562
Pulsader	123
— große	124
Pulsschlag	145
Pupille	92
Putois	779
Putorius	774
Pyrame	570
Quadrumana	198
Queerfell	115
Rabbet	1120
Rasselmaus	1053
Rassen	177
Rat	931
— black	931
— brown	931
— d'au	980
— gregarious	997
--- rustic	973
Ratte, aschgraue	937
--- geschäckte	934
--- große, wilde, hüpfende	931
--- weiße	934
Ratten	937
Rattenmäuse	931
Rattenschwänzige Mäuse	931

	Seite
Ratz	779. 1053
--- brauner	779
Ratze	731
Raubthiere	180. 200. 542
Raude der Hunde	588
--- Kaninchen	1131
--- Pferde	271
--- Schafe	391
Rauhflügel	1182
Reem	189. 1222
Regnum animale	8
--- minerale	8
--- vegitabile	8
Reh	487
Rehbock	487
Rehe der Pferde	269
Rehnetze	163
Reifen, beinerne	112
Reitpferd	340
Renard	624
Rellmaus	1053
Rennjagd	166
Reproductionskraft	30
Retine	93
Reutmaus	861. 980. 996
--- kleine	996
Rhinoceros unicornis	188
Ringelbär	719
Ringkrankheit	389
Ritter (Hund)	547
Robbe	1197. 1198
--- Buchten	1212
--- Caspischer	1102
--- hasenhaariger	1020
--- kleiner	1213
--- rauher	1212
--- schackiger	1216
Robbe, Sibirischer	1202
Roe	487
Rohm	114
Rohrkolben	462
Rolltuch	165
Roquet	558
Rosaret	748
Rosenack	718
Rosmarus	214
Rosores	304. 845
Rothfuchs	624
Rothhirsch	453
Rothluchs	678. 684
Rotz	263
Rücken	82
Rückenmark	151
Rückgrat	151
Rüsselmaus	978
Ruhr der Rehe	490
Rumpf	82
Runzeln	150
Rundkopf	555
Rupfhasen	1134
Rupicapra	429
Russak	1112
Ruthe (Magen)	113
Ruthe, männliche	131
Saalhund	1198
Saamen, männlicher	138
Saamenthierchen	13
Sammelbeutel d. Milch	121
Sammelkasten	121
Säbelfisch	1257
Sägedelphin	1257
Sägefisch	1257
Säugethiere	47. 50

Seite

Säugethiere mit Fingern oder Zehen 191. 542
--- mit Flughäuten 210. 1142
--- mit Flossenfüßen 214. 1197
— Thüringische 222
Säugethierkalender 1259
Sau, wilde 528
Saubeller 557
Sanglier 528
Satteldrückung 271
Saufinder 553. 557
Saufisch 1251
Saunetze 162
Saurüden 557
Saw-fish 1257
Schaden der Säugethiere 170
Schaf 355
— Englisches 364
— gemeines 385
— Spanisches 363
— wildes 357
Schafreh 365
Schafegel 391
Schäferhund 553
Schärmaus 846
Scharrmaus 846. 980. 996
Scheermaus 980
Scheidewand des Herzens 121
Schenkel 86
Schlafen 101
Schlafratte 1003. 1060. 1069
Schlafratz 1053
Schlag des Herzens 145

Seite

Schlagadern 123
Schlagbäume 324
Schläfer 1052
Schleim, netzförmiger 182
Schlund 112
Schmiervieh 388
Schnabelthier 203
Schnecke im Ohr 97
Schneewiesel 814
Schneidezuhne 131
Schnucken 356
Schörmaus 980
Schooshündchen 571
Schrotthiere 204. 845
Schulterblatt 86
Schuppenthier 209
Schuppotter 838
Schußpferd 239
Schwangerschaft 88
Schwanenhälse 196
Schwanz 84
— Beschaffenheit 84
— Nutzen 85
Schwarzwild 528
Schweif 228
Schwein 504
— gemeine 505
— wilde 525
— zahme 506
Schweinedachse 733
Schweineigel 891
Schweishund 563
Schweiß 153
Schwielen 156
Schwimmfüße 88
Schwindsucht d. Schweine 560
Schwungmaus 213

	Seite
Sciurus	1074
— Glis	1053
— vulgaris	1075
Seal common	1199
Sectiones	176
Seeinhorn	1218
Seehund, Bothnischer	1212
— gemeiner	1198
— gesprenkelter	1199
— grauer	1212
— kleiner, geöhrter	1213
Seejungfer	1203
Seekalb	1188
Seethiere, säugende	180
Seewolf	1198
Sehen	94
Sehnen	98
Sehnerven	94
Seidenbudel	569
Seidenhasen	1134
Seidenhund	569
Seitenzähne	109
Serotine	1170
Serum	142
Sheep common	356
Sheep hornless	355
Shermann	981
Shrew-mouse	861
Siebenschläfer	1059
Silberbär	699
Simia Cynomolgus	199
Sinne bey den Jungen	132
Skelette	172
Solidungula	182. 223
Sorex	864
— araneus	861
— carinatus	885
Sorex constrictus	884
— cunicularius	879
— Eremita	879
— Leucodon	882
— Russulus	863
— tetragonurus	883
Souris	951
Souslic	1043
Spätling	1170
Species	176
Speckhauer	1254
Speckmaus, große	1172
— kleine	1178
Speichel	139
Speicherwiesel	812
Speiseröhre	112
Spielarten	24. 176
Spiegelzeuch	165
Spitz	551
— Wißbader	551
Spitzmaus	860
— gefurchte	885
— gemeine	861
— grabende	879
— weißzähnige	882
— mit dem vierseitigen Schwanze	883
— verkehrtschwänzige	884
Spitzzähne	109
Springer	206. 1246
Schwungfüße	89
Springratte	206
Spürhund	561
Squirrel common	1075
Staatsrobbe	1215
Stammvater der Menschen	191
Stacheln	94

	Seite
Stachelschwein	205
Stachelthier	205
Stänker	779
Stänkerratz	779
Stag	454
Stallfütterung	314
Staupe	591
Stegreif im Ohr	75
Steigbügel	75
Steinbock	400
Stellung der Säugethiere	172
Steindogge	558
Steinesel	282
Steingeiß	409
Steinhase	1112
Steinhund	838
Steinmarder	755
— weißer	759
Steinziege	429
Stier	305
Stimme	127
Stimmritze	127
Stinkthier	202-770
Stoat	798
Stöberhund	576
Stockmaus	996
Stockzähne	109
Stoßmaus	989. 996
— kleine	996
Strandrobbe, graue	1215
— schwarze	1215
Streifjagd	161
Streifmaus	972
Strengel	268
Stute	226
Sturmfisch	154
Sühlhund	198
Sumpfmaus	980
Sumpfotter	838
Sumpfottermarder	838
Sumpfratte	980
Surmulot	944
Sus	504
— sacrofa domesticus	506
— — Aper	528
Sublic	1043
Symmetrie	95
Synthetische Methode	1285
Syrman	1203
System	177
— der Natur	178
Tagschläfer, Preußischer	1053
Talpa	845
— europaea	846
Tannenmarder	769
Tannhirsch	445
Tapir	189
Tatarn	297
Taupe	846
Taumler	1246
Taurus	297
Tellereisen	166
Tellerfallen	167
Teufelskind	779
Theoria epigeneseos	12
— evolutionis	13
— disseminationis	16
— panspermiae	16
Thiere	8
-- Anzahl	48
- einhufige	182. 225
-- menschenähnliche	179

	Seite
Thiere mit einem Pfer- degebiß	179
-- mit Hufen 225.	182
-- mit vier Händen	198
-- harmlose	207
-- ohne Schneidezähne	179
-- vielhufige	188
-- wiederkäuende 114.	179. 183
-- mit Flossenfüßen 214.	1197
-- zahnlose	208
-- zweyhufige 183.	297
Thierreich	8
-- Uebersicht	45
Thränen	152
Thränendrüse	152
Thränenhöhle	74
Thränenpunkte	152
Tollheit der Hunde	591
Tollwurm	592
Traubenhaut des Auges	91
Träume	102
Treibjagd	162
Trichechus Rosmarus	214
Trifselsucher	553
Trigene der Pferde	271
Trommelfell im Ohr	95
Tücher, Dänische	164
Tücher, hohe	164
Tücherlappen	158
Tümmler 1246.	1251
Ulk	779
Umlauf des Bluts	20
Ungulata 225.	182
Unicorn-fish	1218
Unke	779
Unorganisirte Körper	10
-- Aufenthalt	155
-- Entstehung	17
-- Ernährung	30
-- Structur	32
-- Wachsthum	31
Unterleib	—
Urchin	368
Urin	154
Ursus	694
Ursus Arctos	694
-- Gulo	718
-- Meles	729
Varietäten	176
Varrat	536
Vegetabilien	8
Vehe	1127
Venen	1128
Verfangen der Schweine	523
Vermes	48
Vernageln	271
Verstopfung der Hunde	590
Vespertilio 213.	1142
-- auritus	1143
-- Myotis	1154
-- murinus 1155.	1163
-- Noctula	1172
-- serotinus	1170
-- spectrum	212
Vielfraß	718
Vielfraßbär	718
Vielfraßmarder	718
Viehmarder	769
Vison	839
Viverra nasua	203

	Seite
Vollblütigkeit der Schafe	399
Vorderzähne	139
Vorjagd	167
Vögel	47
Vulpes	624
Wachen	101
Wachtelhund	564
-- Englischer	571
-- Spanischer	569
-- -- kleiner	569
Wachthund	554
Währwrlf	622
Waldfuchs	624
Waldhase	1092
Waldmarder	769
Waldmaus	963
-- rothe	1069
Waldratte	963
-- große	944
Waldratz	1053
Waldthier	429
Waldwiesel	791
Wallach	226. 258
Wallfischtödtee	1251
Wallfisch, gemeiner	1225
Wallroß	214
Wampe	113
Wandermaus	944
Wanderratte	944
Wanst	944
Wanstkolik der Schafe	389
Warzen an den Kühen	342
Wasserhund	566. 568
Wasserjagd	157
Wassermaus	980
-- große	944
Wasserratze	980
Wasserspitzmaus	863
Wassersucht der Schafe	390
Wasserwiesel	838
Water-Rat	980
Water-shrew	863
Weesel common	812
Weichen	82
Weißzahn	882
Whale groenland	1225
Wiederkäuende Thiere	179
Wickelschwanz	85
Wiesel, großes	798
-- aschgraues	803
-- großes verkehrtes	803
-- kleines	812
-- Sardinisches	818
-- weißes	798
-- wildes	791
Wild	454
Wildmarder	300
Windhund	574
- Irländischer	576
-- kleiner	576
-- zottiger	575
Windspiel	576
-- Türkisches	578
Winterschlaf	103
Winterschläfer	1096
Witterung	106
Wolf	608
Wolfshund	551. 608
Wolfsnetze	162
Wolle	68
Wolverene	718
Wunden der Hunde	597
Wundernase	1187

	Seite
Wurm der Pferde	266
Würmer	48
Wurmförmige Bewegung	118
Wurzeln der Zähne	109
Wuth der Hunde	591
Ybschen	400
Ybsch Geyß	400
Zähne	109
Zehen	66
Zeidelbär	695
Zeisel	1043
Zeugungswerkzeuge	131
Ziege	400
-- Angorische	424
-- aschgraue	408
Ziesel	1043
Zieselmardar	1043
Zieselmaus	1044
-- gelbliche	1047
-- geperlte	1046
-- getiegerte	1046
-- gewässerte	1046
Zirbeldrüse	157
Zismaus	1144
Zitzen	47
Zoologie	8
Zuchthengst	252
Zuchtstute	250
Zunge	78. 99
Zungenkrebs des Rindviehs	337
-- der Schafe	389
-- der Schweine	524
Zusammenziehen des Herzens	123
Zwerchfell	115
Zwerch	1178
Zwergfledermaus	1178
Zwergpudel	518
Zwitter-	131
Zwölffingerdarm	118

Nachricht für den Buchbinder.

Die Kupfertafeln, worauf die Fährten stehen, werden am Ende zum Herausschlagen eingebunden.

Verbesserungen.

S. 213. Z. 14. st. Noctitio l: Noctilio
— 559. — 24. st. Bragre l. Brague
— 718. st. Taf. VIII. l. Taf. VII. Fig. 1.
— 729. ist Taf. VII. Fig. 2. ausgelassen: der bunte Dachs.
— 791. st. Taf. V. l. Taf. VIII. Fig. 1.
— 802. st. Taf. VI. l. Taf. VII. Fig. 2.
— 838. st. Taf. VII. l. Taf. IX. Fig. 1.
— 921. Z. 2. st. Cavex l. Carex
— 944. Z. 3. fällt Taf. X. Fig. 1. weg
— 1027. Z. 5. st. Murmrutl l. Murmeutl
— 1120. — 2. st. Lullen l. Küllen
— 1120. — 6. st. Lepin l. Lapin
— 1128. — 6. desgl.
— 1170. st. Taf. II. l. Taf. XVII.
— 1182. ist Taf. XVI. Fig. 2. ausgelassen.
— 1187. Z. 6. st. ferum l. ferrum
— — — 17. Naske l. Maske
— 1194. ist Taf. XVII. Fig. 2. ausgelassen.
— 1199. Z. 1. Phaca l. Phoca
— 1218. ist Taf. XIX. ausgelassen.
— 1240. Z. 12. st. Fig. 1. l. Fig. 2.
— 1246. ist Taf. XVIII. Fig. ausgelassen.



2.

Leipziger Maasstab.

3.



Französischer Maasstab.

1. Gemeines Pferd.
2. Gemeiner Ochs.

1

2

Capieux. Del. Sc.

1. Spanisches Schaf.
2. Gems.

Taf. IV.

1. Steinbock.
2. Wildes Schwein.

1. Damhirsch Männchen.
2. Damhirsch Weibchen.

1. Wolf.
2. Rothluchs.

1. Vielfraß.
2. Dachs.

1. Frettchen.
2. Groſses Wieſel.

1. Sumpfotter.
2. Gemeiner Maulwurf.

Capieux del. & fc. 1800.

1. Wasser Spitzmaus.
2. Grabende Spitzmaus.

1. Gemeiner Igel.
2. Meerschweinchen.

Taf. XII.

Capieux. del. et fc. 1800.

1. Brandmaus.
2 Rüsselmaus.

Capieux. Del. a fc. 1800.

1. Alpen Murmelthier.
2. Ohrloses Murmelthier.

1. Siebenschläfer.
2. Gartenschläfer.

1. Haselschläfer.
2. Gemeines Eichhorn.

1. Veränderlicher Hase.
2. Rauchflügelige Fledermaus.

1. Blasse Fledermaus.
2. Kleine Hufeisen Flugmaus.



1. Gemeiner Seehund.
2. Stumpfschnauziger Delphin.

Gemeiner Narwall.



Gemeiner Wallfisch.
Kleinäugiger Cachelot.

1.

2.

3.

4.

Taf. XXII.

5.

6.

7.

8.

Capieux fc. 1800.

9.

10.

11.

12.

a

b

13.

14.



15.



16.

17.

Capieux fe. 1800.

N.

s.

n the

vo, or
naller
ook is

eyond
xpense

sehold of

and re-
M., to 8
from 10
re sun-

ne dol-
time in
d.
brary, can
or returned
ng to the
r received